千金要方

一冊

備急千金要方

江戶醫學影北宋本

光緒戊寅夏五購自東瀛印於上海長洲黃學熙記

影宋本備急千金要方序

蓋聞醫經經方性命所繫固已為至鉅至急擇於醫經經方之書拔其精且善者繫版以被之宇內貽諸後世其為深仁廣澤更何如哉我烈祖好生之德根之天性既圖治於聖經而尤深拳拳乎疾醫一職是以慶元韃橐以還乃遍蒐羅醫籍充諸書府尒来世意佐求迨享保中屢刊布方書以貽後世天下沐其深仁廣澤蓋不唯如膏雨也寛政初載乃一新醫學比年以来百度畢張凡其所以教養勸勉之具靡不至焉但刊印醫書費皆出醫

官私貲無有官刻也臣等濫竽醫僚大懇經方至急而不能擇其書之精且善者廣布諸天下後世無以稱我

大府

列代好生至意也嘗竊攷之晉唐以降醫籍浩繁其存而傳于今者亦復何限求其可以扶翊長沙繩尺百世者蓋莫若孫思邈千金方者爲是書

皇國嚮傳唐代真本惜僅存第一卷其餘寘無聞焉若今所傳係明人傳刻道藏本率意劓政疑誤宏多強分卷帙極失本真亦往往傳元版文字頗亟稍如可觀而仍不免時有疑誤則均未爲精善也獨米澤大守上杉氏所藏宋槧一部較諸元版筆畫端楷更爲清朗撿其趺諱其爲北宋刊本不疑間有乾淳間補刻亦唯寥寥數紙則仍是爲林億等校正之舊釐然可覆按也蓋是本元明以後久既屬絶響是以康熙中張璐撰千金方衍義稱照宋刻本校其文字却同明代坊刻乾隆四庫全書目亦特載道藏本則知其既佚也是本每卷有金澤文庫印記實係北條顯時舊藏原本距今五百餘年而此一部巋然獨存真爲天壤間絶無僅有之祕

笈矣臣等竊以為孫氏書之傳于今者未有若是本精且善者而及今不傳恐日後遂歸晦昧湮滅不可復問寧不大曠厥職上負
大府
列代好生至意乎將同人共商各捐私貲以付
梓也曾聞之
朝而不圖
朝旨為發帑金俾刊之醫學臣等遂此盛舉尤
屬曠典亟倩好手影寫選子弟才俊者雠對點
勘靡日或輟於是僅半歲剞劂告竣其第四卷
止存二葉今從元版補完其指義參緩疑尚有
別風淮雨宜從他本校治者詳加甄録別為考
異以附其後庶乎得失無明来者有所考信焉
蓋病情萬變唯賴文字以見之則一字或失貽
誤不細此録之所以不得已也顧念臣等向校
刊元版千金翼方置之醫學嘗歎為希覯此刻
之成也孫氏之書雙壁相合再顯我
曰域不其偉歟抑知物之顯晦雖有數存焉固
未必不應
昌期以煥發幽光非偶然也臣等不堪躍喜敢
忘駑鈍勉竭消埃竊幸醫學之日以益盛人材
之日以益長人人循真人之津梁究長沙之奥

突則凡在醫官莫不欽賴而在海内為醫者得由以各明其術尊其道焉則

大府

列代之深仁廣澤天下莫不霑濡當代紹述之功衣被於宇内者尤將永古而無窮矣嘉永二季二月十五日侍醫尚藥醫學教諭無智西城侍醫醫學教諭法眼務法眼臣多紀元昕内直醫官醫學教諭法眼臣小島尚質等謹序

朝奉郎守太常卿兼秘閣校理製簽閤檢院上護軍賜緋魚袋臣林億等校正

卷第一 序例

大醫習業第一

大醫精誠第二

治病略例第三

診候第四

處方第五

用藥第六

合和第七

服餌第八

藥藏第九

卷第二 婦人方上

金澤文庫

求子第一　轉女爲男附
妊娠惡阻第二　辨男女　辨將産附
養胎第三　禁忌　滑胎附
妊娠諸病第四　此篇有十章
胎動及數墮胎　漏胞　下血　子煩
心腹腰痛及脹滿　傷寒　瘧病　下痢
小便病
水腫
産難第五　運悶附
子死腹中第六　得病須去胎附
逆生第七
胞衣不出第八
下乳第九
卷第三　婦人方中
虛損第一　盜汗附
虛煩第二
中風第三　心虛驚悸附
心腹痛第四
惡露第五　血瘕附
下痢第六
淋渴第七
雜治第八
卷第四　婦人方下
補益第一
月水不通第二　癥瘕附
赤白帶下崩中漏下第三
月水不調第四
卷第五上　少小嬰孺上

序例第一 擇乳母附
初生出腹第二 拭兒口 治生不作声 斷臍
哺乳 浴兒法并方 鵝口
治生輒死 相兒壽夭 衣兒 裹臍 甘草湯 朱蜜
驚癎第三 中風附
客忤第四 噦病夜啼
驚啼附
傷寒第五 寒熱温瘧附
卷第五下 少小嬰孺下
欬嗽第六
癖結脹滿第七 霍乱附
癰疽瘰癧第八
雜病第九
卷第六上 七竅病上
目病第一

鼻病第二
口病第三 香附
舌病第四
脣病第五 甲煎附
卷第六下 七竅病下
齒病第六
喉病第七 咽附
耳病第八
面病第九
卷第七 風毒脚氣
論風毒狀第一
湯液第二 裹腳方附
諸散第三

酒醴第四
膏第五
卷第八 諸風
論雜風狀第一 痺痙附
諸風第二 風熱 風寒附
賊風第三 歷節附
偏風第四 猥退 攣急 緩弱 腰脚痛附
風痱第五 口禁 失音 口喎 尸厥附
風懿第六
角弓反張第七
風痺第八
卷第九 傷寒方上
傷寒例第一
辟温第二 治瘴霧氣附
傷寒膏第三
發汗散第四
發汗湯第五
發汗丸第六
宜吐第七
宜下第八
發汗吐下後第九
卷第十 傷寒方下
傷寒雜治第一 熱毒 斑出 嘔噦 疏豆瘡 攻手足 毒腫 皐卹 喉閉
勞復第二 口苦 口乾 虛腫 下痢 汗不止 盜汗附 食忌 陰陽易 理髮附
百合第三

傷寒不發汗變成狐惑第四
傷寒發黃第五
溫瘧第六
溪毒證第七
卷第十一 肝臟
肝臟脉論第一
肝虛實第二 肝膽俱虛實附
肝勞第三
筋極第四 筋虛實附
堅癥積聚第五
卷第十二 膽腑
膽腑脉論第一
膽虛實第二 虛煩不得眠附
咽門論第三
髓虛實第四
風虛雜補瀉煎第五 食治方附
卷第十三 心藏
吐血第六
萬病九散第七
心藏脉論第一
心虛實第二 心小腸俱虛實附
心勞第三
脉極第四
脉虛實第五
心腹痛第六
腎痺第七

頭面風第八 頭眩面風髮白生髮白赤禿
卷第十四 小腸腑 大腸腑
小腸腑脉論第一
小腸虛實第二
舌論第三
風眩第四
風癲第五 狂邪針灸圖訣附
心風驚悸第六
好忘第七
卷第十五上 脾藏上
脾藏脉論第一
脾虛實第二 脾胃俱虛實消食附
脾勞第三
肉極論第四
肉虛實第五 脾藏下
卷第十五下 脾藏下
秘澀第六 大小便失禁大小便不通附
熱痢第七
冷痢第八
疳濕痢第九 月蝕瘡附
小兒痢第十
卷第十六 胃腑
胃腑脉論第一
胃虛實第二
噎膈論第三 噦附
反胃第四 酢咽附

嘔吐噦逆第五 惡心附
噎塞第六 哽附
脹滿第七
痼冷積熱第八 寒疝骨蒸附

卷第十七 肺藏

肺藏脉論第一
肺虛實第二 肺與大腸俱虛俱實附
肺勞第三
氣極第四 氣虛實附
積氣第五 七氣 奔豚附 五膈
肺痿第六
肺癰第七
飛尸鬼疰第八

卷第十八 大腸腑

大腸腑脉論第一
大腸虛實第二
肛門論第三
皮虛實第四
欬嗽第五
痰飲第六
九蟲第七 濕蟨附

卷第十九 腎藏

腎藏脉論第一
腎虛實第二 腎與膀胱俱虛實附
腎勞第三
精極第四 精虛實附

骨極第五
骨虛實第六
腰痛第七
補腰第八
卷第二十 膀胱腑
膀胱腑脉論第一
膀胱虛實第二
胞囊論第三
三焦脉論第四
三焦虛實第五
霍亂第六
雜補第七
卷第二十一 尿血 淋閉 水腫
消渴第一 消中 渴利 彊中 渴而不渴而利 渴蒸他病附
淋閉第二 尿遺尿 失禁 尿牀附
尿血第三
水腫第四 腫癰疽
卷第二十二 丁腫
丁腫第一
癰疽第二 毒腫 石癰附
發背第三
丹毒第四 小兒丹附
隱軫第五
瘭疽第六 惡肉 赤脉 惡核 痛病 附骨疽 賊風 風熱毒 洪燭瘡 肥瘡 風疽 漫淫瘡 石疽 癌瘡 骭瘡 瘡因風致腫 骨疽 惡露瘡 反花瘡 代指 指疽 逆臚 尸胗 割甲侵肉附

卷第二十三 痔漏
九漏第一 瘰癧附
腸癰第二 妒乳附
五痔第三
疥癬第四 癮疹赤疵 白癜疵目附
惡疾第五
卷第二十四 解毒并雜治
解食毒第一
解百藥毒第二
解五石毒第三
蠱毒第四
胡臭漏腋第五
脫肛第六
癭瘤第七
癲病第八 陰癪 妒精癪附
卷第二十五 備急
卒死第一 魘溺 中惡 自縊 腭
蛇毒第二 虎 蝮蜂 蠆螋 射工 沙虱 蛭 水毒 猘鬼 蠭螋 馬咬 猘狗毒附
被打第三 從高墮下 竹木刺 著漆附
火癐第四 灸 金癐 毒矢附
卷第二十六 食治
序論第一
果實第二
菜蔬第三
穀米第四
鳥獸第五 蟲魚附

卷第二十七 養性
養性序第一
道林養性第二
居處法第三
按摩法第四
調氣法第五
服食法第六
黃帝雜忌第七
房中補益第八
卷第二十八 平脉
平脉大法第一
診五藏脉輕重第二
指下形狀第三
五藏脉所屬第四
分別病形狀第五
三關主對法第六
五藏積聚第七
陰陽表裏虛實第八
何時得病第九
扁鵲華佗察聲色要訣第十
五藏六腑氣絶證候第十一
四時相反脉第十二
診脉動止投數疎數死期年月第十三
扁鵲診諸反逆死脉要訣第十四
診百病死生訣第十五
三部虛實訣死生第十六

卷第二十九
明堂三人
三陰三陽流注第二上下
針灸禁忌第三
五藏六腑傍通第四
用針略例第五
灸例第六
太醫針灸宜忌第七
卷第三十 針灸下孔穴主對法
頭面第一 項目耳口齒咽喉附
心腹第二 胸脇脹滿消渴水腫大小便泄痢吐血奔肫附 欬逆上氣
四肢第三 手腰脊臂肘肩背膝脚附
風痺第四 癲癎尸厥中惡尸注附
熱病第五 瘧黃疸附 霍乱
癰瘤第六 痔漏陰病附 癩疝
雜病第七
婦人第八 小兒附
備急千金要方目録

新校備急千金要方序

昔神農徧嘗百藥以辨五苦六辛之味逮伊尹而湯液之劑備黃帝欲創九針以治三陰三陽之疾得岐伯而砭艾之法精雖大聖人有意於拯民之瘼必待賢明博通之臣或爲之先或爲之後然後聖人之所爲得行於永久也醫家之務經是二聖二賢而能事畢矣後之留意於方術者苟知藥而不知灸未足以盡治療之體知灸而不知針未足以極表裏之變如能兼是聖賢之編者其名醫之良乎有唐眞人孫思邈者乃其人也以上智之材抱康時之志當太宗治平之際思所以佐廸后庶民之事以謂上醫之道眞聖人之政而王官之一守也而乃祖述農黃之旨發明岐挚之學經掇扁鵲之難方採倉公之禁仲景黃素元化綠袟葛仙翁之必效胡居士之經驗張苗之藥對叔和之脉法皇甫謐之三部陶隱居之

百一自餘郭玉范汪僧坦阮炳上極文字之初下訖有隋之
世或經或方無不採摭集諸家之所秘要去衆說之所未至
成書一部摠三十卷目録一通藏腑之論針艾之法脉證之
辨食治之宜始婦人而次嬰孺先脚氣而後中風傷寒癰疽
消渴水腫七竅之病五石之毒備急之方養性之術摠篇二
百三十二門合方論五千三百首莫不十全可驗四種兼包
厚德過於千金遺法傳於百代使二聖二賢之美不墜于地
而世之人得以階近而至遠上識於三皇之奥者孫眞人善
述之功也然以俗尚險怪我道純正不述剖腹易心之異世
務徑省我書浩博不可道聽塗說而知是以學寡其人寖以
紛靡賢不繼世簡編斷缺不知者以異端見黜好之者以闕
疑輟功恭惟
我朝以好生爲德以廣愛爲仁迺

詔儒臣正是墜學臣等術謝多通職專典校於是請
内府之秘書探道藏之別録公私衆本搜訪幾遍得以正其
訛謬補其遺佚文之重複者削之事之不倫者緝之編次類
聚暮月功至綱領雖有所立文義猶或疑阻是用端本以正
末如素問九墟靈樞甲乙太素巢源諸家本草前古脉書金
匱玉函肘後備急謝士泰刪繁方劉涓子鬼遺論之類事關
所出無不研核尚有所闕而又泝流以討源如五鑒經千金
翼崔氏纂要延年秘録正元廣利外臺秘要兵部手集夢得
傳信之類凡所泝别無不考理互相質正反覆稽參然後遺
文疑義煥然悉明書雖是舊用之惟新可以濟函靈裨
乃聖好生之治可以傳乎太平之文致寔可佐皇極之錫福校
上王廣愛之心非徒為進庶備
讎既成繕寫伊始恭以上進庶備

親覽太子右贊善大夫呂高保衡尚書都官員外郎臣孫奇
尚書司封郎中充秘閣校理臣林億等謹上

新校備急千金要方例
千金方舊有例數十條散在諸篇凡用一法皆宜徧知之雖
素熟其書者臨事尚慮有所遺失況倉卒遘疾按證爲治不
能無未達之惑及新加撰次不可無法今撮集舊凡并新校
之意爲例一篇次於今序之末庶後之施用者無疑滯焉
凡和劑之法有斤兩升合尺寸之數合湯藥者不可不知按
吳有複秤單秤隨有大升小升此制雖復紛紜正惟求之太
深不知其要耳陶隱居撰本草序録一用累黍之法神農舊
秤爲定孫思邈從而用之孫氏生於隋末終于唐永淳中蓋
見隋志唐今之法矣則今之此書當用三兩爲一兩三升爲
一升之制世之妄者乃爲古今之人大小有異所以古人服
藥劑多無稽之言莫此爲甚今之用藥定以三兩爲今一兩
三升爲今一升方中雖皆復有用尺寸處舊例已有準折斤

兩法今則不復重述也
凡古方治疾全用湯法百十之中未有一用散者今世醫工承疑傳謬按湯法咬咀嫣㕮切豆散
湯散未辨宜其多說異端矣須湯以蕩滌長病痼疾須散以漸
法治節攝治擇節卒病賊邪須湯以蕩滌長病痼疾須散以漸
漬此古人用湯液煮散之意也後世醫工惟務力省一切為
散遂忘湯法傳用既久不知其非一旦用湯妄生疑評殊不
知前世用湯藥劑雖大而日飲不過三數服而且方用專一
今人治病劑科雖薄而數藥競進每藥數服以古較今豈不
今反多乎又昔人長將藥者多作煮散法蓋取其積日之功
故每用一方寸匕為一服多不過三方寸匕然而須臾裏
煮時微微振動是古人之意豈須欲多服藥哉又服九之法
大率如梧子者二十九多不過三十四十九及服散者少則
刀圭錢五匕多則方寸而已豈服湯特多煮散丸散則少乎
是知世人既不知斤兩升合之制又不知湯液煮散之法今
從舊例率定以藥二十古兩水一小升煮取今一升五合去
滓分三服自餘利湯欲少水而多取數補湯欲多水而少
取數各依方下別法
凡古經方用藥所有熬練節度皆脚注之今方則不然撮合
諸家之法而為合和一篇更不於方下各注各注則徒煩而不備
集出則詳審而不煩凡合和者於第一卷檢之常用烏頭止
言炮裂此物大毒難循舊制當依治歷節防已湯云凡用烏頭
皆去皮熬令黑乃堪用不然至毒人特宜慎之又桂本畏火
所不可近若婦人姙娠又慮動胎當依惡阻篇茯苓丸方云
姙娠忌桂故熬而用之又方中用大黃者當依治癰疽地黃
凡諸方用藥多出神農本經但古今不同詳略或異施於達

者不假縷陳與衆共之事須詮詔古文從簡則茅黄渾於山吴門冬隱於天麥椒不判於秦蜀荆圂分於牡蔓今則檢從本草各以一二而詳之又近世用藥相承其謬若不辨正爲損滋多求眞朱者罕知朱砂之爲末多以水銀朱充用擇通草者鮮知木通之别號皆以通脫木爲名以杜衡而當細辛用黄耆而得苜蓿白蒺藜棗蒺藜之僞以剌者爲良青木香木香之佳以土者爲惡桂心蓋取其枝中之肉狗脊何尚乎金色之毛山梔子梔子本爲一物訶黎勒訶子元無二條檳榔大腹古昔用之無别枳實枳殼後世曲生異端蚱蟬以聲而命名用啞者則顯知其繆胡麻以國而爲號以烏者正得其眞天南星虎掌名異而實同茵蔯蒿茵蔯名同而實異斯寔藥家之消息爲醫者可不留心又如白朮一物古書惟只言朮近代醫家咸以朮爲蒼朮今則加以白字庶乎臨用無惑矣

凡諸方中用藥間復有不出本草舊經者咸名醫垂記或累世傳良或博聞有驗或自用得力故孫氏不得而棄之傳之方來豈小補哉

凡古名賢治病多用生命以濟災急雖曰賤畜貴人至於愛命人畜一也損彼益已物情同患況於人乎夫殺生求生去生更遠今之此方所以不用生命物爲藥也其虫蟲水蛭輩市有先死者可市而用之不在此例又云用雞子者皆取先破者用之完者無力

凡古今病名率多不同緩急尋檢常致疑阻若不判別何以示衆且如世人呼陰毒傷寒最爲劇病嘗深迹其由然口稱陰毒之名意指少陰之證病實陰易之候命一疾而涉三病以此爲治豈不遠而殊不知陰毒少陰陰易自是三候爲治全別古有方證其說甚明今而混淆害人最急又如腸風藏

毒咳逆慢驚遍稽方論無此名稱深窮其狀腸風乃腸痔下
血藏毒乃痢之蠱毒咳逆者噦逆之名慢驚者陰癇之病若
不知古知今何以為人司命加以古之經方言多雅奧以利
為滯下以蹙為腳氣以瘡為膏肓以喘嗽為欬逆以強直為痙以不
虎為歷節以瞞氣為痛以悒悒為悸以痰為飲以黃為癉諸如
語為癡以緩縱為痱以怔
此類可不討論而況病有數候相類二病同名者哉宜其視
傷寒中風熱病温疫通曰傷寒膚脹鼓脹腸覃石瘕率為水
氣療中風專用乎痰藥指帶下或以為勞疾伏梁不辨乎風
根中風不分乎時疾此今天下醫者之公患也是以別白而
言之
凡方後舊有禁忌法或有或無或詳或略全無類例今則集
諸藥反惡畏忌及諸雜忌為一篇凡服餌者於第一卷檢之
凡下丸散不云酒水飲者本方如此而別說用酒水飲則是
可通用三物服也
凡諸方論咸出前古諸家及唐代名醫加減為用而各有效
今則遍尋諸家有增損不同者各顯注于方下庶後人用之
左右逢其原也
凡諸卷有一篇治數病者今則各以類次仍於卷首目下注
云某病附焉
凡諸方與篇題各不相符者卒急之際難於尋檢今則改其
詮次庶幾歷然易曉
凡諸方有一方數篇重出主治不殊者則去之各有治療者
則云方見某卷某篇
凡諸篇類例之體則論居首脉次之大方在前單方次之針
灸法處末焉緩急檢之繁而不雜也

婦人卷中有虛損一篇補益一篇事涉相類詳而察之亦自有條諸丸大方皆在補益諸湯與前煎盡屬虛損又頭面篇中備載風眩之治小腸腑卷重出風眩一門求之類例不當複出蓋前篇雜疏諸家之法廣記而備言之後篇特記徐嗣伯十方欲後人知所適從耳

凡婦人之病比之男子十倍難治所以別立方也若是四時節氣爲病虛實冷熱爲患者故與丈夫同也其雜病與丈夫同者散在諸卷

凡小兒之病與大人不殊惟用藥有多少爲異甚驚癇客忤解顱不行等八九篇合爲一卷自餘下利等方並散在諸篇中可披而得也

凡針灸孔穴已具明堂篇中其逐篇諸穴多有不與明堂同者及明堂中所無者亦廣記當時所傳得效者耳故不必盡同舊經也

凡諸卷中用字文多假借如乾字作干屎字作矢鉞字作兌其類非一今則各仍舊更不普加改定亦從古之意也

凡諸方論令各檢見所從來及所流派比欲各加題別竊爲非醫家之急今但按文校定其諸書之名則隱而不出以成一家之美焉

備急千金要方序

夫清濁剖判上下攸分三才肇基五行敘落萬物淳朴無得而稱燧人氏出觀斗極以定方名始有火化伏羲氏作因之而畫八卦立庖廚滋味既興痾瘵萌起大聖神農氏愍黎元之多疾遂嘗百藥以救療之猶未盡善黃帝受命創制九針與方士岐伯雷公之倫備論經脉旁通問難詳究義理以爲

經論故後世可得依而
則有扁鵲漢有倉公仲景
微用藥不過二三灸炷不
雖復名醫間出然治十不
心不常婬放縱逸有闕攝
家家自學人人自曉君親
小人多行詭詐倚傍聖教
術之名多教子弟誦短文
闕而邪論叵可怪也嗟乎
造醫門湯藥之資罄盡家
首之年未常釋卷至於切
避慎一事長於已者不遠
悟是以親隣中外有疾厄

暢焉春秋之際良醫和緩六國之時
景魏有華他並皆探賾索隱窮幽洞
一不能愈五六良由今人嗜慾泰甚立
養所致耳余緬尋聖人設教欲使
有疾不能療之者非忠孝也末俗
欺紿遂令朝野士庶咸恥醫
深乖聖賢之本意吾幼遭風冷屢
脈診候採藥合和服餌節度將息
千里伏膺取決至於弱冠頗覺有
者多所濟益在身之患斷絶醫門

故知方藥本草不可不學吾見諸方部秩浩博忽遇倉卒求
檢至難比得方訖疾已不救矣嗚呼痛天枉之幽厄惜墮學
之昏愚乃博採羣經刪裁繁重務在簡易以爲備急千金要
方一部凡三十卷雖不能究盡病源但使留意於斯者亦思
過半矣以爲人命至重有貴千金一方濟之德踰於此故以
爲名也未可傳於士族以貽厥後私門張仲景曰當今居世
之士曾不留神醫藥精究方術上以療君親之疾下以救貧
賤之厄中以保身長全以養其生而但競逐榮勢企踵權豪
孜孜汲汲唯名利是務崇飾其末而忽棄其本欲華其表而
悴其內皮之不存毛將安附進不能愛人知物退不能愛躬
知已卒然遇邪風之氣門戶嬰非常之疾患及禍至而後震慄身
居厄地蒙蒙昧昧競若遊魂降志屈節欽望巫祝告窮歸天
束手受敗齋百年之壽命將至貴之重器委付庸醫恣其所

措咄嗟喑嗚厥身已斃神明消滅変爲異物幽潛重泉徒爲涕泣痛夫舉世昏迷莫能覺悟自肓若是夫何榮勢之哉此之謂也

備急千金要方卷第一序例

朝奉郎守太常少卿充秘閣校理判登聞檢院護軍賜緋魚袋臣林億等校正

大醫習業第一

大醫精誠第二

治病略例第三

診候第四

處方第五

用藥第六

合和第七

服餌第八

藥藏第九

大醫習業第一

凡欲爲大醫必須諳素問甲乙黃帝鍼經明堂流注十二經

脉三部九候五藏六腑表裏孔穴本草藥對張仲景王叔和阮河南范東陽張苗靳邵等諸部經方又須妙解陰陽祿命諸家相法及灼龜五兆周易六壬並須精熟如此乃得爲大醫若不爾者如無目夜遊動致殞次須熟讀此方尋思妙理留意鑽研始可與言於醫道者矣又須涉獵群書何者若不讀五經不知有仁義之道不讀三史不知有古今之事不讀諸子覩事則不能默而識之不讀內經則不知有慈悲喜捨之德不讀莊老不能任眞體運則吉凶拘忌觸塗而生至於五行休王七耀天文並須探賾若能具而學之則於醫道無所滯礙盡善盡美矣矣

大醫精誠第二

張湛曰夫經方之難精由來尚矣今病有內同而外異亦有內異而外同故五藏六腑之盈虛血脉榮衛之通塞固非耳目之所察必先診候以審之而寸口關尺有浮沈絃緊之亂俞穴流注有高下淺深之差肌膚筋骨有厚薄剛柔之異唯用心精微者始可與言於茲矣今以至精至微之事求之於至麤至淺之思其不殆哉若盈而益之虛而損之通而徹之塞而壅之寒而冷之熱而温之是重加其疾而望其生吾見其死矣故醫方卜筮藝能之難精者也既非神授何以得其幽微世有愚者讀方三年便謂天下無病可治及治病三年乃知天下無方可用故學者必須博極醫源精勤不倦不得道聽途說而言醫道已了深自誤哉凡大醫治病必當安神定志無欲無求先發大慈惻隱之心誓願普救含靈之苦若有疾厄來求救者不得問其貴賤貧富長幼妍蚩怨親善友華夷愚智普同一等皆如至親之想亦不得瞻前顧後自慮吉凶護惜身命見彼苦惱若已有之深心悽愴勿避嶮巇晝

夜寒暑飢渴疲勞一心赴救無作功夫形迹之心如此可爲
菩生大醫反此則是舍靈巨賊自古名賢治病多用生命以
濟危急雖曰賤畜貴人至於愛命人畜一也損彼益已物情
同患況於人乎夫殺生求生去生更遠吾今此方所以不用
生命爲藥者良由此也其毒蟲水蛭之屬市有先死者則市
而用之不在此例只如雞卵一物以其混沌未分必有大段
要急之處不得已隱忍而用之能不用者斯爲大折亦所不
及也其有患瘡瘍下痢臭穢不可瞻視人所惡見者但發慙
愧悽憐憂惱之意不得起一念蒂芥之心是吾之志也夫大
醫之體欲得澄神內視望之儼然寬裕汪汪不皎不昧省病
診疾至意深心詳察形候纖毫勿失處判針藥無得參差雖
曰病宜速救要須臨事不惑唯當審諦覃思不得於性命之
上率爾自逞倏快邀射名譽甚不仁矣又到病家縱綺羅滿
目勿左右顧眄絲竹湊耳無得似有所娛珍羞迭薦食如無
味醪醑兼陳看有若無所以爾者夫壹人向隅滿堂不樂而
況病人苦楚不離斯須而醫者安然懽娛傲然自得茲乃人
神之所共恥至人之所不爲斯蓋醫之本意也夫爲醫之法
不得多語調笑談謔謳諱譁道說是非議論人物衒燿聲名訾
毀諸醫自矜已德偶然治差一病則昂頭戴面而有自許之
皃謂天下無雙此醫人之膏肓也老君曰人行陽德人自報
之人行陰德鬼神報之人行陽惡人自報之人行陰惡鬼神
害之尋此貳途陰陽報施豈誣也哉所以醫人不得恃已所
長專心經略財物但作救苦之心於冥運道中自感多福者
耳又不得以彼富貴處以珍貴之藥令彼難求自衒功能諒
非忠恕之道志存救濟故亦曲碎論之學者不可恥言之鄙
俚也

治病略例第三

夫天布五行以植萬類人稟五常以爲五藏經絡腑輸陰陽會通玄冥幽微變化難極易曰非天下之至賾其孰能與於此觀今之醫皆不念思求經旨以演其所知各承家伎始終循舊省病問疾務在口給相對斯須便處湯藥按寸不及尺握手不及足人迎趺陽參動數發息不滿伍拾短期未知決診九候曾無鬄髮明堂闕庭盡不見察所謂窺管而已夫欲視死別生固亦難矣此皆醫之深戒病者可不謹以察之而自防慮也古來醫人皆相嫉害扁鵲爲秦太醫令李醯所得使別醫和合脫或私加毒藥所害即其事也壹醫處方不得壹特須愼之寧可不服其藥令人增疾漸以致困如此者非壹以任天眞不得使愚醫相嫉賊人性命甚可哀傷

夫百病之本有中風傷寒寒熱溫瘧中惡霍亂大腹水腫腸澼下痢大小便不通賁豚上氣欬逆嘔吐黃疸消渴留飲癖食堅積癥瘕驚邪癲癇鬼疰咳逆痺痛齒痛耳聾目盲金瘡踠折癰腫惡瘡瘡痔瘻癭男子五勞七傷虛乏羸瘦女子帶下崩中血閉陰蝕蟲蛇蠱毒所傷此皆大略宗兆其間變動枝葉各依端緒以取之又有冷熱勞損傷飽房勞驚悸恐懼憂恚怵惕又有產乳落胎墮壬瘀血又有貧餌五石以求房中之樂此皆病之根源爲患生諸枝葉也不可不知其本末但向醫說男女長幼之病有半與病源相附會者便可服藥也男子者衆陽所歸常居於燥陽氣遊動強力施泄便成勞損損傷之病亦以衆矣若比之女人則十倍易治凡女子十四已上則有月事月事來日得風冷濕熱四時之病相協者皆自說之不爾與治悞相觸動更增困也處方者亦應問之凡用藥皆隨土地所宜江南嶺表其地暑濕其人肌膚薄脆腠

裏開疎用藥輕省關中河北土地剛燥其人皮膚堅硬腠裏閉塞用藥重複世有少盛之人不避風濕觸犯禁忌暴竭精液雖得微疾皆不可輕以利藥下之一利大重竭其精液困滯著牀動經年月也凡長宿病宜服利湯不須盡劑候利之足則止病源未除者於後更合耳稍有氣力堪盡劑則不論也病源須服利湯取除者服利湯後宜將丸散時時助之凡病服利湯得差者此後愼不中服補湯也若得補湯病勢還復成也更重瀉之則其人重受斃也若初差氣力未甚平復者但消息之須服藥者當以平藥和之夫常患之人不妨行走氣力未甚欲將補益冷熱隨宜丸散者可先服利湯瀉除胷腹中擁積痰實然後可服補藥也夫極虛勞應服補湯者不過三劑即止若治風病應服治風湯者皆非三五劑可知也自有滯風洞虛即服十數劑乃至百餘日可差也故曰

實則瀉之虛則補之

夫二儀之內陰陽之中唯人最貴人者稟受天地中和之氣法律禮樂莫不由人人始生先成其精精成而腦髓生頭圓法天足方象地眼目應日月五藏法五星六腑法六律以心爲中極大腸長一丈二尺以應十二時小腸長二丈四尺以應二十四氣身有三百六十五絡以應一歲人有九竅以應九州天有寒暑人有虛實天有刑德人有愛憎天有陰陽人有男女月有大小人有長短所以服食五穀不能將節冷熱鹹苦更相攻擊變成疾病凡醫診候固是不易又問而知之別病深淺名曰巧醫仲景曰凡欲和湯合藥針灸之法宜應精思必通十二經脉知三百六十孔穴榮衛氣行知病所在宜治之法不可不通古者上醫相色色脉與形不得相失黑乘赤者死赤乘青者生中醫聽聲聲合五音火

聞水聲煩悶干驚木聞金聲恐畏相刑脾者土也生育萬
物迎助四傍善者不見死則歸之太過則四肢不舉不及則
九竅不通六識閉塞猶如醉人四季運轉終而復始下醫
診脉知病元由流轉移動四時逆順相害相生審知藏腑
之微此乃爲妙也

診候第四

夫欲理病先察其源候其病機五藏未虛六腑未竭血脉未
亂精神未散服藥必活若病已成可得半愈病勢已過命將
難全

夫診候之法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脉
未盛絡脉調均氣血未亂精取其脉知其逆順非其時不用
也深察三部九候而明告之古之善爲醫者上醫醫國中
醫醫人下醫醫病又曰上醫聽聲中醫察色下醫診脉又曰
上醫醫未病之病中醫醫已病之病下醫醫已病之病若不
加心用意於事混淆即病者難以救矣何謂三部寸關尺也
上部爲天肺也中部爲人脾也下部爲地腎也何謂九候部
各有三合爲九候上部天兩額動脉主頭角之氣也上部地
兩頰動脉主口齒之氣也上部人耳前動脉主耳目之氣也
中部天手太陰肺之氣也下部地手陽明胃中之氣也中部
人手少陰心之氣也下部地足厥陰肝之氣也下部地足少陰
腎之氣也下部人足太陰脾之氣也合爲九候夫形盛脉細
少氣不足以息者死形瘦脉大胃中多氣者死形氣相得者
生參五不調者病三部九候皆相失者死愚醫不通三部九
候及四時之經或用湯藥倒錯針灸失度順方治病更增他
疾遂致滅亡哀哉蒸民枉死者半可爲世無良醫爲其解釋
經說地水火風和合成人凡火氣不調舉身蒸熱風氣不

調全身彊直諸毛孔閉塞水氣不調身體浮腫氣滿喘麤上氣不調四肢不舉言無音聲火去則身冷風止則氣絶水竭則無血土散則身裂然愚醫不思脉道反治其病使藏中五行共相尅切如火熾然重加其油不可不慎凡四氣合德四神安和一氣不調百一病生四神動作四百四病同時俱發又云一百一病不治自愈一百一病須治而愈一百一病雖治難愈一百一病眞死不治

張仲景曰欲療諸病當先以湯蕩滌五藏六腑開通諸脉治道陰陽破散邪氣潤澤枯朽悅人皮膚益人氣血水能淨萬物故用湯也若四肢病久風冷發動次當用散散能逐邪風氣濕痺表裏移走居無常處者散當平之次當用丸丸藥者能逐風冷破積聚消諸堅癖進飲食調和榮衛能參合而行之者可謂上工故曰醫者意也又曰不須汗而彊汗之者出其津液枯竭而死須汗而不與汗之者使諸毛孔閉塞令人悶絶而死又不須灸而灸與灸之者令人火邪入腹干錯五藏重加其煩而死須灸而不與灸者令人心內懊憹脹滿煩亂浮腫而死又無地消散病篤而死

黃帝問曰淫邪泮衍奈何岐伯對曰正邪從外襲內而未有定舍及淫於藏不得定處與榮衛俱行而與魂魄飛揚使人卧不得安而喜夢也凡氣淫於腑則有餘於外不足於內氣淫於藏則有餘於內不足於外問曰有餘不足有形乎對曰陰盛則夢涉大水而恐懼陽盛則夢蹈大火而燔灼陰陽俱盛則夢相殺毀傷上盛則夢飛揚下盛則夢墮髙甚飽則夢與巢源云夢行甚飢則夢取巢源云夢卧肝氣盛則夢怒肺氣盛則夢

恐懼哭泣心氣盛則夢喜笑及恐畏脾氣盛則夢歌樂體重手足不舉腎氣盛則夢腰脊兩解而不屬凡此十二盛者至而瀉之立已厥氣客於心則夢見丘山煙火客於肺則夢飛揚見金鐵之器奇物客於肝則夢見山林樹木客於脾則夢見丘陵大澤壞屋風雨客於腎則夢見臨淵沒居水中客於膀胱則夢見遊行客於胃則夢見飲食客於大腸則夢見田野客於小腸則夢見聚邑街衢客於膽則夢見鬬訟自刳客於陰器則夢交接鬬內客於項則夢見斬首客於跨則夢見行走而不能前進及池渠穽宻中居客於股則夢見禮節拜跪客於胞脰則夢見溲溺便利凡此拾伍不足者至而補之立已善診候者亦可深思此意乃盡善盡美矣

史記曰病有六不治驕恣不論於理壹不治也輕身重財貳不治也衣食不能適參不治也陰陽并藏氣不定肆不治也

形羸不能服藥五不治也信巫不信醫六不治也生候尚存形色未改病未入腠裏針藥及時能將節調理委以良醫病無不愈

處方第五

夫療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼疰蠱毒以蟲毒藥癰腫瘡瘤以疽瘡瘤藥風濕以風濕藥風勞氣冷各隨其所宜雷公云藥有三品病有三階藥有甘苦輕重不同病有新久寒溫亦異重熱膩滑鹹酢藥石飲食等於風病為治餘病非對輕冷麤澀甘苦藥草飲食等於熱病為治餘病非對輕熱辛苦淡藥飲食等於冷病為治餘病非對其大網略顯其源流自餘覩狀可知臨事制宜當識斯要

藥對曰夫衆病積聚皆起於虛虛生百病積者五藏之所積聚者六腑之所聚如斯等疾多從舊方不假增損虛而勞者

其弊萬端宜應隨病增減古之善爲醫者皆自採藥審其躰
性所主取其時節早晚早則藥勢未成晚則盛勢已歇今之
爲醫不自採藥且不委節氣早晚只共採取用以爲藥又不
知冷熱消息分兩多少徒有療病之心永無必愈之効此實
浮惑聊復審其冷熱記其增損之主耳虛勞而苦頭痛復熱
加枸杞萎蕤虛而欲吐加人參虛而不安亦加人參虛而多
夢紛紜加龍骨虛而多熱加地黃牡蠣地膚子甘草虛而冷
加當歸芎藭乾薑虛而損加鍾乳棘刺肉蓯蓉巴戟天虛而
大熱加黃芩天門冬虛而多忘加茯神遠志虛而驚悸不安
加龍齒紫石英沙參小草冷則用紫石英小草若客熱即用
沙參龍齒不冷不熱無用之虛而口乾加麥門冬知母虛而
吸吸加胡麻覆盆子柏子人虛而多氣兼微欬加五味子大
棗虛而身彊腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加桂心吳茱

萸附子烏頭虛而小便赤加黃芩虛而客熱加地骨皮白水
黃者虛而冷用隴西黃者虛而痰復有氣加生薑半夏枳實
虛而小腸利加桑螵蛸龍骨雞肫胵虛而小腸不利加茯苓
澤瀉虛而溺白加厚朴諸藥無有一一歷而小腸不利之但據躰性
冷熱的相主對聊叙增損之一隅入處方者宜準此

用藥第六

上藥一百二十種爲君主養命以應天無毒多服久服不傷
人欲輕身益氣不老延年者本上經
中藥一百二十種爲臣主養性以應人有毒無毒斟酌其宜
欲退病補虛羸者本中經
下藥一百二十五種爲佐使主治病以應地多毒不可久服
欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經
三品合三百六十五種法三百六十五度每一度應一日以

以成一歲倍其數合七百三十名也
凡藥有君臣佐使以相宣攝合和者宜用一君二臣三佐五使又可一君三臣九佐使也
又有陰陽配合子母兄弟根莖花實草石骨肉有單行者有相須者有相使者有相畏者有相惡者有相反者有相殺者不尒勿合用也又凡此七情合和之時用意視之當用相須相使者良勿用相惡相反者若有毒毋宜制可用相畏相殺者不尒勿合用也又有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱温涼四氣及有毒無毒陰乾暴乾採造時月生熟土地所出真僞陳新並各有法其相使相畏七情列之如左處方之日宜善究之

玉石上部

玉泉 畏款冬花

玉屑 惡鹿茸

丹砂 惡磁石 畏鹹水

曾青 畏菟絲子

石膽 水英為使 桂花辛夷白薇 菌桂 畏牡蠣

雲母 澤瀉為使 及流水 惡鮫甲

鍾乳 蛇牀子 玄石 牡蒙 畏菟絲子 為使 惡牡丹 紫石英 蘘草

朴消 畏麥句薑

消石 苦參 為萊畏女菀

芒消 石韋為使 惡石韋 麥句薑

礬石 甘草 惡牡蠣 為使

滑石 石韋為使 惡曾青

紫石英 長石為使 畏扁青 附子 不欲鮫甲 黄連 麥句薑

白石英 惡大黄 毒公 馬目 畏苦參 長芫花

赤石脂 惡大黄 畏苦參 長芫花

黃石脂 畏畫曾青爲使惡細辛
白石脂 畏蜚蠊扁青附子
太一餘糧 落昌蒲貝母畏鐵
玉石中部
水銀 畏礜石
朩薛 惡防已 畏術
松脂 畏黃芩 鷺糞爲使惡
孔公孽 惡木蘭爲使
陽起石 惡細辛
礜石 畏鉛
凝水石 畏地榆解
石膏 雞子爲使惡 畏黃石 惡牡丹 莽草
磁石 柴胡爲使畏 惡牡丹 莽草
玄石 惡松脂桔梗 畏桂
理石 畏滑石爲使 惡麻黃
桑螵蛸爲使惡澤瀉菌桂
雷丸 蛇蛻皮畏萹蓄絲子
巴豆 畏地榆解 毒

玉石下部
青琅玕 得水銀良 畏銀錫毒 殺雞骨
礜石 得火良 棘掌毒 公驚屎針爲使惡 虎細辛畏水
特生礜石 得火良 畏水
方解石 惡巴豆
代赭 畏天雄
大鹽 編蘆爲使

草藥上部
六芝 署預爲使得髮良 惡恒山畏扁青茵蔯
天門冬 垣衣爲使 畏地曾黃爲青
麥門冬 地黃車前爲使惡款冬 苦瓠畏苦參青蘘
朮 防風地榆爲使
女萎萎蕤 畏鹵鹹

乾地黃 得麥門冬清酒良 惡貝母畏蕪荑
菖蒲 秦艽秦皮爲使 惡地膽麻黃
遠志 得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄 附子毒畏蕪荑
澤瀉 畏海蛤 文蛤
署預 紫芝爲使 惡甘遂
菊花 术枸杞根桑根白皮爲使 惡藜蘆
甘草 术乾漆苦參爲使 反甘遂大戟芫花海藻
人參 茯苓爲使 惡凌雹反黎蘆
石斛 陸英爲使 惡巴豆畏白殭蠶
牛膝 惡焚火龜甲車前 陸英畏車前
細辛 曾青棗根爲使 莫黃耆畏滑石消石反藜蘆
獨活 蠶實爲使
柴胡 半夏爲使 惡皂莢畏女菀藜蘆

菴蕳子 荊子爲使 惡細辛乾薑
薪夷子 得荊子薏故人爲使 惡乾薑苦參
龍膽 貫衆爲使 惡葵地黃
蒐絲子 得酒良署預松脂爲使 惡雚菌
巴戟天 覆盆子爲使 惡朝生雷丸丹參
蒺藜子 烏頭爲使
防風 惡乾薑藜蘆白斂 惡花殺附子毒
絡石 杜仲牡丹爲使 惡鐵落畏菖蒲貝母
黃連 黃芩龍骨良 惡參白斂皮畏款冬勝烏頭解巴豆毒
沙參 惡防已 反藜蘆
丹參 畏鹹水 反藜蘆
天名精 垣衣爲使
決明子 薯蕷爲使 惡大麻子

芎藭 白芷為使
續斷 地黃為使 惡雷丸
黃耆 惡龜甲
杜若 得辛夷細辛良 惡柴胡前胡
蚱牀子 惡牡丹巴豆貝母
茜根 畏鼠姑
飛廉 得烏頭良 惡麻黃
薇銜 得秦皮良
五味子 菱蕤蓉為使惡萇勝烏頭

草藥中部

當歸 惡蘭茹畏菖蒲海藻牡蒙
秦艽 菖蒲為使
黃芩 山茱萸龍骨為使惡葱實畏丹砂牡丹蒸蘆

芍藥 雷丸為使惡石斛芒消畏消石鼈甲小薊反藜蘆
乾薑 秦椒為使惡黃連黃芩天鼠糞殺半夏苡良菖毒
蓇本 惡藭蘆

麻黃 厚朴為使惡辛夷石韋
葛根 殺野葛巴豆百藥毒
前胡 半夏為使惡皂角畏藜蘆
貝母 厚朴白薇為使惡秦艽礬石蒴藋草反烏頭
栝樓 枸杞為使惡牛膝乾漆反藜蘆
玄參 惡黃耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆
苦參 玄參蘆葦為使惡貝母漏蘆反蒴藋蘆
石龍芮 大戟為使惡吳茱萸畏蛇
石韋 滑石杏人為使得昌蒲良
狗脊 蕪薾為使惡敗醬

華蘛薢 惡苡為使 畏葵根大
黃蘗 柴胡 牡蠣 前胡
瞿麥 蕢草 牡丹 惡桑螵蛸 為使
白芷 當歸為使 惡天雄瞿
惡旋復花 志畏茵蔯
紫菀 款冬 為使 惡桑螵蛸桔
麥雷丸 遠志 畏茵蔯
白鮮皮 惡黃耆大棗
梗莽草 乾漆 黃芩 黃連
白薇 惡薑乾漆 大棗 山茱萸
紫參 畏辛夷
仙靈脾 署預為使
款冬花 杏人為使 得紫菀良 惡皂莢 消石 玄參
畏貝母 辛夷 麻黃 黃芩 黃連 黃耆 青葙
牡丹 畏絲子 菀
防已 朮薯為使 惡細辛
畏蘼蕪 藸蘛殺雄黃毒
女菀 畏鹹鹵
鹹
澤蘭 防已為使

地榆 得髮良 惡麥門冬
海藻 反甘草

草藥下部

大黃 黃芩為使
桔梗 節皮為使 畏白及龍膽 龍眼
甘遂 瓜蔕為使 惡甘草
遠志 反甘草
葶藶 榆皮為使 得酒良
惡蠐螬石龍芮
芫花 決明為使
反甘草
澤漆 小豆為使
惡署預
大戟 反甘
草
鉤吻 半夏為使
惡黃芩
藜蘆 黃連為使 反細辛
芎藭草為使 惡大黃
烏頭烏喙 莽草 反半夏 栝樓
貝母 白斂 白及 惡藜蘆

天雄遠志爲使惡腐婢
附子地膽爲使惡蜈蚣畏防風甘草黃耆人參烏韭大豆
貫衆薤菌爲使
半夏射干爲使惡皂莢畏雄黃薑乾薑秦皮龜甲反烏頭生
虎掌蜀漆爲使畏莽草
蜀漆括樓爲使惡貫衆
恒山畏玉札
狼毒蕪荑爲使惡秦艽地榆
白斂代赭爲使反烏頭
白及紫石英爲使惡石李核人杏人
薤菌得酒良畏雞子
蔺茹甘草爲使惡麥門冬
薑草畏鼠婦

木藥上部

夏枯草土瓜爲使
狼毒大豆爲使惡麥句薑
鬼臼畏衣畏垣
茯苓茯神馬蘭爲使惡白斂畏牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲
栢子人牡蠣桂心瓜子爲使畏菊花羊蹄諸石麵麴
杜仲惡玄參蛇蛻
乾漆半夏爲使畏雞子
蔓荊子惡烏頭石膏
牡荊實惡防風爲使畏石膏
五加皮遠志爲使玄參畏蛇蛻
黃蘗惡漆乾
辛夷芎藭爲使惡五石脂畏昌蒲蒲蘭黃連石膏黃環

酸棗人 惡防己

槐子 天雄景天爲使

木藥中部

厚朴 乾薑爲使惡石消石

山茱萸 蔘實爲使惡丹參防風

吳茱萸 蔘實爲使惡丹參消石白堊畏紫石英

秦皮 大戟爲使惡吳茱萸使

占斯 解狼毒毒

梔子 解蜘蹏毒

秦椒 惡栝樓防葵畏蜂黃

桑根白皮 續斷桂心麻子爲使

木藥下部

黃瑾 鼠尾爲使惡茯苓防己

石南 五加皮爲使

巴豆 芫花爲使惡蕤草畏大黃黃連藜蘆殺斑貓毒

蜀椒 杏人爲使惡款冬

欒華 決明爲使

雷丸 荔實厚朴爲使惡葛根

淩霄 漏蘆爲使

皂莢 栢子爲使惡麥門冬畏空青人參苦參

獸上部

龍骨 得人參牛黃良畏石膏

龍角 畏乾漆蜀椒理石

牛黃 人參爲使惡龍骨地黃龍膽蜚蠊畏牛膝

白膠 得火良畏大黃

阿膠 得火良畏大黃

獸中部

犀角 松脂為使惡 藿菌雷丸

羖羊角 莧絲子為使 麻勃為使

鹿茸 杜仲為使

鹿角

獸下部

麋脂 畏大黃惡甘草

蟲魚上部

蜜蠟 惡芫花 齊蛤

蜂子 畏黃芩 藥牡蠣

牡蠣 貝母為使得甘草牛膝遠志 蚶良惡麻黃吳茱萸辛夷

桑螵蛸 畏桑 復花 漆為使畏狗

海蛤 蜀漆為使畏狗 膽甘遂芫花

龜甲 惡沙參 鱉蠍

蟲魚中部

仇retry 惡寒 實雷丸為使

蝟皮 得酒良 梗麥門冬畏桔

蜥蜴 惡硫黃 貓蘇黃

露蜂房 惡乾薑 苓苓為使丹參黃 蘗牡蠣

蠮螉 畏皂莢 昌蒲

蟾蜍 蟲為使 附子

鼈甲 惡礬 石

鮀魚甲 蜀漆為使畏狗 膽甘遂芫花

烏賊魚骨 惡白 及白斂

蟹 殺莨菪 毒漆毒

天鼠糞 惡白 白薇

蟲魚下部

蛇蛻畏磁石及酒

蜣蜋畏羊角石膏

斑猫馬刀爲使畏巴豆丹參空青惡盧青

地膽惡甘草

馬刀得水良

果上部

大棗殺烏頭毒

果下部

杏人得火良惡黃耆黃芩葛根解錫胡粉毒畏莽草

菜上部

冬葵子黃芩爲使

菜中部

葱實解藜蘆毒

米上部

麻蕡麻子畏牡蠣惡五參龍膽得前胡烏喙白薇惡牡蠣良殺烏頭毒

米中部

大豆及黃卷惡杏人

大麥雞蜜使

醬殺藥毒火毒

右一百九十七種有相制使其餘皆無故不備録

或曰古人用藥至少分兩亦輕差病極多觀君處方非不煩重分兩亦多而差病不及古人者何也答曰古者日月長遠藥在土中自養經久氣味眞實百姓少欲禀氣中和感病輕微易爲醫療今時日月短促藥力輕虛人多巧詐感病厚重難以爲醫病輕用藥須少病重用藥即多此則醫之

一隅何足怪也又古之醫有自將採取陰乾暴乾乾皆悉如法用藥必依土地所以治十得九今之醫者但知診脉處方不委採藥時節至於出處土地新陳虛實皆不悉所以治十不得五六者寔由於此夫處方者常須加意重複用藥藥乃有力若學古人徒自誤耳將來學者須詳熟之

凡紫石英白石英朱砂雄黃硫黃等皆須光明映澈色理鮮靜者爲佳不然令人身酥乾燥發熱口乾而死

凡草石藥皆須土地堅實氣味濃烈不爾治病不愈

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳久者良其餘唯須精新也

合和第七

問曰凡和合湯藥治諸草石蟲獸用水升數消殺之法則云何荅曰凡草有根莖枝葉皮骨花實諸蟲有毛翅皮甲頭足尾骨之屬有須燒鍊炮炙生熟有定一如後法順方者福逆之者殃或須皮去肉或去皮須肉或須根莖或須花實依方鍊治極令淨潔然後升合秤兩勿令參差藥有相生相殺氣力有強有弱君臣相理佐使相持若不廣通諸經則不知有好有惡或醫自以意加減不依方分使諸草石強弱相欺入人腹中不能治病更加鬬爭草石相反使人迷亂力甚刀劒若調和得所雖未能治病猶得安利五藏於病無所增劇例曰諸經方用藥所有熬鍊節度皆悉脚注之今方則不然於此篇具條之

凡用石藥及玉皆碎如米粒綿裹內湯酒中

凡鍾乳等諸石以玉搥水研三日三夜漂鍊務令極細

凡銀屑以水銀和成泥

凡礞石赤泥團之入火半日乃熟可用仍不得過之不鍊生
入藥使人破心肝
凡朴消礬石燒令汁盡乃入丸散並消朴消皆絞湯訖內汁
中更上火兩三沸煠盡乃服
凡湯中用丹砂雄黃者熟末如粉臨服內湯中攪令調和服之
凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子之類是也用細核物亦打
碎山茱萸五味子薏核決明子之類是也細花子物正爾完
用之旋復花菊花地膚子葵子之類是也米麥豆輩恋完用之
凡橘皮吳茱萸椒等入湯不咬咀
凡諸果實人皆去尖及雙人者湯柔撻去皮仍切之用梔子
者去皮用蒲黃者湯成下
凡麥門冬生薑入湯皆切三撾絞取汁湯成去滓下之煮
五六沸依如升數不可共藥煮之一法薄切用

凡麥門冬皆微潤抽去心
凡麻黃去節先別煮兩三沸掠去沫更益水如本數乃內餘
藥不爾令人煩寸斬之小草則全用之石斛入丸散者先以碪槌
斬之膏中細剉也
凡牛膝石斛等入湯酒拍碎用之石斛入丸散者先以碪槌
極打令碎乃入曰不爾擣不熟入酒亦然
凡桂厚朴杜仲秦皮木蘭之輩皆削去上虛軟甲錯取裏有
味者秤之茯苓猪苓削除黑皮牡丹巴戟天遠志野葛等皆
槌破去心紫菀洗去土暴乾乃秤之薤白葱白除青令盡菉
草石南茵芋澤蘭剔取葉及嫩莖去大枝鬼臼黃連皆除根
毛石韋辛夷拭去毛辛夷又去心蜀椒去閉口者及目用大
凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥唯赤者

凡菟絲子煖湯淘汰去沙土乾漉煖酒漬經一宿漉出暴微
白擣之不盡者更以酒漬經三五日乃出更曬微乾擣之須
臾悉盡極易碎
凡用甘草厚朴枳實宕南茵芋藜蘆皂莢之類皆炙之而枳
實去穰黎蘆去頭皂莢去皮子
凡用椒實微熬令汗出則有勢力
凡湯丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆熯灰炮令微拆削
去黑皮乃秤之唯薑附湯及膏酒中生用亦削去皮乃秤之
直理破作七八片
凡半夏熱湯洗去上滑一云十洗四破乃秤之以入湯若膏
酒丸散皆熯灰炮之
凡巴豆去皮心膜熬令紫色挑人杏人葶藶胡麻諸有脂膏
藥皆熬黃黑別擣令如膏指撚視泯泯爾乃以向成散稍稍
下曰中合研擣令消散乃復都以輕絹筛之須盡又內曰中
依法擣數百杵也湯膏中雖有生用者並擣破
凡用麥蘗菜麴末大豆黃卷澤蘭蕪荑皆微炒乾漆炒令煙斷
用烏梅入丸散者熬之用熟者去核炙合諸藥擣令細
散不可篩者內散中和之
凡用諸毛羽齒牙蹄甲龜鼈鮫鯉等甲皮肉骨角筋鹿茸等
皆炙之蛇蛻皮微炙
凡用斑猫等諸蟲皆去足翅微熬用桑螵蛸中破炙之牡蠣
熬令黃色殭蠶蜂房微炒之
凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黃須末如粉臨服內湯
中攪令調和服之
凡丸散用膠先炙使通躰沸起燥乃可擣有不沸處更炙之
斷下湯直爾用之勿炙諸湯中用阿膠皆絞湯畢內汁中更

上火兩三沸令炸
凡用蜜先火煎掠去沫令色微黃則丸經久不壞掠之多少隨蜜精麤遂至大稠於丸彌佳
凡丸中用蠟炸投少蜜中攪調以和藥
凡湯中用飴糖皆湯成下諸湯用酒者皆臨熟下之
凡藥有宜丸者宜散者宜湯者宜酒漬者宜膏煎者亦有一物兼宜者亦有不入湯酒者並隨藥性不得違之其不宜湯酒者列之如左

朱砂 湯熟入 雌黃 雲母 陽起石 酒入
礬石 酒入 硫黃 酒入 鍾乳 酒入 孔公孽 酒入
礦石 酒入 銀屑 白堊 銅鏡皐
胡粉 鉛丹 鹵鹹 酒入 石灰 酒入 蔡灰
右石類二十七種

野葛 狼毒 毒公 鬼臼 莽草
葫蕫 酒入 巴豆 蹢躅 酒入 皂莢 酒入 雚菌
藜蘆 茵芋 貫衆 酒入 燕薁 雷丸
狼牙 鳶尾 蔺茹 酒入 女菀 菜耳
紫葳 酒入 薇銜 酒入 白及 牡蒙 飛廉
蛇銜 占其 辛夷 石南 酒入 楝實
虎杖 單漬入酒 虎掌 蓫根 羊桃 酒入 麻勃
苦瓠 瓜蒂 陟釐 狼跋子 酒入 雲實
槐子 酒入 地膚子 蛇牀子 酒入 青葙子 菟蔚子
王不留行 薪莫子 菟絲子 酒入
右草木之類肆拾捌種
蜂子 蜜蠟 白馬莖 狗陰 雀卵
伏翼 鼠婦 鷦雞 雞子 雄鵲

螢火　蠐螬　蠷蠷　蜥蜴
斑猫　芫青　亭長　蛇膽　蚤蟲
蜚蠊　螻蛄　馬刀　豬甽　蝦蟇
蝟皮　生鼠　生龜酒入　蝸牛　諸鳥獸酒入
蟲魚嘗胃骨髓膽屎溺

右蟲獸之類貳拾玖種

古秤唯有銖兩而無分名今則以拾黍爲壹銖陸銖爲壹分此則神農之稱也吳人以貳兩肆分爲壹斤此則神農之稱也吳人以貳兩爲壹兩隋人以參兩爲壹兩今依肆分爲壹兩稱爲定方家凡云等分者皆是丸散隨病輕重所須多少無定銖兩參種伍種皆悉分兩同等耳凡丸散云若干分兩者是品諸藥宜多宜少之分兩非必止於若干之分兩也假令日服參方寸匕須差止是三五兩藥耳凡散藥有云刀圭者拾分方寸匕之一

堆如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落爲度錢匕者以大錢上全抄之若云半錢匕者則是一錢抄取一邊爾並用五銖錢也錢五匕者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落爲度一撮者四刀圭也十撮爲一勺兩勺爲一合以藥外分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分內散藥勿按抑之正爾微動令平調耳今人分藥不復用此凡丸藥有云如細麻大者即胡麻也不必扁扁但令較略大小相稱爾如黍粟者亦然以十六黍爲一大豆也如麻子者即今大麻子準三細麻也如胡豆者今青斑豆也以二大麻子準之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻子準之如大豆者以二小豆準之如梧桐子者以二大豆準之一方寸匕散以蜜和得如梧桐子十丸爲定如彈丸及雞子黃者以十梧桐子準之

凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤之以一分準十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩準一枚杌實若干枚者去穰畢以一分準三枚橘皮一分準三枚棗有大小以三枚準一兩云乾薑一累者以半兩爲正本草云一兩雞正凡方云半夏一升者洗畢秤五兩爲正菴蕳子一升九兩爲正菟絲子一升四茱萸一升五兩爲正蛇牀子一升三兩爲正椒一升三兩爲正吳兩爲正蛇牀子一升三兩半爲正地膚子一升四兩爲正此其不同也云某子一升者其子各有虛實輕重不可通以秤準皆取平升爲正

凡方云桂一尺者削去皮畢重半兩爲正甘草一尺者重三兩爲正云某草一束者重三兩爲正一把者重二兩爲正凡云蜜一斤者有七合猪膏一斤者一升二合

凡湯酒膏藥舊方皆云㕮咀者謂秤畢擣之如大豆又使㕮咀者乃得無末而片粒去細末此於事殊不允當藥有易碎難碎多末少末秤兩則不復均平今皆細切之較略令如㕮咀者乃得無末而片粒調和也凡云末之者謂擣篩如法也

凡丸散先細切暴燥乃擣之有各擣者有合擣者並隨方所言其潤濕藥如天門冬乾地黃輩皆先切暴乾獨擣令偏碎更出細擘暴乾若值陰雨可微火烘之既燥小停冷乃擣之凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得眉乃秤之爲正其湯酒中不須如此

凡篩丸藥用重密絹令細於蜜丸即易熟若篩散草藥用輕疎絹於酒中服即不泥其石藥亦用細絹篩令如丸藥者

凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣之數百過視其色理和同爲佳

凡煮湯當取井華水極令靜潔升斗量勿使多少煮之調

和候火用心一如鍊法
凡煮湯用微火令小沸其水數依方多少大略二十兩藥用
水一斗煮取四升以此爲率皆絞去滓而後酌量也然則利
湯欲生少水而多取汁者爲病須使利所以少水而多取汁
補湯欲熟多水而少取汁者爲病須補益是以多水而少取
汁好詳視之不得令水多少湯熟用新布兩人以尺木絞之
澄去涇濁分再服三服者第二第三服以紙覆令密勿令泄
氣欲服以銅器於熱湯上暖之勿令器中有水氣
凡漬藥酒皆須切細生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑日數
視其濃淺烈便可漉出不必待至酒盡也滓可暴燥微擣更漬
飲之亦可散服
凡建中腎瀝諸補湯滓合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑新
藥貧人當依此用皆應先暴令燥也

凡合膏先以苦酒漬令淹淡不用多汁密覆勿泄云睟時者
周時也從今旦至明旦亦有止壹宿煮膏當參上參下以泄
其熱勢令藥味得出上之使匝匝沸乃下之取沸靜良久乃
止寧欲小生其中有殭白者以兩頭微焦黃爲候有白芷附
子者亦令小黃色爲度猪肪皆勿令經水臘月者彌佳絞膏
亦以新布絞之若是可服之膏膏滓則宜以傳病上此蓋欲兼盡其藥力故也
凡膏中有雄黃朱砂輩皆別擣細研如麪須絞膏畢乃投中
以物疾攪至于凝彊勿使沈聚在下不調也有水銀者於凝
膏中研令消散胡粉亦爾
凡擣藥法燒香洒掃淨潔不得雜語喧呼當使童子擣之務
令細熟杵數可至千萬杵過多爲佳
凡合腎氣署預及諸大補五石大麝香丸金乎散大酒煎膏

等合時煎時並勿令婦人小兒產母喪孝固疾六根不具足人及雞犬六畜等見之大忌切宜愼之其續命湯麻黃等諸小湯不在禁忌之限比來田野下里家因市得藥隨便市上雇人擣合非止諸不如法至於石斛菟絲子等難擣之藥費人功力貨作擣者隱主悉盜棄之又為塵埃穢氣入藥中羅篩麤麤惡隨風飄揚衆品嘗之衆皐鼠之藥精氣宣切都盡與朽木不殊又復服餌不能盡如法服盡之後反加虛損遂謗醫者處方不効夫如此者非醫之咎自緣發意甚誤宜熟思之也

服餌第八

若用毒藥治病先起如黍粟病去即止不去倍之不去拾之取去為度病在胷膈已上者先食而後服藥病在心腹已下者先服藥而後食病在四肢血脉者宜空腹而在旦病在骨髓者宜飽滿而在夜

凡服丸散不云酒水飲者本方如此是可通用也

凡服利湯欲得侵早凡服湯欲得稍熱服之即易消下不吐若冷則吐嘔不下若太熱即破人咽喉務在用意湯必須澄清若濁令人心悶不解中間相去如步行十里久再服若太促數前湯未消後湯來衝必當吐逆仍問病者腹中藥消散乃可進服

凡服湯法大約皆分為三服取三升然後乘病人穀氣彊進一服最須多次一服漸少後一服最須少如此即甚安穩所以病人於後氣力漸微故湯須漸少凡服補湯欲得服三升半晝三夜一中間間食則湯氣既灌百脉易得藥力凡服湯不得太緩太急也又須左右俯仰覆卧各一食頃即湯勢遍行腹中又於室中行皆可一百步許一日勿出外即大益凡服

湯三日常忌酒緣湯忌酒故也凡服治風湯第一服厚覆取汗若得汗即須薄覆勿令大汗中間亦須間食不爾令人無力更益虛羸

凡丸藥皆如梧桐子補者十丸為始從一服漸加不過四十丸過亦損人云一日三度服欲得引日多時不關藥氣漸漬熏蒸五藏積久為佳不必頓服早盡為善徒棄名藥獲益甚少凡人四十以下有病可服瀉藥不甚須服補藥必若有所損不在此限四十已上則不可服瀉藥須服補藥五十已上四時勿關補藥如此乃可延年得養生之術耳其方備在第二十七卷中素問曰實即瀉之虛即補之不虛不實以經調之此其大略也凡有藏腑積聚無問少長須瀉則瀉凡有虛損無問少長須補即補以意量度而用之

凡服藥皆慎猪雞魚油等至差

凡服瀉藥不過以利為度慎勿過多令人下利無度大損人也

凡諸惡瘡差後皆百日慎口不爾即瘡發也

凡服酒藥欲得使酒氣相接無得斷絕絕則不得藥力多少皆以知為度不可令至醉及吐則大損人也

凡服藥皆斷生冷醋滑猪犬雞魚油麪蒜及果實等其矢補丸散切忌陳臭宿滯之物有空青忌食生血物天門冬忌鯉魚白朮忌桃李及雀肉葫荽大蒜青魚鮓等物地黃忌蕪荑甘草忌菘菜海藻細辛忌生菜菟絲子忌菟肉牛膝忌牛肉黃連桔梗忌猪肉牡丹忌葫荽黎蘆忌狸肉半夏昌蒲忌飴糖及羊肉恒山桂心忌生葱生菜商陸忌犬肉茯苓忌醋物柏子人忌濕麪巴豆忌蕎麥麪及猪肉鼈甲忌莧菜

凡服藥忌見死尸及產婦穢汚觸之兼及忿怒憂勞

凡餌湯藥其粥食肉菜皆須大熟熟即易消與藥相宜若生則難消復損藥力仍須少食菜及硬物於藥為佳亦少進鹽醋乃善亦不得苦心用力及房室喜怒是以治病用藥力唯在食治將息得力太半於藥有益所以病者務在將息節慎節慎之至可以長生豈惟愈病而已

凡服瀉湯及諸丸散酒等至食時須食者皆先與一口冷醋飯須更乃進食為佳

凡人忽遇風發身心頓惡或不能言有如此者當服大小續命湯及西州續命排風越婢等湯於無風處密室之中日夜四五服勿計劑數多少亦勿慮虛常使頭面手足腹背汗出不絕為佳服湯之時湯消即食粥粥消即服湯湯亦少與羊肉臛將補若風大重者相續五日五夜服湯不絕即經二日停湯以羹臛自補將息四體若小差即當停藥漸漸將息如其不差當更服湯攻之以差為度

凡患風服湯非得大汗其風不去所以諸風方中皆有麻黃至如西州續命即用八兩越婢六兩大小續命或用一兩三兩四兩故知非汗不差所以治風非密室不得輒服湯藥徒自悞耳惟更加增未見損減矣

凡人五十已上大虛者服三石更生慎勿用五石也四時常以平旦服一二升暖飲終身勿絕又一時勿食蒜油猪雞鵝鴨牛馬等肉即無病矣

藥藏第九

存不忘亡安不忘危大聖之至教求民之瘼恤民之隱賢人之用心所以神農鳩集百藥黃帝纂錄針經皆備預之常道也且人疴瘵多起倉卒不與人期一朝嬰已豈遑知救想諸好事者可貯藥藏用以備不虞所謂起心雖微所救惟廣見

諸世禄之家有善養馬者尚貯馬藥數十斤不見養身者有畜人藥一錙銖以此類之極可媿矣貴畜而賤身誠可羞矣傷人乎不問馬此言安用哉至如人或有公私使命行邁邊隅地既不毛藥物焉出忽逢瘴癘藉素不資貯無以救療遂拱手待斃以致夭殁者斯為自致昔是枉横何者既不能深心以自衛一朝至此何歎惜之晚哉故畜藥菫藥葉藥花藥皮藥子藥五穀五果五菜諸獸齒牙骨角蹄甲皮毛尿屎等藥酥髓乳酪醍醐石蜜沙糖飴糖酒醋膠麴蘗豉等藥右件藥依時收採以貯藏之蟲豸之藥不收採也

秤斗升合鐵臼木臼綃羅紗羅馬尾羅刀砧玉槌瓷鉢大小銅銚鐺金銅鐵匙等

右合藥所須極當預貯

凡藥皆不欲數數曬暴多見風日氣力即薄歇宜熟知之諸藥未即用者候天大晴時於烈日中暴之令大乾以新瓦器貯之泥頭密封須用開取即急封之勿令中風濕之氣雖經年亦如新也其丸散以瓷器貯密蠟封之勿令泄氣則三十年不壞諸杏人及子等藥皆器貯之則鼠不能得之也凡貯藥法皆須去地三四尺則土濕之氣不中也

備急千金要方卷第一

備急千金要方卷第二婦人方上

朝奉郎守太常少卿充秘閣校理判登聞檢院護軍賜紫臣林億等校正

求子第一轉女爲男附

妊娠惡阻第二辨男女辨將產附

養胎第三禁忌滑胎附

妊娠諸病第四此篇有十章胎動及數墮胎

妊娠下血腫胞子煩心腹腰痛及脹滿傷寒雜病小便病下痢水腫附

產難第五運悶附

子死腹中第六得病須去胎附

逆生第七

胞衣不出第八

下乳第九

求子第一 凡論六首 方十五首
一灸法六首 轉女爲男法三首

論曰夫婦人之別有方者以其胎姙生產崩傷之異故也是以婦人之病比之男子十倍難療經言婦人者衆陰所集常與濕居十四已上陰氣浮溢百想經心內傷五藏外損姿顏月水去留前後交互瘀血停凝中道斷絕其中傷墮不可具論生熟二藏虛實交錯惡血內漏氣脉損竭或飲食無度損傷非一或瘡痍未愈便合陰陽或便利於懸厠之上風從下入便成十二痼疾所以婦人別立方也若是四時節氣為病虛實冷熱為患者故與丈夫同也惟懷胎姙而挾病者避其毒藥耳其雜病與丈夫同則散在諸卷中可得而知也然而女人嗜欲多於丈夫感病倍於男子加以慈戀愛憎嫉妒憙染著堅牢情不自抑所以為病根深療之難差故養生之家特須教子女學習此三卷婦人方令其精曉即於君卒之秋何憂畏也夫四德者女子立身之樞機產育者婦人性命之長務若不通明於此則何以免於夭枉者哉故傅母之徒亦不可不學常宜繕寫一本懷挾隨身以防不虞也

論曰人之情性皆願賢已而疾不及人至於學問則隨情逐物墮於事業詎肯專一推求至理莫不虛棄光陰沒齒無益夫婚姻養育者人倫之本王化之基聖人設教備論厥旨後生莫能精曉臨事之日昏爾若愚是則徒願賢已而疾不及人之謬也斯實不達賢已之趣而妄徇虛聲以終無用今具述求子之法以貽後嗣同志之士或可覽焉

論曰夫欲求子者當先知夫妻本命五行相生及與德合并本命不在子休廢死墓中者則求子必得若其本命五行相剋及與刑殺衝破并在子休廢死墓中者則求子了不可得慎無措意縱或得者於後終亦累人若其相生并遇福德者仍須依法如方避諸禁忌則所誕兒子盡善盡美難以具陳

矣禁忌法受胎時日推王相貴宿日法在二十七卷中

論曰凡人無子當爲夫妻俱有五勞七傷虛羸百病所致故有絶嗣之殃夫治之法男服七子散女服紫石門冬丸及坐藥盪胞湯無不有子也

七子散治丈夫風虛目暗精氣衰少無子補不足方

五味子　牡荊子　菟絲子　車前子
薪萯子　石斛　署預　乾地黃
杜仲　鹿茸　遠志 各八銖　附子
蛇牀子　苁蓉 各六銖　山茱萸　天雄
人參　茯苓　牛膝 各五銖
桂心 十銖　巴戟天 十二銖　蒐絲 十銖　鍾乳粉 八銖

右二十四味治下篩酒服方寸匕日二不知增至三匕以知爲度禁如藥法不能酒者蜜和丸服亦得一方加覆盆子八銖求子法一依後房中篇

朴消盪胞湯治婦人立身已來全不產及斷緒久不產三十年者方

朴消　牡丹　當歸　大黃　桃人 生用各三銖
細辛　厚朴　桔梗　赤芍藥　人參
茯苓 二　桂心　甘草　牛膝　橘皮 各一銖
蚤蟲 十枚　水蛭 十枚　附子 六銖

右十八味㕮咀以清酒五升水五升合煮取三升分四服日三夜一每服相去三時更服如常覆被取少汗汗不出冬日著火籠之必下積血及冷赤膿如赤小豆汁本爲婦人子宮內有此惡物令然或天陰臍下痛或月水不調爲有冷血不受胎若斟酌下盡氣力弱大困不堪更服亦可二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿一口即止然恐

去惡物不盡不大得藥力若能忍服盡大好一日後仍著
道寸藥千金翼不用桔梗甘草
治全不產及斷緒服前朴消湯後著坐導藥方
皂莢　山茱萸千金翼作萯　當歸各一兩　細辛
五味子　乾薑各二兩　大黃　礬石　戎鹽
蜀椒各半兩
右十味末之以絹袋盛大如指長三寸盛藥令滿內婦人
陰中坐卧任意勿行走急小便時去之更安新者一日一
度必下青黃冷汁汁盡止即可幸御自有子若未見病出
亦可至十日安之一本別有蔓蘼砒霜各半兩此藥為服
朴消湯恐去冷惡物出不盡以導藥下之值天陰冷不疼
不須著道寸藥亦有著鹽為道寸藥者然不如此藥其服朴
消湯後即安道寸藥經一日外服紫石門冬丸

紫石門冬丸治全不產及斷緒方
紫石英　天門冬各三兩　當歸　芎藭
紫葳　卷柏　桂心　烏頭　乾地黃
牡蒙千金翼作牡蒙外臺作壯蒙荊
禹餘粮　石斛　辛夷各二兩
人參　桑寄生　細辛　厚朴
乾薑　食茱萸　續斷　細辛
署預　烏賊骨　甘草各一兩半　牡丹　牛膝各二十銖　柏子人一兩
右三十六味末之蜜和丸酒服如梧桐子大十丸日三漸
增至三十九以腹中熱為度不禁房室夫行不在不可服
禁如藥法比來服者不至盡劑即有娠
白薇丸主令婦人有子方
白薇　細辛　防風　人參
白斂一云白芷　桂心　牛膝　秦椒
秦艽　蕪荑

沙參 芍藥 五味子 白薑蠶 牡丹
蜚蠊各一兩 乾漆 柏子人 乾薑 卷柏
附子 芎藭各二銖 紫石英各二兩 桃人一兩半 鍾乳
乾地黃 白石英各二兩 鼠婦半兩 水蛭
蚖蟲各十五枚 吳茱萸十銖 麻布叩幔頭燒尺八
右三十二味末之蜜和丸酒服如梧子大十五丸日再稍
加至三十丸當有所去小學
論曰古者求子多用慶雲散承澤丸今代人絕不用此雖未
試驗其法可重故述之
慶雲散主丈夫陽氣不足不能施化施化無成方
覆盆子 五味子各一升 天雄一兩 石斛
白朮一兩三 桑寄生四兩 天門冬九兩 兎絲子一升
紫石英二兩

右九味治下篩酒服方寸匕先食日三服素不耐冷者去
寄生加細辛四兩陽氣不少而無子者去石斛加檳榔十
五枚

承澤丸主婦人下焦三十六疾不孕絕產方
梅核人 辛夷各一升 葛上亭長七枚
澤蘭子五合 溲疏二兩 藁本一兩
右六味末之蜜和丸先食服如大豆二丸日三不知稍增
若腹中無堅癖積聚者去亭長加通草一兩惡甘者和藥
先以苦酒搜散乃內少蜜和為丸
大黃丸主帶下百病無子服藥十日下血二十日下長蟲及
清黃汁三十日病除五十日肥白方
大黃破如米豆熬令黑 柴胡二兩 朴消各二升 芎藭五兩
乾薑一升 蜀椒二兩 茯苓如雞子大一枚

右七味末之蜜和丸如梧桐子大先食服七丸米飲下加至十丸以知爲度五日微下

治女人積年不孕吉祥丸方

天麻一兩　五味子二兩　覆盆子一升　桃花二兩

栝蔞一兩　苦參二兩　牡丹一兩　白朮二兩

桃人一百枚　菟絲子一升　茯苓一兩　楮實子一升

乾地黃一兩　桂心一兩

右十四味末之蜜和丸如豆大每服空心飲若酒下五丸日中一服晚一服

消石大黃丸治十二痕癖及婦人帶下絶產無子并服寒食藥而腹中有癖者當先服大丸下之乃服寒食藥耳大丸不下水穀但下病耳不令人虛極方在第十一卷中

治月水不利閉塞絶產十八年服此藥三十八日有子金城太守白薇丸方

白薇三十銖　人參　杜蘅古今錄驗用牡蠣　牡蒙各十八銖

牛膝半兩　細辛三十銖　厚朴　半夏各十八銖

沙參　乾薑兩各半　白殭蠶十八銖　秦艽一兩半

蜀椒一兩半　當歸十八銖　附子一兩半　防風一兩半

紫菀十八銖

右十七味末之蜜和先食服如梧子大三丸不知稍增至四五丸此藥不長將服覺有娠則止用之大驗崔氏有桔梗丹參十八銖白薇丸主久無子或斷緒上熱下冷百病皆治之方

白薇十八銖　紫石英三十銖　澤蘭　太一餘糧各三兩

當歸一兩　赤石脂一兩　菴蕳子　卷柏各二十銖

藁本　石膏

蛇牀子一兩　桂心二兩半　白芷一兩半　芎藭一兩

細辛三兩　覆盆子

桃人 各二兩半　乾地黃 二兩半　乾薑　蜀椒

車前子 各十八銖　蒲黃　人參 一兩半　白龍骨

遠志　麥門冬　茯苓 各二兩　橘皮 半兩

右二十八味末之蜜和酒服十五丸如梧子大日再漸增
以知爲度亦可至五十丸慎豬雞生冷酢滑魚蒜驢馬牛
肉等覺有娠即停三月正擇食時可食牛肝及心至四月
五月不須不可故殺令子短壽遇得者大良

治婦人絕產生來未產盪滌腑藏使玉門受子精秦椒丸方

秦椒　天雄 各八銖　玄參　人參　白斂

鼠婦　白芷　黃耆　桔梗　露蜂房

白殭蠶　桃人　蠐螬　白薇　細辛

蜚蠊 各一兩　牡蒙　沙參　防風　甘草

牡丹皮　牛膝　卷栢　五味子　芍藥

桂心　大黃　石斛　白朮 各二十銖　栢子人

茯苓　當歸　乾薑 各一兩　澤蘭　乾地黃

芎藭 各一兩十八銖　附子 各二兩　鍾乳 二兩半　水蛭 七枚　蛴蟲 十枚　麻布 覆頭燒 七寸

右四十四味末之蜜丸酒服十丸如梧子日再稍加至二
十丸若有所去如豆汁鼻涕此是病出覺有異即停

婦人絕子灸然谷五十壯在內踝前直下一寸婦人絕嗣不
生胞門閉塞灸關元三十壯報之

婦人雍子不成若墮落腹痛漏見赤灸胞門五十壯在關元
左邊二寸是也右邊二寸名子户

婦人絕嗣不生灸氣門穴在關元傍三寸各百壯

婦人子藏閉塞不受精爽灸胞門五十壯

婦人絕嗣不生漏赤白灸泉門十壯三報之穴在橫骨當陰

論曰陰陽調和二氣相感陽施陰化是以有娠而三陰所會則多生女但姙娠二月名曰始胎血脉不流象形而藏變未有定儀見物而化是時男女未分故未滿三月者可服藥方術轉之令生男也

治婦人始覺有娠養胎并轉女爲男丹參丸方

丹參　續斷　芍藥　白朮　白膠　人參　芎藭　乾薑各三十銖　柏子人各二兩　當歸　橘皮　吳茱萸各一兩十八銖　白芷　蒲黃十八銖　乾地黃一兩半　甘草二兩　犬卵一具　東門上雄雞頭一枚

右十九味末之蜜和丸酒服十九日弄稍加至三十丸如梧子大

又方　取原蠶蟲矢一枚并花水服之日三

又方

取弓弩弦一枚絳囊盛帶婦人左臂一法以繫腰下滿百日去之

又方

取雄黃一兩絳囊盛帶之要女者帶雌黃

又方

以斧一柄於產婦臥牀下置之仍繫勿向下勿令人知如不信者待雞抱卵時依此置於窠下一窠兒子盡爲雄也

姙娠惡阻第二　論二首　法二首　方四首

論曰何以知婦人姙娠脉平而虛者乳子法也經云陰搏陽別謂之有子此是血氣和調陽施陰化也診其手少陰脉動

甚者姙子也少陰心脉也心主血脉又腎名胞門子戸尺中腎脉也尺中之脉按之不絶法姙娠也三部脉沈浮正等按之無絶者有娠也

姙娠初時寸微小呼吸五至三月而尺數也

姙娠四月欲知男女者左疾為男右疾為女左右俱疾為産二子又法左手沈實為男右手浮大為女左右手俱沈實猥生三男俱浮大猥生三女尺脉若左偏大為男右偏大為女左右俱大産二子大者如實狀又法左手尺中浮大者男右手尺中沈細者女若來而斷絶者月水不利又法左右尺俱浮為産二男不然女作男生俱沈為産三女不爾男作女生又法得太陰脉為男得太陽脉為女太陰脉沈太陽脉浮又遣姙娠人面南行還復呼之左迴首者是男右迴首者是女又看上圊時夫從後急呼之左迴首是男右迴首是女又婦人姙娠其夫左乳房有核是男右乳房有核是女

姙娠欲知將産者懷姙離經其脉浮設腹痛引腰脊為今出也但離經者不病也又法欲生其脉離經夜半覺痛日中則生也

論曰凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有淡水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月水尚來顏色肌膚如常但苦沈重憒悶不欲食飲又不知其患所在脉理順時平和則是欲有娠也如此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憒憒頭重眼眩四肢沈重懈墮不欲執作惡聞食氣欲嘔酸鹹酸果實多卧少起世謂惡食其至三四月日已上皆大劇吐逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬於藏藏氣不宣逼故心煩憒悶氣逆而嘔吐也血脉不通經絡否澁則四肢沈重挾風則頭目眩也覺如此候者

便宜服半夏茯苓湯數劑後將茯苓九淡水消除便欲食也
既得食力體強氣盛力足養胎母便健矣古今治阻病方有
十數首不問虛實冷熱長少殆死者活於此方半夏茯苓湯
治娠娠阻病心中憒悶空煩吐逆惡聞食氣頭眩重四肢百
節疼煩沈重多卧少起惡寒汗出疲極黃瘦方

半夏三十銖　茯苓　乾地黃各十八銖　橘皮
細辛　人參　芍藥　旋復花　苦蘞
桔梗　甘草各十二銖　生薑三十銖

右十二味咬咀以水一斗煮取三升分三服若病阻積月
日不得治及服藥冷熱失候病變客熱煩渴口生瘡者去
橘皮細辛加前胡知母各十二銖若變冷下痢者去乾地黃
入桂心十二銖若食少胃中虛生熱大便悶塞小便赤少
者宜加大黃十八銖去地黃加黃芩六銖餘依方服一劑
得下後消息看氣力冷熱增損方調定更服一劑湯便急
服茯苓丸令能食便強健也忌生冷醋滑油膩菘菜海藻
逆吐悶顛倒四肢垂弱不自勝持服之即效要先服半夏茯
苓湯兩劑後可將服此方

茯苓　人參　桂心　黍　乾薑　半夏
橘皮各一兩　白朮　葛根　甘草　枳實各三兩

右十味末之蜜和爲丸如梧子飲服二十丸漸加至三十
丸日三（朋後不用乾薑半夏橘皮白朮葛只五味又云娠忌桂故熬）
治娠娠惡阻嘔吐不下食方

青竹茹　橘皮各八銖　茯苓　生薑各一兩
半夏三十銖

右五味咬咀以水六升煮取三升半分三服不差頻作

治娠嘔吐不下食橘皮湯方

橘皮　竹茹　人參　白朮各十八銖

生薑一兩　厚朴十二銖

右六味咬咀以水七升煮取二升半分三服不差重作

養胎第三論二首　方二十三首
禁忌二首　逐月養胎二十首

論曰舊說凡受胎三月逐物變化稟質未定故娠婦三月欲得觀犀象猛獸珠玉寶物欲得見賢人君子盛德大師觀禮樂鍾鼓徂豆軍旅陳設焚燒名香口誦詩書古今箴誡居處簡靜割不正不食席不正不坐彈琴瑟調心神和情性節嗜慾庶事清淨生子皆良長壽忠孝仁義聰惠無疾斯蓋文王胎教者也

論曰兒在胎日月未滿陰陽未備腑藏骨節皆未成足故自初訖于將產飲食居處皆有禁忌

娠婦食羊肝令子多厄

娠婦食山羊肉令子多病

娠婦食驢馬肉延月

娠婦食騾肉產難

娠婦食犬肉令子無音聲并缺脣

娠婦食兔肉并豆醬令子滿面多黡黶黑子

娠婦食雞子及乾鯉魚令子多瘡

娠婦食雞肉糯米令子多寸白蟲

娠婦食雀肉并鴨子令子倒出心寒

娠婦食雀肉飲酒令子心搖情亂不畏羞恥

娠婦食鼈令子項短

娠婦食冰漿絕胎

娠婦勿向非常地大小便必半產殺人

徐之才逐月養胎方

姙娠一月名始胚飲食精熟酸美受御宜食大麥無食腥辛是謂才正

姙娠一月足厥陰脉養不可針灸其經足厥陰內屬於肝肝主筋及血一月之時血行否澀不為力事寢必安靜無令恐畏

姙娠一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚舉重腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服烏雌雞湯方

烏雌雞一隻 治如食法　茯苓二兩　吳茱萸一升　芍藥

白朮各三兩　麥門冬五合　人參三兩　阿膠二兩

甘草一兩　生薑一兩

右十味㕮咀以水一斗二升煮雞取汁六升去雞下藥煎取三升內酒三升并膠炳盡取三升放温每服一升日三若曾傷一月胎者當預服補胎湯方

細辛一兩　乾地黃　白朮各三兩　生薑四兩　大麥各五合

吳茱萸各五合　烏梅一升　防風二兩

右八味㕮咀以水七升煮取二升半分三服先食服寒多者倍細辛茱萸若熱多渴者去細辛茱萸加栝樓根二兩

姙娠二月名始膏無食辛臊居必靜處男子勿勞百節皆痛是為胎始結

姙娠二月足少陽脉養不可針灸其經足少陽內屬於膽主精二月之時兒精成於胞裏當慎護驚動也

姙娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎悴中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所下乍寒乍熱艾葉湯主之方

艾葉　丹參　當歸　麻黃各二兩　人參

阿膠酪三兩　甘草一兩

右九味㕮咀以酒三升水一斗煮減半去滓內膠煎取三升分三服一方用烏雌雞一隻宿肥者治如食法割頭取血內三升酒中相和雞以水一斗二升先煮取汁去雞內藥煎煮取三升內血酒并膠煎取三升分溫三服

若曾傷二月胎者當預服黃連湯方

黃連　人參酪一兩　生地黃五兩用阿膠一方　吳茱萸五合　生薑三兩

右五味㕮咀以酢漿七升煮取三升分四服日三夜一十日一作若頗覺不安加烏梅一升加烏梅者不用漿直用水耳一方用當歸半兩

婬娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良端坐清虛是謂外象而內感者也

婬娠三月手心主脉養不可針灸其經手心主內屬於心無悲哀思慮驚動

婬娠三月為定形有寒大便青有埶小便難不赤即黃茲驚恐憂愁嗔怒喜頓仆動於經脉腹滿繞臍苦痛或腰背痛卒有所下雄雞湯方

雄雞一隻治如食法　甘草　人參　茯苓　阿膠酪二合　黃芩　白朮酪一兩　麥門冬五合　芍藥四兩　大棗十二枚擘　生薑一兩

右十一味㕮咀以水一斗五升煮雞減半出雞內藥煮取三升分三服一日盡之當溫卧一方用當歸芎各二兩若曾傷三月胎者當預服芩神湯方半內清酒三升并膠煎取三升分三服一日盡之當溫卧若曾傷三月胎者當預服芩神湯方

茯神　丹參　龍骨各一兩　阿膠　當歸
甘草　人參各二兩　赤小豆三十粒　大棗三十枚
右九味㕮咀以酢漿一斗煮取三升分四服先食服七日
後服一劑腰痛者加桑寄生二兩深師有薤白二兩麻子一升
妊娠四月始受水精以成血脉食宜稻粳羹宜魚鴈是謂盛
血氣以通耳目而行經絡
妊娠四月手少陽脉養不可針灸其經手少陽內輸參焦四月
之時兒六腑順成當靜形躰和志節飲食
妊娠四月有寒忽下慍慍欲嘔胃脘滿不欲食有熱小便難
數數如淋狀臍下苦急卒風寒頸項強痛寒熱或驚動身軀
腰背腹痛往來有時胎上迫胷煩不得安卒有所下菊花
湯方
菊花如雞子大一枚　麥門冬一升　麻黃　阿膠各三

人參一兩半　甘草　當歸各二兩　生薑五兩
半夏四兩　大棗十二枚
右十味㕮咀以水八升煮減半內清酒三升并阿膠煎取
三升分三服溫卧當汗以粉粉之護風寒四五日一方用
烏雌雞一隻煮汁煎藥
若曾傷四月胎者當預服調中湯方
白芍藥四兩　續斷　芎藭　甘草各一兩
白朮　柴胡各三兩　當歸半一兩　烏梅一升
生薑四兩　厚朴　枳實　生李根皮各三兩
妊娠五月始受火精以成其氣卧必晏起沐浴浣衣深其居
處厚其衣裳朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和以

茱萸調以五味是謂養氣以定五藏

婦娠五月足太陰脉養不可針灸其經足太陰內輸於脾五月之時見四肢皆成無大飢無甚飽無食乾燥無自灸熱無勞倦

婦娠五月有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢痿痺寒熱胎動無常處腹痛悶頓欲仆卒有所下阿膠湯主之方

阿膠四兩　旋復花二合　麥門冬一升　人參一兩
吳茱萸七合　生薑六兩　當歸　芍藥各二兩
甘草　黃芩各二兩

右十味咬咀以水九升煮藥減半內清酒三升并膠微火煎取三升半分四服日三夜一先食服便愈不差再服一方用烏雌雞一隻割取咽血內酒中以水煮雞以煎藥減半內酒半分四服

曾傷五月胎者當預服安中湯方

黃芩一兩　當歸　苦蔕　人參
乾地黃酪二合　甘草　芍藥酪各三兩　生薑六兩
麥門冬一升　五味子五合　大棗三十五枚　大麻人五合

右十二味咬咀以水七升清酒五升煮取三升半分四服日三夜一七日復服一劑

婦娠六月始受金精以成其筋身欲微勞無得靜處出遊於野數觀走犬及視走馬食宜熟鳥猛獸之肉是謂變腠理紐筋以養其力以堅脊膂

婦娠六月足陽明脉養不可針灸其經足陽明內屬於胃主其口目六月之時見口目皆成調五味食甘美無大飽

婦娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身躰腫驚悸

忽有所下腹痛如欲產手足煩疼宜服麥門冬湯方

麥門冬一升　人參　甘草　黃芩各二兩　乾地黃三兩　阿膠四兩　生薑六兩　大棗十五枚

右八味㕮咀以水七升煮減半內清酒二升并膠煎取三升分三服中間進糜粥一方用烏雌雞一隻煮水以煎藥若曾傷六月胎者當預服柴胡湯方

柴胡四兩　白朮　芍藥一方作紫菀一兩　甘草各二兩　蒄蓉一兩　麥門冬二兩　乾地黃五兩　大棗三十枚　生薑六兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一中間進糜粥勿食生冷及堅硬之物七日更服一劑

婦娠七月始受木精以成其骨勞身搖肢無使定止動作屈伸以運血氣居處必燥飲食避寒常食稻粳密腠理是謂養骨而堅齒

婦娠七月手大陰脉養不可針灸其經手太陰內屬於肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無太言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲

婦娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脉若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項及腰背強葱白湯主之方

葱白十莖長三寸四分　半夏一升　生薑八兩　甘草　當歸　黃耆各三兩　麥門冬一升　阿膠四兩　人參一兩半　黃芩一兩　旋復花一合

右十一味㕮咀以水八升煮減半內清酒三升及膠煎取四升服一升日三夜一温卧當汗出若不出者加麻黃三兩煮服如前法若秋後勿強責汗一方以黃雌雞一隻割咽取血內酒中煮雞取汁以煎藥

若胃傷七月胎者當預服杏人湯方

杏人　甘草　麥門冬　吳茱萸各一升　鍾乳　乾薑各二兩　粳米五合　五味子五合　紫菀二兩

右九味㕮咀以水八升煮取三升半分四服日三夜一中間進食七日服一劑一方用白雞一隻煮汁煎藥

婦娠八月始受王精以成膚革和心靜息無使氣極是謂密腠理而光澤顏色

婦娠八月手陽明脉養不可針灸其經手陽明內屬於大腸主九竅八月之時兒九竅皆成無食燥物無輒失食無忍大起

婦娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或黃或使寒慄腰背苦冷而痛目眩睆巧藥湯主之方

芍藥　生薑各四兩　厚朴二兩　甘草　當歸　白朮　人參各三兩　薤白切一升　葵子二升　生薑六兩　柴胡各三兩　大棗二十枚　厚朴二兩　甘草二兩　芍藥四兩　白朮

右八味㕮咀以水九升煮取三升分三服日三十日一劑一方用烏雌雞一隻煮汁以煎藥

婦娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲醴食甘緩帶自持而待之是謂養毛駿致才力

主續縷九月之時兒脉續縷皆成無處濕冷無著炙衣

婦娠九月足少陰脉養不可針灸其經足少陰內屬於腎腎

姙娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上衝心腰背痛不可轉
側短氣半夏湯方

半夏　麥門冬酌各五　阿膠酌三　乾薑一兩　吳茱萸　當歸
大棗十二枚

右七味㕮咀以水九升煮取三升去滓內白蜜八合微火
上溫分四服痢即止一方用烏雌雞一隻煮汁以煎藥
若曾傷九月胎者當頭服豬腎湯方

豬腎一具　白朮四兩　茯苓　桑寄生　乾薑
乾地黃　苦參酌各三兩　麥門冬一升　附子中者一枚　大豆三合

右十味㕮咀以水一斗煮腎令熟去腎內諸藥煎取三升
半分四服日三夜一十日更一劑
姙娠十月五藏俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使關節
人神皆備但俟時而生
姙娠一月始胚二月始胎三月始胞四月形體成五月能動
六月筋骨立七月毛髮生八月藏腑具九月穀氣入胃十月
諸神備曰滿即產矣宜服滑胎藥入月即服
養胎臨月服令滑易產丹參膏方

丹參半斤　苦參　當歸各三兩　蜀椒五合有熱者以大麻人五合足代

右四味㕮咀以清酒淒濕停一宿以成煎猪膏四升微火
煎膏色赤如血膏成新布絞去滓每日取如棗許內酒中
服之不可逆服至臨月乃可服舊用常驗
甘草散令易生母無疾病未生一月日預服過三十日行步
動作如故兒生墮地皆不自覺方

甘草二兩　大豆黃卷　黃芩一方作茯苓　乾薑　桂心　麻子人
大麥蘗一方用粳米　吳茱萸各三兩

右八味治下篩酒服方寸匕日三煖水服亦得

千金九主養胎及產難顛倒胞不出服一丸傷毀不下產餘病汗不出煩滿不止氣逆滿以酒服一丸良一名保生九方

甘草　貝母　秦椒　乾薑　桂心

黃芩　石斛　石膏　粳米一作糯米　大棗黃卷各六銖

右十二味末之蜜和丸如彈子大每服一丸日三用棗湯下一方用蒲黃二兩

治姙娠養胎令易產蒸大黃丸方

當歸十三銖　麻子三合

大黃三十銖蒸　枳實

芍藥　乾薑

右九味末之蜜丸如梧桐子大空腹酒下二丸日三不知稍加之

芎藭　白朮　杏人各十八銖

厚朴二十銖　吳茱萸一兩

滑胎令易產方

車前子一升　阿膠八兩　滑石二兩

右三味治下篩飲服方寸匕日再至生月乃服藥利九竅不可先服

姙娠諸病第四 凡此篇有十章 方八十九首 灸法三首

治姙娠二三月上至八九月胎動及數墮胎第一方六章 灸法一首

艾葉　阿膠　芎藭　肘後不用芎　當歸各三兩

甘草一兩

右五味㕮咀以水八升煮取三升去滓內膠令消分三服日三

治姙娠胎動去血腰腹痛方

芎藭　當歸　青竹茹各三兩　阿膠二兩

右四味咬咀以水一斗半煮銀二斤取六升去銀內藥煎取二升半內膠令烊分三服不差重作一方用甘草二兩

治妊娠胎動不安腹痛葱白湯方

葱白切一升　阿膠二兩　當歸　續斷

芎藭各三兩

右五味咬咀以水一斗先煮銀六七兩取七升去銀內藥煎取二升半下膠令烊分三服不差重作

治妊娠胎動晝夜叫呼口噤唇黑及下重痢不息方

艾葉咬咀以好酒五升煮取四升去滓更煎取一升服口閉者格口灌之藥下即差亦治妊娠腰痛及妊娠熱病并妊娠卒下血

治妊娠六七月胎不安常服旋復花湯方

旋復花一兩　厚朴　白朮　黃芩　茯苓

枳實各三兩　半夏　芍藥　生薑各二兩

右九味咬咀以水一斗煮取二升半分五服日三夜二先食服

治妊娠數墮胎方

赤小豆末酒服方寸匕日二亦治妊娠數月水尚來者

又妊娠三月灸膝下一寸七壯

漏胞第二方四首

治妊娠下血如故名曰漏胞胞乾便死方

生地黃半斤咬咀以清酒二升煮三沸絞去滓服之

無時能多服佳（姙婦食法崔氏取雌雄一頭治如夫加黃雌血和藥中服）

治妊娠血下不止名曰漏胞胞血盡子死方

乾地黃擣末以三指撮酒服不過三服

又方

生地黃汁一升以清酒四合煮三四沸頓服之不止
頻服

又方

乾地黃四兩　乾薑二兩

右二味治下篩以酒服方寸匕日再三服
子煩第三方二首

治妊娠常苦煩悶此是子煩竹瀝湯方

竹瀝一升　防風

右五味㕮咀以水四升合竹瀝煮取二升分三服不差再作
又方　時時服竹瀝隨多少取差止

心腹腰痛及脹滿第四方三十首

治妊娠心痛方

青竹皮一升以酒二升煮三兩沸頓服之

又方　破生雞子一枚和酒服之

又方

青竹筎一升　羊脂八兩　白蜜三兩

右三味合煎食頃服如棗核大三枚日三

又方　蜜一升和井底泥泥心下

又方　燒棗二七枚末尿服之立愈

治妊娠腹中痛方

生地黃三斤擣絞取汁用清酒一升合煎減半頓服

又方

燒車缸脂內酒中服一升蜜良

治妊娠腹中滿痛入心不得飲食方

白朮六兩　芍藥四兩　黃芩三兩

右三味咬咀以水六升煮取三升分三服半日令藥盡微
下水令易生月飲一劑為善
治妊娠忽苦心腹痛方
燒塩令赤熱三指撮酒服之立產
治妊娠傷胎結血心腹痛方
服小兒尿二升頓服之立差大良
治妊娠中惡心腹痛方
新生雞子二枚破著杯中以糯米粉和如粥頓服亦
不止
治妊娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血
又方 水三升洗夫靴剔汁温服
治妊娠中蟲心腹痛方
燒敗鼓皮酒服方寸匕須臾自呼蟲主姓名

治妊娠腰痛方
大豆二升以酒三升煮取二升頓服之亦治常人卒
腰痛
又方
麻子三升以水五升煮取汁三升分五服亦治心痛
又方
榆白皮(三兩) 豉(二兩)
右二味熟擣蜜丸如梧桐子大服二七丸亦治心痛
又方 燒牛屎焦末水服方寸匕日三服
又方 地黃汁八合酒五合合煎分温服
治妊娠脹滿方
服秤鍾酒良燒之淬酒中服亦治妊娠卒下血

治婬娠傷寒頭痛壯熱肢節煩疼方

石膏八兩　前胡　梔子人　知母㕮咀四兩　大青　黃芩㕮咀三兩　葱白切一升

右七味㕮咀以水七升煮取二升半去滓分五服別相去如人行七八里再服不利

治婬娠頭痛壯熱心煩嘔吐不下食方

生薑根一升　知母四兩　青竹茹三兩　粳米五合　麻黃拌　竹葉切一升　石膏末三升

右三味以水五升煮取一升去滓冷用以拭身躰又以故布揩頭額胷心燥則易之患瘧者加恒山五兩

治婬娠傷寒方

葱白十莖　生薑二兩切

右二味以水三升煮取一升半頓服取汗

治婬娠中風寒熱腹中絞痛不可針灸方

鯽魚一頭燒作灰擣末酒服方寸匕取汗

治婬娠遭時疾令子不落方

取竈中黃土水和塗臍乾復塗之一方酒和塗方五寸又泔清和塗之並佳

又方　犬尿泥塗腹勿令乾

治婬娠熱病方

車轄脂酒服大良

又方

葱白五兩　豉一升

右二味以水六升煮取二升分二服取汗

又方

葱白一把以水三升煮令熟服之取汗食葱令盡亦主安胎若胎已死者須臾即出

又方　水服伏龍肝一雞子大

又方　井底泥泥心下三寸立愈

又方　青羊糞塗腹上

治大熱煩悶者方

葛根汁二升分三服如人行五里進一服

又方　梔實燒灰服方寸匕酒和服

又方　燒大棗七枚末酒和服

瘧病第六　方二首

治妊娠患瘧湯方

恒山二兩　甘草一兩　黄芩三兩　烏梅十四枚　石膏八兩

右五味㕮咀以酒水各一升半合漬藥一宿煮三四沸去滓初服六合次服四合後服二合凡三服

又方

恒山　竹葉各三兩

右四味㕮咀以水六升煮取二升半去滓分三服第一服取未發前一食頃服之第二服取臨欲發服之餘一服用以塗頭額及肩前五心藥滓置頭邊當一日勿近水及進飲食過發後乃進粥食

下血第七　方十一首

治妊娠忽暴下血數升胎燥不動方

榆白皮三兩　當歸　葵子一升後不用　生薑四兩　乾地黄四兩

右五味㕮咀以水五升煮取二升半分三服不差更作服

之甚良

治妊娠卒驚奔走或從高墮下暴出血數升馬通湯方

馬通汁一升　乾地黃四兩　當歸三兩　阿膠四兩　艾葉三兩

右五味㕮咀以水五升煮取二升半去滓內馬通汁及膠令烊分三服不差重作

治妊娠二三月上至七八月其人頓仆失踞胎動不下傷損腰腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心短氣膠艾湯方

阿膠二兩　艾葉三兩　當歸各三兩　芎藭　芍藥　甘草　乾地黃四兩

右七味㕮咀以水五升好酒三升合煮取三升去滓內膠更上火令消盡分三服日三不差更作

治妊娠卒下血方

葵子一升以水五升煮取二升分三服差止

又方

生地黃切一升以酒五升煮取三升分三服亦治落身後血

又方　葵根莖燒作灰以酒服方寸匕日三

治妊娠僵仆失據胎動轉上搶心甚者血從口出逆不得息或注下血一斗五升胎不出子死則寒熨人腹中急如產狀虛乏少氣困頓欲死煩悶反覆服藥母即得安下血亦止其當產者立生蟹爪湯方

蟹爪一升　桂心各二尺　阿膠二兩　甘草

右四味㕮咀以東流水一斗煮取三升去滓內膠烊盡能為一服佳不能者食頃再服之若口急不能飲者格口灌之藥下便活也與母俱生若胎已死獨母活也若不僵仆平安妊娠無有所見下血服此湯即止或云桂不安胎亦

未必爾

治妊娠胎墮下血不止方

丹參十二兩㕮咀以清酒五升煮取三升温服一升日三

又方　地黃汁和代赭末服方寸匕

又方　桑蠶蟲矢燒灰酒服方寸匕

治半産下血不盡苦衆去煩滿欲死香豉湯方

香豉一升半以水三升煮三沸漉去滓內成末鹿角一方七頓服之須臾更血自下鹿角燒亦得

小便病第八　方十五首　灸法一首

治妊娠小便不利方

葵子一升　榆白皮一把切

右二味以水五升煮五沸服一升日三

又方

葵子　茯苓各一兩

右二味末之以水服方寸匕日三小便利則止　仲景云妊娠有水氣身重小便不利洒洒惡寒起即頭眩

治妊娠患子淋方

葵子一升以水三升煮取二升分再服

又方　葵根一把以水三升煮取二升分再服

治妊娠小便不通利方

蕪荑子十合爲末水和服方寸匕日三服

治妊娠尿血方

黍穰燒灰酒服方寸匕日三服

治婦人無故尿血方

龍骨五兩治下篩酒服方寸匕空腹服日三久者二

十服愈

又方

瓜甲　亂髮　鼠婦各一兩　桂心一兩　卷

右三味並燒末等分酒服方寸匕日三飲服亦得

又方

鹿角屑　大豆黃卷

右三味治下篩酒服方寸匕日三服

又方

取去爪甲燒作灰酒服之

又方

取故船上竹箔暴乾擣末酒服方寸匕日三亦主遺尿

治婦人遺尿不知出時方

白薇　芍藥各一兩

右二味治下篩酒服方寸匕日三

又方

胡蘘窠中草燒末酒服半錢匕亦治丈夫

又方

礬石　牡蠣各二兩

右二味治下篩酒服方寸匕亦治丈夫

又方　燒遺尿人薦草灰服之差

又灸橫骨當陰門七壯

下痢第九方八首　灸法一首

治妊娠下痢方

酸石榴皮　黃芩　人參各三兩　櫸皮四兩

粳米三合

右五味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

治婦女患膿血赤滯魚腦白滯臍腹絞痛不可忍者方

薤白 切一升 酸石榴皮 二兩 阿膠 二兩

黃蘗 三兩產寶作黃連 地榆 四兩

右五味㕮咀以水七升煮取二升半分三服不差更作

治婦娠下痢方

白楊皮一斤㕮咀以水一大升煮取二小升分三服

又方 燒中衣帶三寸未服之

又方

羊脂如碁子大十枚温酒一升投中頓服之日三

治婦娠注下不止方

阿膠 艾葉 酸石榴皮 各二兩

右三味㕮咀以水七升煮取二升去滓內膠令烊分三服

治婦娠及產已寒熱下痢方

黃連 外一 梔子 二十枚 黃蘗 斤一

右三味㕮咀以水五升漬一宿煮三沸服一升一日一夜令

盡嘔者加橘皮二兩生薑二兩亦治丈夫常痢

治婦人痢欲痢輒先心痛腹脹滿日夜五六十行方

麴 石榴皮 黃連 艾 各一兩 黃蘗一作麥蘗 烏梅

乾薑 各三兩 附子 五枚 防已 二兩 阿膠

右十味末之蜜和丸飲服如梧子大二十丸日三漸加至

三十四十丸

婦人水腫痢灸氣海百壯三報

水腫第十方五首

治婦娠體腫有水氣心腹急滿湯方

茯苓 白朮 各四兩無朮氏崔 黃芩 三兩 旋復花 二兩

杏人 三兩

右五味咬咀以水六升煮取二升半分三服

治妊娠腹大胎間有水氣鯉魚湯方

鯉魚一頭重二斤 白朮 五兩 生薑 三兩 芍藥

當歸 四兩 茯苓 四兩

右六味咬咀以水一斗二升先煮魚熟澄清取八升內藥

煎取三升分五服

治妊娠毒腫方

蕪菁根淨洗去皮擣酢和如薄泥勿令有汁猛火煮

之二沸適性薄腫以帛急裹之日再易寒時溫覆非根

時用子若腫在咽中取汁含咽之

又方

燒犍牛屎酢和傳之乾則易亦可服方寸匕日三

治妊娠手脚皆腫攣急方

赤小豆 五升 商陸根 切一斤

右二味以水三升煮取一升稍稍飲之盡更作一方加澤

漆一斤

產難第五 論一首八條 法一首 方二十一首

論曰產婦雖是穢惡然將痛之時及未產已產並不得令死

喪汚穢家人來視之則生難若已產者則傷兒也

婦人產乳忌反支月若值此月當在牛皮上若灰上勿令水

血惡物著地則殺人及浣濯衣水皆以器盛過此忌月乃止

凡生產不依產圖脫有犯觸於後母子皆死若不至死即母

子俱病庶事皆不稱心若能依圖無所犯觸母即無病子亦

易養

凡欲產時特忌多人瞻視惟得三二人在傍待趨產訖乃可

告語諸人也若人衆看之無不難產耳

凡產婦第一不得忽忽忙怕傍人極須穩審皆不得預緩預急及憂悒憂愒則難產若腹痛眼中火生此兒迴轉未即生也兒出訖一切人及母皆忌問是男是女兒始落地與新汲井水五咽忌與暖湯物勿令母看視穢汚

凡產婦愼食熱藥熱麪食常識此飲食當如人肌溫溫也

凡欲臨產時必先脫尋常所著衣以籠罩頭及罩口令至密即易產也

凡產難及子死腹中并逆生與胞胎不出諸篇方可通檢用之

不產血氣上搶心母面無顏色氣欲絕者方

右三味合煎取二升分再服不能再服可隨所能服之治

成煎猪膏一升白蜜一升淳酒二升

產後惡血不除上搶心痛煩急者以地黃汁代醇酒

治難產方

槐枝切二升 瞿麥 通草各五兩 牛膝四兩

榆白皮切 大麻人各一升

右六味㕮咀以水一斗二升煮取三升半分五服

治產難累日氣力乏盡不能得生此是宿有病方

赤小豆二升 阿膠二兩

右二味以水九升煮豆令熟去滓內膠令烊一服五合不覺更服不過三服即出

又方

槐子十四枚 蒲黃一合

右二味合內酒中溫服須更不生再服之水服亦得

又方

生地黃汁半升　生薑汁半升

右二味合煎熟頓服之

治產難及日月未足而欲產者方

知母一兩爲末蜜丸如兔屎服一丸痛不止更服丸

治產難方

吞皂莢子二枚

治產難三日不出方

取鼠頭燒作屑井花水服方寸匕日三

又方

車軸脂吞大豆許兩丸

又方

燒大刀鐶以酒一杯沃之頓服即出救死不分兔者

又方　燒藥杵令赤內酒中飲之

治難產方

取廁前已用草二七枚燒作屑水調服之

又方　令夫唾婦口中二七過立出

難產針兩眉井入一寸寫之須臾即分兔

羚羊角散治產後心悶是血氣上衝心方

羚羊角一枚燒作灰下篩以東流水服方寸匕若未差須更服取悶差乃止

又方

羖羊角燒作灰以溫酒服方寸匕不差須更服

方以治產難

治產乳連絕方

半夏一兩擣篩丸如大豆內鼻孔中即愈此是扁鵲法

又方　神麴末水服方寸匕亦治產難

又方

赤小豆擣爲散東流水服方寸匕不差更服

又方　含醡醋潠面即愈凡悶即潠之愈

又方　取醡醋和產血如棗許大服之

治心悶方

產後心悶眼不得開即當頂上取髮如兩指大強以人牽之眼即開

子死腹中第六論一首方論十七首

論曰凡婦人產難死生之候母面赤舌青者兒死母活母脣口青口兩邊沫出者母子俱死母面青舌赤口中沫出者母死子活

治動胎及產難子死腹中并姙兩兒一死一生令死者出生胎安神驗方

蟹爪　甘草二尺　阿膠三兩

右三味以東流水一斗先煮二物得三升去滓內膠令烊頓服之不能分再服若人困拗口內藥藥入即活煎藥作東向竈用葦薪煮之

治子死腹中不出方

以牛屎塗母腹上立出

治子死腹中方

取竈下黃土三指撮以酒服之立出土當著兒頭上出亦治逆生及橫生不出手足先見者

治胎死腹中眞朱湯方

熟眞朱一兩　榆白皮切一升

右二味以苦酒三升煮取一升頓服死胎立出

又方　服水銀三兩立出

又方

三家雞卵各一枚三家鹽各一撮三家水各一升合煮令產婦東向飲之立出

又方　取夫尿二升煮令沸飲之

又方　吞槐子二七枚亦治逆生

又方　酢二升拗口開灌之即出

治產難子死腹中方

葵子一升　阿膠五兩

右二味以水五升煮取二升頓服之未出再煮服

治胎死腹中乾燥著背方

瞿麥一斤以水八升煮取一升服一升不出再服

治妊娠未足月而胎卒死不出其母欲死方

以苦酒濃煮大豆一服一升死胎立出不能頓服分再服一方用醇酒煮大豆亦治積聚成瘕

治妊娠胎死腹中若子生胞衣不出腹中引腰背痛方

甘草一尺　蒲黃一合　筒桂四寸　香豉二升

雞子一枚

右五味以水六升煮取一升頓服之胎胞穢惡盡去大良

治妊娠得病須去胎方

以雞子一枚鹽三指撮和服立下　凡與阮河南療難產同

又方　麥蘖一升末和蜜一升服之立下

又方

七月七日神麴三升酢一升煮兩沸宿不食旦頓服即下

又方

大麥麴五升酒一斗煮三沸去滓分五服令盡當宿

勿食其子如糜令母肥盛無疾苦千金不傳

逆生第七 論一首 方十四首

論曰凡產難或兒橫生側生或手足先出可以針錐刺兒手足入一二分許兒得痛驚轉即縮自當回順也

治逆生方

以塩塗兒足底又可急搔之并以塩摩產婦腹上即愈

又方 以塩和粉塗兒足下即順 子母秘錄云塩和胡粉

又方 梁上塵取如彈丸許二枚治末三指撮温酒服之

治逆生及橫生不出手足先見者

燒蚯蚓脫皮末服一刀圭亦云三指撮面向東酒服即順

又方

以蟬殼二枚治爲末三指撮温酒服 崔氏外臺子母秘錄作彈丸二枚爲末酒服

又方

取夫陰毛二七莖燒以猪膏和丸如大豆吞之兒手即持丸出神驗

又方 蛇蛻皮燒灰猪膏和丸東向服

又方 以手中指取釜底墨交畫兒足下即順生

又方 取父名書兒足下即順生

治橫生及足先出者方

取梁上塵竈突墨酒服之

又方 取車釭中脂書兒脚下及掌中

治縱橫生不可出者方

菟絲子末酒若米汁服方寸匕即生車前子亦好服

如法上

又方 水若酒服竈突黑塵

治產時子但趨穀道者方

熬塩熨之自止

胞胎不出第八 方二 二首

治產兒胞衣不出令胞爛牛膝湯方

牛膝 瞿麥 滑石 當歸 通草 葵子 半夏 白斂

右六味咬咀以水九升煮取三升分三服

治產難胞衣不出橫倒者及兒死腹中母氣欲絕方

右二味治下篩服方寸匕小難一服橫生三服倒生三服

兒死四服亦可加代赭鼈甲各二兩爲佳

治胎死腹中若母病欲下之方

取榆白皮細切煮汁三升分服之即下難生者亦佳

又方

牛膝三兩 葵子一升

右二味以水七升煮取三升分三服

又方

生地黃汁一升苦酒三合令暖服之不能頓服分再服亦得

又方

澤蘭葉三兩 滑石五合 生麻油二合

右三味以水一升半煮澤蘭取七合去滓內麻油滑石頓服之

治胞衣不出方

取小麥合小豆煮令濃飲其汁立出亦治橫逆生者

治逆生胎不出方

取竈屋上墨以酒煮一兩沸取汁服

治胞衣不出方

取瓜瓣二七枚服之立出良

又方　苦酒服眞朱一兩

又方　服蒲黃如棗許以井花水

又方　生男吞小豆七枚生女者十四枚即出

又方

取水煮弓弩弦飲其汁五合即出亦可燒灰酒和服

又方　雞子一枚苦酒一合和飲之即出

又方　墨三寸末之酒服

又方

取宅中所埋柱掘出取坎底當柱下土大如雞子酒和服之良

治產後胞不時出方

井底土如雞子中黃以井花水和服之立出

又方

取井中黃土丸如梧桐子吞之立出又治兒不出

治子死腹中若衣不出欲上搶心方

急取蟻蛭土三升熬之令熱囊盛熨心下令胎不得上搶心甚良

又方

末竈突中墨三指撮以水若酒服之立出當著兒頭生

又方　取炊竈當户前燒服之

又方　取夫內衣蓋井上立出

下乳第九方二十一首

治婦人乳無汁鍾乳湯方

石鍾乳　白石脂銖各六　通草十二銖　桔梗半兩切

消石六銖一方用滑石

右五味㕮咀以水五升煮三沸三上三下去滓內消石令烊分服

治婦人乳無汁漏蘆湯方

漏蘆　通草兩絡二石鍾乳兩　黍米升

右四味㕮咀米宿漬揩撻取汁三升煮藥三沸去滓作飲之日三

治婦人乳無汁單行石膏湯方

石膏四兩研以水二升煮三沸稍稍服一日令盡

又方

通草　石鍾乳

右二味各等分末粥飲服方寸匕日三後可兼養兩兒（通草橫心者是勿取羊桃根色黃無益）

一方二味酒五升漬一宿明旦煮沸去滓服一升日三夏冷服冬溫服

治婦人乳無汁麥門冬散方

麥門冬　石鍾乳　通草　理石

右四味各等分治下篩先食酒服方寸匕日三

治婦人乳無汁漏蘆散方

漏蘆酢　石鍾乳　栝樓根酪一　蟅蟧三合

右四味治下篩先食糖水服方寸匕日三

又方

麥門冬　通草　石鍾乳　理石

大棗　蟅蟧　土瓜根

右七味等分治下篩食畢用酒服方寸匕日三

治乳無汁方

石鍾乳四兩　甘草二兩一方不用　漏蘆三兩　通草五兩

栝樓根五兩

右五味咬咀以水一斗煮取三升分三服一云用栝樓實一枚

又方

母猪蹄一具麁切以水二斗煮熟得五六升汁飲之不出更作

又方

猪蹄二枚熟炙搥碎 通草細切兩

右二味以清酒一斗浸之稍稍飲盡不出更作 外臺猪蹄以水一斗煮取四升入酒四升更煮飲之

又方 栝樓根切一升酒四升煮三沸去滓分三服

又方

取栝樓子尚青色大者一枚熟擣以白酒一斗煮取四升去滓温服一升日三黄色小者用二枚亦好

又方

石鍾乳 通草酪各一兩 瀉蘆半兩 桂心

甘草 栝樓根鏃各六

右六味治下篩酒服方寸匕日三最驗

又方

石鍾乳 瀉蘆酪各三

右二味治下篩飲服方寸匕即下

又方 燒鯉魚頭末酒服三指撮

又方

燒死鼠作胾酒服方寸匕日三立下勿令知

下乳汁鯽魚湯方

鯽魚長七寸 猪肪半斤 瀉蘆八兩 石鍾乳八兩

右四味切猪肪煮不須洗治清酒一斗二升合煮魚熟藥成絞去滓適寒温分五服即乳下飲其間相去須臾一飲令藥力相及

治婦人乳無汁單行鬼箭湯方

鬼箭五兩以水六升煮取四升一服八合日三亦可燒作灰水服方寸匕日三

治婦人乳無汁方

栝樓根三兩　石鍾乳四兩　滑石二兩　通草二兩　漏蘆三兩　白頭翁一兩

右六味治下篩以酒服方寸匕日三

治婦人乳無汁甘草散方

甘草一兩　通草三銖　石鍾乳三十銖　屋上散草二把成灰燒　雲母半兩

右五味治下篩食後温漏蘆湯服方寸匕日三乳下止

又方

土瓜根治下篩服半錢匕日三乳如流水

金澤文庫

備急千金要方卷第三 婦人中

朝奉郎守太常卿兼秘閣校理臣高保衡
朝奉郎守尚書祠部員外郎兼秘閣校理臣孫奇
朝奉大夫守尚書祠部郎中兼秘閣校理臣林億等校正

虛損第一 附盜汗
虛煩第二
中風第三 心悸 虛驚 附
心腹痛第四
惡露第五 附血瘕
下痢第六
淋渴第七
雜治第八

虛損第一 論一首 方二十三條 附一首

論曰凡婦人非止臨產須憂至於產後大須將愼危篤之至其在於斯勿以產時無他乃縱心恣意無所不犯犯時微

金澤文庫

若秋毫感病廣於嵩岱何則產後之病難治於餘病也婦
人產訖五藏虛羸惟得將補不可轉瀉若其有病不須駐藥
若行駐藥轉更增虛就中更虛向生路遠所以婦人產後百
日已來極須慇懃慙憂畏勿縱心犯觸及即便行房若有所
犯必身反強直猶如角弓反張名曰蓐風則是其犯候也若
似角弓命同轉燭凡百女人宜好思之苟或在微不慎戲笑
作病一朝困卧控告無所縱多出財寶遍處求醫醫者未必
解此縱得醫來大命已去何處追尋學者於此一方大須
精孰不得同於常方耳特忌上厠便利宜室中盆上佳
凡產後滿百日乃可合會不爾至死虛羸百病滋長愼之
凡婦人皆患風氣臍下虛冷莫不由此早行房故也
凡產後七日內惡血未盡不可服湯候臍下塊散乃進羊肉
湯有痛甚切者不在此例後三兩日消息可服澤蘭丸比至
滿月丸盡爲佳不爾虛損不可平復也全極消瘦不可救者
服五石澤蘭丸凡在蓐必須服澤蘭丸補之服法必七日外
不得早服也

凡婦人因暑月產乳取涼太多得風冷腹中積聚百病競起
迄至於老百方治不能差桃人煎主之出蓐後服之婦人縱
令無病每至秋冬須服一兩亦產訖可服四順理中丸方

甘草 二兩　人參　白朮　乾薑各一兩

右四味末之蜜和丸如梧子服十丸稍增至二十丸新生
藏虛此所以養藏氣也

桃人煎治婦人產後百疾諸氣補益悅澤方

桃人一千二百枚擣令細熟以上好酒一斗五升研濾三
四遍如作麥粥法以極細爲佳內長頂瓷瓶中密塞以麪

封之內湯中煮一伏時不停火亦勿令火猛使瓶口常出在湯上無令沒之熟訖出溫酒服一合日再服丈夫亦可服之

治婦人虛羸短氣胷逆滿悶風氣石斛地黃煎方

石斛 四兩 生地黃汁 八升 桃人 半升 桂心 二兩
甘草 四兩 大黃 八兩 紫菀 四兩 麥門冬 二升
茯苓 斤 淳酒 八升

右十味爲末於銅器中炭火上熬內鹿角膠一斤耗得一斗次內飴三斤白蜜三升和調更於銅器中釜上煎微耗以生竹攪無令著耗令相得藥成先食酒服如彈子一丸日三不知稍加至三丸一方用人參三兩

治婦人產後欲令肥白飲食平調地黃羊脂煎方

生地黃汁 斗 生薑汁 五升 羊脂 二斤 白蜜 五升

右四味先煎地黃令得五升次內羊脂合煎減半內薑汁復煎令減合蜜著銅器中煎如飴取雞子大一枚投熟酒中服日三

地黃酒治產後百病未產前月當預釀之產訖蓐中服之方

地黃汁 斗 好麴 一斤 好米 二升

右三味先以地黃汁漬麴令發淮家法醞之至熟封七日取清服之常使酒氣相接勿令斷絕愼蒜生冷酢滑豬雞魚一切婦人皆須服之但夏三月熟不可合春秋冬並得合服地黃并滓內米中炊合用之一石十石一淮此一升爲率先服羊肉當歸湯三劑乃服之佳

治產後虛羸喘乏百汗出腹中絞痛羊肉湯方

肥羊肉 三斤 去脂 當歸 一兩 用慈白 桂心 二兩 姚氏
甘草 二兩 生薑 四兩

芍藥 四兩子母秘錄作慈白

苓鶉三兩子毋秘錄作豉一升

右八味㕮咀以水一斗半先煮肉取七升去肉內餘藥煮取三升去滓分三服不差重作千金翼有慈白一斤子毋秘錄若胷中微熱加黃芩麥門冬各一兩頭痛加石膏一兩中風加防風一兩大便不利加大黃一兩小便難加葵子一兩上氣欬逆加五味子一兩

治產後虛羸喘乏乍寒乍熱病如瘧狀名爲蓐勞猪腎湯方

猪腎一具去脂四破無則用羊腎代

白粳米

右四味以水三斗煮取五升去滓任情服之不差更作廣濟方有人參當歸各二兩爲六味

羊肉湯治產後虛羸補益方

羊肉三斤

黃耆三兩

大棗三十枚

茯苓

甘草

當歸

桂心

芍藥

麥門冬

乾地黃各兩

乾地黃五兩

右十味㕮咀以水二斗煮羊肉取一斗去肉內諸藥煎取三升去滓分三服日三

鹿肉湯治產後虛羸勞損補乏方

鹿肉四斤

人參

當歸各二兩

麥門冬

茯苓各二兩

生薑二兩

右十三味㕮咀以水二斗五升煮肉取一斗三升去肉內藥煎煮取五升去滓分四服日三夜一

治產後虛乏五勞七傷虛損不足藏腑冷熱不調麞骨湯方

麞骨一具

遠志

防風

乾薑

茯苓一作伏神各三兩

厚朴

當歸

橘皮

甘草

獨活

芍藥 兩各二　桂心

右十五味㕮咀以水三斗煮麞骨取二斗去骨內藥煎
取五升去滓分五服

當歸芍藥湯治產後虛損逆害飲食方

當歸 一兩半　芍藥 一兩各一　生薑 兩各四

生薑　甘草 炙　人參

右八味㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服日三

治產後虛氣杏人湯方

杏人　橘皮　白前　人參 兩各三　桂心 兩四

蘇葉 一升半　夏 一升　生薑 兩十　麥門冬 一兩

右九味㕮咀以水一斗二升煮取三升半去滓分五服

治產後上氣及婦人賁豚氣積勞藏氣不足肖中煩躁開
元以下如懷五千錢狀方

厚朴　桂心

芍藥　石膏 兩各二

澤瀉 兩各二　吳茱萸 五兩洗

枯梗 三兩　乾薑 一兩

右十三味㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服服
三劑佳

當歸　細辛

甘草　黃芩

治產後七傷虛損少氣不足并主腎勞寒冷補益氣乳蜜湯方

牛乳 七升無則用羊乳　當歸　人參

獨活 各三兩　大棗 二十枚　甘草　桂心 兩各二

右㕮咀諸藥以乳蜜中煮取三升去滓分四服

治產後虛冷七傷時寒熱體痛乏力補腎并治百病五石
湯方

紫石英　鍾乳　白石英　赤石脂

石膏　茯苓　白朮　桂心
芍藥　甘草（各二兩）　薤白（陸兩）　人參
當歸（各三兩）　生薑（八兩）　大棗（二十枚）

右拾伍味五石並末之諸藥各㕮咀以水壹斗二升煮取三升六合去滓分六服若中風加葛根獨活各二兩下痢加龍骨一兩

三石湯主病如前方

紫石英（二兩）　白石英（二兩半）　鍾乳（二兩半）　生薑
當歸　甘草（二兩）　茯苓
人參　半夏（五兩）　大棗（十五枚）
乾地黃　桂心（各三兩）

右十二味三石末之㕮咀諸藥以水一斗二升煮取三升去滓分四服若中風加葛根四兩

內補黃耆湯主婦人七傷身體疼痛小腹急滿面目黃黑不能食飲并諸虛乏不足少氣心悸不安方

黃耆　芍藥　乾地黃
半夏（各三兩）　當歸　人參　桂心
遠志　茯苓　甘草　五味子
白朮　麥門冬、　澤瀉（各二兩）　乾薑（四兩）　大棗（三十枚）

右十六味㕮咀以水一斗半煮取三升去滓一服五合日三夜一服

治產後虛羸盜汗濇濇惡寒吳茱萸湯方

吳茱萸三兩以清酒三升漬一宿煮如蟻皆沸減半得二升許中分之頓服一升日再間日再作服亦治產後腹中疾痛

治產後體虛寒熱自汗出豬膏煎方

豬膏（一升）　生薑汁（一升五合）　清酒（一升）　白蜜（一升）

右四味煎令調和五上五下膏成隨意以酒服方寸匕當
炭火上熬
鯉魚湯主婦人體虛流汗不止或時溢汗方
鯉魚二升 葱白切一升 豉一升 乾薑二兩 桂心二兩
右五味咬咀三物以水一斗煮魚取六升去滓分再服取微汗即愈勿用生魚
火煮取二升去滓分再服取微汗即愈勿用生魚
治產後風虛汗出不止小便難四肢微急難以屈伸者桂枝
加附子湯方
桂枝 芍藥各三兩 甘草一兩半 附子二枚
生薑三兩 大棗十二枚
右六味咬咀以水七升煎取三升分爲三服
虛煩第二方十首
薤白湯治產後胷中煩熱逆氣方

薤白 半夏 甘草 人參
知母各二兩 石膏四兩 栝樓根三兩 麥門冬半升
右八味咬咀以水一斗三升煮取四升去滓分五服日三
夜二熱甚即加石膏知母各一兩
竹根湯治產後虛煩方
甘竹根細切一斗 小麥二升 大棗二十枚 人參當歸湯治產後煩悶不安方
小麥二升大棗二十枚復煮麥熟三四沸內甘草一
兩麥門冬二升湯成去滓服五合不差更服取差短
氣亦服之
人參 當歸
乾地黃各一兩 大棗二十个 粳米一升 麥門冬 桂心
芍藥四兩 淡竹葉三升

右九味咬咀以水一斗二升先煮竹葉及米取八升去滓
內藥煮取三升去滓分三服若煩悶不安者當取豉一升
以水三升煮取二升盡服之甚良

甘竹茹一升　人參　茯苓　甘草各一兩　黃芩三兩

右五味咬咀以水六升煮取二升去滓分三服日三
服湯治產後下寒乍熱通身温壯肖心煩悶方

知母三兩　芍藥　黃芩各二兩　桂心　甘草各一兩

右五味咬咀以水五升煮取二升半分三服一方不用桂
心加生地黃

竹葉湯治產後心中煩悶不解方

生淡竹葉　麥門冬各三升　甘草二兩　生薑

茯苓各三兩　大棗十四个　小麥五合

右柒味咬咀以水壹斗先煮竹葉小麥取八升內諸藥煮取
三升去滓分三服若心中虛悸者加人參二兩其人食少
無穀氣者加粳米五合氣逆者加半夏二兩

淡竹茹湯治產後虛煩頭痛短氣欲絕心中悶亂不解必效方

生淡竹茹一升　麥門冬五合　甘草一兩

小麥五合　生薑三兩　大棗十四枚　半夏二兩

右六味咬咀以水一斗煮竹茹小麥取八升去滓乃內諸
藥煮取一升去滓分三服贏人分作三服若有人參入一
兩半亦佳人參茯苓皆治心煩悶及心虛驚悸安定精神有則為良無者依方服壹劑不差
更作若氣逆者加半夏二兩

赤小豆散治產後煩悶不能食虛滿方

赤小豆三七枚燒作末以冷水和頓服之

治産後煩悶蒲黃散方

蒲黃以東流水和方寸匕服極良

蜀漆湯治産後虛熱往來心胷煩滿骨節疼痛及頭痛壯熱晡時輒甚又如微瘧方

蜀漆葉一兩　黃芩各一兩　知母五兩　桂心　甘草　芍藥各二兩　生地黃一斤

右八味�mentioned咀以水一斗煮取三升分三服此湯治寒熱禁不傷人

芍藥湯治産後虛熱頭痛方

白芍藥　乾地黃　牡蠣各五兩　桂心三兩

右四味㕮咀以水一斗煮取二升半去滓分三服日三此湯不傷損人無毒亦治腹中拘急痛若通身發熱加黃芩二兩

論曰凡産後角弓反張及諸風病不得用毒藥惟宜單行一兩味亦不得大發汗特忌轉瀉吐利必死無疑大豆紫湯

産後大善

治産後百病及中風痱痙或背強口噤或但煩熱苦渴或頭身皆重或身癢劇者嘔逆直視此皆因虛風冷濕及勞傷所爲大豆紫湯方

大豆五升　清酒一斗

右二味以鐵鐺猛火熬豆令極熱焦烟出以酒沃之去滓服一升日夜數過服之盡更合小汗則愈一以去風二則消血結如姙娠傷折胎死在腹中三日服此酒即差

治産後百日中風痙口噤不開并治血氣痛勞傷補腎獨活紫湯方

獨活一斤　大豆五升　酒一斗三升

右三味先以酒漬獨活再宿若急須微火煮之令減三升去滓別熬大豆極焦使煙出以獨活酒沃之去豆服一升日三夜二

小獨活湯治如前狀方

獨活八兩　葛根六兩　甘草二兩　生薑六兩

右四味㕮咀以水九升煮取三升去滓分四服微汗佳

甘草湯治在蓐中風背強不得轉動名曰風痙方

甘草　乾地黃　麥門冬　麻黃各二兩

芎藭　黃芩　葛根各三兩　杏人五十枚

葛根半斤

右九味㕮咀以水一斗五升酒五升合煮葛根取八升去滓內諸藥煮取三升去滓分再服一劑不差更合良（千金翼崔氏有前胡三兩）

獨活湯治產後中風口噤不能言方

獨活五兩　防風　秦艽　桂心

白朮　甘草　當歸　附子各二兩

雞糞酒主產後中風及百病并男子中一切風神效方

雞糞一升令黃熬　烏豆一升熬令聲絕勿焦

右二味以清酒三升半先淋雞糞次淋豆取汁一服一升

葛根三兩　生薑五兩　防已一兩

右十一味㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服

溫服取汗病重者凡四五日服之無不愈

治產後中風發熱面正赤喘氣頭痛竹葉湯方

淡竹葉一握　葛根三兩　防風二兩　桔梗

甘草　人參各一兩　大附子一枚　生薑五兩

大棗十五枚　桂心一兩　右十味㕮咀以水一斗煮取二升半去滓分三服日三温覆使汗出若頸項強者用大附子若嘔者加半夏四兩

防風湯治産後中風背急短氣方 千金翼作短氣 裏急

防風五兩　當歸　芍藥　人參　甘草　乾薑各二兩　獨活　葛根各五兩　右八味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服日三

鹿肉湯治産後風虛頭痛壯熱言語邪僻方

鹿肉三斤　芍藥三兩　半夏一升　乾地黄二兩　獨活三兩　生薑六兩　桂心　苁蓉各一兩　甘草　阿膠各一兩　人參　茯苓各四兩 千金翼作茯神　秦艽　黄芩　黄耆各三兩

右十五味㕮咀以水二斗煮肉得一斗二升去肉内藥煎取三升去滓内膠令烊分四服日三夜一

治産後中風獨活酒方

獨活一斤　桂心三兩　秦艽五兩

右三味㕮咀以酒一斗半漬三日飲五合稍加至一升不能多飲隨性服

大豆湯主産後卒中風發病倒悶不知人及娠婦挾風兼治在孕諸疾方

大豆五升炒令微焦　葛根　獨活各八兩　防巳六兩

右四味㕮咀以酒一斗二升煮豆取八升去滓内藥煮取四升去滓分六服日四夜三

五石湯主産後卒中風發疾口噤倒悶吐沫痢瘛瘲眩冒不知人及濕痺緩弱身體瘛瘲娠娠百病方

白石英　鍾乳　赤石脂　石膏 各二兩
紫石英 三兩　牡蠣　人參　黃芩
白朮　甘草　桔梗根　芎藭
桂心　防巳　當歸　乾薑 各二兩
獨活 三兩　葛根 四兩

右十八味末五石以水一斗四升煮取三升半諸藥以水一斗四升煮取三升半四石湯治產後卒中風發疾口噤瘈瘲悶滿不知人并緩急諸風毒痺身體痙強及挾胎中風婦人百病方

分五服日三夜二方有滑石寒水石各二兩棗二十枚

紫石英　白石英　石膏　赤石脂 各三兩
獨活　生薑 各六兩　葛根 四兩　桂心
芎藭　甘草　芍藥　黃芩 各二兩

右十二味以水一斗二升煮取三升半去滓分五服

日三夜二

治婦人在蓐得風蓋四肢苦煩熱皆自發露所爲若頭痛與小柴胡湯頭不痛但煩熱與三物黃芩湯小柴胡湯方

柴胡 半斤　黃芩　人參
甘草 各三兩　生薑 二兩　大棗 十二枚
半夏 半升

右七味以水一斗二升煮取六升去滓服一升日三服

三物黃芩湯方

黃芩　苦參 各二兩　乾地黃 四兩

右以咀以水八升煮取二升去滓適寒溫服一升日二多吐下蟲

治產後腹中傷絕寒熱悅惚狂言見鬼此病中風內絕藏氣虛所爲甘草湯方

甘草　芍藥各五兩　通草三兩　產寶用當歸
羊肉三斤
右四味㕮咀以水一斗六升煮肉取一斗去肉內藥煮取
六升去滓分五服日三夜三
羊肉湯治產後中風久絕不產月水不利乍赤乍白及男子
虛勞冷盛方
羊肉二斤　成擇大蒜去皮切三升　香豉三升
右三味以水一斗三升煮取五升去滓內酥一升更煮取
三升分溫三服
葛根湯治產後中風口噤痙痺氣息迫急眩冒困頓并產
後諸疾方
葛根
當歸三兩　生薑各六兩　獨活四兩
甘草　桂心

茯苓　石膏　人參
白朮
右拾貳味㕮咀以水壹斗貳升煮取參升去滓分參服日參
治產後中風防風酒方
防風　獨活各壹
桂心各貳　女萎
芎藭　防風各貳
白朮　石斛伍兩
右陸味㕮咀以酒貳斗漬參宿初服壹合稍加至參肆合
日參
治產後中風木防已膏方
木防已半升　茵芋伍兩
右貳味㕮咀以苦酒玖升漬壹宿猪膏肆分煎參上參下
膏成炙手摩手千遍差
治產後中柔風舉體疼痛自汗出者及餘百疾方

獨活 捌兩 當歸 肆兩

右貳味㕮咀以酒捌升煮取肆升去滓分肆服日參夜壹

取微汗 葛氏單行獨活小品加當歸若上氣者加桂心貳兩不差更作

治產後中風流腫浴湯方

塩 伍升令赤熬 雞毛 壹把燒作灰

右貳味以水壹石者煮塩作湯內雞毛灰著湯中適冷暖以

浴大良又浴婦人陰冷腫痛凡風腫面欲裂破者以紫湯是炒黑豆作者

治產後中風頭面手臂通滿方

大豆參升以水陸升煮取壹升半去豆澄清更煎取

壹升內白朮捌兩附子參兩獨活參兩生薑薑捌兩添

水壹斗煎取伍升內好酒伍升合煎取伍升去滓分

伍服日參夜貳間粥頻服參劑

茯神湯治產後忽苦心中衝悸或志意不定恍恍惚惚言語

錯謬心虛所致方

茯神 四兩 人參 茯苓 肆兩

芍藥 甘草 當歸

桂心 肆兩 生薑 捌兩

右九味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三甚良

遠志湯治產後忽苦心中衝悸不定志意不安言語錯誤惚

惚憒憒情不自覺方

遠志 人參 甘草 當歸

桂心 麥門冬 肆兩 芍藥 兩

生薑 大棗 二十枚

右十味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三贏者

分四服產後得此正是心虛所致無當歸用芍藥若其人

心肖中逆氣加半夏三兩
茯苓湯治產後暴苦心悸不定言語謬錯恍恍惚惚心中憒憒此皆心虛所致方

茯苓兩五　甘草　芍藥　桂心各二兩
生薑六兩　當歸二兩　麥門冬一升　大棗三十枚

右八味�mouth以水一斗煮取三升去滓分三服日三無當歸可用芎藭若苦心志不定加人參二兩亦可內遠志二兩若苦煩悶短氣加生竹葉一升先以水一斗三升煮竹葉取一斗內藥若有微風加獨活三兩麻黃二兩桂心二兩用水一斗五升若頸項苦急脊膊強者加獨活葛根各三兩麻黃桂心各二兩生薑八兩用水一斗半

安心湯治產後心衝悸不定恍恍惚惚惚惚不自知覺言語錯誤虛煩短氣志意不定此是心虛所致方

遠志　甘草各二兩
當歸　芍藥各二兩
右八味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三若苦虛煩短氣者加淡竹葉二升水一斗二升煮竹葉取一斗內藥若肖中少氣者益甘草爲三兩善

甘草丸治產後心虛不足虛悸心神不安吸吸乏氣或若恍恍惚惚不自覺知者方

甘草三兩　人參二兩　茯神
昌蒲三兩　澤瀉一兩　麥門冬二兩
茯苓二兩　大棗五十枚　遠志三兩
桂心一兩　乾薑二兩

右十味末之蜜丸如大豆酒服二十九日四五服夜冉服不知稍加若無澤瀉以白朮代之若肖中冷增乾薑

人參丸治產後大虛心悸志意不安不自覺恍惚恐畏夜不

得眠虛煩少氣方

人參　甘草　茯苓各三兩　麥門冬

昌蒲　澤瀉　署預　乾薑各二兩

桂心一兩　大棗擘十枚

右十味末之以蜜棗膏和丸如梧子未食酒服二十九日三夜一不知稍增若有遠志內二兩為善善風氣內當歸

獨活三兩亦治男子虛損心悸

大遠志丸治產後心虛不足下虛悸志意不安恍恍惚惚腹中拘急痛夜卧不安胷中吸吸少氣內補傷損益氣安定心神亦治虛損方

遠志　甘草　茯苓　麥門冬

人參　當歸　白朮　澤瀉

獨活　昌蒲各三兩　署預　阿膠各二兩

乾薑四兩　乾地黃五兩　桂心三兩

右十五味末之蜜和如大豆未食溫酒服二十九日三不知稍增至五十九若大虛身體冷少津液加鍾乳三兩為善

心腹痛第四方二十六首

蜀椒湯治產後心痛此大寒冷所為方

蜀椒二合　芍藥一兩　當歸　半夏

甘草　桂心　人參　茯苓各二兩

蜜一升　生薑汁五合

右十味咬咀以水九升煮椒令沸然後內諸藥煮取二升半去滓內薑汁及蜜煎取三升一服五合漸加至六合禁勿冷食

大巖蜜湯治產後心痛方

乾地黃　當歸　獨活　甘草

芍藥　桂心　細辛　小草 各二兩

吳茱萸　外乾薑 各一兩

右十味㕮咀以水九升煮取三升內蜜五合重煮分三服日三 胡洽不用獨活桂心甘草千金翼不用蜜

乾地黃湯治產後兩脅滿痛兼除百病方

乾地黃　芍藥 各三兩　當歸　蒲黃 各二兩

生薑 五兩　桂心 六兩　甘草 一兩　大棗 二十枚

右八味㕮咀以水一斗煮取三升半去滓分服日三

治產後苦少腹痛芍藥湯方

芍藥 六兩　桂心 三兩　甘草 二兩　膠飴 八兩

生薑 三兩　大棗 十二枚

右六味㕮咀以水七升煮取四升去滓內膠飴令烊分三服日三

當歸湯治婦人寒疝虛勞不足若產後腹中絞痛方

當歸 二兩　芍藥 二兩子母秘錄作甘草　羊肉 一斤

生薑 五兩　芍藥 二兩

右四味㕮咀以水八升煮羊肉熟取汁煎藥得三升適寒溫服七合日三 俗本此處要略胡洽不用藥名小羊肉湯

治產後腹中疾痛桃人芍藥湯方

桃人 半升外　芍藥　當歸

乾漆　桂心　甘草 各二兩

右七味㕮咀以水八升煮取三升分三服

羊肉湯治產後及傷身大虛上氣腹痛兼微風方

肥羊肉 二斤如無鹿肉用麞肉　茯苓　黃耆　乾薑 各三兩

甘草

麥門冬 七合

生地黃 五兩　大棗 十二枚

右十一味㕮咀以水二斗煮肉取一斗去肉內藥煮取三

外半去滓分四服日三夜一 千金翼無乾薑

羊肉當歸湯治產後腹中心下切痛不能食往來寒熱若中風之氣力方

羊肉三斤 當歸 黃芩肘後用黃耆 芍藥 甘草 防風各二兩肘後用人參 芍藥三兩 生薑四兩

右八味㕮咀以水一斗二升先煮肉熟減半內餘藥取三升去滓分三服日三夜一 胡洽以黃耆代黃芩白朮代芍藥名大羊肉湯子母秘錄以桂心代防風加大棗十枚

羊肉杜仲湯治產後腰痛疫噉方

羊肉四斤 杜仲 紫菀各三兩 五味子 細辛 款冬花 人參 厚朴 芍藥 附子 蒲薤 甘草 黃耆各二兩 當歸 桂心 白朮各三兩

生薑八兩 大棗三十枚

右十八味㕮咀以水二斗半煮肉取汁一斗五升去肉內藥煎取三升半去滓分五服日三夜二

羊肉生地湯治產後三日腹痛補中益藏強氣力消血方

羊肉三斤 生地黃切二升 桂心 當歸 甘草 芍藥各二兩 人參 芍藥三兩

右八味㕮咀以水二斗煮肉取一斗去肉內藥煎取三升分四服日三夜一

內補當歸建中湯治產後虛羸不足腹中疠痛不止吸吸少氣或苦小腹拘急痛引腰背不能飲食產後一月日得服四五劑爲善令人丁壯方

當歸四兩 芍藥六兩 甘草二兩 生薑六兩 桂心三兩 大棗十枚

右六味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服一日令盡
若大虛內餙糖六兩湯成內之於火上餙消若無生薑則
以乾薑三兩代之若其人去血過多崩傷內竭不止加地
黃六兩阿膠二兩合八種湯成去滓內阿膠若無當歸以
芎藭代之 六味

內補芎藭湯治婦人產後虛羸及崩傷過多虛竭腹中絞
痛方

芎藭 乾地黃 各四兩 芍藥 五兩 桂心 二兩
甘草 乾薑 各三兩 大棗 四十枚

右七味咬咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服日三
不差復作至三劑若有寒苦微下加附子三兩治婦人虛
羸少氣傷絕腹中拘急痛崩傷虛竭面目無色及唾吐血
甚良

大補中當歸湯治產後虛損不足腹中拘急或溺血少腹苦
痛或從高墮下犯內及金瘡血多內傷男子亦宜服之方

當歸 續斷 桂心 芎藭
乾薑 麥門冬 各三兩 芍藥 四兩 吳茱萸 一升
乾地黃 六兩 甘草 白芷 各二兩 大棗 四十枚

右十二味咬咀以酒一斗漬藥一宿明旦以水一斗合煮
取五升去滓分五服日三夜二有黃耆入二兩益加
桂心酒治產後疹痛及卒心腹痛方

桂心三兩以酒三升煮取二升去滓分三服日三
生牛膝酒治產後腹中苦痛方

生牛膝五兩以酒五升煮取二升去滓分二服若用
乾牛膝根以酒漬之一宿然後可煮
治產後腹中如弦當堅痛無聊賴方

當歸末二方寸匕內蜜一升煎之適寒温頓服之

吳茱萸湯治婦人先有寒冷肖滿痛或心腹刺痛或嘔吐食少或腫或寒或下痢氣息綿慞欲絶産後益劇皆主之方

吳茱萸二兩　防風　甘草　細辛　桔梗　乾薑　當歸各十銖　乾地黃十八銖

右八味咬咀以水四升煮取一升半去滓分再服

蒲黃湯治産後餘疾肖中少氣腹痛頭疼餘血未盡除腹中脹滿欲死方

蒲黃五兩　桂心　芒消一兩　生薑　芍藥各一兩　桃人二十枚　當歸各十銖　乾地黃十八銖

右八味咬咀以水九升煮取二升半去滓内芒消分三服日三良驗

敗醬湯治産後疹痛引腰腹中如錐刀所刺方

敗醬三兩　桂心　芍藥各一兩半　當歸一兩

右四味咬咀以清酒二升水四升微火煮取二升去滓適寒温服七合日三服食前服之千金翼只用一味

芎藭湯治産後腹痛方

芎藭　甘草各二兩　蒲黃　女萎各一兩半

芍藥　大黃各三十銖　當歸　桂心

桃人　黃耆千金翼作黃芩各一兩　生地黃一升

獨活湯治産後腹痛引腰髀拘急痛方

獨活　當歸　桂心　芍藥

生薑各三兩　甘草二兩　大棗二十枚

右七味咬咀以水八升煮取三升去滓分三服服相去如

人行十里久進之

芍藥黃耆湯治產後心腹痛方

芍藥四兩　黃耆　白芷　桂心　芎藭　當歸

乾地黃　甘草各二兩　茯苓三兩　大棗十枚

生薑　人參

右十二味㕮咀以酒水各五升合煮取三升去滓先食服一升日三（千金翼無人參當歸芎藭地黃茯苓為七味）

治產後腹脹痛不可忍者方

煮黍粘根為飲一服即愈

治婦人心痛方

布裹塩如彈丸燒作灰酒服之愈

又方　燒秤鎚投酒中服亦佳

又方　炒大豆投酒中服佳

乾地黃湯治產後惡露不盡除諸疾補不足方

乾地黃三兩　芎藭　桂心　黃耆

當歸各二兩　人參　防風　茯苓

細辛　芍藥

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服日夜一劑

桃人湯治產後往來寒熱惡露不盡方

桃人五兩（吳茱萸二升黃耆　當歸

芍藥各三兩生薑　甘草各一兩　醍醐百鍊酥　柴胡各八兩）

右八味㕮咀以酒一斗水二升合煮取三升去滓適寒溫先食服一升日三

澤蘭湯治產後惡露不盡腹痛不除小腹急痛痛引腰背少氣力方

澤蘭　當歸　生地黃各二兩　甘草一兩半
生薑三兩　芍藥一兩　大棗十枚
右七味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服日三隨身
欲死服亦瘥

甘草湯治產乳餘血不盡逆搶心胃手足逆冷脣乾腹脹短氣方

甘草　芍藥　桂心　阿膠各三兩　大黃四兩
右五味㕮咀以東流水一斗煮取三升去滓內阿膠令烊
分三服一服入腹中面即有顏色一日一夜盡此三升即
下腹中惡血一二升立瘥當養之如新產者

大黃湯治產後惡露不盡方

大黃　當歸　甘草　生薑
牡丹　芍藥各三兩　吳茱萸一升

宋本缺據元版補刊

右七味㕮咀以水一斗煮取四升去滓分四服一日令盡
加人參三兩名人參大黃湯

治產後往來寒熱惡露不盡柴胡湯方

柴胡八兩　桃人五十枚　當歸　黃耆
芍藥各三兩　生薑八兩　吳茱萸二升
右七味㕮咀以水一斗三升煮取三升去滓先食服一升
日三
酒一金鐺斗煮以清

蒲黃湯治產後餘疾有積血不去腹大短氣不得飲食上衝
胷脅時時煩憒逆滿手足悄疼胃中結熱方

蒲黃半兩　大黃　芒消　甘草
黃芩各一兩　大棗三十枚
右六味㕮咀以水五升煮取一升清朝服至日中下若不
止進冷粥半盞即止若不下與少熱飲自下人羸者半之

治產後餘疾惡露不除積聚作病血氣結搏心腹疼痛銅鏡
（千金翼名大黃湯而不用芒消）
鼈湯方

銅鏡鼈十八銖燒末　大黃二兩半　乾地黃　芍藥
苦蒄　乾漆　芒消各二兩　桂心
大棗三十枚　乾薑　乾地黃各二兩　桃人五十枚

右九味㕮咀以水七升煮取二升二合去滓內髮灰鏡鼈末分三服

末分三服

小銅鏡鼈湯治如前狀方

銅鏡鼈十銖燒末　大黃　甘草　黃芩
芒消　乾地黃各二兩　桃人五十枚

右七味㕮咀以酒六升煮取三升去滓內鏡鼈末分三服
亦治遁尸心腹痛及三十六尸疾

治產後兒生處空流血不盡小腹絞痛梔子湯方

梔子三十枚以水一斗煮取六升內當歸芍藥各二
兩蜜五合生薑五兩羊脂一兩於梔子汁中煎取二
升分三服日三

治產後三日至七日腹中餘血未盡絞痛強滿氣息不通
生地黃湯方

生地黃五兩　大黃　芍藥
茯苓　細辛　桂心　當歸
甘草　黃芩各一兩半　大棗二十枚　乾薑三兩　乾薑各二兩

治新產後有血腹中切痛大黃乾漆湯方

大黃　乾漆　乾地黃　桂心　乾薑各二兩

右五味㕮咀以水三升清酒五升煮取三升去滓溫服一升

血當下若不差明旦服一升滿三服病無不差

治產後血不去麻子酒方

麻子五升擣以酒一斗漬一宿明旦去滓温服一升先食服不差夜服一升不吐下忌房事一月將養如初產法

治產後惡物不盡或經一月半歲一歲升麻湯方

升麻三兩以清酒五升煮取二升去滓分再服當吐下惡物勿怪良

治產後惡血不盡腹中絞刺痛不可忍方

大黃　黃芩　芍藥　桃人　桂心　各三兩　甘草　當歸　生地黃　各二兩

右八味咬咀以水九升煮取二升半去滓食前分三服

治產後漏血不止方

露蜂房　敗舡灰　各等分

右二味等分作灰取酪若漿服方寸匕日三

又方

大黃三兩　芒消一兩　桃人三十枚　水蛭三十枚　蚖蟲三十枚　甘草　當歸　各二兩　蠐螬四十枚

右八味咬咀以水三升酒二升合煮取三升去滓分三服當下血

又方

桂心　蠐螬　各三兩　栝樓根　牡丹　各三兩　豉一升

右五味咬咀以水八升煮取三升去滓分三服

治產後血不可止者方

乾昌蒲三兩以清酒五升漬煮取三升分再服即止

治產後惡血不除四體並惡方

續骨末二十兩破如箄子大以水一斗煮取三升分
三服相去如人行十里久間食粥或小便數或惡血
下即差此木得三遍煮

治產後下血不盡煩悶腹痛方

羚羊角燒成炭刮取三兩　芍藥二兩熬　枳實一兩細切熬令黃

右三味治下篩煮水作湯服方寸匕日再夜一稍加至二匕

又方

鹿角燒成炭擣篩煮豉汁服方寸匕日三夜再稍加
至二七不能用豉清煮水作湯用之

又方　擣生藕取汁飲二升甚驗

又方　生地黃汁一升酒三合和溫頓服之

又方

赤小豆擣散取東流水和服方寸匕不差更服

治產後血瘕痛方

古鐵一斤秤鐵斧頭鐵杵亦得炭火燒令赤內酒五
升中稍熱服之神妙

治婦人血瘕心腹積聚乳餘疾絕生小腹堅滿貫臍中熱腰
脊痛小便不利大便難不下食有伏虫臚脹癰疽腫久寒
留熱胃管有邪氣方

半夏六銖一兩　石膏　藜蘆　牡蒙

蓯蓉各八銖十　桂心　乾薑一兩　烏喙一兩半

巴豆六十銖研如膏

右九味末之蜜丸如小豆服二九日三及治男子疝病

治婦人血瘕痛方

乾薑一兩　烏賊魚骨一兩

右二味治下篩酒服方寸匕日三

又方　末桂温酒服方寸匕日三

下痢第六方十九首

膠蠟湯治産後三日内下諸雜五色痢方

阿膠一兩　蜡如博碁三枚　當歸一兩半　黄連二兩　黄蘗一兩　陳廩米一升

右六味㕮咀以水八升煮米蟹目沸去米内藥煮取二升去滓内膠蠟令烊分四服一日令盡

治産後餘寒下痢便膿血赤白日數十行腹痛時時下血桂心二兩　蜜一升　附子一兩　乾薑甘草二兩炙　當歸二兩　赤石脂十兩

右七味㕮咀以水六升煮取三升去滓内蜜煎一兩沸分三服日三

治産後下赤白腹中絞痛湯方

芍藥一兩　乾地黄四兩　甘草八兩　阿膠

艾葉一升　當歸二兩

右六味㕮咀以水七升煮取二升半去滓内膠令烊分三服

治産後赤白下久不斷身面悉腫方

大豆一升微熬　小麥一升　吳茱萸半升　蒲黄一升

右四味以水九升煮取三升去滓分三服此方神驗亦可

治産後痢赤白心腹刺痛方

薤白一兩　當歸二兩　酸石榴皮三兩

地榆四兩　粳米五合

右五味㕮咀以水六升煮取二升半去滓分三服必效方加厚朴一兩阿膠人參甘草黄連各一兩半

治產後下痢赤白腹痛當歸湯方

當歸 三兩　芍藥 二兩半　乾薑　甘草　白朮 各二兩　白艾 灸熟　附子 各一兩　龍骨 三兩

右八味㕮咀以水六升煮取二升去滓分三服一日令盡

治產後下痢兼虛極白頭翁湯方

白頭翁 二兩　阿膠　秦皮　黃蘗 三兩　甘草 各二兩

右六味㕮咀以水七升煮取二升半去滓內膠令烊分三服日三

治產後早起中風冷泄痢及帶下鼈甲湯方

鼈甲 如手大　當歸　黃連　乾薑 各二兩　黃蘗 廣三寸

右五味㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服日三千金翼加白

龍骨丸治產後虛冷下血及穀下晝夜無數兼治產後惡露不斷方

白頭翁 一兩

龍骨 四兩　乾薑　甘草　桂心 各二兩

右四味末之蜜和暖酒服二十丸如梧子曰三二方用參地黃各二兩

阿膠丸治產後虛冷洞下心腹絞痛兼泄瀉不止方

阿膠 四兩　人參　乾地黃　白朮　甘草　龍骨　桂心　黃連　當歸　附子 各二兩

右十味末之蜜丸如梧子溫酒服二十丸日三

澤蘭湯治產後餘疾寒下凍膿裏急胷脇滿痛欬嗽嘔逆寒熱小便赤黃大便不利方

澤蘭 二十四銖　石膏 二十四銖　當歸 十八銖　遠志 三十銖

甘草　厚朴各八銖　葛本　芎藭各五銖
乾薑　人參　桔梗　乾地黃各三銖
白朮　蜀椒　白芷　柏子人
防風　山茱萸　細辛各九銖　桑白皮
麻子人升各半

右二十一味㕮咀以水一斗五升先內桑白皮煮取七升半去之內諸藥煮取三升五合去滓分三服

治產後下痢乾地黃湯方

乾地黃三兩　白頭翁
蜜蠟一方寸　阿膠如大一手掬　黃連各一兩

右五味㕮咀以水五升煮取二升半去滓內膠蠟令烊分三服日三千金翼用乾薑一兩

治產後忽著寒熱下痢生地黃湯方

生地黃五兩　甘草
大棗二十枚　淡竹葉二升作竹皮　赤石脂二兩
桂心各一兩　黃連

右七味㕮咀以水一斗煮竹葉取七升去滓內藥煮取三升半分三服日三

治產後下痢藍青丸方

藍青熬　附子　鬼臼　蜀椒各一兩半
厚朴　阿膠　甘草各三兩　艾葉
龍骨　黃連　當歸各三兩　黃蘗
茯苓　人參各一兩

右十四味末之蜜和丸如梧子空腹每服以飲下二十九一方用赤石脂四兩

治產後虛冷下痢赤石脂丸方

赤石脂三兩　當歸　白朮　黃連　乾薑

秦皮　甘草各二兩　蜀椒　附子各一兩

右九味末之蜜丸如梧子酒服二十九日三千金翼作散空腹飲服方寸匕

治產後下痢赤散方

赤石脂三兩　桂心一兩　代赭三兩

右三味治下篩酒服方寸匕日三十日愈

治產後下痢黑散方

麻黃　貫衆　桂心各一兩　甘草三兩

乾漆三兩　細辛二兩

右六味治下篩酒服五撮日再五日愈麥粥下尤佳

治產後下痢黃散方

黃連一兩　黃芩　蠐螬　乾地黃各

右四味治下篩酒服方寸匕日三十日愈

治產後痢龍骨散方

五色龍骨　黃檗根皮蜜炙令焦　代赭

赤石脂　艾各一兩半　黃連二兩

右六味治下篩飲服方寸匕日三

治產後小便數兼渴栝樓湯方九首

淋渴第七方

栝樓根　黃連各三兩　人參三兩　大棗十五枚

甘草二兩　麥門冬二兩　桑螵蛸二十枚　生薑三兩

右八味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

治產後小便數雞肫胵湯方

雞肫胵至二十具　雞腸三洗具　乾地黃

甘草一兩半　麻黃四兩　厚朴　人參各三兩

生薑五兩　大棗二十枚

右十味㕮咀以水一斗煮取七升去滓內

諸藥煎取三升半分三服

治婦人結氣成淋小便引痛上至小腹或時溺血或如膠餚每發欲死食不生肌面目萎黃師所不能治方

貝齒四枚燒末 葵子一升 石膏五兩碎 滑石二兩末

右四味以水七升煮三物取二升去滓內二末及猪脂一合更煎三沸分三服日三不差再合服

治產後卒淋氣淋血淋石韋湯方

石韋二兩 榆皮五兩 黃芩二兩 大棗三十枚

通草二兩 甘草二兩 葵子二升 白朮產寶用芍藥

生薑各三兩

右九味㕮咀以水八升煮取二升半分三服集驗無甘草生薑崔氏同產寶不用薑棗

治產後淋澀葵根湯方

葵根二兩 車前子一升 亂髮燒灰 大黃各一兩

冬瓜練一合作汁通草二兩 桂心 滑石各一兩

生薑六兩

右九味㕮咀以水七升煮取二升半分三服千金翼不用冬瓜練

治產後淋茅根湯方

白茅根一斤瞿麥四兩 地脈二兩 桃膠

甘草各一兩 鯉魚齒一百枚 人參二兩 茯苓四兩

生薑三兩

右九味㕮咀以水一斗煮取二升半分三服

治產後淋滑石散方

滑石五兩 通草 車前子 葵子各四兩

右四味治下篩酢漿水服方寸匕稍加至二匕

治產後虛渴少氣力竹葉湯方

竹葉三升　甘草
生薑三兩　大棗十四枚　半夏三兩　麥門冬五兩　茯苓　人參各二兩　小麥五合

右九味㕮咀以水九升煮竹葉小麥取七升去滓內諸藥更煎取二升半一服五合日三夜一

治產後渴不止栝樓湯方

栝樓根四兩　人參三兩　甘草二兩炙氏不用　麥門冬三兩　大棗二十枚　土瓜根五兩崔氏用蓋根　乾地黃二兩

右七味㕮咀以水一斗二升煮取六升分六服

雜治第八　方五十九首　灸法九首

治婦人勞氣食氣胃滿吐逆其病頭重結痛小便赤黃大下氣方

烏頭　黃芩　大黃兩半　戎鹽一兩半　巴豆各半兩　半夏三兩　蠐螬　桂心

苦參各十八銖　人參

右十一味末之以蜜青牛膽拌和擣三萬杵丸如梧子宿不食酒服五丸安卧須臾當下下黃者小腹積也青者疝也白者內風也如水者留飲也青如粥汁膈上邪氣也血如腐肉者傷也赤如血者乳餘疾也如蟲刺者蟲也下已必渴渴飲粥飢食酥糜三日後當溫食食必肥濃三十日平復亦名破積烏頭丸主心腹積聚氣悶脹疝瘕內傷瘀血產乳餘疾及諸不足

消石硳一

治婦人汗血吐血尿血下血竹茹湯方

竹茹二升　乾地黃四兩　人參　芍藥　桔梗　甘草　桂心硳一　當歸

右九味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

治婦人自少患風頭眩眼疼方

石南一方用石韋細辛
山茱萸乾薑各三兩署預天雄茵芊各二兩
貫衆獨活防風
右十一味㕮咀以酒三斗漬五日初飲二合日三稍稍加之
治婦人經服硫黃丸忽患頭痛項冷冷歇又心胷煩熱眉骨
眼皆癢痛有時生瘡喉中乾燥四體痛癢方
栝樓根麥門冬龍膽各三兩
大黃二兩土瓜根八兩杏人二升
右六味末之蜜丸飲服如梧子十枚日三服漸加之
治婦人患癖按時如有三五箇而作水聲殊不得寢食常悶
方
牽牛子三升治下篩飲服方寸匕日一服三十服後
可服好硫黃一兩

治婦人忽與鬼交通方
松脂二兩雄黃末一兩
右二味先烊松脂乃內雄黃末以虎爪攪令相得藥成取
如雞子中黃夜卧以著燻籠中燒令病人取自舁其上以
被自覆摧出頭勿令過熱及令氣得泄也
厚朴湯治婦人下焦勞冷膀胱腎氣損弱白汁與小便俱出
者方
厚朴如手大長四寸以酒五升煮兩沸去滓取桂一
尺末之內汁中調和一宿勿食旦頓服之
溫經湯主婦人小腹痛方
茯苓六兩芍藥三兩薏苡仁半升土瓜根三兩
右四味㕮咀以酒三升漬一宿旦加水七升煎取二升分
再服

治婦人胷滿心下堅咽中帖帖如有炙肉齎吐之不出咽之不下半夏厚朴湯方

半夏一升　厚朴三兩　茯苓四兩　生薑五兩　蘇葉二兩

右五味㕮咀以水七升煮取四升分四服日三夜一不差頻服一方無蘇葉生薑

治婦人氣方

平旦服烏牛尿日一止

治婦人胷中伏氣昆布丸方

昆布　海藻　芍藥　桂心

人參　白石英　款冬花　桑白皮各二

茯苓　鍾乳　柏子人碎　紫菀

甘草各一兩　乾薑一兩六銖　吳茱萸　五味子

細辛各一兩半　杏人百枚　橘皮　蘇子各五

右二十味末之蜜和酒服二十丸如梧子日冊加至四十丸治婦人無故憂恚胷中迫塞氣不下方

芍藥　滑石　黃連　石膏

前胡　山茱萸各一兩六銖　大黃　細辛

麥門冬各一兩半　半夏十八銖　桂心半兩　生薑一兩

右十二味末之蜜丸如梧子酒服二十丸加至三十丸日三服

婦人斷產方

蠶子故紙方一尺燒爲末酒服之終身不產

又方

油煎水銀一日勿自息空肚服棗大一枚永斷不損人

治勞損產後無子陰中冷溢出子門閉積年不差身體寒冷方

防風一兩半　桔梗銖三十　人參一兩　昌蒲
半夏　丹參　厚朴　乾薑
紫菀　杜蘅各十銖　秦艽各半兩　白斂
牛膝　沙參各半兩

右十四味末之白蜜和丸如小豆食後服十五丸日三服
不知增至二十九有身止夫不在勿服之服藥後七日方
合陰陽

治產後癖瘦玉門冷五加酒方

五加皮二分　乾地黃　丹參各二兩
枸杞子二升　天門冬四兩　蛇牀子一升
杜仲一斤　乾薑三兩
乳牀半斤

右九味咬咀以絹袋子盛酒三斗漬三宿一服五合日再
稍加至十合佳

治子門閉血聚腹中生肉癥藏寒所致方

生地黃汁三升　生牛膝汁一斤　乾漆半斤

右三味先擣漆爲散內汁中攪微火煎令丸酒服如梧子
三九日再若覺腹中痛食後服之

治產勞玉門開而不閉方

硫黃四兩　吳茱萸半兩　菟絲子一兩六銖　蛇牀子一兩

右四味爲散以水一升煎二方寸匕洗玉門日再

治產後陰道開不閉方

石灰一斗熬令燒草以水二斗投之適寒溫入汁中
坐漬之須臾復易坐如常法已效千金不傳

治婦人陰脫黃芩散方

黃芩　蜻皮　當歸各半兩　芍藥一兩
牡蠣　竹皮各二兩半　狐蔥一具千金翼用松皮

右七味治下篩飲服方寸匕日三禁舉重房勞勿冷食

治婦人陰脫硫黃散方

硫黃　烏賊魚骨各半兩　五味子三銖

右三味治下篩以粉其上良日冊三粉之

治婦人陰脫當歸散方

當歸　黃芩各三兩　芍藥一兩六銖　蜻皮半兩　牡蠣三兩半

右五味治下篩酒服方寸匕日三禁舉重良

治產後陰下脫方

蛇牀子一升布裹炙熨之亦治產後陰出痛

羊脂煎訖適冷暖以塗上以鐵精傅脂上多少令調以火炙布暖以慰肛上漸推內之末磁石酒服方寸匕日三

治產後陰下脫方

燒人屎爲末酒服方寸匕日三

又方

燒弊帚頭爲灰酒服方寸匕

又方

皂莢酥炙半兩　大黃　細辛各十八銖　蛇牀子三十銖

右伍味治下篩以薄絹囊盛大如指內陰中日二易即差

又方

鼷頭伍枚燒末以井花水服方寸匕日叁

又方

蜀椒　吳茱萸各一升　戎鹽如雞子大

右叁味皆熬令變色治末以綿裹如半雞子大內陰中日壹易貳拾日差

治陰下挺出方

蜀椒　烏頭　白及 各半兩

右參味治末以方寸匕綿裹內陰中入參寸腹中熱易之日壹度明旦乃復著柒日愈 廣濟方不用蜀椒

治產後藏中風陰腫痛當歸洗湯方

當歸　獨活　白芷　地榆 酪三兩

右陸味㕮咀以水壹斗半煮取伍升適冷煖稍洗陰日參

治產後陰腫痛方

敗醬 千金翼不用　礬石 酪三兩

熟擣桃人傅之良日參度

治男女陰瘡膏方

米粉 一杯酒　芍藥　黃芩　牡蠣

附子　白芷 各八銖

右陸味㕮咀以不中水猪膏壹斤煎之於微火上參下參上

侯白芷黃膏成絞去滓內白粉和令相得傅瘡上并治瘡

治陰中痛生瘡方

羊脂一斤　杏人一升

右五味末之以羊脂和諸藥內鉢中置甑內蒸之三升米頃藥成取如大豆綿裹內陰中日一易

治陰中蠹如蟲行狀方

礬石 鉢八銖　芍藥 丹雨　砂少許

右三味治下篩以綿裹藥著陰中蟲自死

治男女陰蝕瘡盡方

蝦蟇　兔屎

右二味等分為末以傅瘡上

又方

當歸　芍藥　甘草　蛇牀子 各一兩一方用芍窮

地榆三兩

右五味㕮咀以水五升煮取二升洗之日三夜二

又方

蒲黃一升　水銀一兩

右二味研之以粉上

又方

肥猪肉十斤以水煮取熟去肉盆中浸之冷易不過三兩度亦治陰中瘡濕癢方

治男女陰中瘡濕癢有蟲

薰連　梔子　甘草　黃蘗各一兩　蛇牀子二兩

右五味治下篩以粉瘡上無汁以猪脂和塗之深者用綿裹內瘡中日三

治陰中癢入骨困方

頭黃　黃芩　黃著各一兩　芍藥半兩

玄參　丹參各十銖　吳茱萸三十銖

右七味治下篩酒服方寸匕日三

又方

狼牙兩把以水五升煮取一升洗之日五六度

治陰瘡方

蕪荑　苦參　甘草　礬石

雄黃　附子　白芷　黃連

右九味各六銖㕮咀以猪膏四兩合煎傳之

治女人交接輒血出方

桂心　伏龍肝各二兩

右二味末酒服方寸匕立止

治童女交接陽道違理及為他物所傷血出流離不止方

取釜底墨少許研胡麻以傅之

又方　燒青布并髮灰傅之立愈

又方　燒雷絮灰傅之

治合陰陽輒痛不可忍方

黃連一兩半　牛膝　甘草各一兩

右三味㕮咀以水四升煮取二升洗之日四度

治女人傷於丈夫四體沈重噓吸頭痛方

生地黃八兩　芍藥五兩　香豉一升

葱白一升　生薑四兩　甘草二兩

右六味㕮咀以水七升煮取二升半分三服不差重作愼房事（集驗方無生薑甘草）

治婦人陰陽過度玉門疼痛小便不通白玉湯方

白玉二兩半　白朮五兩　澤瀉　蒺蓉各三兩　當歸五兩

右五味㕮咀先以水一斗煎玉五十沸去玉內藥煎取二升分再服相去一炊頃

治動胎見血腰痛小腹疼月水不通陰中腫痛方

蒲黃二兩　葱白一斤切　當歸二兩　吳茱萸

阿膠各一兩

右五味以水九升煮取二升半去滓內膠令烊分三服

治婬婦為夫所動欲死單行竹瀝汁方

取淡竹斷兩頭節火燒中央器盛兩頭得汁飲之立效

治傷丈夫苦頭痛欲嘔心悶桑根白皮湯方

桑根白皮半兩　乾薑二兩　桂心五寸　大棗二十枚

右四味㕮咀以酒一斗煮取三升去滓分三服適衣无令汗出

治嫁痛單行方

大黃十八銖以好酒二升煮三沸頓服之良

治小戶嫁痛連日方

廿草二兩　芍藥半兩　生薑十八銖　桂心六銖

右四味㕮咀以酒二升煮三沸去滓盡服神効

又方　牛膝五兩以酒二升煮取半去滓分三服

治小戶嫁痛方

烏賊魚骨燒為屑酒服方寸匕日三

治陰寒大冷窄小方

兎屎　乾漆各半兩　鼠頭骨一枚　雌雞肝二具陰乾百日

右四味末之蜜丸如小豆大十丸陰頭令徐

徐內之三日知十日小五十日如十五歲童女

治陰冷令熱方

內良茱萸於牛膽中冷滿陰乾百日每取二七枚綿

裹之齒嚼令碎內陰中良久熱如火

月水不利貢豚上下并無子灸四滿三十壯穴在丹田兩邊

相去各一寸半丹田在臍下二寸是也

婦人胞落頹灸臍中三百壯

又灸身交五十壯三報在臍下橫文中

又灸背脊當臍五十壯

又灸玉泉五十壯三報

又灸龍門二十壯三報在玉泉下女人入陰內外之際此穴卑

仌廢不針灸

婦人胞下垂注陰下脫灸俠玉泉三十隨年壯三報

婦人陰冷腫痛灸歸來三十壯三報俠玉泉五寸是其穴

婦人欲斷產灸右踝上一寸三壯即斷

朝奉郎守太常少卿充祕閣校理判登聞檢院上護軍賜緋魚袋臣林億等校正

補益第一

月水不通第二　癥瘕附

赤白帶下崩中漏下第三

月水不調第四

補益第一　論一首　方十四首

論曰凡婦人欲求美色肥白罕比年至七十與少不殊者勿服紫石英令人色黑當服鍾乳澤蘭丸也

柏子人丸治婦人五勞七傷羸冷瘦削面無顏色飲食減少貌失光澤及產後斷緒無子能久服令人肥白補益方

柏子人　二兩　蜀椒　一兩半　桂心　各一兩　澤蘭　二兩六銖　杜仲　四十二銖　厚朴　黃耆　二兩　當歸　四十二銖

乾薑二兩　甘草四兩炙　芍藥四兩　白朮四兩
細辛　獨活　人參　石斛
白芷　芍藥　五味子　桔梗各一兩
藁本十八銖　蒚蓉一兩　蕪荑十八銖　防風
烏頭一方作牛膝　乾地黃各三十銖　鍾乳　白石英
紫石英各二兩　赤石脂一兩

右三十味末之蜜和酒服二十丸如梧子不知加至三十
丸千金翼無烏頭有龍骨防葵茯苓秦艽悉治產後半身枯悴各半兩爲三十三味并
大五石澤蘭丸治婦人風虛寒中腹內雷鳴緩急風頭痛寒
熱月經不調繞臍惻惻痛或心腹痞堅逆害飲食手足常冷
多夢紛紜身體痺痛榮衛不和虛弱不能動搖及產後虛損
並宜服此方

鍾乳　禹餘粮各一兩半　石膏　白石英各二兩

紫石英二兩半　澤蘭二兩六銖　蜀椒　乾薑各二兩
當歸　桂心　芍藥　厚朴
柏子人　乾地黃　細辛　茯苓
五味子　龍骨各一兩半　甘草　黃耆各二兩半
石斛　遠志　人參　續斷
白朮　防風　烏頭十各三銖　山茱萸
紫菀各一兩　白芷　藁本　蕪荑各十八銖

右三十二味末之蜜和丸如梧子大酒服二十丸加至三
十九千金翼有陽起石二兩
小五石澤蘭丸治婦人勞冷虛損飲食減少面無光色腹中
冷痛經候不調吸吸少氣無力補益溫中方

鍾乳　紫石英
赤石脂各四十銖　石膏　礬石各一兩半　白石英
陽起石各二兩　澤蘭二兩六銖

乾薑二兩　當歸　甘草各四十二銖　薤蓉

龍骨　桂心各一兩半　白朮　芍藥

厚朴　人參　蜀椒　山茱萸各三十銖

蓇本　柏子人各一兩　蕪荑十八銖

右二十三味末之蜜和丸如梧子大酒服二十九加至三十九日三服

增損澤蘭丸治產後百病理血氣補虛勞方

澤蘭　甘草　當歸　芍藥各四十二銖

附子　乾薑　白朮　白芷

桂心　細辛各一兩　防風　人參

牛膝各三十銖　柏子人　乾地黃　石斛各三十六銖

厚朴　蓇本　蕪荑各半兩　麥門冬一兩

右二十味末之以蜜和丸如梧子空腹酒下十五丸至二

論一首　方十四首

補益第一

論曰凡婦人欲求美色肥白罕比年至七十與少不殊者勿服紫石英令人色黑當服鍾乳澤蘭丸也

柏子人丸　治婦人五勞七傷羸冷瘦削面無顏色飲食減少貌失光澤及產後斷緒無子能久服令人肥白補益方

柏子人　黃耆　當歸　甘草　芍藥各二兩　乾薑　紫石英各貳兩

蜀椒壹兩半　杜仲　厚朴　桂心　桔梗　赤石脂　薤蓉

五味子　白朮　石斛　獨活　人參

芍藥各壹兩　澤蘭貳兩陸銖　蓇本　細辛　白芷

烏頭一方作牛膝　防風各拾銖　薏苡仁拾貳銖　乾地黃

鍾乳　白石英各貳兩

右三十味爲末蜜和酒服二十丸如梧子不知加至三十丸千金翼無烏頭有龍骨防葵茯苓秦艽各十二味并治產後半身枯悴

大五石續命團　治婦人風虛寒中腹內雷鳴緩急風頭痛寒熱月經不調繞臍側側痛或心腹痞堅逆害飲食手足常冷多夢紛紜身體癉痛榮衛不和虛弱不能動搖及產後虛損並宜服此方

鍾乳　禹餘粮　紫石英　甘草　黃耆各貳兩半

石膏　白石英　蜀椒　乾薑各貳兩　澤蘭貳兩陸銖

當歸　桂心　芎藭　厚朴　柏子人

乾地黃　細辛　茯苓　五味子　龍骨各壹兩半

石斛　遠志　人參　續斷　白朮

防風　烏頭各拾銖　山茱萸　紫菀各壹兩　白芷

葉本　蔥黃各拾捌銖

右三十二味爲末蜜和丸如梧子大酒服二十丸加至三十丸千金翼有陽起石貳兩

大五石續命團　治婦人勞冷虛損飲食減少面無光色腹中冷痛經候不調吸吸少氣無力補益溫中方

鍾乳　紫石英　礬石各壹兩半　白石英　赤石脂

當歸　甘草各肆拾貳銖　石膏　陽起石

乾薑各貳兩　澤蘭貳兩陸銖　龍骨　桂心各貳兩半

白朮　芍藥　厚朴　人參　蜀椒

山茱萸各參拾銖　柏子人　葉本各壹兩　蔥黃拾捌銖

右二十三味爲末蜜和丸如梧子大酒服二十丸加至

增損澤蘭圓 治產後百病理血氣補虛勞方

澤蘭　甘草　當歸　芎藭各肆拾貳銖
附子　細辛各壹兩　防風　人參　牛膝各叁拾銖　柏子人
乾地黃　乾薑　白朮　白芷　桂心
蕪荑各半兩　石斛各叁拾陸銖　厚朴　葉本
右二十味爲末蜜和丸如梧子空腹酒下十五丸至二
十九

大補益當歸圓 治產後虛羸不足胃中少氣腹中拘急疼
痛或引腰脊痛或所下過多血不止虛竭乏氣晝夜不得
眠及崩中面目脫色唇乾口燥亦治男子傷絕或從高墮
婦人補益方

下內有所傷臟虛吐血及金瘡傷犯皮肉方

當歸　芎藭　續斷　乾薑　阿膠
甘草各肆兩　白朮　吳茱萸　附子　白芷各叁
桂心　芍藥各貳兩　乾地黃拾兩
右十三味爲末蜜和丸如梧子大酒服二十九日三夜
一不知加至五十九若有真蒲黃加一升絕妙

當歸圓 治產後所下過多及崩中傷損虛竭少氣面目脫
色腹中痛方

當歸　乾地黃肆兩　續斷　乾薑
白芷伍兩　阿膠各叁兩　附子壹兩
右七味爲末蜜和丸如梧子大酒服二十九日四五服
無當歸芎藭代入蒲黃一兩妙無續斷大薊根代

梔子人圓 治女子遇冬天時行温風至春夏病熱酸懶恍惚不能起居方

紫石英　柏子人各參兩　烏頭　桂心
當歸　澤瀉　芎藭　石斛
遠志　寄生　蓯蓉　乾薑
蜀椒　杜蘅一作仲辛夷各壹兩　細辛壹兩半　甘草各貳兩

右十八味爲末蜜和丸如梧子酒服二十丸漸加至三十九日三服一方用牡蠣一兩

鍾乳羊藿圓 治婦人久虛羸瘦四肢百體煩疼臍下結冷不能食面目瘀黑憂恚不樂百病方

鍾乳參兩　澤蘭參兩　陸錄　防風肆拾貳銖　人參　柏子人　麥門冬　乾地黃　石膏
石斛各壹兩半　芎藭　甘草　白芷　牛膝
山茱萸　薯蕷　當歸　藁本各參拾銖　細辛
桂心各壹兩　蘼蕪半兩　艾葉拾捌銖

右二十一味爲末蜜和丸如梧子酒服二十丸加至四十九日二服

治婦人虛損圓 治婦人虛損及中風餘病疝瘕陰中冷痛或頭風入腦寒痺筋攣緩急血閉無子面上遊風去來目淚出陰中腫痛胷脅支滿或身體皮膚中澁如麻豆苦癢瘀癖結氣或四肢拘攣風行周身骨節疼痛目眩無所見或上

氣惡寒洒淅如瘧或咳嗽鼻鼽風癇癲疾或月水不通魂
魄不定飲食無味并產後內衂無所不治服之令人有子

澤蘭貳兩陸銖　當歸　甘草各壹兩拾銖　芎藭　乾地黃　柏子人
紫石英叁兩　五味子各壹兩半　桂心　石斛　白朮壹兩陸銖
白芷　蒐蕘　乾薑　厚朴　防風　薯蕷
茯苓　乾薑　禹餘粮　細辛　卷柏各壹兩
蜀椒　人參　杜仲　牛膝　蛇床子
續斷　艾葉　蕪荑各拾銖
赤石脂　石膏各貳兩

右三十二味爲末蜜和爲丸如梧子大酒服二十丸至
四十丸久赤白痢去乾地黃石膏麥門冬柏子人加大

婦人補益方

麥蘗陳麴龍骨阿膠黃連各壹兩半有鍾乳加二兩良

婦人補益方

治產後虛羸勞冷身體枉瘦方

澤蘭貳兩陸銖當歸　甘草各壹兩拾銖　芎藭
柏子人　防風　茯苓各壹兩　白芷　蜀椒
藁本　細辛　白朮　桂心　蕪荑
人參　食茱萸　厚朴各拾銖　石膏貳兩

右十八味爲末蜜和丸如梧子大酒服二十丸日三服
稍加至四十丸無疾者依此方春秋二時常服一劑甚
良有病虛羸黃瘦者服如前一方無茯苓石膏有芍藥
乾薑胡洽十五味無柏子人人參食茱萸除細辛桂心
中服之千金崔氏無茯苓
食茱萸有乾薑壹兩

婦人方中卷

主風冷在子宮有子常墮落或始爲婦

便患心痛仍成心疾月水都未曾來服之肥充令人有子

紫石英　天門冬　禹餘粮各叁兩　蘼蕪
烏頭　薤蓉
柏子人　石斛　桂心　甘草　五味子
人參　澤瀉一作澤蘭遠志
杜仲各貳兩　蜀椒　卷柏　寄生　石南
雲母　當歸一作辛夷　烏賊骨各壹兩

右二十二味爲末蜜和爲丸梧子大酒服二十九日二服加至四十九

治風虛不足通血脉補寒冷方亦名石斛澤蘭丸

鍾乳　白石英各肆兩　紫石英　防風
藁本　茯神各壹兩陸銖　澤蘭貳兩陸銖
黃耆　石斛
石膏酪各貳　甘草　當歸

苦參各壹兩拾捌銖　白朮　桂心　人參
乾薑　獨活
乾地黃各壹兩半　白芷
桔梗　細辛
柏子人　五味子　蜀椒
黃芩　薤蓉
芍藥　秦艽　防葵各壹兩
厚朴　蘼蕪各拾捌銖

治男子女人五勞七傷諸不足定志意除煩滿手足虛冷羸瘦及月水往來不調體不能動等病方

右三十二味爲末蜜和丸如梧子大酒服二十九加至三十九日二三服

澤蘭　細辛　黃耆　鍾乳各叁兩　柏子人
乾地黃各貳兩半　大黃　前胡　遠志
紫石英各貳兩　芍藥　白朮　蜀椒各壹兩半

白芷　丹參　梔子一本用枳實　芍藥
桔梗　秦艽　沙參　桂心　厚朴
石斛　苦參　人參　麥門冬　乾薑各壹
附子陸兩去皮　吳茱萸　麥蘗各伍合　陳麴壹升　棗伍拾枚作膏
右三十二味爲末蜜和丸如梧子大酒服二十九加至三十九令人肥健一本無乾薑有當歸參兩

澤蘭散　治產後風虛方
澤蘭玖分禹餘粮　防風各拾分石膏　白芷
乾地黃　赤石脂　肉蓯蓉　鹿茸　芎藭各捌分
蔓本　蜀椒
桂心　甘草　白朮　柏子人各伍分
細辛　當歸　乾薑各柒分蕪荑
厚朴各肆分人參參分

右二十二味治下篩酒服方寸匕日三以意增之

月水不通第二方三十一首

桃仁湯　治婦人月水不通方
桃人　朴消　牡丹皮　射干　土瓜根
黃芩兩各參分芍藥
大黃　柴胡兩各肆分牛膝
桂心兩各貳　水蛭　蝱蟲各柒枚

鼈甲圓　治婦人寒熱羸瘦酸消怠惰胷中支滿肩背脊重痛腹裏堅滿積聚或痛不可忍引腰小腹痛四肢煩疼手足厥逆寒至肘膝或煩滿手足虛熱意欲投水中百節盡痛心下常苦懸痛時寒時熱惡心涎唾喜出每愛鹹酸酢苦之物身體或如雞皮月經不通大小便苦難食不生肌

乾薑　苦窮　茯苓　消石
杏人　水蛭　蝱蟲　桃人
蠐螬　蠐蟲各壹兩　柴胡　芍藥
人參　大黃　蜀椒　當歸各貳兩

右十六味爲末蜜和丸如梧子空心飲下三丸不知加至十丸千金謂以療婦人瘕結脅肋下疾

乾漆湯　治月水不通小腹堅痛不得近方

乾漆　菱蒾　芍藥　細辛
甘草　附子各壹兩　當歸　桂心
芒消　黃芩各貳兩　大黃參兩　吳茱萸壹升

右十二味咬咀以清酒一斗浸一宿煮取三升去滓內芒消烊盡分爲三服相去如一炊頃

芒消湯　治月經不通方

芒消　冊砂末　當歸　芍藥
土瓜根　水蛭各貳兩　大黃參兩　桃人壹升

右八味咬咀以水九升煮取三升去滓內冊砂芒消分爲三服

治月經不通心腹絞痛欲死通血止痛方

當歸　大黃　芍藥各參兩　吳茱萸
乾薑　芎藭　苦窮　蝱蟲　水蛭各貳兩
乾地黃　乾薑　甘草　桂心各壹兩　梔子拾肆枚　桃人壹升
細辛　甘草　桂心各壹兩　梔子拾肆枚　桃人壹升

右十四味咬咀以水一斗五升煮取五升分爲五服一本有牛膝麻子人各三兩

桃人湯　治月經不通方

桃人壹升當歸　土瓜根　大黃　水蛭
蝱蟲　芒消各貳兩　牛膝　麻子人　桂心各參兩
右十味㕮咀以水九升煮取三升半去滓內消令烊分
爲三服卧後無當歸麻子人用牡丹射干黃芩芍藥柴胡各三兩爲十三味千金翼無蝱蟲
前胡牡丹湯　治婦人盛實有熱在腹月經來得熱不通及勞
熱熱病後或因月經來得熱不通方
前胡　牡丹　玄參　桃人　黃芩
射干　旋復花　栝蔞根　甘草各貳兩　芍藥
茯苓　大黃　枳實各參兩
右十三味㕮咀以水一斗煮取三升分爲三服
當歸貝母丸　治月水不通或一月再來或隔月不至或
多或少或淋瀝不斷或來而腰腹刺痛不可忍四體噓吸
月水不通

不欲食心腹堅痛有青黃黑色水下或如清水不欲行動
舉體沈重惟思眠臥欲餐酸物虛乏黃瘦方
乾地黃參兩當歸　甘草各壹兩半　牛膝　芍藥
乾薑　澤蘭　人參　牡丹各壹兩陸銖
丹參　蜀椒　白芷　黃芩　桑耳
桂心酌各壹兩陸銖　蜚蠊拾枚　苦蔞壹兩拾銖　桃人貳兩
水蛭　蝱蟲各柒拾枚　蒲黃貳合
右二十一味爲末蜜和丸如梧子大每日空心酒下十
五丸漸加至三十丸以知爲度一本無
通并新產後瘀血不消服諸湯利血後餘瘀未平宜服之
取平復方

牡丹參兩　芍藥　玄參　桃人
當歸　桂心各貳兩　蝱蟲
蠐螬貳拾枚　瞿麥　莒窮　海藻各壹兩
右十二味爲末蜜和丸如梧子大酒下十五丸加至二
十九血盛者作散服方寸匕腹中當轉如沸血自化成
水去如小便赤少除桂心用地鼈子一兩

薏苡附子湯　治女人從小至大月經未嘗衆顏色萎黃氣
力衰少飲食無味方
薏苡　牡丹　桃人　瞿麥　莒窮各貳兩
黃芩　牡蠣　射干　海藻　大黃各參兩
芍藥　枳實
蝱蟲柒拾枚　水蛭伍拾枚　蠐螬拾枚
右十三味㕮咀以水一斗煮取三升分三服服兩劑後
炙乳下一寸黑貝際各五十枚

治月經不通方
取葶藶一升爲末蜜丸如彈子大綿裹內陰中入三
寸每丸一宿易之有汁出止

乾漆圓　治月經不通百療不瘥方
乾漆　牛膝　土瓜根　射干　芍藥各壹兩半牡丹
柴胡　久吕蟲兩隂銭　桂心　吳茱萸　大黃
蠐螬各貳拾枚　水蛭　桃人　鼈甲各貳兩　蠭蟲
亂髮雞子大貳枚　蝱蟲各柒拾枚　大麻人肆合
右二十味爲末以蜜和爲丸每日酒下十五丸梧子大
漸加至三十丸日三仍用後浸酒服前丸藥

浸酒方

大麻子 叁升 菴蕳子 貳升 桃人 壹升 竈屋炲煤肆兩
土瓜根 射干 各陸兩 牛膝 捌兩 桂心 肆兩

右八味咬咀以清酒三斗絹袋盛藥浸五宿以一盞下
前丸藥甚良或單服之亦好

當歸圓 治女人臍下癥結刺痛如蟲所嚙及如錐刀所刺
或赤白帶下十二疾腰背疼痛月水或在月前或在月後

當歸 葶藶 黃耆 桂心 乾薑 牡丹 細辛 秦椒 甘草 各壹兩 蜣蟲 柴胡 厚朴 各壹兩陸銖
牡蒙 無一方 甘草 各壹兩 蜣蟲 水蛭 各伍拾枚

右十八味爲末蜜和丸如梧子大空心酒下十五丸日

一冊有胎勿服之

鼈甲圓 治女人小腹中積聚大如七八寸盤面上下周流
痛不可忍手足苦冷欬噫腥臭兩脇熱如火炙玉門冷如
風吹經水不通或在月前或在月後服之三十日便瘥有
孕此是河內太守程心夫人方

鼈甲 桂心 各壹兩半 蜂房 半兩 亥參 蜀椒
細辛 人參 苦參 丹參 沙參
吳茱萸 各拾捌銖 蠐螬 貳拾枚 蜣蟲 水蛭 乾薑
牡丹 附子 皂莢 當歸 芍藥
右二十四味爲末蜜和丸如梧子大酒下七丸日三稍
加之以知爲度

治婦人因產後虛冷堅結積在腹內月經往來不時
苦腹脹滿繞臍下痛引腰脊手足煩或冷熱心悶不欲食

鼈甲 煮熟半斤 乾薑 赤石脂 丹參 禹餘粮

甘草 鹿茸 烏賊骨 蠐螬各拾捌錢

桂心 細辛 蜀椒 附子各壹兩

右十七味末蜜和丸如梧子大空心酒下五丸加至十丸

禹餘粮圓 治婦人產後積冷堅癖方

禹餘粮 烏賊骨 吳茱萸 桂心 蜀椒各貳兩半

當歸 白朮 細辛 乾地黃 人參

芍藥 前胡各壹兩陸錢 乾薑叁兩

礬石 陸錢 白薇 紫菀 黃芩捌各拾捌錢 蠐螬壹兩

右十九味爲末蜜和丸如梧子空心酒若飲下二十丸
日二不知則加之

牡蒙圓 治婦人產後十二癥病帶下無子皆是冷風寒氣
或產後未滿百日胞胳惡血未盡便利於懸圊上及久坐
濕寒入胞裏結在小腹牢痛爲之積聚小如雞子大者如
拳按之跳手隱隱然或如蟲嚙或如針刺氣時攙心兩脇
支滿不能食飲食不消化上下通流或守胃管痛連玉門
背膊嘔逆短氣汗出少腹苦寒胞中創熬引陰痛小便自
出子門不正令人無子腰膀疼痛四肢沈重淫躍一身盡
腫尒來尒去大便不利小便淋瀝或月經不通或下如腐
肉青黃赤白黑等如豆汁夢想不祥方亦名紫蓋丸

牡蒙 厚朴 消石 前胡 乾薑

蠐螬　牡丹　蜀椒　黃芩　桔梗
茯苓　細辛　葶藶　人參　芎藭
吳茱萸　桂心　㕮咀各拾大黃貳兩附子壹兩炮去皮破八片錄當歸半兩
右二十味爲末蜜和更擣萬杵丸如梧子大空心酒服
三九日三不知則加之至五六丸下赤白青黃物如魚
子者病根出矣
治月經不通結成癥瘕如石腹大骨立宜此破血下癥方
大黃　消石各兩　巴豆　蜀椒各壹兩代赭
柴胡熬令色如水蛭　丹參熬令紫色土瓜根各叁兩
乾漆　芎藭　蠐螬　茯苓各貳兩
右十四味爲末巴豆別研蜜和丸如梧子空心酒服二
丸日再服千金䇿無柴胡水蛭用參土瓜根

大蠐螬圓　治月經不通六七年或腫滿氣逆腹脹瘕瘕宜
服此數有神驗方
蠐螬肆伯熬　蠐螬肆伯熬　蠐螬壹升　乾地黃　牡丹　乾漆
芎藭　牛膝　土瓜根　桂心各肆兩　吳茱萸
桃人　黃芩　牡蒙各叁兩　茯苓　海藻各伍兩
水蛭叁伯熬　芒消壹兩　人參壹兩半　葶藶伍合
右十九味爲末蜜和丸如梧子大每日空心酒下七丸
不知加之日三服千金䇿無芒消人參

桂心酒　治月經不通結成癥瘕方
桂心　牡丹　芎藭　牛膝　乾漆
土瓜根　牡蒙各肆兩　吳茱萸壹升　大黃叁兩　黃芩
乾薑各貳兩　蠐螬貳伯熬　蠐螬　蠐螬　水蛭各柒拾枚

亂髮灰　細辛各壹兩　殭蠶伍拾枚　大麻人　竈突墨叁升

乾地黃陸兩　虎杖根　鼈甲各伍兩　菴蕳子貳升

右二十四味㕮咀以酒四斗分兩甕漫之七日併一甕盛攪令調還分作兩甕初服二合日二加至三四合

虎杖煎　治腹內積聚虛脹雷鳴四肢沈重月經不通亦治丈夫病方

取高地虎杖根細剉二斛以水二石五斗煮取一大斗半去滓澄濾令淨取好淳酒五升和煎令如餳每服一合消息爲度不知則加之

又方　治月經閉不通結瘕腹大如甕短氣欲死方

虎杖根百斤去頭去土暴乾切　土瓜根　牛膝各取汁二斗

右三味㕮咀以水一斛浸虎杖根一宿明旦煎取二斗內土瓜牛膝汁攪令調勻煎令如餳每以酒服一合日再夜一宿血當下若病去止服

桃人煎　治帶下經閉不通方

桃人　蝱蟲各壹升　朴消伍兩　大黃陸兩

右四味爲末別治桃人以醇苦酒四升內銅鐺中炭火煎取二升下大黃桃人蝱蟲等攪勿住手當欲可丸下朴消更攪勿住手良久出之可丸乃止取一丸如雞子黃投酒中預一宿勿食服之至晡時下如大豆汁或如雞肝凝血蝦蟇子或如膏此是病下也

治月經不通臍下堅結大如杯升發熱往來下痢羸瘦此爲氣瘕一作瘕若生肉癥不可爲也療之方

生地黃參拾斤取汁　乾漆壹斤爲末

右一味以漆末內地黃汁中微火煎令可丸每服酒下
如梧子大三丸不知加之常以食後服
治月經不通甚極閉塞方
牛膝壹斤　麻子叁升蒸　土瓜根叁兩　桃人貳升
右四味㕮咀以好酒一斗五升浸五宿一服五合漸加
至一升日三能多益佳
治產後風冷留血不去停結月水閉塞方
桃人　麻子人各貳升　菴蕳子壹升
右三味㕮咀以好酒三斗浸五宿每服五合日三稍加
至一升
五京圓　治婦人腹中積聚九痛七害及腰中冷引小腹害
食得冷便下方

月經

乾薑　當歸　罌蜀椒各叁兩　附子壹兩　吳茱萸壹升
右八味爲末蜜和九如梧子初服三九日二加至十九
此出京氏五君故名五京久患冷困當服之
雞鳴散圓　治婦人癥瘕積聚方
皂莢壹分熬盧　很毒　黃芩　牡蠣各貳兩
杏人　乾薑　桂心　巴豆各貳分　前胡
人參各肆分代赭伍分阿膠陸分大黃拾分
右十四味爲末蜜丸如梧子雞鳴時服一丸日益一丸
至五九止仍從一起下白者風也赤者癥瘕也青微黃
者心腹病

遼東都尉所上圓　治臍下堅癖無所不治方

恒山　大黃　巴豆各壹分　天雄貳枚若參

白薇　乾薑　人參　細辛　狼牙

龍膽　沙參　玄參　丹參各叁分　芍藥

附子　牛膝　茯苓各伍分　牡蒙肆分

雚蘆陸分　一方云貳兩參分

右二十味爲末蜜丸宿勿食服五丸日三大羸瘦月水不調當二十五日服之下長蟲或下種種病出二十五日服中所苦悉愈肌膚盛五十日萬病除斷緒者有子

牡蠣圓 治經閉不通不欲飲食方

牡蠣肆兩　大黃壹斤　柴胡伍兩　乾薑叁兩　芍藥

茯苓各貳兩半　蜀椒拾兩　葶藶子　芒消　杏人各伍合

水蛭　蝱蟲各半　桃人柒拾枚

右十三味爲末蜜丸如梧子大飲服七丸日三

當歸圓 治腰腹痛月水不通利方

當歸　芎藭各肆兩　蝱蟲　烏頭

丹參　乾漆各壹兩　人參　牡蠣

土瓜根　水蛭各貳兩　桃人伍拾枚

右十一味爲末以白蜜丸如梧子大酒下三丸日三服

消石湯 治血瘕月水留瘀血大不通下病散堅血方

消石　附子　蝱蟲各叁兩　大黃　細辛

乾薑　黃芩各壹兩　芍藥　土瓜根　丹參

代赭　蠐螬各貳兩　大棗拾枚　桃人貳升　牛膝壹斤

朴消肆兩

右十六味咬咀以酒五升水九升漬藥一宿明旦煎取

四升去滓下朴消消石烊盡分四服相去如炊頃去病
後食黃鴨羹勿見風

赤白帶下崩中漏下第三論一首方六十五炙法八首

論曰諸方說三十六疾者十二癥九痛七害五傷三痼不
通是也何謂十二癥是所下之物一曰狀如膏二曰如黑
血三曰如紫汁四曰如赤肉五曰如膿痂六曰如豆汁七
曰如葵羹八曰如凝血九曰如清血血似水十曰如米泔
十一曰如月浣乍前乍却十二曰經度不應期也何謂九
痛一曰陰中痛傷二曰陰中淋瀝痛三曰小便即痛四曰
寒冷痛五曰經來即腹中痛六曰氣滿痛七曰汁出陰中
如有蟲嚙痛八曰脅下分痛九曰腰胯痛何謂七害一曰
窮孔痛不利二曰中寒熱痛三曰小腹急堅痛四曰藏不
仁五曰子門不端引背痛六曰月浣乍多乍少七曰害吐
何謂五傷一曰兩脇支滿痛二曰心痛引脇三曰氣結不
通四曰邪思洩利五曰前後痼寒何謂三痼一曰羸瘦不
生肌膚二曰絕產乳三曰經水閉塞病有異同具治之方

白墜圓治女人三十六疾方又方見後

白墜　龍骨　芍藥各拾捌銖　黃連　當歸
茯苓　黃芩　矍麥　白斂　石韋
甘草　牡蠣　細辛　附子　禹餘粮
白石脂　人參　烏賊骨　蘗本　甘皮
大黃已上各半兩

右二十一味爲末蜜和丸如梧子大空腹飲服十九日
再不知加之二十日知一月百病除若十二癥倍牡蠣

崩漏

禹餘粮烏賊骨白石脂龍骨若九痛倍黃連白斂甘草
當歸若七害倍細辛蘗本甘皮加椒茱萸各一兩若五
傷倍大黃石韋瞿麥若三痼倍人參加赤石脂礬石巴
戟天各半兩合藥時隨病增減之
治女人腹中十二疾一曰經水不時二曰經來如清水三
曰經水不周時五曰生不乳六曰絕無子七曰
陰陽減少八曰腹苦痛如刺九曰陰中寒十曰子門相引
痛十一曰經來凍如葵汁狀十二曰腰急痛凡此十二病
得之時因與夫卧起月經不去或卧濕冷地及以冷水洗
浴當時取快而後生百疾或癥瘕未瘥便合陰陽及起早
作勞衣單席薄寒從下入方
半夏 赤石脂各壹兩陸錢 蜀椒

乾薑 吳茱萸 當歸 桂心
丹參 白斂 防風各壹兩 瞿麥半兩
右十一味爲末蜜和丸如梧子大每日空心酒服十丸
日三不知稍加以知爲度

白石脂圓 治婦人三十六疾胞中痛漏下赤白方
白石脂 烏賊骨 禹餘粮 牡蠣各拾捌銖
赤石脂 乾地黃 乾薑 龍骨 桂心
石韋 白斂 細辛 芍藥 黃連
附子 當歸 蜀椒 鍾乳
白芷 芎藭 甘草各半兩
右二十二味爲末蜜和丸如梧子大每日空心酒下十
五丸日再一方有黃蘗半兩

小牛角鰓散 治帶下五賁一曰熱病下血二曰寒熱下血三曰經脉未斷爲房事則血漏四曰經來舉重傷任脉下血五曰産後臟開經利五賁之病外實內虛方

牛角鰓壹枚燒令赤　鹿茸　禹餘粮
當歸　乾薑　續斷各貳兩　阿膠叁兩
烏賊骨　龍骨各壹兩　赤小豆貳升

右十味治下篩空腹以酒服方寸匕日三（千金無鹿茸烏賊骨）

龍骨散 治淳下十二病絶産一曰白帶二曰赤帶三曰經水不利四曰陰胎五曰子藏堅六曰藏癖七曰陰陽患痛八曰內強九曰腹寒十曰藏閉十一曰五藏酸痛十二曰夢與鬼交宜服之（淳下一本作腹下）

龍骨叁兩　黃蘗　半夏　竈中黃土
桂心　乾薑各貳兩　石韋　滑石各壹兩
烏賊骨　代赭各肆兩　白殭蠶伍枚

右十一味治下篩酒服方寸匕日三白多者加烏賊骨殭蠶各二兩赤多者加代赭五兩小腹冷加黃蘗二兩子藏堅加乾薑桂心各二兩已上各隨病增之服藥三月有子即住藥藥太過多生兩子當審方取好藥寡婦童女不可妄服

治女人帶下諸病方

大黃蒸叁斗米下　附子　茯苓　牡蒙
牡丹　桔梗　葶藶各叁兩　厚朴　芎藭
人參　當歸　蜈蚣　蜀椒　吳茱萸
柴胡　乾薑　桂心各半兩　細辛貳兩半

帶下

右十八味爲末蜜和丸如梧子大每日空心酒服二九
不知加之以腹中温温爲度一本有昧子參兩澤瀉
治帶下百病無子服藥十四日下血二十日下長蟲及清
黄汁出三十日病除五十日肥白方

大黄破如豆粒熬令黑色 柴胡 朴消各壹斤
芎藭伍兩 乾薑 蜀椒各壹升 茯苓如雞子大壹枚
右七味爲末蜜丸如梧子大先食米飲服七丸不知加
至十九以知爲度

治帶下方

枸杞根壹斤 生地黄伍斤
右二味㕮咀以酒一斗煮取五升分爲三服水煮亦得
治婦人及女子赤白帶方

禹餘粮 當歸 芎藭各壹兩半 赤石脂 白石脂
阿膠 龍骨 石韋壹兩 烏賊骨 黄蘗
白斂 黄芩一名黄連續斷 桑耳 牡蠣各壹兩
右十五味爲末蜜丸梧子大空心飲下十五九日再加
至三十丸爲度

白馬蹄圓 治女人下焦寒冷成帶下赤白涎方

白馬蹄 鼈甲 鯉魚甲 龜甲 蜀椒各壹兩
礜石 甘草 杜仲 蕳蘞 當歸
續斷 芎藭 禹餘粮 桑耳 附子各貳兩
右十五味爲末蜜丸梧子大以酒服十九加至三十九
日三服一本無鼈甲

白馬騧散 治帶下方下白者取白馬騧下赤
者取赤馬騧隨色取之

白馬駃貳兩　龜甲肆兩　鼈甲拾捌銖　牡蠣壹兩拾捌銖

右四味治下篩空心酒下方寸匕日三服加至一匕半治五色帶下方

服大豆紫湯日三服方見前三卷風痛中

又方　燒馬左蹄爲末以酒服方寸匕日三服

又方　燒狗頭和毛皮骨爲末以酒服方寸匕

又方　黃顝帶汁服一杯良

又方　燒馬蹄底護乾爲末以酒服方寸匕日三

雲母苦寒散　衛公治五崩身瘦欬逆煩滿少氣心下痛面生瘡腰痛不可俛仰陰中腫如有瘡狀毛中癢時痛與子藏相通小便不利常拘急頭眩頸項急痛手足熱氣逆衝急心煩不得卧腹中急痛食不下吞醋噫苦上下腸鳴漏下赤白青黃黑汁大臭如膠汚衣狀皆是內傷所致中寒即下白熱即下赤多飲即下黑多食即下黃多藥即下青或喜或怒心中常恐或憂勞便發動大惡風寒

雲母　苦寒　代赭　東門邊木燒各壹兩　白堊　蝟皮炙各貳兩　烏賊骨　白蘞　鯉魚頭各拾捌銖　桂心　伏龍肝　生

右十一味治下篩酒服方寸匕日三夜一　一方有龍骨乾薑

黃散　治崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令人面黑無潤色皮骨相連月經失度往來無常小腹弦急或苦絞痛上至心兩脅腫脹食不生肌膚令人偏枯氣息之少腰脊痛連脇不能久立每嗜卧困懶又方見後

慎火草　白石脂　禹餘粮　鼈甲

乾薑　細辛　當歸　吉窮
石斛　芍藥
薔薇根皮　乾地黃各肆兩　熟艾　桂心各壹兩
右十六味治下節空腹酒服方寸匕日三稍加至二匕
若寒多者加附子炮去皮各一兩白多
者加乾薑白石脂赤多者加桂心代赭各二兩

禹餘糧圓　治崩中赤白不絕用篤方
禹餘糧伍兩　白馬蹄拾兩
鹿茸貳兩　烏賊魚骨壹兩　龍骨參兩
右五味為末蜜丸梧子大以酒服二十九日再以知為度

攝續無餘糧圓　治女人勞損因成崩中狀如月經來去多
不可禁止積日不斷五藏空虛失色黃瘦崩竭暫止少日
復發不耐動搖小勞輒劇治法且宜與湯未宜與此丸也
發時服湯減退即與此丸若是疾久可長與此方

禹餘糧　龍骨　人參　桂心　紫石英
烏頭　寄生　杜仲　五味子　遠志各貳兩
澤瀉　當歸　石斛　蒐絲　乾薑各參兩
蜀椒　牡蠣　甘草各壹兩
右十八味為末蜜丸梧子大空心酒下十九漸加至二
十九日三服

治女人白崩及痔病方
棍耳　白斂　艾葉　浦黃　白芷各貳
薯蕷　入參　續斷　當歸　禹餘糧
橘皮　茯苓　乾地黃　蝟皮各參　牛角鰓肆兩

猪後懸蹄貳拾箇　白馬蹄肆兩酒浸一宿熬

右十七味爲末蜜丸每日空心酒下二十九日二加之

治婦人忽暴崩中去血不斷或如鵝鴨肝者方

小薊根陸兩　當歸　阿膠　續斷
青竹茹　芎藭各叁兩　生地黃捌兩　地榆
釜月下土各肆觔製

右十味以水八升和馬通汁煮取三升分三服不止頻服二四劑未全止續服後丸方

續斷　甘草　地榆　鹿茸　小薊根
飛麥各拾錢乾地黃貳兩半　芎藭　赤石脂
阿膠　當歸各壹兩半　柏子人壹兩集驗作柏葉
龜甲　秦牛角鰓各叁兩劉熬令黑

右十四味爲末蜜丸梧子大空心以酒服十九日再後稍加至三十九

治女人崩中去赤白方

白馬蹄伍兩　蒲黃　鹿茸　禹餘粮　白馬髻毛
小薊根　白芷　續斷各肆兩　人參　乾地黃
柏子人　烏賊骨　黃耆　茯苓　當歸各參兩
艾葉　蒐蓉　伏龍肝各貳兩

右十八味爲末蜜丸如梧子大空心飲服二十九日再加至四十九

當歸湯　治崩中去血虛羸方

當歸　芎藭　黃芩
芍藥　甘草各貳兩　生竹茹貳升

右六味咬咀以水一斗煮竹茹取六升去滓內諸藥煎取三升半分三服忌勞動嗔怒禁百日房事

治崩中晝夜十數行衆醫所不能瘥者方

芎藭八兩咬咀以酒五升煮取三升分三服不飲酒水煮亦得

治崩中下血出血一斛服之即斷或月經來過多及過期不來者服之亦佳方

呉茱萸

芍藥

生薑

右十二味咬咀以水一斗煮取三升分爲三服

當歸各參兩芎藭

人參

牡丹

桂心

阿膠

甘草各貳兩半夏捌兩

麥門冬壹升

治暴崩中去血不止方

牡蠣

兎骨各貳兩半炙

右二味治下篩酒服方寸匕日三

治女人白崩方

芎藭

桂心

阿膠

赤石脂

小薊根各貳兩

乾地黃雉兩伏龍肝如雞子大柒枚

右七味咬咀以酒六升水四升合煮取三升去滓內膠令烊盡分三服日三千金翼止六味無伏龍肝

伏龍肝湯 治崩中去赤白或如豆汁方

伏龍肝如彈丸柒枚

生地黃伍兩

甘草

艾葉

赤石脂

桂心各貳兩

右七味咬咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一

治積冷崩中去血不止腰背痛四肢沈重

虛極方

牛角人燒灰續斷 乾地黃 桑耳
白朮 赤石脂 礬石 乾薑
附子 龍骨 當歸各參兩 人參壹兩
蒲黃 防風 禹餘粮各貳兩

右十五味治下篩以温酒未食服方寸匕日三不知加
治崩中去血積時不止起死方

生地黃湯 治崩中及諸藥煮取三升分四服即斷尤宜羸瘦人服之

生地黃壹斤 乾薑 當歸各參兩 生地黃貳升
細辛參兩

右四味㕮咀以水二斗煮羊肉取一斗三升下地黃汁
煮取三升分四服即斷尤宜羸瘦人服之

治崩中漏下赤白不止氣虛竭方

龜甲〃 牡蠣各參兩

右二味治下篩酒服方寸匕日三

又方 燒亂髮酒和服方寸匕日三

又方 桑耳貳兩半 鹿茸拾捌銖

右二味以醋五升漬炙燥漬盡爲度治下篩服方寸匕
日三

又方 燒鹿角爲末酒服方寸匕日三

又方 燒桃核爲末酒服方寸匕日三

又方 地榆

知母

右二味各指大長一尺者㕮咀以醋三升東向竈中治

極濃去滓服之

桑木中蜴屎燒灰酒服方寸匕

治崩中下血羸瘦少氣調中補虛止血方

澤蘭　蜀椒炒去汗陸錢　藁本　柏子人　山茱萸
厚朴各拾捌錢　乾地黃　牡蠣各壹兩半　代赭　桂心
防風　細辛　乾薑各壹兩拾捌錢　蕪荑半兩　甘草　當歸
芎藭各壹兩拾捌錢

右十七味治下篩空心溫酒服方寸匕日三神良一方

加白芷龍骨各十八銖人參一兩十八銖爲一十味

治崩中方

白茅根參斤　小薊根伍斤

右二味㕮咀以水五斗煎取四斗稍稍服之外臺用酒煎

丹參酒　治崩中去血及產餘疾方

丹參　艾葉　地黃　忍冬　地榆各伍斤

右五味剉先洗曰乾米一斛炊飯釀酒酒熟舂以水漬三宿出滓煮取汁以黍

牡丹皮湯　治崩中血盛併服三劑即瘥方

牡丹皮　乾地黃　斛脉各參兩　禹餘粮　艾葉
龍骨　柏葉　厚朴　白芷　伏龍肝
青竹茹　芎藭　地榆各貳兩　阿膠壹兩　芍藥肆兩

右十五味㕮咀以水一斗五升煮取五升分五服相去如人行十里久再服

治崩中單方

燒牛角末以酒服方寸匕日三服亦治帶下

又方 桑耳燒令黑爲末酒服方寸匕日二服亦治帶下

又方 生薊根一斤半擣取汁温服亦可酒煮服之

又方 羊脛一具以酢煮去血服之即止忌猪魚酢滑物犯之便死亦治帶下

治白崩方

灸小腹橫文當臍孔直下百壯又灸內踝上三寸左右各百壯

論曰治漏血不止或新傷胎及産後餘血不消作堅便胞門不閉淋瀝去血經踰日月不止者未可以諸斷血湯宜且與牡丹丸散等待血堅消便停也堅血消者所去淋瀝便自止亦漸變消少也此後有餘傷毀不復處此乃可作諸主治耳婦人産乳去血多傷胎去血多崩中去血多金

瘡去血多拔牙齒去血多未止心中懸虛心悶眩冒頭重目暗耳聾漏舉頭便悶欲倒宜且煮當歸芎藭各三兩以水四升煮取二升去滓分二服即定衰轉續次合諸湯治之

白墨圓 治女人三十六疾胞中病漏下不絶方又方見前

堊鄂白墨	禹餘粮	白芷	白石脂
乾薑	桂心	矍麥	大黃
石韋	白斂	細辛	芍藥	甘草
黃連	附子	當歸	茯苓	鍾乳
蜀椒	黃芩各半兩	牡蠣	烏賊骨各拾捌銖

右二十三味爲末蜜丸梧子大空心酒服五丸日再服不知加至十丸

治女人漏下或産或劇常漏不止身體羸瘦飲食減少或赤或白或黃使人無子者方

牡蠣　伏龍肝　赤石脂　白龍骨
桂心　烏賊骨　禹餘粮各等分

右七味治下篩空心酒服方寸匕日二白多者加牡蠣龍骨赤多者加赤石脂禹餘粮黃多者加伏龍肝桂心隨病加之（張文仲同亦療崩中附後無白龍骨以粥飲服）

治婦人漏下不止散方

鹿茸　阿膠各參兩　烏賊骨　當歸各貳兩　蒲黃壹兩
礬石壹兩　附子壹枚

右五味治下篩空心酒服方寸匕日二夜再服

治女人産後漏下及痔病下血方

右二味爲末蜜丸如梧子大空心酒下二九日三稍加至五丸數日産能百日服之永斷

治帶下漏血不止方

芎藭　吳茱萸

右八味吸咀以水一斗煮取三升分三服若月經後因有赤白不止者除地黃吳茱萸更加杜仲人參各二兩

治漏下不止方

乾地黃　薯蕷　芍藥
甘草各貳兩　當歸　乾薑各參兩

治漏下神方

取槐子燒末酒服方寸匕日三立瘥

治漏下去黑方

乾㮈 麻黃 細辛 桂心各壹兩 甘草半兩

右五味治下篩以指撮著米飲中服之

治漏下去赤方

白朮貳兩 白薇半兩 黃蘗貳兩半

右三味治下篩空心酒服方寸匕日三

治漏下去黃方

黃連 黃芩 大黃 桂心各半兩

右六味治下篩空心酒服方寸匕日三

治漏下去青方

大黃 蠐螬 乾地黃各陸銖 黃芩 白薇各半兩 桂心 牡蠣各陸銖

右五味治下篩空心酒服方寸匕日三

治漏下去白方

鹿茸壹兩 白斂拾捌銖 狗脊半兩

右三味治下篩空心米飲服方寸匕日三

治女子漏下積年不斷困篤方

取鵲重巢柴燒灰作末服方寸匕日二服三十日愈

甚良重巢者鵲去年在巢中產今年又在上作重巢

產者是也

馬通湯 治漏下血積月不止方

赤馬通汁一升取新馬屎絞取汁 生艾葉

阿膠各參兩 當歸 乾薑各貳兩 好墨半圓

右六味㕮咀以水八升酒二升煮取三升去滓內馬通

汁及膠微火煎取二升分再服相去如人行十里久

馬蹄膏湯 治白漏不絶方

白馬蹄　赤石脂各伍兩　禹餘粮　烏賊骨
龍骨　牡蠣各肆兩　附子　乾地黄
當歸各叁兩　甘草貳兩　白薑壹兩

右十一味㕮咀以水二斗煮取九升分六服日三

馬蹄圓 治白漏不絶方

白馬蹄　禹餘粮各肆兩　龍骨叁兩
烏賊骨　白薑蠶　赤石脂各貳兩

右六味爲末蜜丸梧子大酒服十丸不知加至三十丸

愼火草散 治漏下方又方見前

愼火草拾兩㮚令黄　當歸　龍骨半兩
阿膠各肆兩　鹿茸

右五味治下篩先食酒服方寸匕日三

蒲黄散 治漏下不止方

蒲黄半升　鹿茸　當歸各貳兩

右三味治下篩酒服五分匕日三不知稍加至方寸匕

灸法

女人胞漏下血不可禁止灸關元兩傍相去三寸
女人陰中痛引心下及小腹紋痛腹中五寒灸關儀百壯
究在膝外邊上一寸宛宛中是　寸宛宛中是
女人漏下赤白及血灸足太陰五十壯究在內踝上三寸
足太陰經內踝上三寸名三陰交
女人漏下赤白月經不調灸交儀二十壯究在內踝上五
寸

女人漏下赤白炙營池四穴二十壯穴在內踝前後兩邊
池中脉上一名陰陽是
女人漏下赤白四肢酸削炙漏陰二十壯穴在內踝下五
分微動脚脉上
女人漏下赤白泄注炙陰陽隨年壯三報穴在足拇趾下
屈裏表頭白肉際是

月經不調第四方二十二首 炙法一首

白堊圓 治婦人月經一月再來或隔月不來或多或少淋瀝不斷或來而腰腹痛噓吸不能食心腹痛或青黃黑色或如水舉體沈重方

白堊 白石脂 牡蠣 禹餘粮 龍骨
烏賊骨各壹兩半 當歸 芍藥
細辛 乾薑 桂心 人參
瞿麥 石韋 白芷 白歛 附子
甘草各壹兩 蜀椒半兩

桃人湯 治產後月水不調或淋瀝不斷或後復來狀如瀉水四體虛噓吸不能食腹中堅痛不可行動月水或前或後或經月不來舉體沈重惟欲眠臥多思酸物方

桃人 牛膝 桂心 牡丹皮 當歸各叁兩 芍藥
枚伍拾 生薑 半夏各肆兩 地黃搗兩浦黃洗合 甘草 芍藥 人參各貳兩

右十四味咬咀以水二斗煮取六升半分六服

黃連 茯苓 乾薑 桂心 人參
瞿麥 石韋 白芷 白歛 附子
甘草各壹兩 蜀椒半兩

右二十一味爲末蜜丸如梧子大空心酒下二十丸日三至月候來時日四五服爲佳

杏人湯 治月經不調或一月再來或兩月三月一來或月前或月後閉塞不通方

杏人貳兩桃人壹兩大黃參兩水蛭　蝱蟲各參拾枚

右五味咬咀以水六升煮取二升分三服一服當有物隨大小便有所下下多者止之少者勿止盡三服

大黃朴消湯 治經年月水不利胞中有風冷所致宜下之

大黃　牛膝各伍兩朴消　牡丹　甘草

紫菀各參兩異作紫蔵千金　水蛭　蝱蟲各伍拾枚代赭壹兩桃人　乾薑　細辛　芒消各貳兩麻人伍合

右十四味咬咀以水一斗五升煮取五升去滓內消令烊分五服五更爲首相去一炊頃自下後將息忌見風月水

桑黃蝱蟲湯 治久寒月經不利或多或少方

吳茱萸參升蝱蟲　水蛭　蠐螬　牡丹各壹兩生薑壹斤小麥　半夏各壹大棗貳拾枚桃人伍拾枚

右十五味咬咀以酒一斗水二斗煮取一斗去滓適寒温一服一升日三不能飲酒人以水代之湯欲成乃內諸蟲不耐藥者飲七合

抵當湯 治月經不利腹中滿時自減并男子膀胱滿急方

虎掌千金異作虎杖　大黃各貳兩桃人參拾枚水蛭貳拾枚

右四味以水二升煮取一升盡服之當下惡血爲度

十灰圓 治月經不利手足煩熱腹滿默默不欲語心煩方

大黃壹兩半　前胡一作柴胡　芒消煞各伍兩　葶藶

芎藭各壹　弱椒並熬各六銖　茯苓拾伍銖

杏人 玖粒 敎 桃人 貳拾枚 敎 蟅蟲 熬 水蛭 各貳錢 蟅蟲 熬

大黃　芍藥　蝱蟲各貳兩　土瓜根
蜀椒　黃芩　白朮　乾薑
地骨皮一作炭　芎藭各壹兩　桂心　乾漆酪煙
右十二味爲末蜜丸如梧子每服十九日三不知加之
小腹裏急下引腰身重方

生脈圓　治產後月水往來下多下少仍復不通時時疼痛

牛膝　芍藥　人參　大黃酪炙　牡丹皮
甘草　當歸　芎藭各貳兩　桂心壹兩　蠐螬各肆拾枚　蝱蟲
螬蟲　斑蠭各柒拾枚　水蛭各柒拾枚
右十四味爲末蜜丸如梧子酒服五丸日三不知稍增

又方　鹿角末服之

又方　生地黃汁三升煮取二升服之

又方　飲人乳汁二合

又方　燒月經衣井花水服之

又方　燒白狗糞焦作末酒服方寸匕日三

又方　取白馬尿服一升良

治月經不斷方

舶茹一斤淨洗河水四升半煮取二升分二服

又方　服地黃酒良

又方　燒箕舌灰酒服之

又方　服大豆酒亦佳

灸內踝下白肉際青脉上隨年壯

重刊孫真人備急千金要方卷之四

論曰夫生民之道莫不以養小爲大若無於小卒不成大故易稱積小以成大詩有厥初生民傳云聲子生隱公此之一義即是從微至著自少及長人情共見不待經史故今斯方先婦人小兒而後丈夫者老者則是崇本之義也然小兒氣勢微弱醫士欲留心救療立功差難今之學者多不存意良由嬰兒在於襁褓之內乳氣腥臊醫者操行英雄詎肯瞻視靜而言之可爲大息者矣小品方云凡人年六歲已上爲小十六已上爲少（巢源外臺作十八已上爲少）三十已上爲壯（巢源外臺作二十已上爲壯）五十已上爲老其六歲已下經所不載所以乳下嬰兒有病難治者皆爲無所承據也中古有巫妨（巢源作巫方）者立小兒顱顖經以占夭壽判疾病死生世相傳授始有小兒方焉逮于晉宋江左推諸蘇家傳習有驗流於人間齊有徐王者亦有小兒方三卷故今之學者頗得傳授然徐氏位望隆重何暇

留心於少小詳其方意不甚深細少有可採未爲至秘今博撰諸家及自經用有效者以爲此卷下痢等餘方並散在諸篇可小之術則無橫夭之禍也

又曰小兒病與大人不殊惟用藥有多少爲異其驚癎客忤解顱不行等八九篇合爲此卷下痢等餘方並散在諸篇可披而得之

凡生後六十日瞳子成能咳笑應和人百日任脉成能自反覆（一作五十日百日）八十日尻骨成能獨坐三百一十日掌骨成能匍匐三百日臏骨成能獨立三百六十日膝骨成能行此其定法若不能依期者必有不平之處

凡兒生三十二日一變六十四日再變變且蒸九十六日三變一百二十八日四變變且蒸一百六十日五變一百九十二日六變變且蒸二百二十四日七變二百五十六日八變

變且蒸二百八十八日九變三百二十日十變變且蒸後六十四日大蒸蒸後一百二十八日復大蒸凡小兒自生三十二日一變再變為一蒸凡十變而五小蒸又三大蒸積五百七十六日大小蒸都畢乃成人小兒所以變蒸者是榮其血脉改其五藏故一變音輒覺情態有異其變蒸之候變者上氣蒸者體熱變蒸有輕重其輕者體熱而微驚耳冷尻冷上脣頭白泡起如魚目珠子微汗出其重者體壯熱而脉亂或汗或不汗不欲食食輒吐哯目白精微赤黑精微白又云目白者重赤黑者微變蒸畢自精明矣此其證也單變小微兼蒸小劇凡蒸平者五日而衰遠者十日而衰先期五日後之五日為十日之中熱乃除耳兒生三十二日一變二十九日先期而熱便治之如法至三十六七日蒸乃畢耳恐不解了故重說之且

變蒸之時不欲驚動勿令傍多人兒變蒸或早或晚不如法者多又初變之時或熱甚者違日數不歇密計變蒸之日當其時有熱微驚慎不可治及灸刺但和視之若良久熱不已少與紫丸微下熱歇便止若於變蒸之中加以時行温病或非變蒸時而得時行者其診皆相似惟耳及尻通熱口上無白泡耳當先服黑散以發其汗汗出温粉粉之熱當歇便就差若猶不都除乃與紫丸下之兒變蒸時若有寒加之即寒熱交爭腹腰天糺啼不止者尉之則愈也（熨法出下篇灸粉絮熨者是）變蒸與温壯傷寒相似若非變蒸身熱耳熱尻亦熱此乃為他病可作餘治審是變蒸不得為餘治也

又一法凡兒生三十二日始變變者身熱也至六十四日再變變且蒸其狀臥端正也至九十六日三變定者候丹孔出而泄至一百二十八日四變

十日五變以成機關也至一百九十二日六變變且蒸五機成也至二百二十四日七變以能匍匐也至二百五十六日八變變且蒸以知欲學語也至二百八十八日九變四蒸也當其變之日慎不可妄治之則加其疾變且蒸者是兒送迎月也蒸者甚熱而脉亂汗出是也近者五日歇遠者八九日歇也當是蒸上不可灸刺妄治之也

紫丸治小兒變蒸發熱不解并挾傷寒温壯汗後熱不歇及腹中有痰癖哺乳不進乳則吐哯食癇先寒後熱者方

代赭　赤石脂酸一兩　巴豆三十枚　杏人五十枚

右四味末之巴豆杏人別研為膏相和更擣三千杵當自相得若硬入少蜜同擣之密器中收三十日兒服如麻子一丸與少乳汁令下食頃後與少乳勿令多至日中當小下熱除若未全除明旦更與一丸百日兒服如小豆一丸以此準量增減夏月多熱喜令發疹三十日輒一服佳紫

黑散治小兒變蒸中挾時行温病或非變蒸時而得時行者方

麻黄半兩　大黄銖六　杏人半兩

右三味先擣麻黄大黄為散別研杏人如脂乃細細内散又擣令調和内密器中一月兒服小豆大一枚以乳汁和服抱令得汗汗出温粉粉之勿使見風百日兒服如棗核以兒大小量之

擇乳母法

凡乳母者其血氣為乳汁也五情善惡悉是血氣所生也其乳兒者皆宜慎於喜怒夫乳母形色所宜其候甚多不可求備但取不胡臭癭癰瘻氣欶瘡疥癡瘖白禿癜瘍瀋唇耳聾聾龜

臭瘡癤無此等疾者便可飲兒也師見其故灸瘢便知其先疾之源也

初生出腹第二論二首二十事

論曰小兒初生先以綿裹指拭兒口中及舌上青泥惡血此爲之玉衡一作衝若不急拭啼聲一發即入腹成百病矣兒生落地不作聲者取暖水一器灌之須臾當啼兒生不作聲者此由難產少氣故也可取兒臍帶向身却捋之令氣入腹仍呵之至百度啼聲自發亦可以葱白徐徐鞭之即啼兒亦生即當舉之舉之遲晚則令中寒腹內雷鳴乃先浴之然後斷臍不得以刀子割之須令人隔單衣物咬斷兼以暖氣呵七遍然後纏結所留臍帶令至兒足趺上短則中寒令兒腹中不調常下痢若先斷臍然後浴者則臍中水臍中水則發腹痛其臍斷訖連臍帶中多有蟲宜急剔撥去之不爾入兒腹

成疾斷兒臍者當令長六寸長則傷肌短則傷藏不以時斷若授汁不盡則令暖氣漸微自生寒令兒臍風生兒宜用其父故衣裹之生女宜以其母故衣皆勿用新帛爲善不可令衣過厚令兒傷皮膚害血脉發雜瘡而黃兒衣綿帛特忌厚熱慎之慎之凡小兒始生肌膚未成不可暖衣暖衣則令筋骨緩弱宜時見風日若都不見風則令肌膚脆輭便易中傷也凡天和暖無風之時令母將兒於日中嬉戲數見風日則血凝氣剛肌肉牢密堪耐風寒不致疾病若常藏在幃帳之中重衣溫暖譬猶陰地之草木不見風日輭脆不堪風寒也凡裹臍法椎治白練令柔輭方四寸新綿厚半寸爲帛等令合之調其緩急急則令兒吐哯兒生三十日乃解視臍若十許日兒怒啼似衣中有刺者此或臍燥還剌其腹當解之易衣更裹裹臍時閉戶下帳然火

令帳中温暖換衣亦然仍以温粉粉之此謂冬時寒也若臍不愈燒絳帛末粉之若過一月臍有汁不愈燒蝦蟆灰粉之日三四度若臍中水及中冷則令兒腹絞痛夭糺啼呼面目青黑此是中水之過當炙粉絮以慰灸之不時治護臍至腫者當隨輕重重者便灸之乃可至八九十壯輕者臍不大腫但出汁時時啼呼者擣當歸末和胡粉傳之灸絮日慰灸之至百日愈以啼呼止為候若兒糞青者冷也与臍中水同兒洗浴斷臍竟裹抱畢未可与朱蜜宜与甘草湯以甘草如手中指一節許打碎以水二合煮取一合以綿纏沾取與兒吮之連吮汁計得一蜆殼入腹止兒當使吐吐去心肖中惡汁也如得吐餘藥更不須与若不得吐可消息計如飢渴須更更與之若前所服及更与並不得吐者但稍稍与之令盡此一合止如得吐去惡汁令兒心神智慧無病也飲一合盡都不吐者是兒不含惡血耳勿復與甘草湯乃可與朱蜜以鎮心神安魂魄也兒新生三日中與朱蜜者不宜多多則令兒脾胃冷腹脹喜陰癇癎氣急癒噤瘛而死新生與朱蜜法以飛鍊朱砂如大豆許以赤蜜一蜆殼和之以綿纏筋頭沾取與兒吮之得三沾止一日令盡此一豆許可三日與之則用三豆許也勿過此則傷兒也與朱蜜竟可與牛黃如朱蜜多少也牛黃益肝膽除熱定精神止驚辟惡氣除小兒百病也新生三日後應開腸胃助穀神可研米作厚飲如乳酪厚薄以豆大與兒咽之頻咽三豆許止日三與之蒲七日可與哺也兒生十日始哺如棗核二十日如彈丸百日如棗若乳汁少不得從此法當用意小增之若三十日而哺者令兒無疾兒哺早者兒不勝穀氣令生病頭面身體喜生瘡愈而復發令兒厄弱難養三十日後雖哺勿多若不嗜食勿強與

之强與之不消復生疾病或哺乳不進者腹中皆有痰癖也當以四物紫丸微下之節哺乳數日便自愈小兒微寒熱亦當爾利之要當下之然後乃差凡乳兒不欲太飽飽則嘔吐每候兒吐者乳太飽也以空乳乳之即消日四乳兒若臍未愈乳兒太飽令風中臍也夏不去熱乳令兒嘔逆冬不去寒乳令兒欬痢母新房以乳兒令兒羸瘦交脛不能行母有熱以乳兒令變黃不能食母怒以乳兒令喜驚發氣疝又令上氣癲狂母新吐下以乳兒令虛羸母醉以乳兒令身熱腹滿凡新生小兒一月內常飲猪乳大佳凡乳母乳兒當先極挼散其熱氣勿令汁奔出令兒噎輒奪其乳令得息息已復乳之如是十返五返視兒飢飽節度知一日中幾乳而足以為常又常捉去宿乳兒若卧乳母當以臂枕之令乳與兒頭平乃乳之令兒不噎母欲寐則奪其乳恐填鼻鼻又不知飢飽也浴兒法凡浴小兒湯極須令熱調和冷熱失所令兒驚亦致五藏疾也凡兒冬不可久浴浴久則傷寒夏不可久浴浴久則傷熱數浴背冷則發癇若不浴又令兒毛落新生浴兒者以猪膽一枚取汁投湯中以浴兒終身不患瘡疥勿以雜水浴之兒生三日宜用桃根湯浴桃根李根梅根各二兩枝亦得咬咀之以水三斗煮二十沸去滓浴兒良去不祥令兒終身無瘡疥治小兒驚辟惡氣以金虎湯浴金一斤虎頭骨一枚以水三斗煮爲湯浴倶煖用之凡小兒初出腹有鵝口者其舌上有白屑如米劇者鼻外俗一中亦有之此由兒在胞胎中受穀氣盛故也或娠時嗜糯米使之然治之法以鬚纏筋頭沾井花水撩拭之三日如此便脫去也如不脫可煮粟萩汁令濃以綿纏筋頭拭之若春夏無粟萩可煮粟木皮如用井花水法小兒初出腹有連舌舌下有膜如石榴

子中隔連其舌下後喜令兒言語不發不轉也可以爪摘斷之微有血出無害若血出不止可燒髮作灰末傅之血便止也小兒出腹六七日後其血氣收斂成肉則口舌喉頰裏淸淨也若痰裹舌上有物如蘆蘡臿盛水狀者若懸癰有脹起者可以綿纏長針留刃處如粟米許大以刺決之令氣泄去青黃赤血汁也一刺之止消息一日未消者來日又刺之不過三刺自消盡餘小小未消三刺亦止自然得消也有著舌下如此者名重舌有著頰裏及上腭如此者名重腭有著齒斷上者名重齗皆刺去血汁也小兒生輒死治之法

當候視兒口中懸癰前上腭有胞者以指摘取頭決令潰去血勿令血入咽入咽殺兒急急愼之

小兒初出腹骨肉未斂肌肉猶是血也血凝乃堅成肌肉耳其血沮敗不成肌肉則使面目繞鼻口左右悉黃而啼閉目聚口撮面口中乾燥四肢不能伸縮者皆是血脉不斂也喜不育若有如此者皆宜與龍膽湯也方出下驚癎篇相兒命短長法

兒初生叫聲連延相屬者壽

聲絶而復揚急者不壽

啼聲散不成人

啼聲深不成人

臍中無血者好

臍小者不壽

通身軟弱如無骨者不壽

鮮白長大者壽

自開目者不成人

目視不正數動者大非佳

汗血者多厄不壽

汗不流不成人
小便凝如脂膏不成人
頭四破不成人
常搖手足者不成人
早坐早行早齒早語皆惡性非佳人
頭毛不周匝者不成人
髮稀少者強不聽人（一作不聰）
額上有旋毛早貴妨父母
兒生枕骨不成者能言而死
尻骨不成者能倨而死
掌骨不成者能匍匐而死
踵骨不成者能行而死
臏骨不成者能立而死
身不收者死
魚口者死
股間無生肉者死
頤下破者死
陰不起者死
陰囊下白者死赤者死
卵縫通達黑者壽

論曰兒三歲已上十歲已下視其性氣高下即可知其夭壽大略兒小時識悟通敏過人者多夭大則項託顏回之流是也小兒骨法成就威儀迴轉遲舒稍費人精神雕琢者壽其預知人意迴旋敏速者亦夭即楊脩孔融之徒是也由此觀之夭壽大略可知也亦由梅花早發不覩歲寒甘菊晚成終於年事是知晚成者壽之兆也

論曰少小所以有癇病及痙病者皆由藏氣不平故也新生即癇者是其五藏不收斂血氣不聚五脉不流骨怯不成也多不全育其一月四十日已上至暮歲而癇者亦由乳養失理血氣不和風邪所中也病先身熱掣瘛驚啼叫喚而後發癇脉浮者爲陽癇病在六腑外在肌膚猶易治也病先身冷不驚掣不啼呼而病發時脉沈者爲陰癇病在五藏內在骨髓極難治也病發身軟時醒時醒者謂之癇也身強直反張如弓不時醒者謂之痙也諸反張大人脊下容側手小兒容三指者不可復治也凡脉浮之與沈以判其病在陰陽表裏耳其浮沈復有大小滑澁虛實遲駛諸證各依脉形爲治治神農本草經說小兒驚癇有一百二十種其證候微異於常便是癇候也初出腹血脉不斂五藏未成稍將養失宜即爲病也時不成人其經變蒸之後有病餘證並寬惟中風最暴卒也小兒四肢不好驚掣氣息小異欲作癇及變蒸日滿不解者並宜龍膽湯也凡小兒之癇風癇驚癇時時有耳拾人之中未有一二是風驚者凡是先寒後熱發者皆是食癇當與猪心湯食癇當下乃愈紫丸佳凡小兒所以得風癇者緣衣暖汗出風因入也風癇者初得之時先屈指如數乃發作者此風癇也驚癇者起於驚怖大啼乃發作者此驚癇也驚癇微者急持之勿復更驚之或自止也甚先不哺乳吐而變熱後發癇此食癇早下則差四味紫丸逐癖飲最良去病速而不虛人赤丸本無赤丸方諸醫方並無按此服四味紫丸不得下者當以赤丸代之諸疾重者當用之今次後癖結脹滿篇中第一方八味名紫雙丸者用朱砂色當赤用巴豆又用甘遂比紫丸當減疑此即赤丸也差駛病重者當用之凡小兒不能乳哺當與紫丸下之小兒始生生氣

尚盛但有微惡則須下之必無所損及其愈病則致深益若不時下則成大疾疾成則難治矣凡下四味紫丸最善雖下不損人足以去疾若四味紫丸不得下者當以赤丸下之赤丸不下當倍之若已下而有餘熱不盡當按方作龍膽湯稍服之并摩赤膏方見此篇末風癎亦當下之然當以猪心湯下之驚癎但按圖灸之及摩生膏方見此篇末不可大下也何者驚癎心氣不定一作足下之內虛益令甚爾驚癎甚者特為難治故養小兒常慎驚勿令聞大聲抱持之間當安徐勿令怖也又天雷時當塞兒耳并作餘細聲以亂之也凡養小兒皆微驚以長血脉但不欲大驚大驚乃灸驚脉若五六十日灸者驚復更甚生百日後灸驚脉乃善兒有熱不欲哺乳臥不安又數驚此癎之初也服紫丸便愈不愈復與之兒眠時小驚者壹月輒壹以紫丸下之減其盛氣令兒不病癎也兒立夏後有病治之慎勿妄灸不欲吐下但以除熱湯浴之除熱散粉之除熱湯散見下篇傷寒條中除熱赤膏摩之又以膏塗臍中令兒在涼處勿禁水漿常以新水飲之小兒衣甚薄則腹中乳食不消不消則大便皆醋臭此欲為癖之漸也便將紫丸以微消之服法先從少起常令大便稀勿大下也稀後便漸減之不醋臭乃止藥也凡小兒冬月下無所畏夏月下難差然有病者不可不下下後腹中當小脹滿故當節哺乳數日不可妄下又乳哺小兒常令多少有常劑兒漸大當稍稍增之若減少者此腹中已有小不調也便微服藥勿復哺之但當與乳甚者十許日微者五六日止哺自當如常若都不肯食哺而但欲乳者此是有癖為疾重要當下之不可不下不下則致寒熱或吐而發癎或更致下痢此皆病重不早下之所為也此即難治矣但先治其輕時兒不耗損而病速愈矣凡小兒呆

黃而臭者此腹中有伏熱宜微將服龍膽湯若白而醋者此挾宿寒不消也當服紫丸微者少與藥令內消甚者小增藥令小下皆復節乳哺數日令胃氣平和若不節乳哺則病易復復下之則傷其胃氣令腹脹滿再三下之尚可過此傷矣凡小兒有癖其脉大必發癇此爲食癇下之便愈當審候掌中與三指脉不可令起而不時下致於發癇則難療矣若早下之此脉終不起也脉在掌中尚可早療若至指則病增也凡小兒腹中有疾生則身寒熱寒熱則血脉動動則心不定心不定則易驚驚則癇發速也

候癇法

夫癇小兒之惡病也或有不及求醫而致困者也然氣發於內必先有候常宜審察其精神而採其候也

手白肉魚際脉黑者是癇候魚際脉赤者熱脉青大者寒脉青細爲平也

鼻口乾燥大小便不利是癇候

眼不明上視喜陽是癇候

耳後完骨上有青絡盛卧不靜是癇候青脉刺之令血出也

小兒髮逆上啼笑面暗色不變是癇候

鼻口青時小驚是癇候

目閉青時小驚是癇候

身熱頭常汗出是癇候

身熱吐哯而喘是癇候

身熱目時直視是癇候

卧惕惕而驚手足振搖是癇候

卧夢笑手足動搖是癇候

意氣下而妄怒是癇候
咽乳不利是癇候
目瞳子卒大黑於常是癇候
喜欠目上視是癇候
身熱小便難是癇候
身熱目視不精是癇候
吐痢不止厥痛時起是癇候
弄舌搖頭是癇候
已上諸候二十條皆癇之初也見其候便爪其陽脉所應灸爪之皆重手令兒驟啼及足絶脉亦依方與湯直視瞳子動腹滿轉鳴下血身熱口噤不得乳反張脊强汗出發熱爲卧不悟手足掣瘛喜驚凡八條癇之劇者也如有此非復湯爪所能救便當時炙

論曰若病家始發便來詣師師可診候所解爲法作次序治之以其節度首尾取差候後師便不知其前證虚實直依其後證作病則變異其本候後師所配依取其前蹤跡治亦不得差也要應精問察之爲前師所配依取其前蹤跡以爲治乃無逆耳前師處湯本應數劑乃差而病家服一兩劑未效便謂不驗已後更問他師師不尋前人爲治寒温次序而更爲治而不次前師治則弊也或前已下之後須平和療以接之而得差也或前人未下之或不去者或前治寒温失度後人應調治之是爲治敗病皆須邀射之然後免耳不依次第及不審察必及重斃并也

龍膽湯治嬰兒出腹血脉盛實寒熱温壯四肢驚掣發熱大吐哯者若已能進哺中食實不消壯熱及變蒸不解中客忤鬼氣并諸驚癇方悉主之十歲已下小兒皆服之小兒龍膽

湯第一此是新出腹嬰兒方若日月長大者以次依此為例
若必知客忤及有賊氣者可加人參當歸各如龍膽多少也
一百日兒加三銖二百日兒加六銖一歲兒加半兩餘藥
皆準耳

龍膽　釣藤皮　柴胡　黃芩
桔梗　芍藥　茯苓一方作茯神　甘草各銖六
蜣蜋二枚　大黃一兩

右十味㕮咀以水一升煮取五合為劑也服之如後節度
藥有虛實虛藥宜足數合水也兒生一日至七日分一合
為三服兒生八日至十五日分一合半為三服兒生十六
日至二十日分二合為三服兒生二十日至三十日分三
合為三服兒生三十日至四十日盡以五合為三服皆得
下即止勿復服也

大黃湯治少小風癇積聚腹痛夭矯二十五癇方

大黃　人參　細辛　乾薑　當歸
甘皮各三銖　白羊鮮湯治小兒風癇胷中有痰方

右六味㕮咀以水一升煮取四合服如棗許曰三
白羊鮮湯治小兒風癇胷中有痰方

白羊鮮三銖　大黃四銖　甘草　釣藤皮
細辛各二銖　蚱蟬二枚　大豆　蛇蛻皮一寸

右八味㕮咀以水二升半煮取一升二合分五服日三若
服已盡而癇不斷者可更加大黃釣藤各一銖以水漬藥
半日然後煮之

增損續命湯治小兒卒中風惡毒及久風四肢角弓反張不
隨并躽瘓僻不能行步方

麻黃　甘草　桂心各一兩　芎藭　葛根

升麻　當歸　獨活各十八銖　人參　黃芩各半兩　杏人二十枚　右十二味㕮咀以水六升煮麻黃去上沫乃內諸藥煮取一升二合三歲兒分為四服一日令盡少取汗得汗以粉之

石膏湯治小兒中風惡瘧不能語口眼了戾四肢不隨方

石膏一合　麻黃八銖　甘草　射干　桂心各四銖　細辛二銖　芍藥　當歸各八銖　右八味㕮咀以水三升半先煮麻黃三沸去上沫內餘藥煮取一升三歲兒分為四服日三

治少小中風狀如欲絕湯方

大黃　牡蠣　桂心各十二銖　赤石脂　寒水石各六銖　龍骨　栝蔞根　甘草　右八味㕮咀以水一升內藥重半兩煮再沸絞去滓半歲兒服如雞子大一枚大兒盡服入口中即愈汗出粉之藥無毒可服日二有熱加大黃不汗加麻黃無寒水石朴消代之

治少小中風手足拘急二物石膏湯方

石膏如雞子大一塊碎　眞朱一兩　右以水二升煮石膏五六沸內眞朱煮取一升稍分服之

治少小中風脉浮發熱自汗出項強鼻鳴乾嘔桂枝湯方

桂心一兩　甘草一兩　芍藥一兩　大棗四枚　生薑一兩　右五味㕮咀三物以水三升煮取一升分三服此方与傷寒篇中方相重

治少小新生中風二物驢毛散方

驢毛一把取背前交脊上會中拔如手拇指大一把　麝香二豆大　右以乳汁和銅器中微火煎令焦熟出末之小兒不能飲

以乳汁和之葦筒貯寫著咽中然後飲乳令入腹

茵芋丸治少小有風癇疾至長不除或遇天陰節變便發動食飲堅強亦發百脉攣縮行步不正言語不便者服之永不發方

茵芋葉　鉛丹　秦艽　釣藤皮

石膏　杜蘅　防葵 各一兩　昌蒲

黃芩 各一兩半　松蘿 半兩　蜣蜋 十枚　甘草 三兩

右十二味末之蜜丸如小豆大三歲已下服五丸三歲已上服七丸五歲已上服十丸十歲已上可至十五丸

鎮惡丸治小兒驚癇百病鎮心氣方

銀屑 十二銖　水銀 二十銖　茯苓 三分　茯神

白斂　雄黃　防葵　鐵精

右十六味先以水銀和銀屑如泥別治諸藥和丸三歲兒如麻子二丸隨兒大小增之一方無牛黃一味

治少小心腹熱除熱丹參赤膏方

丹參　雷丸　芒消　紫石英　眞朱 各四分

右五味㕮咀以苦酒半升浸四種一宿以成鍊猪肪一斤煎三上三下去滓乃內芒消膏成以摩心下冬夏可用一方但用丹參雷丸亦佳

治少小新生肌膚幼弱喜為風邪所中身體壯熱或中大風手足驚掣五物甘草生摩膏方

甘草　防風 一兩　白朮 二十銖　雷丸 二兩半　桔梗 二十銖

右㕮咀以不中水猪肪一斤煎為膏以煎藥微火上煎之消息視稠濁膏成去滓取如彈丸大一枚炙手以摩兒百

過寒者更熱熱者更寒小兒雖無病早起常以膏摩顖上及手足心甚辟寒風

灸法

論曰小兒新生無疾慎不可逆針灸之如逆針灸則忍痛動其五脉因喜成癎訶洛關中土地多寒兒喜病痙其生兒三日多逆灸以防之又灸頰以防噤有噤著舌下脉急牙車筋急甚土地寒皆決舌下去血灸頰以防噤也吳蜀地温無此疾也古方既傳之今人不詳南北之殊便按方而用之是以多害於小兒也所以田舍小兒任其自然皆得無有夭横也小兒驚啼眠中四肢掣動變蒸未解愼不可針灸爪之動其百脉仍因驚成癎也惟陰癎可針灸爪之凡灸癎當先下兒使虚乃承虚灸之未下有實而灸者氣逼前後不通殺人癎發平旦者在足少陽晨朝發者在足厥陰日中發者在足太陽黃昏發者在足少陰

右癎發時病所在視其發早晚灸其所也

癎有五藏之癎六畜之癎或在四肢或在腹内審其候隨病所在灸之雖少必差若失其要則為害也

肝癎之為病面青目反視手足搖灸足少陽厥陰各三壯

心癎之為病面赤心下有熱短氣息微數灸心下第二肋端宛宛中此為巨闕也又灸手心主及少陰各三壯

脾癎之為病面黃腹大喜痢灸胃管三壯俠胃管傍灸二壯

足陽明太陰各二壯

肺癎之為病面目白口沫出灸肺輸三壯又灸手陽明大陰各二壯

腎癎之為病面黑正直視不搖如尸狀灸心下二寸二分三

壯又灸肘中動脉各二壯又灸足大陽少陰各二壯
萬癇之爲病目反四肢不舉灸風府又灸頂上臯人中下脣
承漿皆隨年壯
腸癇之爲病不動搖灸兩承山又灸足心兩手勞宮又灸兩
耳後完骨各隨年壯又灸臍中五十壯

右五藏癇證候

馬癇之爲病張口搖頭馬鳴欲反折灸項風府臍中二壯病
在腹中燒馬蹄末服之良
牛癇之爲病目正直視腹脹灸鳩尾骨及大椎各二壯燒牛
蹄末服之良
羊癇之爲病喜揚目吐舌灸大椎上三壯
猪癇之爲病喜吐沫灸完骨兩傍各一寸七壯
犬癇之爲病手屈拳攣灸兩手心二壯灸足大陽二壯灸肋

雞癇之爲病搖頭反折喜驚目搖灸足諸陽各三壯

右六畜癇證候

小兒暴癇灸兩乳頭女兒灸乳下二分
治小兒暴癇者身軀正直如死人及腹中雷鳴灸太倉及臍
中上下兩傍各一寸凡六處又灸當腹度取背以繩繞頸下
至臍中竭便轉繩向背順脊下行盡繩頭灸兩傍各一寸五壯
若面白啼聲色不變灸顖中取之法橫度口盡兩吻際又
橫度鼻下亦盡兩邊折去鼻度半都合口爲度從額上髮際
上行度之灸度頭一處正在顖上未合骨中隨手動者是此
最要處也次灸當額上入髮二分許直望鼻爲正次灸其兩
邊當目瞳子直上入髮際二分許次灸頂上迴毛中次灸容

主人穴在眉後際動脉是次灸兩耳門當耳開口則骨解開
動張陷是也次灸兩耳上捲耳取之當捲耳上頭是也一法
大人當耳上横三指小兒各自取其指也次灸兩耳後完骨
上青脉亦可以針刺令血出次灸玉枕項後高骨是也次灸
兩風池在項後兩轅動筋外髮際陷中是也次灸風府當項
中央髮際亦可與風池三處高下相等次灸頭兩角兩角當
迴毛兩邊起骨是也
右頭部凡十九處兒生十日可灸三壯三十日可灸五壯五
十日可灸七壯病重者具灸之輕者惟灸顯中風池玉枕也
艾使熟炷令平正著肉火勢乃至病所也艾若生炷不平正
不著肉徒灸多炷故無益也
若腹滿短氣轉鳴灸肺募在兩乳上第二助間宛宛中懸繩
取之當瞳子是次灸膻中次灸巨闕大人去鳩尾下一寸小兒去臍作六分分之去鳩尾下一寸是也并灸兩
邊次灸胃管次灸金門金門在穀道前囊之後當中央是也
從陰囊下度至大孔前中分之
右腹部十二處胃管十日兒可灸三壯一月已上
可五壯陰下縫中可三壯或云隨年壯
若脊強反張灸大椎并灸諸藏輸及督脊上當中從大椎度
至窮骨中屈更從大椎度之灸度下頭是督脊也
右背部十二處十日兒可灸三壯一月已上可灸五壯
若手足掣瘛驚者灸尺澤次灸陽明次灸少商次灸勞宮次
灸心主次灸合谷次灸三間次灸少陽
右手部十六處其要者陽明少商心主尺澤合谷少陽也壯
數如上

又灸伏兔次灸三里次灸髀腸次灸鹿溪次灸陽明次灸
陽次灸然谷

右足部十四處皆要可灸壯數如上

手足陽明謂人四指凡小兒驚癇皆灸之若風病大動手足
掣瘛者盡灸手足十指端又灸本節後

客忤第四論二首 灸法一首 方三十二首 呪法二首

論曰少小所以有客忤病者是外人來氣息忤之一名中人是
爲客忤也雖是家人或別房異戶雖是乳母及父母或從外
還衣服經履鬼神麤惡暴氣或牛馬之氣皆爲忤也執作喘
息乳氣未定者皆爲客忤其乳母遇醉及房勞喘後乳兒最
劇能殺兒也不可不愼凡諸乘馬行得馬汗氣臭未盥洗易
衣裝而便向兒邊令兒中馬客忤兒卒見馬來及聞馬鳴驚
及馬上衣物馬氣皆令小兒中馬客忤愼護之特重一歲兒
也凡小兒衣布帛綿中不得有頭髮履中亦爾白衣青帶青
衣白帶皆令中忤凡非常人及諸物從外來亦驚小兒致病
欲防之法諸有從外來人及有異物入戶當將兒避之勿令
見也若不避者燒牛屎令常有烟熏置戶前則善
小兒中客爲病者無時不有此病也而秋初壹切小兒皆病
者豈是壹切小兒悉中客邪夫小兒所以春冬少病秋夏多
病者秋夏小兒陽氣在外血脉嫩弱秋初夏末晨夕時有暴
冷小兒嫩弱其外則易傷暴冷折其陽陽結則壯熱胃冷則
下痢是故夏末秋初小兒多壯熱而下痢也未必悉是中客
及賊也若治少小法夏末秋初常宜候天氣温涼也有暴寒
卒冷者其少小則多患壯熱而下痢也愼不可先下之皆先
殺毒後下之耳玄中記云天下有女鳥名曰姑獲（翺後子母秘錄作烏獲）
壹名天帝女壹名隱飛鳥壹名夜行遊女又名鈎星鬼喜以

陰雨夜過飛鳴徘徊人村里喚得來者是也鳥淳雌無雄不
產陰氣毒化生喜落毛羽於人中庭置兒衣中便令兒作癎
病必死即化為其兒也是以小兒生至拾歲衣被不可露棄
拗月尤忌

凡中客忤之為病類皆吐下青黃白色水穀解離腹痛天糺
面色變易其候似癎但眼不上插耳其脉急數者是也宜與
龍膽湯下之加人參當歸各如龍膽秤分等多少也
小兒中客急視其口中懸癰左右當有青青黑腫脉核如麻豆
大或赤或白或青如此便宜用針速刺潰去之亦可爪摘決
之并以綿纏釵頭拭去血也少小中客之為病吐下青黃綠
白汁腹中痛及反倒偃側喘似癎狀但目不上插少睡耳面
變五色其脉弦急若失時不治小久則難治矣欲療之方
用豉數合水拌令濕擣熟丸如雞子大以摩兒顖上手足
心各五六遍畢以丸摩兒心及臍上下行轉摩之食頃破
視其中當有細毛即擲丸道中痛即止

治少小中客忤強項欲死方
取衣中白魚十枚為末以傅母乳頭上令兒飲之入咽立
愈一方二枚著兒母手掩兒臍中兒吐下愈亦以摩兒項
及脊強處

治少小客忤二物黃土塗頭方
竈中黃土蚯蚓屎等分擣合水和如雞子黃大塗兒頭上
及五心良一方云雞子清和如泥

又方　吞麝香如大豆許立愈

治少小犯客忤發作有時者方
以母月衣覆兒上大良

治小兒卒中忤方

剪取驢前膊胛上旋毛大如彈子以乳汁煎之令
毛消藥成著乳頭飲之下喉即愈
又方 燒母衣帶三寸并髮合乳汁服之
又方 取牛鼻津服之
又方 取牛口沫傳乳頭飲之
治小兒寒熱及赤氣中人一物猪蹄散方
猪後脚懸蹄燒末摶篩以飲乳汁一撮立效
治少小卒中客忤不知人者方
取熱馬屎一丸絞取汁飲兒下便愈亦治中客忤而
嘔啼面青腹强者
治少小見人來卒不佳腹中作聲者二物燒髮散方
用向來者人顱上髮十莖鬱兒衣帶少許合燒灰細
末和乳飲兒即愈

治小兒卒客忤方
銅鏡鼻燒令紅著少許酒中大兒飲之小兒不能
飲者含與之即愈
治少小中忤一物馬通浴湯方
馬通三升燒令煙絶以酒一斗煮三沸去滓浴兒
即愈
治小兒中人忤嘔啼面青腹强者一物猪通浴方
猳猪通二升以熱湯灌之適寒温浴兒
小兒中馬客忤而吐不止者灸手心主間使大都隱白三陰
交各三壯可用粉丸如豉法並用唾唾而呪之呪法如左
呪客忤法
呪曰摩家公摩家母摩家子兒菩客忤從我始扁鵲
雖良不如善唾良呪訖棄丸道中
又法

取一刀横著竈上解兒衣發其心腹訖取刀持向兒
呪之噉輒以刀擬向心腹啡啡曰音非出噉良煌煌日出
東方背陰向陽葛公葛公不知何公子來不視去不
顧過與生人忤梁上塵天之神戶下土鬼所經大刀
鏁犀對竈君二七噉客愈兒驚噉啡啡如此二七啡
啡每噉以刀擬之呪當三遍乃畢用敢九如上法五
六遍訖取此丸破視其中有毛棄丸道中客忤即愈矣

小兒鬾方

論曰凡小兒所以有鬾病者是婦人懷娠有惡神導其腹中
胎妬嫉他小兒令病也鬾者小鬼也音奇娠婦人不必悉招
鬾鬾人時有此耳鬾之爲疾喜微微下痢寒熱或有去來毫
毛鬚髮鬠髶不悅是其證也宜服龍膽湯凡婦人先有小兒
未能行而母更有娠使兒飲此乳亦作鬾也令兒黃瘦骨立
髮落壯熱是其證也

治鬾方　灸伏翼熟嚼哺之

又方　燒伏翼末飲服之

又方　以水二升煮蒴藋冬瓜各四兩取浴之

治少小客鬾挾實白鮮皮湯方

白鮮皮　大黃　甘草各二兩　芍藥
茯苓　細辛　桂心各十八銖

右七味㕮咀以水二升煮取九合分三服

小兒夜啼方

龍角丸主小兒五驚夜啼方

龍角三銖　牡礪九銖作牡丹一銖　黃芩半兩　蚱蟬二枚
牛黃如小豆五枚　川大黃九銖

右六味末之蜜丸如麻子蔘裹兒服二丸隨兒大小以意

增減之 崔氏名五驚丸

治小兒夜啼至明即安寐苦蒭散方

苦蒭　白朮　防已 各半兩

右三味治下篩以乳和與兒服之量多少又以兒母手掩臍中亦以摩兒頭及眷驗二十日兒未能服散者以乳汁和之服如麻子一丸兒大能服藥者以意斟酌之

治少小夜啼一物前胡丸方

前胡隨多少擣末以蜜和丸如大豆服一丸日三稍加至五六丸以差爲度

又方

以雌鼠時食飲偏有所思者物以此哺兒則愈

又方

交道中土　伏龍肝 各一把

右二味治下篩水和少許飲之

又方　取馬骨燒灰傅乳上飲兒啼即止

治小兒夜啼不已醫所不治者方

取狼糞中骨燒作灰末水服如黍米粒大二枚即定

治小兒驚啼方

取雞糞白熬末以乳服之佳

又方　酒服亂髮灰

又方　臘月縛猪繩燒灰服之

又方　燒蝟皮三寸灰著乳頭飲之

又方　車轄脂如小豆許內口中及臍中

千金湯　主小兒暴驚啼絶死或有人從外來邪氣所逐令兒得疾衆醫不治方

蜀椒　左顧牡蠣各六銖碎

右二味以酢漿水一升半煮取五合一服一合

傷寒第五 論一首 灸法一首 方三十五首

論曰夫小兒未能冒涉霜雪乃不病傷寒也大人解脫之久傷於寒冷則不論耳然天行非節之氣其亦得之有時行疾疫之年小兒出腹便患斑者也治其時行節度故如大人法但用藥分劑少異藥小冷耳

治小兒未滿百日傷寒鼻衄身熱嘔逆麥門冬湯方

麥門冬十銖八 石膏 寒水石 甘草各半兩 桂心八銖

右五味㕮咀以水二升半煮取一升分服一合日三

治少小傷寒芍藥四物解肌湯方

芍藥 黃芩 升麻 葛根各半兩

右四味㕮咀以水三升煮取九合去滓分服暮歲已上分三服

治少小傷寒發熱咳嗽頭面熱者麻黃湯方

麻黃 生薑 黃芩各一兩 甘草

石膏 芍藥各半兩 杏人十枚 桂心半兩

右八味㕮咀以水四升煮取一升半分二服兒若小以意減之

治小兒傷寒方

葛根汁 淡竹瀝各六合

右二味相和二三歲兒分三服百日兒斟酌服之不宜生煮服佳

治小兒時氣方

桃葉三兩擣以水五升煮十沸取汁日五六徧淋之

右二味相和二三歲兒分三服百日兒斟酌服之不宜生煮服佳

若復發燒雄鼠屎二枚燒水調服之

治小兒傷寒病久不除差後復劇瘦瘠骨立五味子湯方

五味子十銖 甘草 當歸各十二銖 大黃六銖

芒消 五銖 麥門冬 黃芩 前胡 各六銖
石膏 一兩 黃連 六銖
右十味㕮咀以水三升煮取一升半服二合得下便止計大小增減之

治少小傷寒莽草湯浴方
莽草 半斤 牡蠣 四兩 雷丸 三十枚 蛇床子 一升 大黃 一兩
右五味㕮咀以水三斗煮取一斗半適寒温以浴兒避眼及陰

治小兒卒寒熱不佳不能服藥莽草湯浴方
莽草 丹參 蛇牀子 一兩 雷丸 一升 桂心 各三兩 昌蒲 半斤
右六味㕮咀以水二斗煮三五沸適寒温以浴兒避目及陰浴方

雷丸 二十枚 大黃 四兩 苦參 三兩 黃芩 一兩
丹參 兩 石膏 三兩
右六味㕮咀以水二斗煮取一斗半浴兒避目及陰浴訖復浴

治少小身熱李葉湯浴方
李葉無多少㕮咀以水煮去滓將浴兒良

治小兒生一月至五月尽寒作熱方
細切柳枝煮取汁洗兒若渴絞冬瓜汁服之

青木香湯浴小兒壯熱羸瘦方
青木香 四兩 麻子人 一升 虎骨 五兩 白芷 三兩 竹葉 一升
右五味㕮咀以水二斗煮取一斗稍稍浴兒

治小兒暴有熱得之二三日李根湯方
李根 桂心 芒消 各八銖 甘草 麥門冬 各一兩

右五味咬咀以水二升煮取一升分五服

治少小身體壯熱不能服藥十二物寒水石散粉方

寒水石　芒消　滑石　石膏
赤石脂　青木香　大黃　甘草
黃芩　防風　苦蘩　麻黃根
右各等分合治下篩以粉一升藥屑三合相和復以篩篩之以粉兒身日三

升麻湯治小兒傷寒變熱毒病身熱面赤口燥心腹堅急大小便不利或口瘡者或因壯熱便四肢攣掣驚仍成癇疾時發時醒醒後身熱如火者悉主之方

升麻　白薇　麻黃　萎蕤
柴胡　甘草　酸棗仁各半兩　黃芩一兩
大黃　鈎藤各六銖　朴消

右十味咬咀以水三升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取一升兒生三十日至六十日一服二合六十日至百日一服二合半百日至二百日一服三合

治小兒肉中久挾宿熱瘦瘠熱進退休作無時大黃湯方

大黃　甘草　芒消各半兩
石膏一兩　大棗擘五枚　桂心錄入

右六味咬咀以水三升煮取一升去滓一歲兒少少溫服半合日再

治小兒潮熱蜀漆湯方

蜀漆　甘草　知母　龍骨　牡蠣各半兩

右五味咬咀以水四升煮取一升去滓一歲兒少少溫服

大黃　黃芩　甘草　芒消

治小兒腹大短氣熱有進退食不安穀為不化方

麥門冬 各半兩 石膏 一兩 桂心 一銖

右七味㕮咀以水三升煮取一升半分三服暮歲已下兒作五服

治小兒夏月患腹中伏熱溫壯來往或患下痢色或白或黃三焦不利竹葉湯方

竹葉 切五合 小麥 三合 柴胡 半兩 黃芩 一兩一銖

茯苓 十八銖 人參 麥門冬 甘草 各半兩

右八味㕮咀以水四升煮竹葉小麥取三升去竹葉麥下諸藥煮取一升半分三服若小兒夏月忽壯熱燒人手洞下黃瀦氣力慞然脉極洪數用此方加大黃二兩再服得下即差

竹葉湯主五六歲兒溫壯腹中急滿息不利或有微腫亦主極羸不下飲食堅痞手足逆冷方

竹葉 切一升 小麥 半升 甘草

栝樓根 澤瀉 茯苓

白朮 大黃 各二兩 黃芩

人參 麥門冬 半夏 各二兩 桂心 二銖 生薑 二兩半

右十六味㕮咀以水七升煮小麥竹葉取四升去滓內藥煎取一升六合分四服若小兒連壯熱實滯不去寒熱往來微驚悸方

大黃 一兩 黃芩

桂心 半兩 栝樓根 甘草 各十八銖

龍骨 滑石 二兩 牡蠣 人參

凝水石 白石脂 消石 各半兩

右十二味㕮咀以水四升煮取一升半服三合一日一夜令盡雖吐亦與之 一本加紫石英半兩

調中湯治小兒春秋月晨夕中暴冷冷氣折其四肢熱不得

泄則壯熱冷氣入胃變下痢或欲赤白滯起數去小腹脹痛
極壯熱氣脉洪大或急數者服之熱便歇下亦差也但壯熱
不吐下者亦主之方

葛根　黄芩　茯苓　桔梗
芍藥　白朮　葉本　大黄
甘草 銖六

右九味㕮咀以水二升煮取五合服如後法兒生一日至
七日取一合分三服生八日至十五日取一合半分三服
生十六日至二十日取二合分三服生二十日至三十日
取三合分三服生三十日至四十日取五合分三服恐喫
五合未得更斟酌之其百日至三百日兒一如前篇龍膽
湯加之

治小兒寒熱進退啼呼腹痛生地黄湯方

生地黄　桂心 各一兩
右二味㕮咀以水三升煮取一升暮歲已下服二合已上
三合一方七味有芍藥寒水石黄芩當歸甘草各半兩

又方　搗土瓜根汁三合服之

又方　搗青麥汁服之

又方　搗韭根汁澄清以滴兒鼻中如大豆許即出黄水差

治少小有熱不汗二物通汗散方

小豆 三七枚　瓜蒂 十四枚　糯米 四十粒

右搗和下篩以粉兒身

雷九 四兩　粉錠 所

治少小頭汗三物茯苓粉散方

茯苓　牡蠣各四兩

右治下篩以粉八兩合搗爲散有熱輒以粉汗即自止

治少小盜汗三物黃連粉方

黃連　牡蠣各四兩　貝母各十八銖

右以粉一升合搗下篩以粉身良

此由心藏熱之所感宜服犀角飲子方

犀角十八銖一兩　茯神一兩　麥門冬半一兩　甘草一兩半　白朮六銖

右五味㕮咀以水九合煎取四合分服加龍齒一兩佳

恒山湯治小兒温瘧方

恒山一兩切　小麥三合　淡竹葉切一升

右三味以水一升半煮取五合一日至七日兒一合爲三服八日至十五日兒一合半爲三服十六日至二十日兒二合爲三服四十日兒六合爲三服六十日兒六合爲三服六十日至百日兒一服二合半百日至三百日兒一服三合

又方　鹿角末先發時便服錢匕

又方

燒鼈甲灰以酒服一錢匕至發時服三匕并以灸身

又方

燒雞肶胵中黃皮末和乳與服男雄女雌

小兒温瘧灸兩乳下一指三壯

備急千金要方卷第五上

百辟
宝之
贵人陆
续舁轻
舆至
福保炯
拜



凌空漸腦棚裏治衆共腹內未進乳食
先以陽甘草汁得一蛾吮汁得一蛾先
入服後吐俟快吐畢服可与食此法物甚
令兒少無病即痲症亦輕疏養兒者不
可不知

舌下筋黏不惟不能轉動且不
能吮乳不与治一二日飢而死
治法以尖摘不斷而以
銀針挑斷之血出不妨未見
其治愈与不治而死者衆矣

兒生七日內窩裏瘡口眉際見黃色
者俗名腦風以火灸之有益可救然
不效者多得效者少不知其血脈
腐敗不成也

相兒壽夭之法準驗非常

魁病即俗名四眼者是誠不可解乃確有之村媪別有治法頗效

小兒夜啼曉靜多是脾寒小灯
爐研細茶調下頻救

朝奉郎守太常少卿充祕閣校理判登聞檢院護軍賜緋魚袋臣林億等校正

欬嗽第六　方十四首

小兒出胎二百許日頭身患小小瘡治護小差復發五月中忽小小欬嗽微溫和治之因變癇一日二十過發四肢縮動背脊躭眺眼反須臾氣絕良久復蘇已與常治癇湯得使吐下經日不間爾後單與竹瀝汁稍進一日一夕中合進一升許發時小踈明日與此竹瀝湯得吐下發便大折其間猶稍稍與竹瀝湯方

竹瀝五合　黃芩三十銖　木防己　羚羊角格六銖

大黃二兩　桑寄生　麻黃　白薇

茵芋三銖　甘草各半兩　白朮六銖一方作白斛

右拾貳味㕮咀以水貳升半煮取藥減半內竹瀝煎取壹

升分服貳合相去壹食久進壹服一方無蘡蘼湯治小兒中冷及傷寒暴嗽或上氣喉咽鳴氣逆或鼻塞清水出者方

紫菀　杏人　麻黃　桂心
兩　兩各半

橘皮　青木香　黃芩　當歸
兩　錄各六

甘草　大黃
兩各半　一兩

右拾味㕮咀以水三升煮取玖合去滓六十日至百日兒一服二合半一百日至二百日兒一服三合

五味子湯治小兒風冷入肺上氣氣逆面青喘迫欬嗽晝夜不息食則吐不下方

五味子　當歸　乾薑
兩各半

桂心　人參　紫菀　甘草
兩各半　兩　錄各六

細辛　款冬花
兩各半　錄各三

右拾壹味㕮咀以水貳升半煮取玖合去滓兒陸拾日至百日壹服貳合日壹百日至貳百日壹服叁合其大黃別浸壹宿下　壹方無款冬大黃有大棗叁枚

治小兒大人欬逆短氣胷中吸吸呵出涕唾嗽出臭膿方

燒淡竹瀝煮貳貳拾沸小兒壹服壹合日伍服大人壹升亦日伍服不妨食息乳哺

治小兒寒熱欬逆膈中有癖乳若吐不欲食方

乾地黃　麥門冬　五味子　蜜
兩四　兩各一　各半

大黃　消石
兩各一

右陸味㕮咀以水叁升煮取壹升去滓內消石蜜煮令沸服貳合日叁胷中當有宿乳汁壹升許出大者服伍合射干湯治小兒欬逆喘息如水雞聲方

射干　半夏　桂心　麻黃
一兩　伍枚　五寸

紫菀　甘草　生薑各一兩　大棗二十枚

右㕮咀以水柒升煮取壹升伍合去滓內蜜伍合煎壹沸分温服貳合日參

又方

半夏四兩　紫菀貳兩　款冬花二合　蜜一合

桂心　生薑　細辛　阿膠

甘草酪二兩

右玖味㕮咀以水壹升煮半夏取陸升去滓內諸藥煮取貳升伍合伍分擣如膏蜜壹升為參分以壹分內杏人擣令強更內壹分擣之如膏又內壹分擣熟止先食已舍四之多少自在日參每服不得過半方寸匕則荊

又方

半夏二斤去皮洗六七度完用水　白礬末壹斤之　丁香

甘草　草豆蔻　川升麻　縮砂各四兩　鹿擣篩

右七味以好酒一斗與半夏拌和勻同浸春冬三七日夏秋七日密封口日足取出用冷水急洗風吹乾每服一粒嚼破用薑湯下或乾嗽候六十日乾方得服疑用孫思邈方

治少小嗽八味生薑煎方

生薑肆兩　桂心貳兩　甘草叁兩

杏人壹外　款冬花　乾薑肆兩

右合諸藥末之微火上煎取如飴餔量其大小多少與兒含咽之百日小兒如棗核許日四五服甚有驗

治小兒嗽日中差夜甚初不得息不能復啼四物款冬丸方

款冬花　紫菀各壹兩半　桂心半兩　伏龍肝陸銖

右末之蜜和如泥取如棗核大傳乳頭令兒飲之日三傳之漸漸令兒飲之

治小兒暴泠嗽及積風泠嗽兼氣逆鳴昌蒲丸方

昌蒲　烏頭　杏人　礬石
細辛　皂莢鉻六　款冬花　乾薑
桂心　紫菀各十八銖　蜀椒卩五　吳茱萸六合

右十二味末之蜜丸如梧子三歲兒飲服五丸加至十丸日三兒小以意減之兒大以意加之暴嗽數服便差

治少小十日已上至五十日卒得聲欬吐乳歐逆暴嗽晝夜不得息桂枝湯方

桂枝半兩　甘草貳兩　紫菀十八銖　麥門冬壹兩捌拾銖

右四味㕮咀以水二升煮取半升以綿著湯中捉綿滴兒口中晝夜四五過與之節乳哺

治少小卒肩息上氣不得安此惡風入肺麻黃湯方

麻黃四兩　甘草一兩　桂心五寸　五味子半升
半夏　生薑各二兩

右六味㕮咀以水五升煮取二升百日兒服一合大小節度服之便愈

癖結脹滿第十七方三十五首灸法一首

紫雙丸治小兒身熱頭痛食飲不消腹中脹滿或小腹絞痛大小便不利或重下數起小兒無異疾惟飲食過度不知自止哺乳失節或驚悸寒熱惟此丸治之不差更可重服小兒欲下是其葸忽候哺食減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調悉宜用此丸不用他藥數用神驗千金不傳方（臣億等詳序例中凡云服紫丸者即前變葸篇十四味者是也云服紫丸不下者服赤丸赤丸差缺病重者當用之方中並无赤丸而此用朱砂又力緊於紫丸疑此即赤丸也）

巴豆八銖　麥門冬十銖　甘草五銖　甘遂二銖
朱砂一銖　蠐螬十銖　蘘核人六銖　牡蠣八銖
右八味以湯熟洗巴豆研新布絞去油別擣甘草甘遂牡蠣麥門冬下篩訖研蘘核人令極熟乃內散更擣三千杵藥燥不能相丸更入少蜜足之半歲兒服如荏子一雙一歲二歲兒服如半麻子一雙三四歲者服如麻子二丸五六歲者服如大麻子二丸七歲八歲服如小豆二丸九歲十歲微大於小豆二丸常以雞鳴時服至日出時不下者熱粥飲數合即下丸皆雙出也下甚者飲以冷粥即止治小兒胎中宿熱乳母飲食麤惡辛苦乳汁不起兒乳哺不為肌膚心腹痞滿委黃瘦瘠四肢痿躄繚戾服之令充悅方

芍藥二兩半　大黃一兩　甘草半兩　柴胡二兩
鼈甲　茯苓各二兩半　乾薑半兩如熱以枳實代人參一兩

右八味末之蜜丸如大豆服一九一歲已上乳服三丸七歲兒服十九日二

治小兒宿乳不消腹痛驚啼牛黃丸方

牛黃鉄參　附子貳枚　真朱壹兩　巴豆壹兩　杏人壹兩

右五味擣附子真朱為末下篩別擣巴豆杏人令如泥內藥及牛黃擣一千二百杵藥成若乾入少蜜足之百日兒服如粟米一丸三歲兒服如麻子一丸五六歲兒服如胡豆一丸日二先乳哺了服之禹上下悉當微轉藥完出者病愈散出者更服以藥完出為度

治小兒宿食癖氣痰飲往來寒熱不欲食消瘦芒消紫丸方

芒消　大黃各肆兩　巴豆貳伯枚　杏人壹伯貳拾枚　半夏貳兩　代赭壹兩
甘遂貳兩

右七味末之別擣巴豆杏人治如膏旋內藥末擣三千杵

令相和合強者內少蜜百日兒服如胡豆一丸過百日至一歲服二丸隨兒大小以意節度當候兒大便中藥出爲愈若不出更服如初

治八歲已上兒熱結痰實不能食自下方

芍藥 梔子 柴胡 升麻 黃連 黃芩 細辛 知母 大黃 柴胡 升麻 芍藥 生薑 杏人

右十一味㕮咀以水六升煮取一升八合去滓分四服十歲兒爲三服一本有枳實杏人各一兩半而無桔梗黃連

治十五已下兒熱結多痰食飲減自下方

大黃 柴胡 升麻 芍藥 生薑 杏人

右十一味㕮咀以水六升半煮取二升半煮取二升十歲至十五者分

三服

治小兒結實乳食不消心腹痛牛黃雙丸方

牛黃 太山甘遂 芍藥 黃芩 真朱 杏人

右七味末之蜜丸一歲兒飲服如麻子二丸但隨兒大小加減之

牛黃鼈甲丸治少小癖實壯熱食不消化中惡忤氣方

牛黃 鼈甲 麥麴 大黃 枳實 柴胡 茯苓 桂心 芍藥 乾薑

右十二味末之蜜丸如小豆日三服以意量之

治小兒心下痞淡癖結聚腹大脹滿身躰壯熱不欲哺乳羌

花丸方

芫花一兩　大黃雄黃各二兩半　黃芩一兩

右四味末之蜜和更擣一千杵三歲兒至一歲已下服如粟米一丸欲服丸內兒喉中令母與乳若長服消病者當以意消息與服之與乳哺相避

治小兒痰實結聚宿癖羸露不能飲食真朱丸方

真朱半兩　麥門冬一兩　巴豆四十枚　雞人三百枚

右四味末之蜜丸朞歲兒服二丸如小豆大二百日兒服如麻子二丸漸增以知為度當下病赤黃白黑葵汁下勿絕藥病盡下自止久服使小兒肥白已試驗

鼈甲丸治少小腹中結堅脇下有疹手足煩熱方

鼈甲　芍藥　大黃各三十銖　茯苓　柴胡　乾薑略二十銖　桂心六銖　蠐螬各二十枚

右九味末之蜜和服如梧子七丸漸漸加之以知為度

治小兒痞氣脇下腹中有積聚堅痛鼈頭丸方

鼈頭一枚　蜈蚣　廣虫　桃人各十八銖　甘皮半兩

右五味末之蜜丸服如小豆二丸日三大便不利加大黃十八銖以知為度

治小兒羸瘦慤慤宜常服不妨乳方

甘草五兩末之蜜丸一歲兒服如小豆十丸日三服盡即更合

治小兒五六日不食氣逆桂心橘皮湯方

桂心半兩　橘皮二兩　成擇薤五兩　黍米五合　人參半兩

右五味㕮咀以水七升先煮藥煎取二升次下薤米米熟藥成稍稍服之

治少小胃氣不調不嗜食生肌肉地黃丸方

乾地黃 大黃 各一兩六銖 茯苓 十八銖 當歸 柴胡 杏人 各半兩

右六味末之以蜜丸如麻子大服五丸日三服

治少小脇下有氣內痛喘逆氣息難往來寒熱羸瘦不食馬通粟丸方

馬通中粟 十銖 杏人 紫菀 細辛 各半兩 石膏 秦艽 半夏 茯苓 五味子 各六銖

右九味末之蜜丸服如小豆十丸日三服不知加至二十丸

治小兒不痢腹大且堅方

以故衣帶多垢者切一升水三升煮取一升分三服

又方 腹上摩衣中白魚亦治陰腫

燒父母指甲灰乳頭上飲之

又方 韭根汁和豬脂煎細細服之

又方 車轂中脂和輸下土如彈丸吞之立愈

小兒癖炙雨乳下一寸各三壯

治小兒胎寒嘔啼腹中痛舌上黑青涎下當歸丸名黑丸方

當歸 鉄 吳茱萸 一作 炙 蜀椒 各半兩 細辛

乾薑 附子 各十八銖 狼毒 九銖 豉 七合

巴豆 十枚

右九味擣七種下篩秤藥末令足研巴豆如膏稍稍內末擣令相得蜜和桑杼盛蒸五升米飯下出擣一千杵一月兒服如黍米一丸日一夜二不知稍加以知為度亦治水癖

馬齒礬丸治小兒胎寒嘔啼驚癎腹脹不嗜食大便青黃并

大人虛冷內冷或有實不可吐下方

馬齒莧一斤燒半日以棗膏和大人服如梧子二九日以腹內温為度有實實去神妙

治小兒忽患腹痛天矯汗出名曰胎寒方

日三小兒以意減之

煮梨葉濃汁七合可三四度飲之

治小兒暴腹滿欲死半夏丸方

半夏隨多少微火炮之擣末酒和服如粟米粒大五九日三立愈

治小兒霍亂吐痢方

人參一兩　厚朴　甘草各半兩　白朮銖八

右四味㕮咀以水一升二合煮取半外六十日兒服一合百日兒分三服暮歲分二服中間隔乳服之乳母忌生冷油膩等一方加乾薑一分或加生薑三分

治毒氣吐下腹脹逆害乳哺藿香湯方

藿香一兩　生薑三兩　青竹筎　甘草各半兩

右四味㕮咀以水二升煮取八合每服一合日三有熱加升麻半兩

治孩子霍亂已用立驗方

人參　蘆籜各半兩　藒豆藤二兩　倉米一撮

右四味㕮咀以水二升煮取八合分温服

又方

人參一兩　木瓜一枚　倉米一撮

右三味㕮咀以水煮分服以意量之立效

治小兒霍亂方

研尿滓乳上服之

又方　牛涎灌口中一合

治少小吐痢方

鹿角 六銖 燒半兩 亂髮

右二味末之米汁服一刀圭日三服

又方 熱牛糞含之一作牛膝

又方 燒特猪糞水解取汁少少服之

癰疽瘰癧第八 論一首 灸法一首 方七十二首

漏蘆湯治小兒熱毒癰疽赤白諸丹毒瘡瘭方

漏蘆 連翹 肘後用白薇 白斂 芫消 肘後勿藥用 甘草 各六銖 大黃 二兩 升麻 枳實

麻黃 黃芩 各九銖

右十味咬咀以水一升半煎取五合兒生一日至七日取一合分三服八日至十五日取一合半分三服十六日至二十日取二合分三服二十日至三十日取三合分三服三十日至四十日取五合分三服 肘後治大人各用二兩大黃參兩以水一斗煮取參升分參服其丹毒須針鏡去血經心錄無連翹有知母芍藥犀角各等分

五香連翹湯治小兒風熱毒腫腫色白或有惡核瘰癧附骨癰疽節解不舉白丹走竟身中白軫瘡不已方

青木香 薰陸香 雞舌香 沈香 麝香 三銖 大黃 二兩 黃芩 各六銖 升麻 射干 海藻 枳實 各半兩 竹瀝 三合

右十四味咬咀以水四升煮藥減半內竹瀝煮取一升二合兒生百日至二百日一服三合二百日至朞歲一服五

連翹丸治小兒無辜寒熱強健如故而身體頸項結核瘰癧及心脇腹背裏有堅核不痛名爲結風氣腫方

連翹　桑白皮　白頭翁　牡丹
防風　黃蘗　桂心　香豉
獨活　秦艽各一兩　海藻半兩

右十一味末之蜜丸如小豆三歲兒飲服五丸加至十丸五歲已上者以意加之

治丹毒大赤腫身壯熱百治不折方

寒水石十六銖　石膏十三銖　藍青十二銖冬用乾者　犀角
柴胡　杏人各八銖　知母十銖　甘草五銖
羚羊角六銖　芍藥七銖　梔子十一銖　黃芩七銖
竹瀝一升　生葛汁四合澄清二升　蜜二升

右十五味咬咀以水五升并竹瀝煮取三升三合去滓內杏人脂葛汁蜜微火煎取二升一二歲兒服二合大者量加之

治小兒丹腫及風毒風疹麻黃湯方

麻黃一兩半　獨活　射干　甘草
桂心　青木香　石膏　黃芩各一兩

右八味咬咀以水四升者煮取一升三歲兒分為四服日再

治小兒惡毒丹及風疹麻黃湯方

麻黃　升麻　葛根各一兩
雞舌香　甘草各半兩　石膏半合　射干

右七味咬咀以水三升者煮取一升三歲兒分三服日三

治小兒數十種丹捐湯方

大黃　甘草　當歸　芎藭
白芷　獨活　黃芩　芍藥
升麻　沈香　青木香　木蘭皮各一兩
芒消三兩

右十三味㕮咀以水一斗一升煮取四升去滓内芫消以綿搵湯中適寒温搨之乾則易之取差止

治小兒溺竈丹初從兩股及臍間起走入陰頭皆赤方

桑根皮切一斗以水二斗煮取一斗以洗浴之

治小兒丹毒方

擣慎火草絞取汁塗之良其丹毒方具在第二十二卷中

治小兒赤遊腫若偏身入心腹即殺人方

擣伏龍肝爲末以雞子白和傅乾易之

又方　白豆末水和傅之勿令乾

治小兒半身皆紅赤漸漸長引者方

牛膝　甘草

右二味㕮咀合得五升以水八升煮三沸去滓和伏龍肝末傅之

治小兒身赤腫起者方

熬米粉令黑以唾和傅之

又方

伏龍肝　劉寄奴燒灰

右二味末之以膏和傅之

治小兒卒腹皮青黑方

以酒和胡粉傅上若不急治須臾便死

又炙臍上下左右去臍半寸并鳩尾骨下一寸凡五處各三壯

五香枳實湯治小兒著風熱瘡瘤堅如麻豆粒瘡瘡癢搔之皮剥汁出或偏身頭面年年常發者方

青木香九銖　麝香六銖　薰陸香　沉香㕮咀兩半　升麻　黃芩　雞舌香　白斂

麻黃各一兩　防風
大黃一兩十八銖　漏蘆半兩
秦艽各半兩　枳實一兩半
右十四味㕮咀以水五升煮取一升八合兒五六歲者一
服四五合七八歲者一服六合十歲至十四五者加大黃
半兩足水爲一斗煮取二升半分三服

治小兒火灼瘡一身盡有如麻豆或有膿汁作痛作癢者方
甘草　芍藥
黃連　黃蘗
右七味末之以蜜和傅之日二夜一亦可作湯洗之

治小兒瘡初起燻漿似火瘡名曰燻瘡亦名爛瘡方
桃人熟擣以面脂和傅之亦治徧身赤腫起

又方
馬骨燒灰傅之

治小兒熱瘡水銀膏方
水銀　胡粉
右三味以猪脂四升煎松脂水氣盡下二物攪令勻不見
水銀以傅之

治小兒上下徧身生瘡方
芍藥　黃連
大黃二兩　蛇牀子一升
右八味㕮咀以水二斗煮取一斗以浸浴兒

苦參湯浴小兒身上下百瘡不差方
苦參八兩　地榆
獨活　艾葉各三兩
右七味㕮咀以水三斗煮取一斗以浴兒瘡上浴訖傅黃
連散

黃芩各三兩　苦參八兩
松脂各三兩
黃蘗五兩　拔葜一斤
黃連　王不留行
竹葉二升

治三日小兒頭面瘡起身體大熱方

升麻　柴胡　石膏 各六銖　甘草
當歸 各十二銖　大黃　黃芩 各十八銖

右七味㕮咀以水四升煮取二升分服日三夜一暈兒大小用之

治小兒身體頭面悉生瘡方

揄白皮隨多少暴令燥下篩醋和塗綿以傳瘡上蟲自出亦可以猪脂和塗之

枳實丸治小兒病風瘙癢痛如疥豆粒年年喜發面目虛肥手足乾枯毛髮細黃及肌膚不光澤鼻氣不利此則少時熱盛極體當風風熱相薄所得也不早治之成大風疾方

枳實 一兩半　菊花　蛇牀子　防風

白薇　浮萍　蓼子 各一兩　天雄
麻黃　漏蘆 各半兩

治小兒風瘙癮疹方

蒴藿　防風
秦椒　升麻
芫花 一云蔚　蓼實
檾石 各一兩

右十三味㕮咀以漿水三斗煮取一斗去滓內檾令小沸浴之

又方

羊桃　石南
苦參　茵芋
蛇牀子　枳實

牛膝末酒服方寸匕漏瘡多年不差擣末傅之亦主

骨疽癭疾瘰癧癰絶妙

澤蘭湯塗丹及癮疹入腹殺人方

澤蘭　芎藭　附子　茵芋

葇本　莽草　細辛 各十二銖

右七味㕮咀以水三升煮取一升半分四服先服此湯然後作餘治

治小兒手足及身腫方

以小便温暖漬之良

又方

巴豆五十枚去心皮以水三升煮取一升以綿内湯中拭病上隨手消并治癮疹

論曰小兒頭生小瘡浸淫遍亦名妬頭瘡以赤龍皮湯及天麻湯洗之内服漏蘆湯外宜

傳飛烏膏散及黄連胡粉水銀膏散 方在第二十三卷

治小兒一切頭瘡久即疽瘡癢不生痂藥蘆

藥蘆　黄連　雄黄

松脂 各三兩　豬脂 半斤　礬石 五兩　黄芩

右七味末之煎令調和先以赤龍皮天麻湯洗訖傳之 赤龍皮 槲木皮是也

治小兒頭瘡經年不差方

松脂　苦參　黄連 各一兩半　大黄

胡粉 各一兩　黄芩

水銀 各二兩　蛇牀子 十八枚　礬石 半兩

右九味末之以臘月豬脂和研水銀不見傳之

又方　取屋塵末和油瓶下滓以皂莢湯洗傳之

又方　取大虫脂傳之亦治白禿

又方　髮中生瘡頂白者皆以熊白傅之

治小兒頭瘡方

胡粉一兩　黃連二兩

右二味末之洗瘡去痂拭乾傅之即差更發如前傅之

又方

胡粉　連翹各一兩　水銀半兩

右三味以水煎連翹內胡粉水銀和調傅之

又方

胡粉　白松脂各二兩　水銀一兩　豬脂四兩

右四味合煎去滓內水銀粉調傅之大人患同

治小兒頭瘡苦參洗湯方

苦參　黃芩　黃連　黃蘗

甘草　大黃　芎藭各一兩　蒺藜子三合

右八味咬咀以水六升煮取三升漬布搦瘡上日數過

治小兒頭上惡毒腫瘙癰諸瘡方

男子屎尖燒灰和臘月豬脂先以醋泔清淨洗拭乾傅之

又方

治小兒禿頭瘡方

取雄雞屎陳醬汁苦酒和以洗瘡了傅之

又方

芫花臘月豬脂和如泥洗去痂傅之日一度

治小兒頭禿瘡方

葶藶子細末先洗傅之

又方　不中水蕪菁子葉燒作灰和豬脂傅之

治小兒頭禿瘡無髮苦瘡方

野葛末　豬脂　羊脂各一兩

右三味合煎令消待冷以傅之不過三上

治少小頭不生髮一物揪葉方

揪葉擣取汁傅頭上立生

治小兒頭不生髮方

燒鯽魚灰末以醬汁和傅之

治小兒瘡瘡方

家中石灰傅之厚著之良

又方

燒桑根灰傅之并燒烏羊角作灰相和傅之

治小兒疽瘡方

丹砂三十銖　雄黃二十四銖　礬石十八銖燒者　雌黃二十四銖

大黃三十銖　黃連三十六銖　莽草十八銖　茼茹二十四銖漆頭者

右八味㕮咀以猪脂一升三合微火煎三上三下膏成去滓下諸石末攪凝傅之

治小兒惡瘡方

熬豉令黃末之傅瘡上不過三傅愈

治小兒疽極月初即生常黃水出方

酢和油煎令如粥及熱傅之三日一易欲重傅則以皂莢湯洗瘡乃傅之

治小兒月蝕瘡隨月生死方

以胡粉和酥傅之五日差

治月蝕九竅皆有瘡者方

燒蚯蚓屎末和猪膏傅之

又方　水和粉傅之

治小兒浸淫瘡方

竈中黃土　髮灰

右二味各等分末之以猪脂和傅之

治小兒黃爛瘡方　竈下土

四交道中土

右二味各等分末之以傅亦治夜啼

又方　燒艾灰傅之

又方　燒牛屎傅之亦滅瘢

治小兒疥方

燒竹葉爲灰雞子白和傅之日三亦治疳瘡

又方　燒乱髮灰和臘月猪脂傅之

又方　以臭酥和胡粉傅之

治小兒頭面瘡疥方

麻子五升末之以水和絞取汁與蜜和傅之若有白

犬膽傅之大佳

治小兒濕癬方

枸杞根擣作末和臘月猪膏傅之

又方　桃青皮擣末和醋傅之日二

又方　揩破以牛鼻上津傅之

又方　煎篤屎洗之

又方　燒狗屎灰和猪脂塗之

治小兒身上生赤疵方

取馬尿洗之日四五度

治小兒身上有赤黑疵方

針父脚中取血貼疵上即消

又方　取狗熱屎傅之皮自卷落

治小兒疣目方

以針及小刀子決目四面令似血出取患瘡人瘡中

汁黃膿傳之莫近水三日即膿潰根動自脫落

小兒雜病第九 方一百二十一首 灸法十三首

治小兒臍中生瘡方

桑汁傳乳上使兒飲之

又方 飲羖羊乳及血

治小兒風臍遂作惡瘡歷年不差方

取東壁上土傅之大佳若汁不止燒蒼耳子粉之

又方 乾螬蟲末粉之不過三四度差

治小兒臍不合方

大車轄脂燒灰日一傅之

又方 燒蜂房灰末傅之

治小兒臍中生瘡方

燒鼈帶灰和膏傅之

治小兒臍赤腫方

杏人半兩 豬頰車髓十八銖

右二味先研杏人如脂和髓傅臍中腫上

治小兒臍汁出不止兼赤腫白石脂散方

以白石脂細研熬令微煖以粉臍瘡日三四度

治小兒鵝口不能飲乳方

鵝屎汁瀝兒口中

又方 黍米汁塗之

又方

取小兒父母亂髮淨洗纏桃枝沾取井花水東向向日以髮拭口中得口中白乳以置水中七過瀝洗三朝作之

治小兒心熱口爲生瘡重舌鵝口方

柘根剉五升無根弓材亦佳以水五升煮取二升去
滓更煎取五合細細傅之數數為之良
治口瘡白漫漫方
取桑汁先以父髮拭口以桑汁塗之
治重舌舌強不能放唾方
鹿角末如大豆許安舌下日三四度亦治小兒不能乳
又方
取蛇蛻燒末以雞毛薷醇醋展藥掠舌下愈
治小兒重舌方
田中蜂房燒灰酒和塗喉下愈
又方 衣魚塗舌上
又方 竈月下黃土末苦酒和塗舌上
又方

三家屠肉切令如拇大摩舌上兒立能啼
又方 赤小豆末醋和塗舌上
又方 燒簸箕灰傳舌上
又方 黃蘗以竹瀝漬取細細點舌上良
重舌灸行間隨年壯穴在足大指歧中
又灸兩足外踝上三壯
治小兒舌上瘡方
蜂房燒灰屋間塵各等分和勻傳之
又方 桑白汁塗乳與兒飲之
又方 羊蹄骨中生髓和胡粉傳之
治舌腫強蒲方
蒲口含糖醋良
又方 飲羖羊乳即差

治小兒口瘡不得吮乳方

大青 十八銖　黃連 十二銖

右二味㕮咀以水三升煮取一升二合一服一合日再夜一

又方

臘月猪脂一斤　蜜二升　甘草如指大三寸

右三味合煎相得舍如棗大稍稍咽之日三

又方

礬石如雞子大置醋中塗兒足下二七徧愈

治小兒口瘡方

燒髮灰和猪脂傳之

治小兒口下黃肌瘡方

取羖羊髭燒作灰和臘月猪脂傳之角亦可用

治口傍惡瘡方

亂髮灰　故絮灰　黃連　乾薑

右四味等分為散以粉瘡上不過三遍

治口噤赤者心噤白者肺噤方

雞屎白棗大綿裹以水一合煮二沸分再服

治小兒口噤方

鹿角粉

右二味等分和乳塗乳上飲兒

大豆末

驢乳　猪乳各一升

右二味合煎得升五合服如杏人許三四服差

雀屎丸主小兒卒中風口噤不下一物方

雀屎如麻子丸之飲下即愈大良雞屎白亦佳

治小兒口中涎出方

以白羊屎內口中沫塗口中及頤上

又方　以東行牛口中沫塗之差

又方　桑白汁塗之差

治小兒卒毒腫著喉頸壯熱妨乳方

升麻　射干　大黃各一兩

右三味㕮咀以水一升五合煮取八合一歲兒分五服以滓薄腫上冷更暖以薄大兒以意加之

升麻湯治小兒喉痛若毒氣盛便咽塞并主大人咽喉不利方

升麻　生薑　射干各二兩　橘皮一兩

右四味㕮咀以水六升煮取二升去滓分三服

治小兒喉痺腫方

魚膽二七枚以和竈底土塗之差止

桂心

右二味末之以綿裹如棗大含咽汁　杏人各半兩

治小兒解顱方

熬蛇蛻皮末之和豬頰車中髓傅頂上日三四度

又方　豬牙頰車髓傅顱上差

治小兒腦長解顱不合羸瘦色黃至四五歲不能行半夏熨方

半夏　生薑　苜蓿各一升　細辛叁兩

桂心壹尺　烏頭拾枚

右六味㕮咀以淳苦酒五升漬之晬時煮三沸絞去滓以綿一片浸藥中適寒溫以熨顱上冷更溫之復熨如前朝暮各三四熨乃止二十日愈

治小兒解顱生蟹足傳方

生蟹足　白斂各半兩

右二味擣末以乳汁和傳顱上立愈

治小兒解顱三物細辛傳方

細辛　桂心各半兩　乾薑拾銖

右末之以乳汁和傳顱上乾復傳之兒面赤即愈

治小兒顱開不合方

防風壹兩半　柏子人　白及各壹兩

右三味末之以乳和傳愈上十日知二十日愈日一

又方　取豬牙車骨煎取髓傳愈上愈

小兒顱陷灸臍上下各半寸及鳩尾骨端又足太陰各一壯

治小兒狐疝傷損生癩方

桂心拾銖　地膚子貳兩半　白朮壹兩拾銖

右三味末之以蜜和丸白酒服如小豆七丸日三亦治大人

又方

芍藥　茯苓　防葵作防風　大黃各半兩

半夏　桂心　蜀椒各拾銖

右七味末之蜜和服如大豆一丸日五服可加至三丸

五等丸治小兒陰偏大又卵核堅癩方

黃蘗　香豉　桂心各二兩　牡丹　防風

右五味末之蜜丸如大豆兒三歲飲服五丸加至十丸兒

小以意酌量著乳頭上服之

治小兒卵腫方

取雞翅六莖燒作灰服之隨卵左右取鼬治陰大如斗今錄驗云

治小兒癩方

蜥蜴一枚燒末酒服之

治小兒氣癩方

土瓜根　芍藥　當歸
右三味各一兩咬咀以水二升煎取一升服五合日三
又方
三月上除日取白頭翁根擣之隨偏處傅之一宿作
瘡二十日愈
氣癩灸足厥陰大敦左灸右右灸左各一壯
治小兒陰瘡方
以人屎灰傅之又狗屎灰傅之又狗骨灰傅之又馬
骨末傅之
治小兒股間連陰囊生瘡汁出先癢後痛十日五日自差
一月或半月復發連年不差者方
灸瘡搔去痂帛拭令乾以蜜傅更溲麪作燒餅熟熨
以餳塗餅　尉灸之冷即止再度差

治小兒陰腫方
狐莖灸擣末酒服之
又方　擣蕪荑末薄上
又方　猪屎五升水煮沸布裹安腫上
又方　擣堊衣傅之又以衣中白魚傅之
又方　所桑木白汁塗之
治小兒陰瘡方
取狼牙濃煮汁洗之
又方　黃連胡粉等分以香脂油和傅之
治小兒核腫壯熱有實方
甘遂　青木香　石膏各十銖　麝香三銖
大黃　前胡各二兩　黃芩半兩　甘草十八銖
右八味咬咀以水七升煮取一升九合每服三合日四夜三

小兒陰腫灸大敦七壯

齲頭丸治小兒積冷久下差後餘脫肛不差腹中冷肛中疼痛不得入者方

死齲頭二枚炙令焦　小蜻蛉皮一枚炙令焦　礜石四兩　桂心三兩

右四味末之蜜丸如大豆兒三歲至五歲服五丸至十丸日三兒大以意加之

小兒脫肛灸頂上旋毛中三壯即入

又灸脽中三壯即差

又灸尾翠骨三壯

又灸臍中隨年壯

治小兒肛濕瘡方

鐵衣著下部中即差

治小兒久痢膿濕蠶方

艾葉五升以水一斗煮取一升半分爲三服

治小兒肛瘡方

以猪脂和胡粉傅之五六度

又方　嚼麻子傅之日六七度

又方

羊膽二枚和醬汁於下部灌之猪脂亦佳

治濕瘡方

濃煎地榆汁洗浴每日二度

除熱結腸方斷小兒熱下黃赤汁沫及魚腦雜血肛中瘡爛坐蠶生虫方

黃連　蘗皮　苦參　鬼臼

獨活　橘皮　芍藥　阿膠各半兩

右八味末之以藍汁及蜜丸如小豆日服三丸至十丸無忌

藍汁可用藍子一合舂蜜和丸

小兒疳濕瘡灸第十五椎俠脊兩傍柒壯未差加柒壯

治小兒蚘虫方

楝木削上蒼皮以水煮取汁飲之量大小多少爲此有小毒

治小兒羸瘦有蚘虫方

薤蘆二兩以水一升米二合煮取米熟去滓與服之

又方

萹蓄三兩水一升煮取四合分服之擣汁服亦佳

又方

東引吳茱萸根白皮四兩桃白皮三兩

右二味咬咀以酒一升二合漬之一宿漸與服取差

又方　取猪膏服之蛕虫云治

又方　擣槐子內下部中差爲度蛕虫云治

又方　楝實一枚內孔中蛕虫云治

治寸白蟲方

東行石榴根一把水一升煮取三合分服

又方　桃葉擣絞取汁服之

治小兒三蟲方

雷丸　苦蕒

右二味各等分爲末服一錢匕日二

治大便竟出血方

鼈頭一枚炙令黃黑末之以飲下五分匕多少量兒大小日三服

又方　燒車缸一枚令赤內一升水中分二服

又方　燒鼈帶末傳乳頭上令兒飲之

治小兒尿血方

燒鵲巢灰井花水服之亦治夜尿牀

又方　尿血灸第七椎兩傍各五寸隨年壯

治小兒遺尿方

瞿麥　龍膽　皂莢　桂心 各半兩

雞腸草一兩　車前子一兩六銖　石韋半兩　人參一兩

右八味末之蜜丸每食後服如小豆大五丸日三加至六七丸

又方　小豆葉擣汁服

又方

燒雞腸末之漿水服方寸匕日三一云面北斗服

遺尿灸臍下一寸半隨年壯

又灸大敦三壯亦治尿血

地膚子湯治小兒熱毒入膀胱中忽患小便不通欲小便則澀痛不出出少如血須臾復出方

地膚子　瞿麥　知母　黃芩

枳實　升麻　葵子　猪苓 各陸銖

海藻　橘皮　通草 各叁銖　大黃拾銖 捌

右十二味㕮咀以水三升煮取一升一日至七日兒服一合為三服八日至十五日兒一合半為三服十六日至二十日兒二合為三服四十日兒以此為準五十日已上七歲已下以意加藥益水

治小兒淋方

車前子一升水二升煮取一升分服

又方　煮冬葵子汁服之

又方

取蜂房亂髮燒灰以水服一錢匕日再

治小兒小便不通方

車前草 切一升 小麥 升

右二味以水二升煮取一升二合去滓煮粥服日三四

又方

冬葵子一升以水二升煮取一升分服入滑石末六銖

治小兒吐血方

燒蛇蛻皮末以乳服之并治重舌

又方 取油三分酒一分和之分再服

治小兒鼻塞生息肉方

通草 細辛 各壹兩

右二味擣末取藥如豆著綿纏頭內鼻中日二

治小兒鼻塞不通足涕出方

杏人 半兩 蜀椒 附子 細辛 各壹銖 陛

右四味咬咀以醋五合漬藥一宿明旦以猪脂五合煎令附子色黃膏成去滓待冷以塗絮導鼻孔中日再兼摩頂上

治小兒聤耳方

末石硫黃以粉耳中日一夜一

治小兒耳瘡方

燒馬骨灰傅之

又方 燒雞屎白筒中吹之

治小兒齒落久不生方

以羊屎中大豆二七枚小開豆頭以注齒根處數度即生

又方

取雄鼠屎三七枚以一屎拭一齒根處盡此止二十一日即生雄鼠屎頭尖

治小兒四五歲不語方

末赤小豆酒和傅舌下

又炙足兩踝各三壯

治小兒數歲不行方

取葬家未開戶盜食來以哺之曰三便起行

治小兒不能乳方

雀屎四枚末之著乳頭飲兒大十枚

治小兒落牀墮地如有瘀血腹中陰陰寒熱不肯乳哺但啼哭叫喚蒲黃湯方

蒲黃　大黃　黃芩各十銖　甘草八銖

麥門冬十銖　芒消七銖　黃連十二銖

右七味㕮咀以水二升煮取一升去滓內芒消分三服消息視兒羸瘦半之大小便血即愈忌冷食

治小兒食不知飢飽方

鼠屎二七枚燒爲末服之

治小兒食土方

取肉一斤繩繫曳地行數里勿洗火炙與喫之

治小兒噦方

生薑汁　牛乳各五合

右二味煎取五合分爲二服

又方　取牛乳一升煎取五合分五服

治小兒疰方

竈中灰鹽等分相和熬熨之

治小兒悞吞針方

取磁石如棗核大吞之及含之其針立出

治小兒悞吞鐵等物方

艾蒿一把剉以水五升煮取一升半服之即下

治小兒蠷螋咬遶腹匝即死方

擣薤葉絞傅之無葉子亦可

又方　取鷰窠中土猪脂和傅之乾即易之

備急千金要方卷第五下

金澤文庫

朝奉郎守太常少卿充秘閣校理判登聞檢院護軍賜緋魚袋臣林億　等校正

目病第一

鼻病第二

口病第三　香附

舌病第四

脣病第五　甲煎附

齒病第六

唉病第七　咽附

耳病第八

面藥第九

目病第一　論一首　證三條　方七十一首　灸法二十八首

論曰凡人年四十五已後漸覺眼暗至六十已後還漸自明

金澤文庫

治之法五十已前可服瀉肝湯五十已後不可瀉肝目中有疾可傳石膽散藥等無病不可輒傳散但補肝而已自有肝中有風熱令人眼昏暗者當灸肝輸及服除風湯丸散數十劑當愈

生食五辛　接熱飲食　熱飡麪食　飲酒不已
房室無節　極目遠視　數看日月　夜視星火
夜讀細書　月下看書　抄寫多年　雕鏤細作
博弈不休　久處煙火　泣淚過多　刺頭盛過多

右十六件並是喪明之本養性之士宜熟慎焉又有馳騁田獵目涉風霜迎風追獸日夜不息者亦是傷目之媒也

忽一時之浮意爲百年之痼疾可不慎歟凡人少時不自將慎年至四十即漸眼昏若能依此慎護可得白首無他所以人年四十已去常須瞑目勿顧他視非有要事不宜輒開此之一術護慎之極也其讀書博弈等過度患目者名曰肝勞若欲治之非三年閉目不視不可得差徒自瀉肝及作諸治終是無效人有風疹必多眼暗先攻其風其

暗自差

足太陽陽明手少陽脉動發目病黃帝問曰余嘗上清零之臺中陛而顧匍匐而前余私異之竊內怪之或獨冥視安心定氣久而不解被髮長跪倪而視復久之又不已卒然自止何氣使然岐伯對曰五藏六腑之精氣皆上注於目而爲之睛睛之果者爲眼骨之精爲瞳子筋之精爲黑眼血之精爲其胳果氣之精爲白眼肌肉之精爲約束果契筋骨血氣之精而與脉并爲系系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢身之虛其入深則隨眼系以入於腦入於腦則轉轉則引目系急急則目眩以轉矣邪中其睛則其睛所中者不相比

則睛散睛散則歧故見兩物目者伍藏陸腑之精也營衛魂
魄之所營也神氣之所生也故神勞則魂魄散志意亂是故
瞳子黑眼法於陰白眼赤脉法於陽故陰陽合揣（靈樞作團）而
精明矣目者心之使也心者神之舍也故神分精亂而不專
（靈樞作轉）卒然見非常之處精神魂魄散不相得故曰惑帝曰余
疑何其然也余每之東菀未嘗不惑去之則復余惟獨爲東
菀勞神乎何其異也岐伯曰不然夫心有所喜神有所惡卒
然相感則精亂視誤故神惑神移乃復是故聞者爲迷甚者
爲惑

目皆外決於面者爲氣皆在內近鼻者上爲外皆下爲內皆
目赤色者病在心白色者病在肺青色者病在肝黃色者病
在脾黑色者病在腎黃色不可名者病在胃中

診目痛赤脉從上下者太陽病從下上者陽明病從外走內
者少陽病

夫鼻洞鼻洞者濁下不止傳爲鼽瞢瞑目故得之氣厥足陽
明有俠鼻入於面者名曰懸顱屬目內眥取之損有餘益不足反者
屬目本名曰眼系頭目固痛取之在項中兩筋間入腦乃別
陰蹻陰陽相交陽入陰出陽交於兌皆陽氣盛則瞑目陰氣
絕則眠

神麹丸主明目百歲可讀注書方

神麹四兩　磁石二兩　光明砂一兩

右三味末之鍊蜜爲丸如梧子飲服三丸日三不禁常服
益眼力衆方不及學者宜知此方神驗不可言當秘之

補肝治眼漠漠不明瓜子散方亦名十子散方

冬瓜子　青葙子　莧蔚子　枸杞子　牡荊子

蒺藜子　菟絲子　蕪菁子　決明子　地膚子
柏子人各二合　牡桂二兩
右十六味治下篩食後以酒服方寸匕日二神驗
補肝丸治眼暗方
蕘蔺根二兩　車前子一兩　青葙子　桂心
細辛　莞蔚子　杏仁
茯苓　黃芩　防風　枸杞子　五味子各一兩
澤瀉　決明子　麥門冬　棘人各一兩六銖
車前子　菟絲子各二合　乾地黃二兩　兎肝一具
右二十味末之蜜丸飲下二十丸如梧子日再加至三十丸
補肝丸治眼暗睆睆不明寒則淚出肝痺所損方
兎肝二具　柏子人　乾地黃　茯苓

細辛　棘人　枸杞子各一兩六銖　防風
芎藭　署預酪各一兩　車前子二合　五味子十八銖
甘草半兩　菟絲子一合
右十四味末之蜜丸酒服如梧子二十九日再服加至四十九
補肝散治目失明漠漠方
青羊肝一具去上膜薄切之以新瓦盛之內肝於中炭火上炙之令極乾汁盡末之　梔子一合擘
決明子半升　蓼子一合熬令香
右三味合治下篩以粥飲食後服方寸匕日二稍加至三匕不過兩劑能一歲服之可夜讀細書
補肝散治三十年失明方
細辛　鍾乳粉鍊成者　茯苓　雲母粉鍊成者
遠志　五味子等分

右六味治下篩以酒服五分匕日三加至一錢匕

補肝蕪荑散常服明目方

蕪荑青子三升淨淘以清酒三升煮令熟暴乾治下篩以井花水和服方寸匕稍加至三匕無所忌可少少作服之令人充肥明目洞視水煮酒服亦可 千金翼同用水 煮三易水

又方

胡麻一斗蒸三十徧治下篩每日酒服一升

又方

服小黑豆一每日空心吞二七粒

又方

三月三日採蔓菁花陰乾治下篩空心井花水服方寸匕久服長生明目可夜讀細書

補肝散治男子五勞七傷明目方

地膚子一升陰乾末之 生地黃十斤擣取汁

右二味以地黃汁和散暴乾更為末以酒服方寸匕日二服

又方

白瓜子七升絹袋盛攪沸湯中三徧暴乾以酢五升浸一宿暴乾治下篩酒服方寸匕日三服之百日夜冩細書

治肝實熱目皆痛如刺梔子人煎方

梔子人 決明子一升 車前葉

秦皮六兩 各一兩 碎如大豆 石膏二兩 小豆三合

細辛一兩 赤蜜三合 苦竹葉二合

右九味㕮咀以井花水三升煮取七合去滓下蜜更煎取四合以綿濾之乾器貯密封勿使草芥落中以藥汁細細

仰卧以傳目中

治眼赤漠漠不見物息肉生瀉肝湯方

柴胡　芍藥　大黃各四兩　決明子

澤瀉　黃芩　杏人各三兩　外麻

枳實　梔子人　竹葉各二兩

右十一味㕮咀水九升煮取二升七合分三服熱多躰壯加大黃二兩羸老去大黃加梔子人五兩

瀉肝湯治眼風赤暗方

前胡　芍藥各四兩　生地黃一斤　芒消

黃芩　茯苓　白朮　枳實各三兩

人參　白芷　澤瀉　梔子人各二兩

甘草　細辛各一兩　竹葉五升

右十五味㕮咀以水一斗二升先煎竹葉取九升去滓下諸藥煮取三升半分三服

治肝熱不止衝眼眼皆赤赤脉息肉痛閉不開熱勢彭彭不歇及目睛黃洗肝乾藍煎方

乾藍　車前葉　苦竹葉各三升　細辛

秦皮　薏人　梔子人　芍藥各三兩

決明子四兩　升麻二兩

右拾味㕮咀以水貳斗先煮乾藍車前竹葉取一斗去滓澄清取八升內藥煮取三升分三服須利加芒消二兩

治目熱皆赤生赤脉侵睛息肉急痛閉不開絮在眼礙痛大棗煎方

大棗七枚去皮核　黃連二兩碎綿裹　淡竹葉切五合

右三味以水二升煮竹葉取一升澄清取八合內棗肉黃連煎取四合去滓令淨細細以傅目皆中

治目中息肉方

驢脂　石塩末

右二味和令調注目兩眥頭日三夜一差

又方

五加不聞水聲者根去土取皮擣末一升和上酒二升浸七日外一日兩時服之禁醋二七日徧身生瘡若不出未得藥力以生熟湯浴之取毒瘡出差

洗眼湯治熱上出攻目生障翳冒熱痛汁出方

秦皮　黄蘗　黄芩　決明子　黄連　梔子七枚　大棗伍枚　豉人各十八銖

右八味㕮咀以水二升浸煮取六合澄清仰卧洗目日一

治目生翳方

貝子拾枚燒灰治下篩取如胡豆著翳上日二正仰卧令人傅之炊久乃拭之息肉者加眞珠如鼻等分

治目赤及翳方

烏賊骨　鉛丹大小等分

右二味合研細和白蜜如泥蒸之半食久冷著眼四眥日一

又方

熟羊眼睛暴乾治下篩傅目兩角

又方

白羊髓傅之

又方

新生孩子胞衣暴乾燒末傅目眥中

又方

古錢枚　鹽方寸匕

右二味合治下篩傅目眥中

治目風淚出浮腎多膿爛眥方

乾薑　礬石　薤人　細辛　黃連

戎鹽　決明子 各六銖　銅青三銖

右八味㕮咀以少許水浸一宿明旦以好白蜜入合和之著銅器中綿蓋器上蒸之飯熟藥成絞去滓以新死大雄鯉魚膽三枚和內藥中又以大錢七枚常著藥底兼常著銅器中竹簪綿裹頭以注目眥頭晝夜三四不避寒暑數著藥乾又以魚膽和好覆藥上

勿令氣歇

治熱腎漫睛方

以羊筋漱口熟嚼夜卧開目內之即閉目睡去膜明日即差 千金翼以治眼目不明

治風腎方

取死猪鼻燒灰治下節日一向日水服方寸匕

治目熱生膚赤白膜方

取雄雀屎細直者人乳和熟研以傳之當漸消爛

又方

以蛔蟲燒爲末傳之

治人馬白膜漫睛方

以雞翎截之近黑睛及當白睛嘲之膜自聚鉤針鉤挽之割去即見物以綿當眼上著血斷三日差

治目白膚風淚下蕩風散方 刪繁方名真朱散

光明朱砂研 兩半　貝齒五枚火上熟燒爲末　衣中白魚七枚

乾薑三銖

右四味於新磁鉢內研之厚帛三下爲散仰卧令人取小指爪挑少許傳目中取差爲度 千金翼名真朱散主目腎覆童睛不見物

治目中生息肉膚腎稍長欲滿目閉瞳子及生珠管方

貝齒七枚燒末之　眞珠等分

右二味合治如粉以注腎肉上日三度甚良亦治目中眯不出

治目生珠管方

滑石一本作冷石　手爪甲燒　龍骨　貝齒　丹砂各等分

右五味治下篩以新筆點取當珠管上日三度良

治毒病後目赤痛有腫以青布掩目上以冷水漬青布數易之

治熱病後生翳方

豉二七枚燒末之內管中以吹目中

治熱病後眼暗失明方

以羊膽傳之晝暮各一

治風眼爛眥方

竹葉　黃連各一兩　柏白皮一兩半

右三味㕮咀以水二升煮取五合絹用滴目兩眥旦三四度

治胎赤眼方

取槐木枝如馬鞭大長二尺齊頭油麻一匙置銅鉢中旦使童子以木研之至暝止夜卧時洗目傳眥日三良

治目爛赤方

取三指撮鹽置古文錢上重重火燒赤投少醋中足淹錢以綿沾汁注目眥中

治目中風冷淚出眥赤癢乳汁煎方

黃連十銖八　蕤仁半兩　乾薑一兩

右三味㕮咀以人乳汁一升浸藥一宿明旦以微火煎取

二合綿絞去滓取如黍米許內目眥頭日再（張文仲方三味等分）

治目中風腫痛除熱揉眼方

礬石三兩燒令汁盡以棗膏和如彈丸揉眼上下食頃日三止

洗眼湯治目赤痛方

甘竹葉（二七枚）　烏梅（三枚）　古錢（三枚）

右三味以水二升漬藥半日東向竈煮二沸三上三下得二合臨欲眠注目眥

治目卒腫方

以酢漿水作鹽湯洗之日四五度

治目卒癢痛方

削乾薑令圓滑內眥中有汁拭却薑復內之味盡易之

五藏客熱上衝眼內外受風令目痛不明方

地膚子　瓜子人　青葙子　蒺藜子　菟蔚子　藍子　兎絲子（千金翼作車前子各二合）　柏子人（一合半）　決明子（五合）　細辛（一兩六銖）　桂心（一兩八銖）　大黃（二兩）　黃連（一兩半）　螢火（六銖）

右十五味末之蜜丸每服如梧子三十丸食後服日三（千金翼無柏子人）

治目赤痛方

雄黃（一銖）　細辛　黃連　乾薑（各二銖）

右四味合治如粉以綿裹釵股唾濡頭注藥末內大眥頭急閉目中淚出須臾止勿將手近勿將息裹勿洗之

又方

雄黃　乾薑　黃連　礬石（各六銖）

右四味合治並如前方一方加細辛六銖

治眼赤暗方

杏人 杏未熟時取人擣汁一合 古青錢三枚 青鹽一兩六銖

右三味合內埳器中封頭勿泄氣百日後出著目四眥頭日二三遍避風冷

治眼暗赤冷淚方

蒺藜 波斯鹽

右二味等分治下篩以鹽生脂和每夜傳目四角以粟大密室中將息一月日差忌五辛失明者三十日傳之

治目痛及淚出不止方

削附子作替蟲屎大內目中卧良

治目不明淚出方

以烏雞膽臨臥傳之

治雀盲方

地膚子五兩 決明子升

右二味末之以米飲汁和丸食後服三十九至三十九日

二盡即更合差止

治雀目術

令雀盲人至黃昏時看雀宿處打令驚起雀飛乃呪曰紫公紫公我還汝盲汝還我明如此日日瞑三過作之眼即明曾試有驗肘後云刪繁載支太醫法

治肝氣虛寒眼青眦眦不見物真珠散方

真珠一兩研 白蜜二合 鯉魚膽一枚 鯉魚腦一枚

右四味和合微火煎兩沸綿裹內目中當汁出藥歇更為之

治目眦眦無所見方

青羊肝一具細切以水一斗內銅器中煮以麴餅覆上上鑽兩孔如人眼正以目向就熏目不過再熏之

即差千金翼治眼眼暮無所見不用麹餅

治眼暗方

以銅器盛大酢三四升煎七八日覆器濕地取銅青一合以三月杏白人一升取汁和銅青傳之日不過三四度大良

又方

古錢七枚　銅青　乾薑　胡粉各中棗大　黃連三銖　烏頭大棗核　薤人一百十枚　蘘荷子大棗　細辛五銖　酢二合　椒葉一把取汁　清酒五合

右十三味治下篩合煎取三分去一盛甕器中若燥取人乳和傳目慎風冷

又方

海朝含黃蘗一爪甲許使津置掌中拭目訖以水洗之至百日眼明此法乃可終身行之永除眼疾神良

又方

柴胡八銖　決明子十八銖

右二味治下篩人乳汁和傳目可夜書見五色

治眼暗方

七月七日生苦瓠中白絞取汁一合以酢一升古文錢七枚浸之微火煎之減半以米許大內眥中

治眼漠漠無所見方

薤人　秦皮　決明子各一合　黃連各十八銖　螢火七枚

右五味㕮咀以水八合微火煎取三合冷以綿注洗目日三度常服蕪菁子主輕身益氣明目方

蕪荑青子一升以水四升煮令汁盡出暴乾復以水四升煮如前法三煮三暴治下節飲服方寸匕千金翼

明目令髮不落方

十月上巳日收槐子內新淨甕中以盆密封口三七日發封洗去皮取子從月一日服一枚二日二枚日別加計十日服五十五枚一月日服一百六十五枚一年服一千九百八十枚小月減六十枚此藥主補腦早服之髮不白好顏色長生益壽先病冷人勿服之肘後出方

又方

牛膽中漬槐子陰乾百日食後吞一枚十日身輕三十日白髮再黑至一百日通神

治目中眯不出方

以蚕沙壹粒吞之即出

治稻麥芒等入目中方

取生蠐螬以新布覆目上持蠐螬從布上摩之芒出著布良

治砂石草木入目中不出方

以雞肝注之

又方

以書中白魚和乳汁注目中

治目中眯法

旦起對門戶跪拜云戶門狹小不足宿客勞便差

治目爲物所傷觸青黑方

煮羊肉令熱熨勿令過熱猪肝亦得

治目痛不得睡方

暮炙新青布熨并蒸大豆袋盛枕之夜恒令熱

目中赤痛從內眥始取之陰蹻

目中痛不能視上星主之先取譩譆後取天牖風池

青盲遠視不明承光主之

目瞑遠視瞋睛目窓主之

目眴赤痛天柱主之

目眩無所見偏頭痛引目外眥而急頷厭主之

目遠視不明惡風目淚出憎寒頭痛目眩瞢內眥赤痛遠視瞋睛無見皆養痛淫膚白翳覆瞳子巨窌主之

青盲無所見遠視瞋睛目中淫膚白幕覆瞳子巨窌主之

目不明淚出目眩瞢瞳子養遠視瞋睛昏夜無見目瞤動與項口參相引喎僻口不能言刺承泣

目痛僻戾目不明四白主之

目赤目黃攢竹主之

眇目水溝主之

目痛不明斷交主之

目瞑身汗出承漿主之

青盲瞶目惡風寒上關主之

青盲商陽主之

瞶目瞋睛偏歷主之

眼痛下廉主之

瞶目瞋睛少氣灸五里右取左左取右

目中白翳前谷主之

目痛泣出甚者如脫前谷主之

白幕覆珠子無所見解谿主之

眼暗灸大椎下數節第十當脊中安灸二百壯惟多爲佳
至驗
肝勞邪氣眼赤灸當容直壯兩邊各爾穴在眼小眥近後當
耳前三陽三陰之會處以兩手按之有上下橫脉則是與耳
門相對是也
眼急痛不可遠視灸當瞳子上入髮際一寸隨年壯兜名當陽
風瞖眥灸人中近鼻柱二壯仰卧灸之
目卒生瞖灸大指節橫文三壯在左灸右在右灸左良
亦如之
鼻病第二 論一 灸法六首 方五十五首
治鼻塞腦冷清涕出方
通草 辛夷 酪半兩 細辛 甘遂 甘一作草
桂心 芎藭
右七味末之蜜丸綿裹內鼻中密封塞勿令氣洩丸如大
麻子稍加微覺小痛擣薑爲丸即愈用白狗膽汁和之更佳
治鼻塞常有清涕出方
細辛 蜀椒 乾薑 芎藭 吳茱萸
附子 酪一兩 炮去皮莖 附子 酪一兩 炮 桂心 四銖 白皮 猪膏一升
右九味咬咀以綿裹苦酒漬一宿取猪膏煎以附子色黃
涕出不止灸鼻兩孔與柱齊
治鼻塞室香膏方
白芷 芎藭 細辛 莽草 一作薰草 通草 八銖 當歸 辛夷 十銖
右七味咬咀以苦酒漬一宿以不中水猪肪一升煎三上

三下以白芷色黃膏成去滓綿沾如棗核大內鼻中日三

小品加桂心十八銖

治鼻不利香膏方

當歸　薰草古今錄驗通草　細辛

白芷各兩半　羊髓四兩脂亦得

㮈人各十銖　苣窮

右八味咬咀以微火合煎三上三下白芷色黃膏成去滓

取如小豆大內鼻中日二先患熱後鼻中生赤爛瘡者以

黃芩梔子代當歸細辛

治鼻室氣息不通方

小薊一把咬咀以水三升煮取一升分二服

又方

瓜蒂末少許吹鼻中亦可綿裹塞鼻中

又方

槐葉五升　葱白切一升　豉一合

右三味以水五升煮取三升分溫三服

治鼻齆多年不聞香臭清水出不止方

取當道車轍過蔌藥一把擣以水三升煎取熟先仰

臥使人滿口含取一合汁灌鼻中使入不過再度大

嚏必出一兩箇息肉似赤蛹一方有黃連等分同煎

治鼻齆方

通草　細辛　附子

右三味各等分末之以蜜和綿裹少許內鼻中

又方

甘遂　通草　細辛　附子等分

右四味末之以白雄犬膽和爲丸如棗核大綿裹內鼻中

辛執湧出四五升差亦治息肉

又方

灸皂莢末之如小豆以竹管吹鼻中

又方

乾薑末蜜和塞鼻中吹亦佳

又方

鐵鏁磨石取末以猪脂和綿裹內之經日肉出差

又方

以馬新粟汁飾頭令滿口灌鼻中

又方

伏面臨牀前以新汲冷水淋玉枕上後以瓜蒂末綿裹塞之

治齆鼻有息肉不聞香臭方

瓜丁　細辛

右二味各等分末之以綿裹如豆大許塞鼻中須臾即通

治鼻中息肉不通利通草散方

通草半兩　礬石一兩　眞朱一兩

右三味末之撚綿如棗核取藥如小豆著綿頭內鼻中日三易之一方有桂心細辛各一兩同前擣末和使之

治齆鼻鼻中息肉不得息方

礬石六銖　藜蘆六銖　瓜蒂二七枚　附子十一銖

右四味各擣篩合和以小竹管吹藥如小豆許於鼻孔中以綿絮塞鼻中日再以愈爲度古今錄驗加蜚蠊半兩

治鼻中息肉方

灸蝦蟆皮末綿裹塞之三日

又方

細篩釜底墨水服之三五日

治鼻中息肉不聞香臭方

燒礬石末以面脂和綿裹著鼻中數息肉隨藥消落

又方

末瓜丁如小豆許吹入鼻中必消即三數度

又方

細辛　釜底墨

右二味末之水和服方寸匕

又方

綿裹瓜蒂末塞鼻中

治鼻中息肉粱起羊肺散方

羊肺一具乾之　白朮二兩　蒐蔂　通草

乾薑　芎藭各二兩

右六味末之食後以米飲服五分匕加至方寸匕

又方

通草十三銖　真朱六銖　礬石　細辛各一兩

右四味末之撚綿如棗核治散如小豆并綿內鼻中日再愈

鼻中息肉炙上星三百壯宛在直鼻入髮際一寸

又炙俠上星兩傍相去三寸各一百壯

治鼻中生瘜方

燒祀竈飯末以傅鼻中

又方

燒故馬絆末傅鼻中

又方

偷孝子帽以裁之

又方

烏牛耳垢傅之

又方
以牛鼻津傅之
又方
擣杏人乳傅之亦燒核壓取油傅之
又方
燒牛狗骨灰以膩月猪脂和傅之
治疳蟲蝕鼻生瘡方
燒銅筯頭以醋淬之數過取醋傅之又以人屎灰塗
之差
治鼻痛方
常以油塗鼻內外酥亦得
治卒食物從鼻中縮入腦中介介痛不出方
牛脂若羊脂如指頭大內鼻中以鼻吸取脂須臾脂

消則物逐脂俱出也
論曰鼻頭微白者亡血設令微赤非時者死病人色白者皆
亡血也凡時行衄不宜斷之如一二升已上恐多者可斷即
以龍骨末吹之九竅出血皆用吹之
治大便出血及鼻皆出血上衝胸心氣急此是勞熱所致方
生地黃八兩　蒲黃一升　地骨皮五兩　黃芩三兩
芍藥　生竹茹三兩
右六味㕮咀以水八升煮取二升七合分温三服
凡吐血衄血溺血崩藏氣虛隔氣傷或起驚悸治之方
生竹皮一升　芍藥二兩　芎藭一兩　黃芩二兩
桂心　甘草一兩
右七味㕮咀以水一斗煮竹皮減三升下藥煎取二升分
三服

治衄血方

伏龍肝二枝如雞子大　生地黄六兩　芎藭一兩　桂心三兩
細辛六銖　吳茱萸　白芷　乾薑　芍藥
右十味㕮咀以水三升酒七升煮取三升分三服

生地黄汤主衄方

生地黄兩八　黄芩一兩　阿膠二兩　柏葉把　甘草二兩
右五味㕮咀以水七升煮取三升去滓內膠煎取二升半
分三服

又方

生地黄切三斤　阿膠二兩　蒲黄六合
右三味以水五升煮取三升分三服

治鼻出血不止方

乾地黄　梔子　甘草等分
右三味治下篩酒服方寸匕日三如鼻疼者加豉一合鼻
有風熱者以葱涕和服如梧子五丸

治鼻衄方

地黄汁五合煮取四合空腹服之忌酒炙肉且服粳
米飲

又方

飲小薊汁

又方

以冷水淨漱口含水以蘆管吹二孔中即止

又方

取亂髮五兩燒作灰以管吹鼻中棗核大不止益吹
之以血斷止并水服方寸匕日三甚者夜二已困不

識人者服亦佳

又方

取人屎尖燒灰水服并吹少許鼻中止

又方

五月五日取人屎燒作灰冷水服五分匕

又方

以膠帖鼻頭上至頂及髮際三寸止

又方

新馬屎汁灌鼻中及飲之

又方

以濕布薄冒上

又方

淳酢和土塗陰囊上乾易之

又方

韭根葱根取汁懸頭著東大內鼻中少時更著兩三度差葱白擣汁亦得

治鼻出血不止方

擣楮葉汁飲三升大良

又方

張弓令弦向上病兒仰卧枕弦放四體如常卧法刎時癢癢便灸足大指節橫理三毛中十壯劇者百壯刎不止灸之并治陰卵腫

又灸風府一穴四壯不止又灸

又灸涌泉二穴各百壯

口病第三論一首 灸法二首 方五十九首

論曰凡患口瘡及齒禁油麪酒將酢酸酢鹹膩乾棗姜後仍愼

之若不久愼尋手再發發即難差薔薇根角葛爲口瘡之
神藥人不知之
凡口中面上息肉轉大以刀決潰去膿血即愈
治口中瘡久不差入鼻中並生瘡三年已上不差者方
濃煎蔾薔薇根汁含之又稍稍咽之日三夜一冬用根
夏用莖葉
又方
角葛灰傅之一宿知二宿差有汁吐之不得咽也
治口瘡不歇方
牛膝　生蘘荷根酪三　黃蘗一兩
右三味㕮咀以綿裹酒三升漬一宿微火煎一兩沸細細
含之
治膀胱熱不已口舌生瘡咽腫升麻煎方

升麻　玄參　薔薇根白皮　射干各四兩
大青　黃蘗酪三兩　蜜七合
右七味㕮咀以水七升煮取一升五合去滓下蜜更煎兩
沸細細含咽之
治口數生瘡連年不差方
薔薇根　黃芩　當歸　桔梗　黃耆
白斂　鼠李根皮　大黃　芍藥　續斷
黃蘗　葛根酪一
右十二味末之以酒服方寸匕日二服亦可漿水服之
治胃中客熱脣口乾燥生瘡方
茯苓　黃芩　甘草　大黃
枳實　杏人　黃連酪三兩　桂心酧兩
右十味末之食前漿水服方寸匕日二

薔薇根（蘇）　杵薔薇根（鈔）

治口熱生瘡方

升麻錄十 黃連十八錄十六分用黃檗

右二味末之綿裹含咽汁亦可去之

治口瘡方

薔薇根皮四兩 黃檗二兩 升麻三兩 生地黃五兩

右四味�once以水七升煮取三升去滓含之差止含極吐却更含

治口中瘡爛痛不得食方

杏人枚二十 甘草寸一 黃連錄六

右三味末之合和綿裹杏人大含之勿咽日三夜一

治口中瘡身躰有熱氣兼瘡蠹微丸方

蔷薇根 黃芩 鼠李根 當歸

葛根 白斂 石龍芮千金翼作黃連 黃檗

芍藥 續斷 黃耆各一兩 栝樓根二兩

右十二味末之蜜和服如梧子十九日三服

治吻瘡方

以楸白皮及濕帖之三四度差

又方

取經年葵根欲腐者弥佳燒作灰及熱傅之

又方

以新炊飯了甑及熱以脣口向甑脣上熏之二七下三兩上差止

又方

梔子 甘草各十八錄 細辛三錄十 桂心十二錄 芎藭一兩

右五味末之蜜丸食後服七九日再服差止

苦參 白芷 橘皮 桂心 棗肉各一兩半
右五味末之以蜜和爲丸食後服十五九又舍之以差爲度此方甚驗

治口肥瘡方
熬龜上飯令焦末傅之

治齲吻瘡方
白楊枯枝鐵上燒取湔及熱傅之

又方
以木屢尾內燼灰中令熱取柱兩吻各二七遍

治口傍惡瘡方
亂髮灰故絮灰
右四味等分合和爲散以粉瘡上不過三遍

治口中瘡咽喉塞不利呂燥膏方
豬膏 白蜜各一兩 黃連一兩
右三味合煎去滓攪令相得含如半棗曰四五夜二

治熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入膏方
當歸 射干 升麻各一兩 附子半兩 白蜜四兩
右五味咬咀以猪脂四兩先煎之令成膏下著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩沸令相得置器中令凝取如杏人大含之曰四五遍輒咽之

治失欠頰車蹉開張不合方
一人以手指牽其頤以漸推之則復入矣推當疾出指恐誤齧傷人指也

治失欠頰車蹉方
消蠟和水傅之

失欠頰車蹉灸背第五椎一日二七壯滿三日未差灸氣衝二百壯胃前喉下甲骨中是亦名氣堂又灸足內踝上三寸宛宛中或三寸五分百壯三報此三陰交穴也

治卒口噤不開方

以附子擣末內管中強開口吹口中

治口中熱乾甘草丸方

甘草　人參　半夏　生薑　烏梅肉各二兩半　棗膏二兩半

右六味末之蜜丸如彈子大旋含咽汁日三

治口乾方

羊脂若猪脂雞子大一枚擘之內半升酢中漬一宿絞取汁含之

治口乾除熱下氣方

石膏碎五合　蜜二升

右二味以水三升煮石膏取二升內蜜煮取二升去滓含如棗核大咽汁盡更含之

治虛勞口乾方

麥門冬去心二兩　大棗二十枚擘肉

右二味以蜜一升和令熟五升米下蒸之任性服

又方

羊脂如雞子大淳酒半升棗七枚擘合漬七日取棗食之愈

又方

酸棗一升　酸石榴子五合　葛根三兩　麥門冬四兩

覆盆子二合　烏梅五合　甘草　栝樓實各三兩

右八味末之以蜜丸含如棗大以潤爲度
五香丸治口及身臭令香止煩散氣方
豆蔻　丁香　藿香　零陵香
青木香　白芷　桂心各一兩　香附子二兩
甘松香　當歸各半兩　檳榔二枚
右十一味末之蜜和丸常含一丸如大豆咽汁日三夜一
亦可常含咽汁五日口香十日躰香二七日衣被香三七
日下風人聞香四七日洗手水落地香五七日把他手亦
治口氣臭穢常服含香丸方
丁香半兩　甘草三兩　細辛一兩　桂心各一兩半　芎一兩
右五味末之蜜和臨卧時服三丸如彈子大
又方

常以月旦日未出時從東壁取歩七歩迴面垣立
含水嚥壁七遍口即美香
又方
桂心　甘草　細辛
右四味等分治下篩以酒服一錢匕差止
又方
芎藭　白芷　橘皮
右五味末之次內棗肉乾則加蜜和丸如大豆服十丸
食前食後常含之或吞之七日大香
治口中臭方
桂心　舊本脫今依千金方補　甘草各等分
右一味末之臨卧以三指撮酒服二十日香
又方　細辛豆蔻含之甚良

又方

蜀椒　桂心　各等分

右二味末之酒服三指撮

主口香去臭方

甘草三十銖　芎藭二十四銖　白芷十八銖

右三味治下篩以酒服方寸匕日三服三十日口香

又方

松根白皮　瓜子人　大棗

右三味治下篩以酒服方寸匕日二百日衣被香

又方

瓜子人　芎藭　葉本　當歸　杜蘅各六銖

細辛一兩　防風二兩

右七味治下篩食後飲服方寸匕日三服五日口香十日身香二十日肉香三十日衣被香五十日遠聞香一方加白芷十八銖

又方

橘皮二十銖　桂心八銖　木蘭皮一兩　大棗二十枚

右四味治下篩酒服方寸匕日三夕服身香亦可以棗肉丸之服二十丸如梧子大稍加至三十丸一方有芎藭十八銖

又方

濃煮細辛汁含之久乃吐之

又方

井花水三升漱口吐廁中良

又方

香薷一把水一斗煎取三升稍稍含之

又方

甜瓜子作末蜜和每日空心洗漱訖含一丸如棗核大亦傳齒

又方

熬大豆令焦及熱酢沃取汁含之

治七孔臭氣皆令香方

沉香五兩　甘草　當歸　墓本三兩　白瓜瓣半升　丁香五合　苦參　麝香各二兩　桂心各一兩

右八味末之蜜丸食後服如小豆大五丸日三夕服令舉身皆香

治身體臭令香方

白芷　甘子皮各半兩　瓜子人二兩　墓本　當歸　細辛

右七味治下篩酒服方寸匕日三五日口香三七日身香

又方

甘草　松根皮　甜瓜子　大棗

右四味各等分治下篩食後服方寸匕日三七日知二百日

大香

熏衣香方

雞骨煎香　零陵香　丁香　青桂皮　青木香　楓香　鬱金香各三兩　薰陸香　甲香　蘇合香　甘松香各二兩　沉水香五兩　雀頭香　藿香　白檀香　安息香　艾納香各一兩　麝香半兩

右十八味末之蜜二升半煮肥棗四十枚令爛熟以手痛搦令爛如粥以生布絞去滓用和香乾濕如捺麪擣五百

拌成丸密封七日乃用之以微火燒之以盆水內籠下以
殺火氣不爾必有焦氣也

又方

沉香 煎香各五兩 雀頭香 藿香 丁子香各一兩
右五味治下節內麝香末半兩以麪羅之臨熏衣時密
和用

又方

墮婆婆香 薰陸香 沉香 檀香
煎香 甘松香 零陵香 藿香各一兩
丁香十八銖 首蓿香二兩 索肉八兩
右十一味麤下合棗肉搥擣量加蜜和用之

濕香方

沉香二斤七兩九銖 甘松 檀香 雀頭香一作藿香
甲香 丁香
麝香二兩九銖 薰陸香三兩六銖 零陵香 雞骨煎香各三兩九銖
右十味末之欲用以蜜和預和歇不中用

又方

沉香三兩 零陵香 煎香 麝香各一兩半
甲香三銖 薰陸香 甘松香 檀香三銖 藿香 丁子香各半兩
右十味麤篩蜜和用熏衣餅盛埋之又窖佳

百和香通道俗用者方

沉水香五兩 甲香 丁子香 雞骨香
墮婆婆香各二兩 薰陸香 零陵香
熟捷香 炭末各二兩 白檀香 藿香
青桂皮 白漸香柴也青木香 甘松香各一兩

雀頭香　蘇合香　麝香
鷰香 兩半
右三十味末之酒灑令奠再宿酒氣歇以白蜜和內甖器
中蠟紙封勿令洩冬月開取用大佳
裹衣香方
零陵香　藿香 兩各四　甘松香
茅香 兩各三　丁子香 一兩　首宿香 二兩
右六味各擣加澤蘭葉四兩麤下用之極美
又方
零陵香 二兩　藿香　甘松香　首宿香
白檀香　沉水香　煎香 兩各一
右七味合擣加麝香半兩麤篩用如前法
又方

藿香 四兩　丁香 枚廿　甘松香　麝香
沈香　煎香
右六味麤篩和爲乾香以裹衣大佳
右六味麤篩和爲乾香以裹衣大佳
舌上瘡裂破引脣揭赤升麻煎泄熱方
舌病第四方十一首
舌主心藏熱即應舌生瘡裂破引脣揭赤升麻煎泄熱方
蜀升麻　射干 各三兩　柏葉 切一升　大青 二兩
苦竹葉 切五合　赤蜜 八合　生芦根　薔薇根白皮 各五兩
生玄參汁 三合　地黃汁 五合
右十味㕮咀以水四升煮取一升去滓下玄參汁令兩沸
次下地黃汁兩沸次下蜜煎取一升七合綿慧取汁安舌
上含細細咽之
舌上瘡不得食舌本強頸兩邊痛此是心虛熱所致治之方
柴胡　升麻
芍藥　梔子人

通草酪二黄芩 大青 杏人酪一兩半
生薑 石膏酪四兩

右十味㕮咀以水一斗九升煮取三升半分四服日三夜一滓可重煎服之

治舌卒腫滿口溢出如吹猪胞氣息不得通須臾不治殺人方

急以指刮破舌兩邊去汁即愈亦可以鈹刀決兩邊破之以瘡膏傅之

又方

刺舌下兩邊大脉血出勿使刺著舌下中央脉血出不止殺人不愈血出數升則燒鐵篦令赤尉熨瘡數過以絶血也

又方

半夏十二枚洗熟以酢一升煮取八合稍稍含歠之吐出加生薑二兩佳

治舌腫強滿口方

滿口含糖酢少許時時熱通即止

治舌腫起如猪胞方

釜下墨末以酢厚傅舌上下脫去更傅須臾即消若先決出血汁竟傅之弥佳凡此患人皆不識或錯治益困殺人甚急但看其舌下自有噤虫形狀或如蝮蛇或如卧蚕子細看之有頭尾其頭少白燒鐵釘烙

治舌脹滿口不得語方

螢虫枚二十 鹽一升

右二味以水三升煮三沸含之稍稍咽之日三

治舌強不得語方

礬石　桂心
右二味等分末之安舌下立差

舌上黑有數孔大如箸出血如涌泉此心藏病治之方

戎鹽　黃芩一作蒽字　黃蘗　大黃各五兩
人參　桂心　甘草各二兩

右七味末之蜜和以飲服十九如梧子曰三亦燒鐵烙之治舌上出血如泉方

燒鐵篦熟爍孔中良

脣病第五甲前煎法二首灸法二首　方二十首

潤脾膏治脾熱脣焦枯無潤方

生地黃汁一升　生麥門冬四兩　生天門冬切一升

萎蕤四兩　細辛　甘草　芎藭

白朮各二兩　黃耆　升麻各三兩　豬膏三升

右十一味㕮咀諸藥苦酒淹一宿綿裹藥臨煎下生地黃汁與豬膏煎取膏鳴水氣盡去滓取細細含之

甲煎脣脂治脣裂口臭方

先以麻擣泥泥兩口好甕瓶容一斗已上各厚半寸暴令乾

甘松香五兩　艾納香　苜蓿香

茅香各一兩　藿香三兩　零陵香四兩

右六味先以酒一升水五升相和作湯洗香令淨切之又以酒水各一升浸一宿明旦內於一斗五升烏麻油中微火煎之三上三下去滓內上件一口瓶中令少許不滿然後取

上色沉香三兩　雀頭香三兩　蘇合香三兩

白膠香五兩　白檀五兩　丁香一兩

麝香 兩　甲香 兩

右八味先酒水相和作湯洗香令淨各別擣碎不用絕細以蜜三升酒一升和香內上件甕瓶中令實滿以綿裹瓶口又以竹篾交橫約之勿令香出先掘地埋上件油瓶令口與地平以香瓶合覆油瓶上令兩口相當以麻擣泥泥兩瓶口際令牢密可厚半寸許用糠雍瓶上厚五寸燒之火欲盡即加糠三日三夜勿令火絕計糠十二石訖停三日令冷出之別鍊蠟八斤煮數沸內紫草十二兩煎之數十沸取一莖紫草骨白出之又以綿濾過與前煎相和令調乃內朱砂粉六兩攪令相得少冷未凝之間傾竹筒中紙裹筒上麻纏之待凝冷解之任意用之計此可得五十挺

甲煎足脂治脣白無血色及口臭方

沈香　甲香　丁香　麝香　檀香
蘇合香　薰陸香　零陵香　白膠香　藿香
甘松香　澤蘭

右十二味各六兩胡麻油五升先煎油令熟乃下白膠藿香甘松澤蘭少時下火綿濾內甕瓶中餘八種香擣作末以蜜和勿過濕內著一小甕瓶中令滿以綿幕口竹十字絡之以小瓶覆大瓶上兩口相合密泥泥之乃掘地埋油瓶令口與地平乃聚乾牛糞燒之七日七夜不須急滿十二日燒之彌佳待冷出之即成其瓶並須熟泥勻厚一寸暴乾乃可用一方用糠火燒之

鍊蠟合甲煎法

蠟二兩　紫草二兩

右先鍊蠟令消乃內紫草煮之少時候看以紫草於指甲上研之紫草心白即出之下蠟勿令凝即傾弱一合甲煎於蠟中均攪之訖灌筒中則勿觸動之冷凝乃取之便成好口脂也傳口面日三

治緊脣方

纏白布作大燈炷如指安釜刃上燃炷令刃汗出拭取傳脣上日二三度故青布亦佳并治瘡脣

又方

青布灰以酒服之亦可脂和塗

又方

以蛇皮拭之燒爲灰傳之

又方

水服蟾齊蟲槽灰良

又方

自死螻蛄灰傳之

又方

以火炙蠟帖脣上差

又方

炙松脂帖上差

緊脣炙虎口男左女右

又炙承漿三壯

治瘡脣方

以乾蟾齊蟲槽燒末和豬脂臨卧傳之

又方

燒鼈甲及頭令煙盡末傳之日三

治脣生瘡方

以頭垢傅之日三

又方

以胡粉傅之

治脣邊生瘡連年不差方

以八月藍葉七斤絞取汁洗不過三日差

治脣生核方

猪屎平量一升以水投絞取汁温服之

治脣古忽生瘡方

燒雞屎白末以布裹著病上含之

治脣黑腫痛癢不可忍方

取大錢四文於石上以臘月猪脂磨取汁塗之

又方

以竹弓彈之出其惡血差

又方

燒亂髮及蜂房六畜毛作灰猪脂和傅之亦治瘡脣

治冬月脣乾坼血出方

擣桃人以猪脂和傅之

治遠行脣口面皴裂方

熟煎猪脂將行夜常傅面卧行萬里野宿不損

朝奉郎守太常少卿充祕閣校理判登聞檢院護軍賜緋袋臣林億等校正

齒病第六 論一首 方三十八首

論曰凡齒齒斷宣露多是疳蟲及月蝕以角蒿灰夜傳齒斷間使滿勿食油不過三三夜差食油及乾棗即發所以患齒者忌油乾棗及桂心每旦以一捻鹽內口中以煖水含指齒及叩齒百遍爲之不絕不過五日口齒即牢密凡人齒齒斷不能食果菜者皆由齒根露也爲此鹽湯揩齒叩齒法無不愈也神良凡人好患齒病多由月蝕夜食飲之所致也識者深宜愼之所以日月蝕未平時特忌飲食小兒亦然

治齲齒及蟲痛方

白附子 知母 芎藭 蒴 高良薑各六 細辛各十 銖 二銖

右五味末之以綿裹少許著齒上有汁吐出一日兩度舍
之亦治口氣

又方

切白馬懸蹄如棗許以綿裹著痛處孔中不過三度
治蟲齒蟲齒積年不差從少至老方

雀麥草一名杜姥草似牛毛草以苦瓠葉四十枚淨
洗露一宿平旦取草屈長二寸廣一寸厚五分以瓠
葉裹縛之作五六十裹子取三年醸醋浸之至日中
取兩裹內火中炮令極熱內口中齒外邊熨之冷則
易之取銅器以水內中解裹於水中洗之得蟲長三
分老者黃赤色小者白色多者得三四十枚少者得
一二十枚

治蟲齒方

莨菪子三合如無葱子韭子並得以青錢七文燒令
赤取小口甕子令可口含得者將錢內甕子中取一撮
許莨菪子安錢上令炮烚聲仍與半合許水淋令氣
上從甕出將口含甕口令氣莫出用熏齒冷復更作
取三合藥盡爲劑非止蟲齒得差或風齒齲齒齒中
病悉主之口中多津即吐之

又方

白楊葉切一升水三升煮取一升含之

又方

大醋一升煮枸杞根白皮一升取半升含之蟲立出

又方

取桃人少許以釵頭穿向燈上燒之煙出經少時吹
滅即內入口安蟲齒上咬之不過五六度一方作胡

桃人

治疳蟲蝕齒根方

地龍置石上著一撮鹽須臾化爲水以麪展取却待疑厚取以內病上又以皂莢去皮塗上蟲即出

又方

純麻子燭燼研以井花水塗之

又方

黑羖羊脂莨菪子各等分先燒鐵鋤斧銼令赤內其中煙出以布單覆頭令煙氣入口熏之

治齒齗腫痛及蟲痛方

黃芩　甘草

當歸　細辛

桂心

蛇牀子　各一兩

右六味㕮咀以醋漿水七升煮取三升去滓含之旦三夜三

治齒有孔不得食面腫方

莽草十葉　猪椒附根皮長四寸者七枚

右二味㕮咀以漿水二升煮取一升含倦即吐却日二三度

治齒根腫方

松葉一把切　鹽一合

右二味以酒三升煮取一升含之

治齒根動欲脫落方

生地黃綿裹著齒上咋之又㕮咀以汁漬齒根日四五著之并咽汁十日大佳

治齒根動痛方

生地黃　獨活各三兩

右二味㕮咀以酒一升漬一宿以含之

治齒斷間津液血出不止方

生竹茹二兩醋煮含之

又方

細辛二兩　甘草一兩

右二味咬咀以醋二升煎取一升日夜旋含之

又方

礬石一兩燒水三升煮取一升先拭血乃含之已後不用朽人牙根齒落不用之可也

治齒間血出方

以苦竹葉濃煮之與鹽少許寒温得所含之冷吐

又方

温童子小便半升取三合含之其血即止

治齒出血不止方

刮生竹皮二兩苦酒浸之令其人解衣坐使人含嚼其背上三過仍取竹茹濃煮汁勿與鹽適寒温含嗽之音日爲度

治酒醉牙齒涌血出方

當歸二兩　桂心　細辛　甘草炙二兩　礬石六銖

右五味咬咀以漿水五升煮取二升含之日五六夜三

又方

燒釘令赤注血孔中止

治頭面風口齒疼痛不可忍方

蜀椒二合　莽草葉汁　雀李根　獨活各二兩

細辛　芎藭　防風各一兩

右七味咬咀以酒二升半煮三五沸去滓含之冷吐更含

之勿咽汁張文仲有白朮二兩

又方
雞屎白燒灰以綿裹置齒痛上咬咋之
又方
雞屎白以醋漬煮稍稍含之
又方
煮枸杞汁含之
又方
生地黃一節　蒜一瓣
右二味熟擣綿裹著痛上咬之勿咽汁汁出吐之日日爲之差止
又方
含鹽尿須臾止
風齒疼痛灸外踝上高骨前交脉三壯

又以線量手中指至掌後橫文折爲四分量里橫文後當臂中灸三壯愈隨左右
含漱湯治齒痛方
獨活三兩　黃芩三兩　芎藭三兩　細辛各二兩　丁香一兩　當歸三兩
右七味咬咀以水五升煮取二升半去滓含漱之須臾吐乃吐更含之古今錄驗同有甘草二兩
又方
含白馬尿隨左右含之不過三五口
治齒痛漱湯方
腐棘刺二百枚以水二升煮取一升旋旋含之日四五度以差止
又方

苦蘭　細辛　防風　礬石
附子　蒺藜　蘆　茅草

右七味各等分作末綿裹如彈丸大酒浸安所患處含之勿咽日三刺破極佳

又方

蚯蚓糞水和作稠泥圍以火燒之令極赤如粉以臘月猪膏和傅齒斷上日三兩度求差

又方

取自死蚯蚓乾者擣末著痛處即止

治齒齗痛不可食生果方

生地黃　慧

右二味合嚼之令味相得吐咽之

又方

馬齒一把嚼之即差

治牙癰塞口噤不開方

附子大者一枚　黃連十八銖　礬石一兩

右三味末之內管中強開口吹之入喉間細細吹之

喉病第七　針灸法二首　證一條　方五十首

凡卒喉痺不得語服小續命湯加杏人一兩方出第八卷中喉嚨者脾胃之候若藏熱喉則腫塞神氣不通烏髭膏主之方

生烏髭爾　升麻三兩　羚羊角二兩

蔷薇根切一升　艾葉六銖生者左佳　芍藥二兩

通草二兩　生地黃切五合　猪脂二斤

右九味㕮咀綿裹苦酒一升淹浸一宿內猪脂中微火煎取苦酒盡膏不鳴為度去滓薄綿裹膏似大杏人內喉中

細細吞之

治喉腫痛風毒衝悶胷方

豉一升半　犀角　射干

杏人　甘草各二兩　羚羊角一兩半

芍藥三兩　梔子七枚　升麻四兩

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓內豉煮一沸分三服

喉腫胷脇支滿灸尺澤百壯

治風毒咽水不下及瘰癧腫方

升麻　芍藥各四兩　射干　杏人

楓香　葛根　麻黃各三兩　甘草二兩

右八味㕮咀以水八升煮取二升半分三服

又方

以水服莨菪子末兩錢匕神良

治喉痺方

荊瀝稍稍咽之

又方

臘月猪尾燒末水服之

又方

燒牛角末酒服之

又方

熬杏人令黑含或末服之

又方

含雞屎白

又方

巴豆去皮針線穿咽入牽出

馬藺子半升水二升煮取一升半服之

又方

煮桃皮汁三升服之

又方

燒荆汁服之又水三升煮荆一握取一升分三服

治喉痺及毒氣方

桔梗二兩水三升煮取一升頓服之

又方

生薑二斤擣取汁蜜五合微火煎相和服一合日五

又方

附子一枚破作大片蜜塗炙令黄含咽汁甘盡更塗

炙如前法

又方

剥大蒜塞耳鼻口二易

喉痺刺手小指爪文中出三大豆許血逐左右刺皆須愼酒

麪毒物

治喉痺卒不得語方

濃煮桂汁服一升亦可末桂著舌下漸咽之良

又方

煮大豆汁含之無豆用豉亦佳

又方

以酒五合和人乳汁半升分二服

又方

燒炊箅作灰三指撮水服之

又方

芥子末水和薄之乾則易

又方
商陸苦酒熬令濃熱傅之
又方
末桂心如棗核大綿裹著舌下須臾破
治喉卒腫不下食方
以韭一把擣熬薄之冷則易
又方
含上好醋口舌有瘡亦佳
治懸癰咽熱暴腫長方
乾薑半夏等分末以少著舌上
又方
塩末以筯頭張口柱之日五
治懸癰咽中生息肉舌腫方
日初出時向日張口使婦人用左裙裾柱其頭上七
下差
又方
羊蹄草煮取汁只含之
又方
鹽豉和塗之
又方
取四五歲小兒尿含鹽含之
凡喉痺深腫連頰嗌氣數者名馬喉痺治之方
馬銜一具水三升煮取一升分三服
又方
韆中蒼耳三七枚燒末水服之
又方

馬鞭草根一握勿中風截去兩頭擣取汁服

又方

燒穀奴灰酒服之立破

咽門者肝膽之候若藏熱咽門則閉而氣塞若腑寒咽門則破而聲嘶毋薑酒主之方

毋薑汁二升　酥　牛髓　油各一升　桂心各一兩

秦椒一合　防風半兩　菖蒲　獨活各一兩六銖

右九味末之內薑汁中煎取相淹濡下髓酥油等令調微火三上三下煎之平旦溫清酒一升下二合膏即細細吞之日三夜一

又方

丹參

鬼臼

升麻　雄黃　杏人

甘草　射干各一兩　麝香半兩

右八味末之以蜜為丸如梧子飲下一丸加至五丸日三

酒服亦佳咽痛失声不利用之良

治咽傷語聲不徹方

酒一升　乾薑二兩半　酥一升　通草

桂心　赤　末

右六味合和服一匕日三

又方

酒一升　酥一升

右三味以酒二合酥一匕薑末二匕相和服日三食後服之亦治肺痛

治啞塞效驗方

桂心　赤鉄　末　乾薑末十兩

右二味末之以蜜丸如杏人大含之細細咽汁日夜勿絕

杏人鉄十八

治咽痛逆氣不能食方

麻子一升熬令黑以酒一升淋取汁窓一服一升漸至三升多汗好覆勿觸風冷此方兼理產婦及丈夫中風如角弓反張口噤不開大驗与紫湯氣力同

治卒咽痛方

懸木枸燒末水服方寸匕日三

又方

燒炊箄一枚搥漿水服方寸匕

治卒風咽腫面腫方

杏人末和雞子黃更擣傅上乾復易之七八度若腫汁出煮醋和伏龍肝傅乾更易之

治卒咽方

燒履鼻繩爲灰煖水服之

又方

燒麻子脂服之

治咽喉不利下氣方

射干　杏人　人參

附子　桂心　各一兩

右五味末之蜜丸如指大含一丸稍稍咽之令藥味相接

治咽喉中痛癢吐之不出咽之不入似得虫毒方

含生薑五十日差

又方

以青布裹麻黃燒以竹筒盛煙熏咽中

治腎熱背急攣痛耳聾或出或生肉塞之不聞人声方

礜石　白朮　牡蠣　各五兩

甘草一兩　生麥門冬六兩生地黃汁一升
芍藥四兩　葱白一升　大棗十五枚
右九味咬咀以水九升煮取三升分三服
治腎熱面黑目白腎氣內傷耳鳴吼閙短氣四肢疼痛腰背相引小便黃赤方
羊腎一具治如食法　白朮五兩　生薑六兩
玄參四兩　澤瀉二兩　芍藥
茯苓酪三兩　淡竹葉切二升　生地黃切一升
右九味咬咀以水二斗煮羊腎竹葉取一斗去滓澄之下藥煮取三升分三服不已三旦更服一劑
治腎熱耳臃血出溜日夜不止方
鯉魚腦一枚　鯉魚腸一具洗細切　鯉魚雖斤三　烏麻子熬令香一升
右四味先擣麻子碎次下餘藥擣爲一家內器中微火熬

煖布裹薄耳得兩食頃開之有白蟲出復更作藥若兩耳並臃出用此爲一劑薄兩耳若止一耳分藥爲兩劑薄不過三薄耳便差愼風冷
治腎虛寒腰脊苦痛陰陽微弱耳鳴羸枯方
生地黃汁二升　生天門冬汁　白蜜各三升
羊腎一具炙　白朮　麥麴各一斤
甘草　乾薑　地骨皮酪八兩
桂心　杜仲　黃耆酪四兩
當歸
右十四味末之內盆中取前三物汁和研微火上煖盆取熱更研日暴乾常研令離盆酒服方寸匕日再
治耳聾鳴汁出皆由腎寒或二十年不差方
故鐵二十斤燒赤水五斗浸去鐵澄清

柘根三十斤水一斗去滓煎取五
昌蒲切五斗水一斗去滓煎取五
右三味合一石五斗用米二石并麴二斗釀如常法酒用
一月封頭開清用磁石鄣鐵者三斤擣為末內酒中浸三
宿飲之日夜飲常取小小醉而眠取聞人語乃止藥
又方
服天門冬酒百日差方在第十四卷中
又方
礬石少許以生昌蒲根汁和點入耳中
治勞龍聾氣龍風龍聾虛龍聾毒龍聾耳鳴方
山茱萸　乾薑　巴戟天　芍藥
澤瀉　桂心　菟絲子　黃耆
乾地黃　遠志　蛇牀子　石斛
當歸　細辛　蒞蓉　牡丹
人參　甘草　附子各二兩　昌蒲一兩
羊腎二枚　防風一兩半　茯苓三兩
右二十三味末之蜜丸如梧子食後服十五丸日三加至
三四十九止皆緣腎虛耳故作補腎方又作薄利九竅藥
即差
治耳聾方
生地黃極麤者長一寸半　巴豆　杏人各七枚
頭髮如大雞子燒灰
右五味治下篩以綿薄裹內耳中一日一夜若小損即去
之直以物塞耳耳中黃水及膿出漸漸有效不得更著不
著一宿後更內一日一夜還去之依前
又方

蕳麻人 五合　杏人 昌蒲 磁石
桃人 烙三分　巴豆一分　石鹽三分　附子二分
薰陸香　松脂烙十蠟八分　通草三分
右十二味先擣草石令細別研諸人如脂內松脂臘合擣
數千杵令可丸乃止以如棗核大綿裹塞耳一日四五度
出之轉捻不過三四日易之

又方
磁石四兩　天門冬　地骨皮　生薑烙三兩
山茱萸　茯苓　昌蒲　苦參
枳實　白芷　橘皮　甘草
土瓜根　牡丹子二兩　竹瀝二升
右十五味㕮咀以水八升煮減半內瀝煮取二升五合分
三服五日一劑三日乃著散內耳中如後方

石昌蒲　白斂
牛膝　土瓜根烙三兩　磁石四兩
右七味治下篩綿裹塞耳日一易之仍服大三五七散佳
方在第十三卷中

又方
薰陸香　蕳麻
亂髮灰　石鹽
右六味等分末之作丸綿裹塞耳時易之差止

治聾方
巴豆十四枚　成鍊松脂半兩
右二味合治丸如黍米大綿裹以簪頭著耳中一日一易
藥如硬微火炙之以汗出乃愈大效

又方

雄鯉魚腦二兩　防風　昌蒲
細辛　附子　苦蘘各六銖

右六味咬咀以魚腦合煎三沸三上三下之膏香為成濾去滓冷以一棗核灌耳中以綿塞之古今錄驗用療風聾年久耳中鳴者以當歸代防風以白芷代苦蘘

又方

竹筒盛鯉魚腦炊飯處蒸之令烊注耳中

又方

昌蒲附子各等分末之以麻油和以綿裹內耳中廣濟方以療耳卒痛求死者崔氏以苦酒和塞耳者

又方

礬石　甘草
細辛　防風
昌蒲　當歸
苦蘘　白芷
附子　烏賊骨
皂莢酪半　巴豆枚廿四

右十二味薄切三升酢漬一宿以不中水雞膏九合煎三上三下以巴豆黃膏成去滓內雄黃末攪調取棗核大瀝耳中綿塞之日三易

又方

燒鐵令赤投酒中飲之仍以磁石塞耳中日一易夜去之旦別著

又方

苴麻一百顆去皮　大棗十五枚去核

右二味熟擣丸如杏人內耳中二十日差

又方

芥子擣碎以男兒乳和綿裹內之

聚胡苗汁灌耳中再度差

又方

作一坑可容三升許著炭火其中坑似窑形以塼覆口上塼上作一孔子容小指塼孔上著地黃一升以木盆覆之以泥泥盆下勿泄盆底上鑽一小孔可容筋其孔上著三重布以耳孔當盆上熏炙若悶去黃水髮裹塩塞之不過三三度神效

又方

擣豉作餅填耳內以地黃長五六分削一頭令尖內耳中与豉餅底齊餅上著楸葉蓋之剜一孔如筋頭透餅於上灸三壯

又方

作泥餅子厚薄如鍪飩皮覆耳上四邊勿令泄氣當耳孔上以草刺泥餅穿作一小孔於上以艾灸之百壯候耳中痛不可忍即止側耳瀉却黃水出盡即差當灸時若泥乾數易之

又方

酒三升碎牡荊子二升浸七日去滓任性服盡雞三

十年久聾亦差

又方

截箭簳二寸內耳中以麪擁四畔勿令泄氣灸筒上

七壯

又方

硫黃雄黃各等分爲末綿裹內耳中數日聞人語聲

又方

桂心十八銖　野葛六銖　成煎雞肪五兩

右三味咬咀於銅器中微火煎三沸去滓密貯勿泄以葦
筒盛如棗核大火炙令少熱欹卧傾耳灌之如此十日耵
聹自出大如指長一寸久聾不過三十日以髮裹膏深塞
莫使泄氣五日乃出之（千金翼云治二十年耳聾）

治耳聾齒痛赤膏方

桂心　大黃　白朮　細辛　芎藭各一兩　乾薑二兩　丹參五兩　蜀椒一升
巴豆十枚大附子二枚

右十味咬咀以苦酒二升浸一宿内成煎猪肪三斤火上
煎三上三下藥成去滓可服可摩耳聾者綿裹内耳中齒
冷痛則著齒間諸痛皆摩若腹中有病以酒和服如棗許
大咽喉痛取棗核大吞之

又方

以綿裹蛇膏塞耳神良

治卒耳聾方

淳酢微火煎附子一宿削令可入耳以綿裹塞之

細辛　昌蒲各六銖　杏人　麴末各十銖

右四味和擣爲丸乾即著少猪脂如棗核大綿裹内耳中
日一易小差二日一易夜去且塞之

治三十年耳聾方

故鐵三十斤以水七斗浸三宿取汁入麴釀米七斗
如常造酒法候熟取礎石一斤研末浸酒中三日乃
可飲取醉以綿裹礎石内耳中好覆頭卧酒醒去礎
石即差

治耳鳴聾方

當歸　細辛
附子　白芷　芎藭　防風
右六味末之以鯉魚腦八兩合煎三上三下膏成去滓以棗核大灌耳中旦以綿塞耳孔
治耳鳴如流水聲不治久成聾方
生烏頭掘得乘濕削如棗核大內耳中日一易之不過三日愈亦療蕎及卒風聾耳
治耳鳴水入方
通草　細辛　桂心各十八銖　昌蒲一兩　附子六銖
礬石燒六銖　當歸　甘草各十二銖　獨活一兩半
右九味末之以白鵜脂半合稍稍和如棗核綿裹內耳中日三旋旋和用一本用葱涕半合
治耳聾有膿散方

烏賊骨　釜底墨　龍骨　伏龍肝各半兩
附子一兩　禹餘糧六銖
右六味末之取皂莢子大綿裹內耳中日一易取差不差者有蟲加麝蚵香一豆大
治耳聾有膿不差有蟲方
鯉魚腸一具切　酢三合
右二味和擣帛裹內耳中兩食頃當悶痛有白虫著藥去之更入新者蟲盡乃止癒
又方
先以紙纏去耳中汁以礬石末粉耳中次石塩末粉其上食久乃起不過再度永差
又方
擣桂和鯉魚腦內耳中不過三四度

治聤耳出膿汁方

礬石　烏賊骨　黃連　赤石脂

右四味等分末之以綿裹如棗核內耳中日三（小品不用赤石脂姚氏加龍骨一兩千金翼同姚氏）

治聤耳耳中痛膿血出方

取釜月下灸薄耳中日三易之每換以篦子去之再著取差止

治聤耳方

桃人熟擣以故緋絹裹內耳中日三易以差爲度

治底耳方

黃礬燒綿裹內耳中不過三日愈或以葦管吹耳中（肘後以療耳聾出膿）

治耳聾乾耵聹不可出方

擣自死白頂蚯蚓安葱涫汁麪封頭蒸之令熟並化爲水以汁滴入耳中滿即止不過數度即挑易出差（肘後以療蚰蜒入耳效）

又方

灌酢三年者寁良綿塞之半日許必有物出

治百蟲入耳方

末蜀椒一撮以半升酢調灌耳中行二十步即出

又方

取桃葉火熨卷之以塞耳立出

又方

車脂傅耳孔蟲自出（肘後以療聤耳膿血）

又方

以葱涕灌耳中蟲即出亦治耳聾

治蜈蚣入耳方

炙猪肉令香掩耳即出

治蚰蜒入耳方

炒胡麻擣之以葛袋盛傾耳枕之即出

又方

以牛酪灌之滿耳即出出當半消若入腹中空腹食好酪一二升即化爲黃水而出不尽更服手用神效

千金翼牛乳

治耳中有物不可出方

以弓弦從一頭令散傅好膠柱著耳中物上停之令相著徐徐引出

五香散治黑皰麤黯黑運赤氣令人白光潤方

面藥第九方八十一首

畢豆四兩　黃耆　白茯苓　菱藕

杜若　當歸　商陸　大豆黃卷二兩　白芷

白殭蠶　白附子　冬瓜人　杜蘅

蜀水花　旋覆花　辛夷人　香附子　丁子香

苦蘘　藁本　皂莢　防風　木蘭

杏人　梅肉　酸漿　白膠

天門冬　白朮　土瓜根三兩　猪胆二具暴乾　水萍

右三十二味下篩以洗面二七日白一年與衆別

洗手面令白淨悅澤澡豆方

白芷　白朮　白鮮皮　白斂

白附子　白茯苓　羌活　菱藕

栝樓子　桃人　杏人　菟絲子

商陸　土瓜根　苦蘘各一兩　豬胰兩具大者細切

冬瓜人四合　白豆麪一升外　麪三升外　豬胰一具洗豬胰焉

右十九味合擣篩簁麪猪胰拌勻更擣每日常用以漿水洗手面甚良

治面黑不淨澡豆洗手面方

白鮮皮　白殭蠶　苦蘘　白芷

白附子　鷹屎白　甘松香　木香各三兩一本用菖蒲本

土瓜根一兩一本用甜瓜子　麝香二兩　雞子白七枚　豬胰三具　白梅肉三七枚　大棗三十枚

白檀香　白朮　丁子香各三兩一本用細辛　杏人三十枚

冬瓜人五合　麪三升外

右二十味先以猪胰和麪暴乾然後合諸藥擣末又以白豆屑二升爲散暫用洗手面十日色白如雪三十日如凝脂神驗千金翼無白殭蠶苦蘘有桂心三兩

洗面藥澡豆方

猪胰五具細切　畢豆麪一升　皂莢三挺　栝樓實三兩一方不用

菱蕤生　白茯苓　土瓜根酪五

右七味擣篩將猪胰拌和更擣令勻每旦取洗手面百日白淨如素

洗面藥方

白芷　白斂　白朮　桃人

冬瓜人　杏人　菱蕤各等分　皂莢倍多

右八味絹篩洗手面時即用

洗面藥除黯黶悅白方

猪胰兩具去脂　豆麪四升　細辛　白朮各一兩

防風　白斂　白芷各三兩　商陸三兩

皂莢 五挺
右十味和土瓜根一兩擣絹羅即取大猪蹄一具煮令爛作汁和散爲餅暴燥更擣爲末羅過洗手面不過一年悅白澡豆治手乾燥少潤膩方

大豆黃五升 苜蓿 零陵香子
赤小豆 各二升去皮 丁香五合 麝香一兩
冬瓜人 茅香 各六兩 猪胰五具細切

右九味細擣羅與猪胰相合和暴乾擣絹篩洗手面澡豆方

白芷 青木香 甘松香 藿香 各一兩
冬葵子一本用冬瓜人 栝樓人 各四兩
零陵香二兩 畢豆麪三升大豆亦得
右八味擣篩用如常法

桃人澡豆主悅澤去黯黯方

桃人 蕪菁子 各一兩 白朮六合 土瓜根七合
畢豆麪二升

右五味合和擣篩以酢漿水洗手面

澡豆主手乾燥常少潤膩方

猪胰五具乾之 白茯苓 白芷 藁本 各四兩
甘松香 零陵香 各二兩 白商陸五兩

大豆末二升 葫藶灰一兩

右九味爲末調和訖與猪胰相和更擣令勻欲用稍稍取以洗手面八九月則合冷處貯之至三月已後勿用神良治面無光澤皮肉皴黑久用之令人潔白光潤玉屑面膏方

五屑細研 苦瓠 土瓜根 菱藕
桃人 白附子 白芷 冬瓜人

木蘭　辛夷　酪一　菟絲子　藁本
青木香　白殭蠶　當歸　黃耆
藿香　細辛各八銖　麝香　防風各半兩
鷹屎白一合　豬臛三具細切　蜀水花一合　白犬脂
鵝脂　熊脂各一升　商陸一兩　豬肪脂一升

右二十八味先以水浸豬鵝犬熊脂數易水浸令血脉盡乃可用㕮咀諸藥清酒一斗漬一宿明旦生擘豬鵝等脂安藥中取銅鐺於炭火上微微煎至暮時乃熟以綿濾置甕器中以傳面仍以練繫白芷片看色黃即膏成其豬臛取浸藥酒投取汁安鎗中玉屑蜀水花鷹屎白麝香末之攪令勻

膏成安藥中攪令勻

面脂去悅澤人面耐老方

白芷　冬瓜人酪三兩　萎蕤　細辛

防風各一兩半　商陸　芎藭各三兩　當歸

藁本　蘼蕪　土瓜根去皮　桃人各一兩

木蘭皮　辛夷　白殭蠶　白附子　零陵香半兩

豬胰三具切水漬六日欲用時以酒挼取汁漬藥

甘松香　麝香　梔子花

中取塗面

鍊脂法

凡合面脂先須知鍊脂法以十二月買極肥大豬脂水煎取清脂沒水中鍊鵝熊脂皆如此法

玉屑面脂方

玉屑　白附子　白茯苓　青木香
菱茭生　白朮　白殭蠶　蜜陀僧
甘松香　烏頭　商陸　石膏
黃耆　胡粉　芍藥　藁本
防風　芒消　桃人　當歸
土瓜根　桃人　白檀各一兩　當歸
桃花　白頭翁　零陵香　細辛
知母各半兩　猪脂一升　羊腎脂一具　白犬脂
鵝脂各一合

右三十三味切以酒水各一升合漬一宿出之用銅器微火煎令水氣盡候白芷色黃去滓停一宿旦以柳枝攪白乃用之

又方令黑者皆白老者皆少方

玉屑　寒水石　珊瑚　苦參　當歸
土瓜根　菟絲　慕本　辛夷人　細辛
菱茭　商陸　白芷　防風　黃耆
白殭蠶　桃人　木蘭皮　藿香　前胡
蜀水花　桂心　冬瓜人　半夏　白斂
青木香　杏人　蘼蕪　芒消　旋覆花
杜蘅　麝香　白茯苓　秦椒　白頭翁
礬石　秦皮　杜若　蜀椒　蕪荑子
升麻　黃芩　白薇　梔子花各六銖
括樓人一兩　熊脂　白狗脂　牛髓　鵝脂
羊髓各五合　清酒一升　鷹屎白一丁香六銖　猪肪脂一升

右五十四味咬咀酒漬一宿內脂等合煎三上三下酒氣盡膏成絞去滓下麝香末一向攪至凝色變止甕器貯勿

面脂治面上皴黑凡是面上之疾皆主之方

丁香　零陵香　桃人　土瓜根　白斂
防風　沈香　辛夷　梔子花　當歸
麝香　藁本　商陸　芎藭各三兩
萎蕤一本作白及　藿香一本無　白芷　甘松香各二兩半
菟絲子三兩　白殭蠶　木蘭皮各二兩半
蜀水花　青木香各三兩　冬瓜人四兩　茯苓三兩
鵝脂　羊腎脂各一升半　羊髓一升　生猪脂三大升

右二十九味㕮咀先以美酒五升浸猪胆六具取汁漬藥一宿於猪脂中極微火煎之三上三下白芷色黃以綿一大兩內生布中絞去滓入麝香末以白木篦攪之至凝乃止任性用之良

面膏去風寒令面光悅却老去皺方

青木香　白附子　芎藭　白蠟
零陵香　香附子　白芷各二兩　茯苓
甘松各兩　羊髓一升半煉

右十味㕮咀以水酒各半升浸藥經宿煎三上三下候水酒盡膏成去滓傳面作粧如有黑黯皆落

猪蹄湯洗手面令光潤方

猪蹄一具　桑白皮　芎藭　萎蕤各三兩
白朮二兩　白茯苓三兩　商陸二兩作當歸　白芷三兩

右八味㕮咀以水三斗煎猪蹄及藥取一斗去滓溫一盞洗手面大佳

令人面白淨悅澤方

白斂　白附子　白朮　白芷各二兩

葉本三兩　猪胆三具水漬去赤汁尽研

右六味末之先以蕪菁子半升酒水各半升相和煎數沸研如泥合諸藥内酒水中以甕器貯封三日每夜傅面旦以漿水洗之

猪蹄漿急面皮去老皺令人光淨方

大猪蹄一具淨治如食法以水二升清漿水一升不渝釜中煮成膠以洗手面又以此藥和澡豆夜塗面旦用漿水洗面皮即急

白面方

牡蠣三兩　土瓜根一兩

右二味末之白蜜和之塗面即白如玉旦以温漿水洗之慎風日

鹿角散令百歲老人面如少女光澤潔白方

鹿角長一握　牛乳升三

天門冬　白芷

白斂各三兩　杏人二七枚

右十一味㕮咀其鹿角先以水漬一百日出與諸藥内牛乳中緩火煎令汁盡出角以白練袋貯之餘藥勿取至夜取牛乳石上摩鹿角取塗面旦以漿洗之無乳小便研之亦得

芎藭　細辛

白附子　白朮

酥三兩

令人面潔白悅澤顏色紅潤方

猪胆五具　蕪菁子二兩　栝樓子五兩　桃人三兩

右四味以酒和熟擣傅之慎風日

又方

採三株桃花陰乾末之空心飲服方寸匕日三并細

又方

以酒漬桃花服之好顏色治百病三月三日收桃花丸治面黑黯令人潔白光悅方

桃花二升　桂心　烏喙　甘草酪一

右四味末之白蜜爲丸服如大豆許十丸日二十日易形一方有白附子甜瓜子杏人各一兩爲七味

鉛丹三十銖　真女菀六十銖

右二味治下篩酒服一刀圭日三男十日知女二十日知知則止黑色皆從大便中出矣面白如雪

白楊皮十八銖一方用橘皮一　桃花一兩　白瓜子人三十銖

右三味治下篩温酒服方寸匕日三欲白加瓜子欲赤加桃花三十日面白五十日手足俱白

治面黯黯内外治方

成鍊松脂爲末温酒服三合日三服盡三升無不差

治外膏方

白芷　白蠟酪二兩　白附子　辛夷

防風　烏頭　藿香酪半兩　蕙本一兩

萎蕤　零陵香酪一兩半　商陸　麝香酪六銖

牛脂　鵝脂酪一　羊脂五合　麻油二合

右十六味薄切醋漬淡淡然一宿合煎候白芷色黄膏成以皂莢湯洗面傅之日三

又方

白礬　石硫黄　白附子各六銖

右三味爲末以酢一斗盛漬之三日夜淨洗面傅之莫見風

日三七日愼之白如雪

又方

雞子三枚　丁香一兩　胡粉一兩細研

右三味先以醋一升漬七日後取雞子白調香粉令勻以漿水洗面傅之

治面黯方

李子人末和雞子白傅一宿即落

又方

白羊乳二升　羊腌二具去汁細擘　甘草二兩末

右三味相和一宿先以酢漿洗面生布拭之夜傅藥兩遍明旦以猪蹄湯洗却每夜洗之

又方

白附子末酒和傅之即落

又方

桂心　石鹽　蜜各等分

右三味末之相和以傅治人面黯黯黑膚色麤澁陷皮厚狀醜方

羖羊脛骨末以雞子白和傅之旦以白粱米泔洗之三日白如珂雪

又方

白蜜和茯苓粉傅之七日愈

又方

杏人末之　雞子白

右二味相和夜塗面明旦以米泔洗之

又方

杏人酒浸皮脫擣絹袋盛夜拭面

又方

酒浸雞子三枚密封四七日成傳面白如雪

治面黯黧令悅澤光白潤好及手皴方

猪蹄兩具治如食法　白粱米一斗淨洗令

右二味以水五斗合煮猪蹄爛取清汁三斗用煮後藥

白茯苓　商陸酪五兩　萎蕤一兩　白芷　藁本各二兩

右五味咬咀以前藥汁三斗并研桃人一升合煮取一斗

五升去滓甕瓶貯之內甘松零陵香末各一兩入膏中攪

令勻綿幕之每夜用塗手面

面多黯黧面皮麤澀令人不老皆主之方

朱砂　雄黃酪二兩　水銀霜研二兩　黃鷹糞一升

上胡粉二兩

右五味並細研如粉以面脂和淨洗面夜塗之以手細摩

令熱明旦不廢作粧然須五日一洗面一塗不過三遍所

有惡物一切皆除數倍少嫩愼風日不傳神秘

治黯黧烏鬣令面潔白方

馬珂二兩　珊瑚　白附子　鷹屎白酪一兩

右四味研成粉和勻用人乳調以傳面夜夜著之明旦以

溫漿水洗之

治面黑生黯皰方

白斂十銖　生礬石無方　白石脂急用　杏人三十銖

右四味研和雞子白夜卧塗面上旦用井花水洗之

治面黯皰令人悅白方

栝樓子六合　麝香半兩　白石脂五合　雀屎二合去黑

右四味擣篩別研麝香雀糞白石脂和合取生菟絲苗汁

和之如薄泥先用澡豆洗去面上膩以塗黯上日夜三四

過旦以温漿水洗之任意作糍

治黡子面不淨方

以上朱砂研細如粉和白蜜塗之旦以酢漿洗之大驗

又方

白附子　香附子　白檀　馬珂　紫檀各一兩

右五味末之白蜜和如杏人大陰乾用時以水研塗面旦以温水洗忌風油七日面如蓮花

治面黡黯方

沈香　牛黃　薰陸香　雌黃

鷹屎　丁香　玉屑各二銖　水銀一銖

右八味末之蜜和以傅

治面黑黡黯皮皺皴散方

白附子　蜜陀僧　牡蠣　茯苓　芎藭各二兩

右五味末之和以羖羊乳夜塗面以手摩之旦用漿水洗不過五六度一重皮脫黡黑差矣

治面黡方

水和丹砂末服方寸匕男七日女二七日色白如雪

白瓜子丸治面黡黯令色白方

白瓜子二兩　藁本　遠志　杜蘅各一兩

天門冬三兩　白芷　當歸　車前子

雲母粉各一兩　柏子人　細辛　橘皮

栝樓人　鉛丹　白石脂各半兩

右十五味末之蜜和空腹服如梧子二十丸日三

去面上黶黑誌方

夜以暖漿水洗面以生布揩黶黑令赤痛水研白旃檀取汁令濃以塗黶黑上旦以暖漿水洗之仍以鷹

屎白粉其上

治粉滓黑黯方

白斂十二銖　白石脂六銖

右二味擣篩以雞子白和夜卧塗面旦用井花水洗去粉滓黑黯皴皰及茸毛令面悅澤光潤如十四五時方

萯耆　白朮　土瓜根　商陸　防風一兩半　白芷　細辛　青木香　芎藭　白附子　杏人各二兩

右十五味末之以雞子白和作挺陰乾石上研之以漿水塗面夜用旦以水洗細絹羅如粉佳

治面粉滓方

敷沸石以清酒和傅之不過三上

又方

擣生菟絲苗汁塗不過三上

治面皰方

羖羊膽　牛膽各一具　淳酒一升

右三味合煮三五沸傅之

治年少氣盛面生疱瘡方

胡粉二銖　水銀一兩

右二味以臘月猪脂和熟研令水銀消散向暝以粉面旦起布拭之愼勿水洗至暝又塗之不過三上差方有真朱白膏治面瘡疱疥癰惡瘡方

附子十五枚　野葛一尺　蜀椒一升

右三味咬咀以酢漬一宿猪膏一斤煎令附子黃去滓塗之日三

梔子丸治酒瘡皶皰方

梔子人 三升 苦參 四兩 大黃 六兩

豉 三升 木蘭皮 半兩 甘草 四兩

右六味末之蜜和服十丸如梧桐子日三稍加至十五丸

薄皶皰方

蒺藜子 梔子人

右四味末之以酢漿水和如泥夜塗上日未出時暖水洗之亦滅瘢痕

治面瘡皰方

鸕鷀屎一升末之以臘月豬脂和令勻夜傳之

治面上風方

玉屑 蜜陀僧 珊瑚 各二兩 白附子 三兩

右四味末之以酥和夜傳面明旦洗之亦滅瘢痕

治面皰甚者方

冬葵子 柏子人 茯苓 冬瓜子

右四味各等分末之酒服方寸匕食後服日三

治面皰方

蕎麥 肉桂 各二兩

右二味末之以酢漿服方寸匕日一亦治黑黯及滅瘢去黑誌

又方

枸杞根 一十斤 生地黃 三斤

右二味先擣篩枸杞又擣碎地黃暴乾合篩空腹酒服方寸匕日三久服顏如玉里子秘之

治面瘡方

木蘭皮一斤以三年酢漬令沒百日暴乾末之溫酒

服方寸匕日三

治面有熱毒惡瘡方

胡粉熬　黃蘗炙　黃連各等分

右三味末之以粉上取差止若瘡乾以面脂調塗之日三

滅瘢痕方

以猪脂三斤飼烏雞一隻又令三日使盡後取白屎內白芷當歸各一兩煎白芷色黃去滓內以鷹屎白半兩攪令調傳之日三

又方

禹餘糧半夏等分末之以雞子黃和先以新布拭瘢令赤以塗之勿見風日二十日差十年者亦滅

又方

鷹屎白一合　辛夷一兩　白附子

杜若　細辛各半兩

右五味咬咀以酒五合浸一宿以羊髓五兩微火煎三上三下去滓小傷瘢上傳之日三

滅瘢痕無問新舊必除方

以人精和鷹屎白傳之日二白蜜亦得

治瘢痕凸出方

春夏以大麥麨秋冬以小麥麨好細絹下篩以酥和封上

又方

鷹屎白一兩　衣白魚二七枚

右二味末之蜜和以傳日三五度良

又方

以熱瓦熨之

又方

以凍凌熨之

又方

鷹屎白二兩 白殭蚕二兩半

右二味末之以白蜜和傅上日三愼五辛生菜

又方

臘月猪脂四升煎大鼠一枚令消盡以生布拭上皮令赤塗之不過四五上

治身及面上印文方

針刺字上破以醋調赤土薄之乾又易以黑滅即止

又方

以未滿月兒屎傅上一月即沒

金澤文庫

備急千金要方卷第七　風毒脚氣

朝奉郎守尚藥奉御臣林億等校正

論風毒狀第一

湯液第二　裹脚附

諸散第三

酒醴第四

膏第五

論風毒狀第一　十六章

論曰考諸經方往往有脚弱之論而古人少有此疾自永嘉南度衣纓士人多有遭者嶺表江東有支法存仰道人等並留意經方偏善斯術晉朝仕望多獲全濟莫不由此二公又宋齊之間有釋門深師道人述法存等諸家舊方為三十卷其脚弱一方近百餘首魏周之代蓋無此病所以姚公集

金澤文庫

驗殊不慇懃徐王撰録未以為意特以三方鼎峙風教未一霜露不均寒暑不等是以關西河北不識此疾自聖唐開闢六合無外南極之地襟帶是重爪牙之寄作鎮於彼不習水土往者皆遭近來中國士大夫雖不涉江表亦有居然而患之者良由今代天下風氣混同物類齊等所致之耳然此病發初得先從脚起因即脛腫時人號為脚氣深師云脚弱者即其義也深師述支法存所用永平山敷施連范祖耀董素等諸脚弱方凡八十餘條皆是精要然學者尋覽頗覺繁重正是方集耳卒欲救急莫測指南今取其所經用灼然有効者以備倉卒餘者不復具述

論何以得之於脚

問曰風毒中人隨處皆得作病何偏著於脚也荅曰夫人有五藏心肺二藏經絡所起在手十指肝腎與脾三藏經絡所起在足十指夫風毒之氣皆起於地地之寒暑風濕皆作蒸氣足當履之所以風毒之氣先著於脚也四肢腹背頭項也微時不覺痼滯乃知經云次傳間傳是也

論得已便令人覺不

凡脚氣病皆由感風毒所致得此病多不令人即覺會因他病一度乃始發動或奄然大悶經三兩日不起方乃覺之諸小庸醫皆不識此疾漫作餘病治之莫不盡斃故此病多不令人識也始起甚微食飲嬉戲氣力如故惟卒起脚屈弱不能動有此為異耳黃帝云緩風濕痺是也

論風毒相貌

夫有脚未覺異而頭項脾胛已有所苦有諸處皆悉未知而心腹五內已有所困又風毒之中人也或見食嘔吐憎聞食臭或有腹痛下痢或大小便秘澁不通或胷中衝悸不欲見

光明或精神惛憒或喜迷忘語言錯亂或壯熱頭痛或身體酷冷疼煩或覺轉筋或腫不腫或腫或脾腿頑痺或時緩縱不隨或復百節攣急或小腹不仁此皆脚氣狀貌也亦云風毒脚氣之候也其候難知當須細意察之不爾必失其機要一朝病成難可以理婦人亦爾又有婦人產後春夏取涼多中此毒宜深愼之其熱悶掣疼驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也又但覺臍下冷痛幅幅然不快兼小便淋瀝不同生平即是脚氣之候頑弱名緩風疼痛爲濕痺

論得之所由

凡四時之中皆不得久立久坐濕冷之地亦不得因酒醉汗出脫衣靴韈當風取涼皆成脚氣若暑月久坐久立濕地者則熱濕之氣蒸入經絡病發必熱四肢酸疼煩悶若寒月久坐久立濕冷地者則冷濕之氣上入經絡病發則四體酷冷轉筋若當風取涼得之者病發則皮肉頑痺諸處瞤動漸漸向頭凡常之日忽然暴熱又皆不能忍得者當於此時必不得頓取於寒以快意也卒有暴寒復不得受之皆生病也世有勤功力學之士一心注意於事久坐行立於濕地不時轉冷風來擊入於經絡不覺成病也故風毒中人或先中手足十指因汗毛孔開腠理疎通風如擊箭或先中足心或先中足跌或先中膝已下腨脛表裏者若欲使人不成病者初覺即灸所覺處三十壯因此即愈不復發也黃帝云當風取涼酔已入房能成此疾

論冷熱不同

問曰何故得者有冷有熱答曰足有三陰三陽寒中三陽所患必冷暑中三陰所患必熱故有表裏冷熱冷熱不同熱者治以冷藥冷者療以熱藥意消息之脾受陽毒即熱頑腎

受陰濕即寒痺

論因腳氣續生諸病

雖患腳氣不妨乳石動發皆須服壓石藥療之夫因患腳氣續生諸病者則以諸藥對之或小便不利則以猪苓茯苓及諸利小便藥治之大便極堅者則以五柔麻人丸等治之遍體腫滿成水病者則取治水方中諸治水之藥治之餘皆倣此更無拘忌 五柔麻人丸出第十五卷中

論須療緩急

凡小覺病候有異即須大怖畏決意急治之傷緩氣上入腹或腫或不腫胷脅逆滿氣上肩息急者死不旋踵寬者數日必死不可不急治也但看心下急氣喘不停或白汗數出或乍寒乍熱其脉促短而數嘔吐不止者皆死

凡腳氣之疾皆由氣實而死終無一人以服藥致虛而殂故腳氣之人皆不得大補亦不可大瀉終不得畏虛故預止湯不服也如此者皆死不治也

論看病問疾人

世間大有病人親朋故舊交遊來問疾其人曾不經一事未讀一方自騁了了詐作明能談說異端或言是虛或道是實或云是風或云是蠱或道是水或云是痰紛紜謬說種種不同破壞病人心意不知孰是遷延未定時不待人欻然致禍各自散走是故大須好人及好名醫識病深淺探賾方書博覽古今是事明解者看病不爾大誤人事竊悲其如此者衆故一一顯析具述病之由狀令來世病者讀之以自防備也但有一狀相應則須依方急治勿取外人言議自貽憂悔但詳方意人死不難莫信他言以自悞也余嘗爲人撰門冬煎

此方治脚氣大有驗病者須用之方在第十二卷中

論脉候法

凡脚氣雖復診候多塗而三部之脉要須不違四時者為吉其逆四時者勿治餘如脉經所說此中不復具載其人本黑瘦者易治肥大肉厚赤白者難愈黑人耐風濕赤白不耐風瘦人肉硬肥人肉軟肉軟則受疾至深難已也

論腫不腫

凡人久患脚氣不自知別於後因有他病發動治之得差後直患嘔吐而復脚弱余為診之乃告為脚氣病者曰某平生不患脚腫何因名為脚氣不肯服湯餘醫以為石發狐疑之間不過一旬而死故脚氣不得一向以腫為候亦有腫者有不腫者其以小腹頑痺不仁者脚多不腫小腹頑後不過三五日即令人嘔吐者名脚氣入心如此者死在旦夕凡患脚氣到心難治以其腎水剋心火故也

論須慎不慎

凡脚氣之病極須慎房室羊肉牛肉魚蒜酢菜菘菜蔓菁瓠子酒麪酥油乳糜猪雞鵝鴨有方用鯉魚頭此等並切禁不得犯之并忌大怒惟得食粳粱粟米醬豉葱韭薤椒薑橘皮又不得食諸生果子酸酢之食犯者皆不可差又大宜生牛乳生栗子矣

論善能治者幾日可差

凡脚氣病枉死者衆略而言之有三種一覺之傷晚二驕很恣傲三狐疑不決此之三種正當枉死之色故世間誠無良醫雖有良醫而病人有生靈堪受入者更復鮮少故雖有驥驎而不遇伯樂雖有尼父而人莫之師其為枉橫亦猶此也今有病者有受入性依法使余治之不過十日可得永差矣

若無受入性者亦不須爲治縱令治之恐無差日也非但脚氣諸病皆然良藥善言觸目可致不可使人必服法爲信者施不爲疑者說

論灸法

凡脚氣初得脚弱使速灸之并服竹瀝湯灸訖可服八風散無不差者惟急速治之若人但灸而不能服散服散而不灸如此者半差半死雖得差者或至一二年復更發動覺得便依此法速灸之及服散者治十十愈此病輕者登時雖不即惡治之不當根源不除久久期於殺人不可不精以爲意

初灸風市　次灸伏兔　次灸犢鼻

次灸膝兩眼　次灸三里　次灸上廉

次灸下廉　次灸絶骨

凡灸八處第一風市穴可令病人起正身平立垂兩臂直下舒十指掩著兩髀便點當手中央指頭髀大筋上是灸之百壯多亦任人輕者不可減百壯重者乃至一處五六百壯勿令頓灸三報之佳第二伏兔穴令病人累夫端坐以病人手夫掩橫膝上夫下傍與曲膝頭齊上傍側夫際當中央是灸百壯亦可五十壯第三犢鼻穴在膝頭蓋骨上際外骨邊平處以手按之得節解則是一云在膝頭下近外三骨箕踵中動脚以手按之得屈解是灸之五十壯可至百壯第四膝眼穴在膝頭骨下兩傍陷者宛宛中是第五三里穴在膝頭骨節下三寸人長短大小當以病人手夫度取灸之百壯第六上廉穴在三里下一夫亦附脛骨外是灸之百壯第七下廉穴在上廉下一夫一云附脛骨外是灸之百壯第八絶骨穴在脚外踝上一夫亦云四寸是凡此諸穴灸不必一頓灸盡壯數可日日報灸之

三日之中灸令盡壯數為佳凡病一脚則灸一脚病兩脚則灸兩脚凡脚弱病皆多兩脚又一方云如覺脚惡便灸三里及絶骨各一處兩脚惡者合四處灸之多多益佳一說灸絶骨雖輕不可減百壯不差速以次灸之多少隨病輕重大要宜要人有患此脚弱不即治及入腹腹腫大上氣於是乃須大法灸隨諸輸及諸管開節腹背盡灸之并服八風散往往得差者諸管輸節解法並在第二十九卷中覺病入腹若病人不堪痛不能盡作大灸但灸肩心腹諸穴及兩脚諸穴亦有得好差者凡量一夫之法覆手併舒四指對度四指上中節上橫過為一夫夫有兩種有三指為一夫者此脚弱灸以四指為一夫也亦依支法存舊法梁丘犢鼻三里上廉下廉解谿太衝陽陵泉絶骨崑崙陰陵泉三陰交足太陰伏溜然谷涌泉承山東骨等凡一十八穴舊法多灸百會風府五臟六腑輸募頃來灸者悉覺引氣向上所以不取其法氣不上者可用之其要病已成恐不救者悉須灸之其足十指去指奇一分兩足凡八穴曹氏名曰八衝極下氣有効其足十指端名曰氣端日灸三壯並大神要其八衝可日灸七壯氣下即止病者非深相委悉愼勿為人灸之愼之凡灸八衝艾炷須小作之

論服湯藥色目

風毒之氣入人體中脉有異耳若脉浮大而緩宜服續命湯兩劑應差若風盛宜作越婢湯加白朮四兩若脉浮大緊轉駛宜作竹瀝湯若病人脉微而弱宜服風引湯此人脉多是因虛而得之若大虛短氣力乏可其間作補湯隨病冷熱而用之若未愈更服竹瀝湯若病人脉浮大而緊駛此是三品之中最惡脉也或沈細而駛者

此脉正與浮大而緊者同是惡脉浮大者病在外沈細者病在内治亦不異當消息以意耳其形尚可而手脚未容至弱數日之中氣上即便命終如此之脉往往有人得之無一存者急服竹瀝湯日服一劑切要湯勢常令相及勿令半日之中空無湯也此湯竹汁多服之若不極熱輒停在胷心更爲人患每服當使極熱若服竹瀝湯得下者必佳也若已服三劑竹瀝湯病及脉勢未折而苦脹滿可以大鼈甲湯下之湯勢盡而不得下可以丸藥助湯令下下後更服竹瀝湯趣令脉勢折氣息料理便停服三十二物八風散佳又初得病便摩野葛膏日再頓痺脚弱都愈乃止若服竹瀝湯脉勢折如未病時氣力轉勝脚故未能行體力充足然後漸微行步病重者差後半年始能扶人行耳既覺脉及體内差但當勤服八風散勿以脚未能行輕加餘治餘治未必全得要更生諸

惡失此諸治也猥人邊亦勿行野葛膏有人聞竹瀝湯云恐傷腰脚者即勿與治宜知此法此人無受入性不可與醫故也不爲疑者說此之謂也竹瀝湯有三首輕者服前方重者次第服後者此風毒乃相注易病人宜將空缺服小金牙散以少許塗鼻孔耳門病困人及新亡人喜易人强健人宜將服之亦以塗耳鼻乃可臨近亡人及視疾者絳囊帶一方寸匕男左女右臂上此散毒服宜從少爲始金牙散方在第十二卷中病人惟宜飲赤小豆飲冬服側子金牙酒續命湯治風毒病初得似時行毒病而脉浮緩終不變駛此不治或數日而死或十日而死或得便不識人或發黃或發斑或目赤或下部穿爛者此最急得之即先服續命湯一劑須服葛根湯麻黃湯下之若故不折更與續命湯兩三劑必差此病大急常令湯勢相接不可使半日闕湯即便殺人

湯液第二 方三十八首

第一竹瀝湯治雨脚痺弱或轉筋皮肉不仁腹脹起如腫按之不陷心中惡不欲食或患冷方

竹瀝 五升　甘草　秦艽　葛根　黃芩
細辛　桂心　乾薑 各一兩
茯苓 二兩　附子 二枚　杏人 五十枚
麻黃　防己
防風　升麻 各一兩半

右十五味㕮咀以水七升合竹瀝煮取三升分三服取汗

第二大竹瀝湯治卒中風口噤不能言四肢緩縱偏痺攣急風經五藏恍惚憑怒無常手足不隨方

竹瀝 一斗四升　獨活　芎藭
茯苓 三兩　防風　薤
甘草　白朮　葛根
細辛　黃芩
防己　人參　石膏
麻黃 各一兩　生薑

茯苓 三兩　烏頭 一枚

右十九味㕮咀以竹瀝煮取四升分六服先未汗者取汗一狀相當即服

第三竹瀝湯治風毒入人五內短氣心下煩熱手足煩疼四肢不舉皮肉不仁口噤不能語方

竹瀝 一斗九升　防風
當歸　黃芩 作芎藭
芎藭 作芎藭　細辛
升麻 作通草　麻黃
蜀椒 一兩　葛根 五兩
白朮 各二兩　附子 二枚
桂心　甘草
茯苓　秦艽 各三兩
人參

右十八味㕮咀以竹瀝煮取四升分五服初得病即須摩膏日再痺定止 黃蜀椒生薑無麻治惡風毒氣腳弱無力 痺四肢不仁失音不能言毒氣衝

心有人病者但一病相當即服第一服此麻黃湯次服第二
第三第四方

麻黃一兩　大棗二十枚　茯苓三兩　杏人三十枚　防風
白朮　當歸　芎藭　麻　芍藥
黃芩　桂心
右十四味㕮咀以水九升清酒二升合煮取二升半分四
服日三夜一覆令小汗粉之莫令見風

第二服獨活湯方

獨活四兩　乾地黃三兩　生薑一斤　葛根
桂心　甘草　芍藥　麻黃各二兩
右八味㕮咀以水八升清酒二升合煎取二升半分四服
日三夜一脚弱特忌食瓠子生菜犯之一世治不愈
第三服兼補厚朴湯并治諸氣欬嗽逆氣嘔吐方

厚朴　芎藭　桂心　乾地黃
芍藥　當歸　人參各二兩　黃耆
甘草各三兩　吳茱萸二升　半夏七兩　生薑一斤
右十二味㕮咀以水二斗煮猪蹄一具取汁一斗二升去
上肥內清酒三升合煮取三升分四服相去如人行二十
里久

第四服風引獨活湯兼補方

獨活四兩　茯苓　甘草各三兩　升麻一兩半　人參
芍藥　當歸　黃耆
桂心　防風
乾薑　附子各二兩　大豆二升
右十三味㕮咀以水九升清酒三升合煮取三升半分四
服相去如人行二十里久更進服
治脚痺防風湯并主毒氣上衝心胸嘔逆宿癖積氣疝氣一

病相當即服之方

防風　麻黃　芎藭　人參　芍藥
當歸　茯苓　半夏　甘草各二兩　鼈甲
生薑　桂心各二兩　杏人一兩半　赤小豆一升　貝子五枚
烏梅五枚　大棗二十枚　吳茱萸五合　犀角　羚羊角各二兩
橘皮一兩　薤白十四枚

右二十二味㕮咀以水一斗煮取三升分三服一日令盡
一方用水一斗二升間食糜一方云半夏三兩隨時用

治脚痺獨活湯方

獨活四兩　當歸　防風　茯苓　芍藥
黃耆　葛根　人參　甘草各二兩　大豆一升
附子一枚　乾薑三兩

右十二味㕮咀以水一斗清酒二升合煮取三升分三服

越婢湯治風痺脚弱方

麻黃六兩　石膏半升　白朮四兩　大附子一枚
生薑三兩　甘草二兩　大棗十五枚

右七味㕮咀以水七升先煮麻黃再沸掠去沫入諸藥煮取三升分三服覆取汗胡洽方只五味若惡風者加附子一枚多淡水者加白朮四兩

治脚弱神驗方

防己　蜀椒　細辛　桂心　麻黃
石膏各一兩　獨活　防風　薏苓　茵芋
葛根　芎藭　芍藥　甘草各一兩　生薑
茯苓各三兩　烏頭二枚

右十七味㕮咀以竹瀝一斗煮取四升分六服令一日一夜服盡其間可常作赤小豆飲有人脚弱先服常用竹瀝湯四劑未覺損作此方後覺得力又云脉沈細駐風在

內者作此湯也

風引湯治兩脚疼痺腫或不仁拘急屈不得行方

麻黃　石膏　獨活　茯苓二兩各三　吳茱萸
秦艽　細辛　桂心　人參　防風
芎藭　防己　甘草二兩各一　乾薑半兩一　白朮三兩

杏人六十枚一　附子一兩

右十七味㕮咀以水一斗六升煮取三升分三服取汗佳

大鼈甲湯治脚弱風毒攣痺氣上及傷寒惡風溫毒山水瘴氣熱毒四肢痺弱方

鼈甲二兩　防風　麻黃　白朮　石膏
知母　升麻　茯苓　橘皮　芎藭
杏人　人參　半夏　當歸　芍藥
菱蕤　甘草　麥門冬二兩各一　羚羊角六銖

大黃一兩半　犀角　青木香　雄黃各半兩　大棗十枚一
貝齒　烏頭各七枚　生薑三兩　薤白十枚四　麝香三銖
赤小豆三合　吳茱萸五合

右三十一味㕮咀以水二斗煮取四升分六服相去十里久得下止一方用大黃半兩畏下可止用六銖一方用羚羊角半兩毒盛可用十八銖胡洽有山茱萸半升為三十二味千金翼無知母升麻橘皮當歸菱蕤人參

小鼈甲湯治身體虛脹如微腫胷心痞滿有氣壯熱小腹厚重兩脚弱方

鼈甲　黃芩　升麻　麻黃　羚羊角
桂心　杏人兩各三　前胡四兩　烏梅二十枚　薤白三十枚

右十味㕮咀以水一斗煮取二升七合分三服此常用若體强壯欲須利者加大黃二兩

風緩湯治脚弱舉體痺不仁熱毒氣入藏匊中滿塞不通食
即嘔吐方

獨活　麻黄　犀角各三兩一方用羚羊角半夏一升
大棗　烏梅二十枚　桂心　鼈甲　升麻
橘皮　枳實　甘草　吳茱萸　大黄各一兩
生薑　石膏各六兩　貝齒七枚

右十七味㕮咀以水一斗四升煮取四升分五服日三夜
二不瘥至三劑必瘥

治脚氣初發從足起至膝脛骨腫疼者方

取蜱麻葉切擣蒸薄裹之日二三易即消蜱麻子似
牛蜱蟲故名蜱麻也若冬月無蜱麻取蒴藋根擣碎
和酒糟三分根一分合蒸熟及熱封裹腫上如前法
日二即消亦治不仁頑痺此方非湯不當見此然以前後三方俱出蘇長史更不分出

宋本校據元版補刊

若腫已入胜至小腹脹小便澁少者方

取烏特牛尿一升一服日二取消乃止千金翼云瘥瘦人二分尿一分許乳合煮乳浮結脯乃服之

若腫已消仍有此候者急服此湯方蘇長史神驗

麻黄　人參　茯苓　防己
射干　半夏　犀角　羚羊角
前胡　枳實各二兩　杏人　升麻各一兩　生薑五兩
青木香　橘皮
獨活三兩　吳茱萸一升

右十七味㕮咀以水一斗一升煮取四升分五服相去二
十里久中間進少粥以助胃氣此湯兩日服一劑取病氣
退乃止以意消息之若熱盛喘煩者加石膏六兩生麥門
冬一升去吳茱萸若心下堅加鼈甲一兩
夫脚氣之疾先起嶺南稍來江東得之無漸或微覺痺痺或

兩脛腫滿或行起澁弱或上入腹不仁或時冷熱小便秘澁
喘息氣衝喉氣急欲死食嘔不下氣上逆者皆其候也若覺
此證先與犀角旋復花湯方

犀角　旋復花各二兩　橘皮　茯苓
生薑各三兩　大棗十枚　香豉一升　紫蘇葉一握
右八味㕮咀以水八升煮取二升七合分三服相去十里
久服之以氣下小便利為度崔氏名小犀角湯如其不下服後大犀角湯

大犀角湯療脚氣毒衝心變成水身體遍腫悶絕欲死者方

犀角　旋復花　白朮
防已　黃芩各二兩　香豉一升　生薑
橘皮　茯苓各二兩　前胡　桂心
紫蘇葉一握　大棗十枚　桑白皮各四兩
右十四味㕮咀以水九升煮取二升七合分三服相去十

里久取下氣為度若得氣下小便利脚腫即消能食若即
湯竟不下氣急不定仍服後犀角麻黃湯崔氏代白朮無防已
名黃芩桑白皮旋復花湯

犀角麻黃湯方

犀角　麻黃　防風　獨活崔氏茯苓用
防已　芎藭　白朮　當歸
羚羊角崔氏用附子用　甘草　杏人崔氏細辛用　桂心各三兩
右十五味㕮咀以水二斗煮麻黃去沫取汁八升下藥煎
取三升分三服相去十里久服訖覆取汗若不差五日後
更一劑取汗同前

葉黃湯治脚氣入腹困悶欲死腹脹方嬾方

吳葉黃六外　木瓜二枚

右二味以水一汁三升煮取三升分三服相去如人行十里久進一服或吐或汗或利或大熱悶即差此起死人方

小風引湯治中風腰脚疼痛弱者方 胡洽名大風引湯

獨活 茯苓 乾薑 胡洽作桂心 人參 各三兩 防風 當歸 胡洽作桂心 甘草 附子 枚一 大豆 升二

右十味㕮咀以水九升煮取三升分四服服別相去如人行十里久 胡洽云南方治脚弱与此別用升麻一兩半夏芍藥各二兩合十三味本只有十味減當歸石斛名小風引湯繁方無石斛以療肉極寒肌肉變舌痿名曰惡風腰痛脚弱

風濕相搏骨節煩疼四肢拘急不可屈伸近之則痛白汗出而短氣小便不利惡風不欲去衣或頭面手足時時浮腫四物附子湯主之方

附子 枚二 桂心 四兩 白朮 三兩 甘草 二兩

右四味㕮咀以水陸升煮取三升分三服微汗愈大汗煩者一服伍合體腫者加防已四兩悸氣小便不利加茯苓三兩既有附子令加生薑三兩

治脚弱風毒實及嶺南瘴氣面腫乍寒乍熱似瘧狀脚腫氣上心悶欬嗽攣緩頑痺方

麻人 升麻 芒消 甘草

右玖味㕮咀以水陸升煮取貳升半內芒消又煎令沸分參服微利壹貳行解毒熱有腫滓薄之凡覺氣滿輒服壹劑佳

麻黃 射干 昌蒲 大黃 各半兩 豉 三合

道人深師增損腎瀝湯治風虛勞損挾毒脚弱疼痺或不隨下焦虛冷肾中微有客熱心虛驚悸不得眠食少失氣味日夜數過心煩迫不得臥小便不利又時復下湘東王至江州

王在嶺南病悉如此極困篤余作此湯令服即得力病似此者服無不差隨宜增損之方

黃耆　甘草　芍藥　麥門冬　人參
肉蓯蓉　乾地黃　赤石脂　地骨皮　茯神
當歸　遠志　礜石　枳實　防風
龍骨 各一兩　桂心　苁蓉 各二兩　生薑 四兩　五味子 三合
半夏 一升　白羊腎 一具　大棗 三十枚

右二十三味㕮咀以水二斗煮羊腎取汁一斗二升內諸藥煮取四升分為五服不利下者除龍骨赤石脂小便澀以赤茯苓代茯神加白朮三兩多熱加黃芩一兩遺溺加桑螵蛸二十枚（胡洽方無黃耆蓯蓉赤石脂地骨皮礜石枳實防風龍骨半夏有黃芩為拾伍味）

石膏湯治脚氣風毒熱氣上衝頭面面赤矜急鼻塞去來來時令人昏憒心胷恍惚悒或苦驚悸身體戰掉手足緩縱或酸

痺頭目眩重眼及鼻辛熱氣出口中或患味甜諸惡不可名狀者方

石膏　龍膽　升麻　芍藥
貝齒　甘草　鼈甲　黃芩
羚羊角 酪一　橘皮　當歸 酪二
人參　半夏 升一　桂心 兩八　細辛
乾薑 兩五　甘草　附子 酪二兩　蜀椒 二合

右十一味㕮咀以水八升煮取三升分為三服

半夏湯治脚氣上入腹腹急上衝胷氣急欲絕方

半夏 升一　桂心 兩八　細辛
乾薑 兩五　甘草　附子 酪二兩　蜀椒 酪一兩　甘草　秦艽

右八味㕮咀以水一斗煮取三升分為三服初稍稍進恐氣衝上格塞不得下小小服通人氣耳

烏頭湯治風冷脚痺疼痛攣弱不可屈伸方

烏頭　細辛　蜀椒 酪一兩　甘草　秦艽

附子　桂心　芍藥各三兩　乾薑　茯苓
防風　當歸各三兩　獨活四兩　大棗二十枚
右十四味㕮咀以水一斗二升煮取四升分五服若熱毒
多服益佳

治毒湯治脚弱風熱上入心腹煩悶欬絶方
半夏四兩　黃耆　甘草　當歸
人參　厚朴　獨活　橘皮各一兩
枳實　麻黃　乾地黃　芍藥各二兩
桂心三兩　生薑四兩　貝子七枚　大棗二十枚
右十六味㕮咀以水一斗二升煮取三升六合分四服日
三夜一

治脚弱體痺不仁毒氣上入藏胥中滿塞不通食輒吐失味
舊說脚弱上氣風緩湯主之方
獨活　甘草　石膏各三兩　犀角半兩　麻黃
防風　當歸　升麻　橘皮　吳茱萸
桂心　半夏　鱉甲各二兩　羚羊角半兩　枳實一兩
生薑六兩　大棗二十枚　貝齒七枚　烏頭二兩一作烏梅十枚
右十九味㕮咀以水一斗四升煮取四升一服一升若有
少虛熱者加乾地黃三兩
紫蘇子湯治脚弱上氣昔宋侑東王在南州患脚氣困篤服
此湯大得力方
紫蘇子一升前胡　厚朴　甘草　當歸各一兩
半夏一升　橘皮三兩　大棗二十枚　生薑一斤　桂心四兩
右十味㕮咀以水一斗三升煮取二升半分爲五服日三
夜二

附子湯治濕痺緩風身體疼痛如欲折肉如錐刺刀割方

附子 三枚 芍藥 桂心 甘草
茯苓 人參 各三兩 白朮 四兩

右七味㕮咀以水八升煮取三升分三服
防風湯治肢體虛風微痊發熱肢節不隨恍惚狂言來去無時不自覺悟南方支法存所用多得力温和不損人爲勝於續命越婢風引等湯羅廣州一門南州士人常用亦治脚弱甚良方

防風 麻黄 秦艽 獨活 各二兩
當歸 遠志 甘草 防巳
人參 黄芩 升麻 芍藥 各一兩
石膏 半兩 麝香 六銖 生薑 半夏 各二兩

一方用白朮一兩

右十六味㕮咀以水一斗三升煮取四升一服一升初服厚覆取微汗亦當兩三行下其間相去如人行十里久更服有熱加大黄二兩先有冷心痛疾者倍當歸加桂心三兩不用大黄

甘草湯治肺弱舉身洪腫胃反食穀吐逆胷中氣結不安而寒熱下痢不止小便難服此湯即益亦服女麴散利小便腫消服大散摩膏有驗方

甘草 人參 各一兩 半夏 一升 桂心 蜀椒 各三兩
小麥 八合 大棗 二十枚 生薑 八兩 吳茱萸 二升

右九味㕮咀以水一斗三升煮小麥取一斗去小麥內諸藥煮取三升分爲六服 女麴散出第十卷第八篇中

若寒熱日再三發可服此恒山甘草湯方

恒山 三兩 甘草 一兩半

右二味㕮咀以水四升煮取一升半分三服相去五里一服

丹參牛膝煮散治脚痺弱氣滿身微腫方

丹參　牛膝　桑白皮　杏人　升麻
猪苓　茯苓各四兩　犀角　黃芩　橘皮
防巳　白前　澤瀉　桂心　秦艽各三兩
生薑　李根白皮各二兩　大麻人升

右十八味擣篩以水一升半內散方寸匕煮取七合輕綃濾去滓頓服日再夏月熱不得服丸散此煮散頃年常用大驗

治腰胯不隨兩脚攣腫方

蜀椒四升以水四斗煮取二斗半甕盛下著火煖之懸板爲橋去湯二寸許以脚蹋板柱脚坐以綿絮密塞勿令泄氣若疲即出入被以粉摩之一食久更入甕常令甕下火不絕勿使湯冷如此消息不過七日得伸展并腫亦消

諸散第三　方七首

例曰大法春秋宜服散

八風散治風虛面青黑土色不見日月光脚氣痺弱進經面青黑主腎不見日月光主肝補腎治肝方

菊花三兩　石斛　天雄一兩半　人參　附子
甘草各一兩六銖　鍾乳　署預　續斷　黃耆
澤瀉　麥門冬　遠志　細辛　龍膽
秦艽　石韋　菟絲子　牛膝　昌蒲
杜仲　茯苓　乾地黃　栢子人　蛇牀子
防風　白朮　乾薑　蓴蘚　山茱萸各一兩
五味子　烏頭各半兩　菰蓉二兩

右三十三味治下篩酒服方寸匕日三服不知加至二匕

大八風散治諸緩風濕痺脚弱方

巴戟天　薰者　桂心　細辛　天雄
萆薢　蒺藜　山茱萸　牡荆子　署預　菊花
白朮　礬石（礬石作）燒　秦艽　黃芩　石斛
蜀椒（酪半）　附子　厚朴　龍膽　人參
茯苓　牛膝（千金翼乾薑）　五味子（八十銖）　烏喙　昌蒲
桔梗（三十銖）　芎藭　藥（各六銖）　遠志（各一兩）

右三十二味治下篩酒服半寸匕日三不知稍增令微覺
（胡洽無桔梗）

內補石斛秦艽散治風虛脚弱手足拘攣疼痺不能行脚趺腫上膝小腹堅如繩約氣息常如憂恚不能食飲者皆由五勞七傷腎氣不足受風濕故也悉主之方

石斛　附子　天雄　桂心　獨活
天門冬（各一兩）　秦艽　烏頭　人參　乾薑
當歸　防風　桔梗　細辛　蜀椒　白芷
白朮（酪半）

右二十三味治下篩酒服方寸匕日再服不知稍增至二匕虛人三建皆炮實人亦可生用風氣者本因腎虛既得病後毒氣外滿則炎洩其氣內滿則藥馳之當其救急理必如此至於風消退四體虛弱餘毒未除不可便止宜服此散推陳致新極為良妙此既人情可解無可疑焉

秦艽散治風無久新卒得不知人四肢不仁一身盡痛偏枯不隨不能屈伸洗洗寒熱頭目眩倒或口面喎僻方

秦艽　乾薑　桔梗　附子（各一兩）　天雄

當歸　天門冬　人參　白朮　蜀椒各三十銖
烏頭　細辛各十八銖　甘草　白芷　山茱萸
麻黃　前胡　防風　五味子各半兩

右十九味治下篩酒服方寸匕日三若老人少服之胡洽無

門冬前胡有莽草桂心防己
蘼白斂黃耆爲二十三味

單服松脂治一切風及大風腳弱風痺方薰陸法亦同

松脂三十斤以楸皮袋盛鑿竈鐺底布竹木置袋於
上以石三五顆壓之下水於鎗中令滿煮之膏浮出
得盡以後量更三十沸接置於冷水中易袋洗鎗更
煮如此九遍藥成擣篩爲散以麤羅下之用酒服一
方寸匕日二初和藥以冷酒藥入腹後飲熱酒行藥
以知爲度如覺熱即減不減令人大小便秘澀若澀
冥食慈羔美仍自不通宜服生地黃汁令取泄痢除忌

大麻子以外無所禁若欲斷米加茯苓與松脂等分
蜜中爲丸但食淡麪餺飥日兩度食一食一小椀勿
多食也作餺飥法硬和麪熟捺煮五十餘沸漉出冷水
淘更置湯中煮十餘沸然後漉出食之服松脂三十
日後即覺有驗兩腳如似水流下是效如恐秘澀和
一斤松脂茯苓與棗栗許大酥即不澀服經一百日

後腳氣當愈仙經曰服松脂一年增壽十年

增壽二年及服之主風濕疼腰腳不隨方

淮南八公石斛萬病散主風

防風　菊花　細辛　蜀椒
茯苓　薤蓉　人參　乾地黃
乾薑　雲母　蒐絲子
附子　石斛　杜仲　遠志
天雄　菟絲　牛膝　蛇牀子
桂心

白朮　署預　巴戟　昌蒲　續斷
山茱萸各一兩　五味子一升兩
右二十七味治下篩酒服方寸匕日再
茱萸散主冷風腳跛偏枯半身不隨晝夜呻吟醫所不治方
吳茱萸　乾薑　白斂　牡荊千金翼作牡桂
附子　天雄　署預　防風各半兩　狗脊　乾漆
署預　秦艽
右十一味治下篩先食服方寸匕日三藥入肌膚中搖搖
然三日知一月差
酒醴第四例方十六首一首
例曰凡合酒皆薄切藥以絹袋盛藥內酒中密封頭春夏四
五日秋冬七八日皆以味足為度去滓服酒盡後其滓擣篩
服方寸匕日三大法冬宜服酒至立春宜停

石斛酒治風虛氣滿腳疼痺攣弱不能行方
石斛　丹參　五加皮各五兩　側子　秦艽
杜仲　山茱萸　牛膝各四兩　桂心　乾薑
羌活　苁蓉　橘皮　黃耆　白前
蜀椒　茵芊　當歸各三兩　薏苡人升　防風二兩
鍾乳八兩盛繫大藥袋內別絹袋擣碎
右二十一味㕮咀以清酒四斗漬三日初服三合日再稍
稍加以知為度
烏麻酒方
烏麻五升微熬擣碎以酒一斗漬一宿隨所能飲之
盡更作甚良
治風虛勞損腳疼冷痺羸瘦攣弱不能行鍾乳酒方
鍾乳六兩　丹參　石斛　杜仲

天門冬 酪五 牛膝 防風 黃耆
苣蔞 當歸 酪各四兩 附子 桂心
秦艽 乾薑 酪各三兩 山茱萸 薏苡人 各一升
右十六味㕮咀以清酒三斗漬之三日初服三合日再稍
稍加之以知為度
枸杞昌蒲酒治緩急風四肢不隨行步不正口急及四體不
得屈伸方
枸杞根一百斤 昌蒲五斤
右二味細剉以水四石煮取一石六斗去滓釀二斛米酒
熟稍稍飲之
虎骨酒治骨髓疼痛風經五藏方
虎骨一具炭火炙令黃色槌刮取淨擣碎得數升清
酒六升浸五宿隨性多少稍飲之易云虎嘯風生龍

吟雲起此亦有情與無情相感治風之效故亦無疑
蓼酒治胃管冷不能飲食耳目不聰明四肢有氣冬卧脚冷
服此酒拾日後目既精明體又充壯方
捌月叁日取蓼暴燥把之如伍升大陸拾把水陸石
煮取壹石去滓以釀酒如常法隨多少飲之已用訖
效甚速
小萯著酒大治風虛痰癖四肢偏枯兩脚弱手不能上頭或
小腹縮痛脇下攣急心下有伏水脇下有積飲夜喜夢悲愁
不樂恍惚善忘此由風虛五藏受邪所致或久坐腰痛耳聾羣
起眼眩頭重或舉體流腫痰痺飲食惡冷淫淫惡寒胷中痰
滿心下寒疝藥皆主之及婦人產後餘疾風虛積冷不除者方
萯著 附子 蜀椒 防風 牛膝
細辛 桂心 獨活 白朮 苣蔞

甘草 各叁兩 秦艽
烏頭 臘驗用 預參兩 署 大黃
葛根 乾薑
山茱萸 各貳兩 當歸貳兩半

右拾捌味㕮咀少壯人無所熬練虛老人微熬之以絹袋中盛清酒貳斗漬之春夏伍日秋冬柒日可先食服壹合不知可至肆伍合日參服此藥攻痺甚佳亦不令人吐悶小熱宜冷飲食也大虛加菱蓉貳兩下痢加女萎兩多忘加石斛昌蒲紫石各貳兩心下多水者加茯苓人參各貳兩署預參兩酒盡可更以酒貳斗重漬滓服之不爾可暴滓擣下酒服方寸匕不知稍增之服壹劑得力令人耐寒冷補虛治諸風冷神良

黃耆酒治風虛腳疼瘺弱氣悶不自收攝兼補方

黃耆 烏頭
蜀椒 芎藭
附子 乾薑 秦艽
獨活 防風
白朮 牛膝
菱蕤 細辛
昌蒲 各三兩半 山茱萸
天雄 石斛

右二十五味㕮咀無所熬練清酒三斗漬之先食服一合不知可至五合日三以攻痺為佳大虛加菱蓉下痢加女萎多忘加昌蒲各三兩胡洽有澤瀉三兩茯苓二兩人參茵芋酸疼手不得上頭足不得屈伸不能躡履行欲傾跛皮中動滕菱蓉甘草葛根當歸昌蒲鍾乳大黃為二十二味名大黃耆蒲鍾乳酒

淫淫如有蟲啄軫蹇搔之生瘡甚著狂走有此諸病藥皆主之方

甘草 各三兩 葛根 當歸
昌蒲 各二兩半 山茱萸
桂心 鍾乳 柏子人
天雄 石斛
防風 各二兩 大黃 石南 各一兩

右二十五味㕮咀無所熬練清酒三斗漬之先食服一合不知可至五合日三以攻痺為佳大虛加菱蓉下痢加女萎多忘加昌蒲各三兩胡洽有澤瀉三兩茯苓二兩人參茵芋酸疼手不得上頭足不得屈伸不能躡履行欲傾跛皮中動淫淫如有蟲啄軫蹇搔之生瘡甚著狂走有此諸病藥皆主

茵芋 烏頭
石南 防風
蜀椒

女萎　附子　紐辛　獨活　卷柏
桂心　天雄　秦艽　防巳各一兩　鼯鼠二兩
右十五味㕮咀少壯人無所熬練虛老人薄熬之清酒二斗漬之冬七日夏三日春秋五日初服一合不知加至三合寧從少起日再以微痺爲度胡洽無蜀椒獨活柏爲十二味
大金牙酒治瘴癘毒氣中人風冷濕痺口喎面戾半身不遂手足拘攣歷節腫痛甚者小腹不仁名曰肺氣無所不治方
金牙斤　側子　附子　天雄　人參
蒻蓉　茯苓　防風　當歸　菖蒲
署預　細辛　桂心　蓮蘞　菱蘞
白芷　桔梗　黃芩　遠志　牡荊子
芎藭　地骨皮　五加皮　杜仲　厚朴
柏實　白朮各三兩　獨活　牛膝　茵芋　石南

狗脊各二兩　牛膝　丹參各三兩　磁石十兩　薏苡人
麥門冬各一升　生石斛八兩　蒴藋四兩　生地黃切二升
右三十九味㕮咀以酒八斗漬七日溫服一合日四五夜一石藥細研別絹袋盛共藥同漬藥力和善主治極多凡是風虛四體小覺有風疹者皆須將服之無所不治也服者一依方合之不得輒信人大言浪有加減
鍾乳酒治虛損通順血脉極補下氣方
鍾乳五兩　甘菊各二兩　石斛　蒻蓉各五兩
附子
右五味㕮咀以清酒三斗漬服二合日再稍增至一升
秦艽酒治四肢風手臂不收髀脚疼弱或有拘急攣縮屈指偏枯痿躄痛小不仁頑痺者悉主之方
秦艽　牛膝　附子　桂心　五加皮
天門冬各三兩　巴戟天　杜仲　石南

細辛各二兩　獨活五兩　薏苡人兩

右十二味㕮咀以酒二斗漬之得氣味可服三合漸加至五六合日三夜一服

術膏酒治脚弱風虛五勞七傷萬病皆主之方

生白朮淨洗一石五斗擣取汁三斗煎取半

濕荊二十五束束別三尺圍各長二尺五寸徑一寸燒取瀝三斗煎取半

青竹三十束束別三尺圍各長二尺五寸徑頭二寸燒取瀝三斗煎取半

生地黃根五大斗麤擣大者擣取汁三斗煎取半

生五加根三十六斤去滓澄清取汁七斗以銅器中盛大釜內水四石煎之煎諸藥法一準五加例

右件白朮等五種藥搗計得汁九斗五升好糯米一石五斗上小麥麴八斤暴乾末之以藥汁六斗浸麴五日待麴起第一投淨淘米七斗令得三十遍下米置淨席上以生布拭之勿令不淨然後炊之下饋以餘藥汁浸饋調強弱更蒸之待饋上痂生然後下於席上調強弱冷熱如常釀酒法醞之甕中密蓋頭三日後第二投更淘米四斗一如前法投之三日後即加藥如左

桂心　甘草　當歸　麻黃　乾薑　五加皮各一兩　右十二味㕮咀訖第三投以米四斗淨淘如前法還以餘汁澆饋重蒸待上痂生下置席上調冷熱如常釀法和上件藥投之三日外然後嘗甘苦得中訖密封頭二七日乃押取清酒一服四合日再服細細加以知爲度溫酒不得

白芷　細辛　防風　芎藭各六兩　附子五兩　牛膝九兩

過熱愼生冷酢滑猪鯉魚蒜牛肉等
松葉酒主脚弱十二風痺不能行服更生散數劑及衆治不
得力服此一劑便能遠行不過兩劑方
松葉六十斤㕮咀之以水四石煮取四斗九升以釀
五斗米如常法別煮松葉汁以漬米幷饋飯泥釀封
頭七日發澄飲之取醉得此力者甚衆神妙
治脚氣方
好豉三斗蒸一石米下暴乾如是三上以酒五斗漬
七日去滓飲惟醉爲佳酒盡更以二斗半漬之飲如初
側子酒治風濕痺不仁脚弱不能行方
側子　牛膝　山茱萸　蒴藋根
杜仲　石斛四兩　防風　乾薑　蜀椒
細辛　獨活　秦艽　桂心　苓蘑

當歸　白朮
右二十味㕮咀絹袋盛清酒四斗漬六宿初服三合稍加
以知爲度患目昏頭眩者彌精
菌于三兩　五加皮五兩　薏苡人升二
膏第五例一首方八首
例曰凡作膏常以破除日無令喪孝汚穢產婦下賤人雞犬
禽獸見之病在外火灸摩之在內温酒服如棗核許
神明白膏治百病中風惡氣及頭面諸病青盲風目爛眥管
腎耳聾聾鼻塞齲齒齒根挺痛及癰痔瘡癬疥等悉主之方
吳茱萸　蜀椒
前胡各一升崔氏作白前
當歸　細辛各三兩
右十味㕮咀淳苦酒於銅器中淹浸諸藥一宿以成煎猪
膏十斤炭火上煎三沸三上三下白芷色黃爲候病在腹
苓蘑　白朮　白芷
附子三十枚　桂心

內溫酒服如彈九一枚日三目痛取如黍米內兩眥中以
目向風無風可以扇扇之諸瘡痔齲齒耳皁卑百病主之皆
以膏傅病在皮膚灸手摩病上日三肘後九味無桂心
衛侯青膏治百病久風頭眩皁塞清涕淚出霍亂吐逆傷寒
咽痛脊背頭項強偏枯拘攣或緩或急或心腹久寒積聚疼
痛欬逆上氣往來寒熱風漏瘰癧歷節疼腫關節盡痛男子
七傷臚脹腹滿羸瘦不能飲食婦人生產餘疾諸病瘕疝惡
瘡癰腫陰蝕黃疸發背馬鞍牛領瘡腫方

當歸	栝樓根	半夏	汁	桂心			
黃芩	桔梗	厚朴		烏頭			
黃連	寄生	芍藥		細辛		附子	酪四兩
天雄	蔡蘆	皂莢	各一兩半	乾薑		人參	
續斷	戎鹽	各三兩	黃野葛	二分			

生竹筎六升　巴豆二十枚　石南　杏人各一兩
猪脂三斗　苦酒一斗六升

右三十一味咬咀諸藥以苦酒漬一宿以猪脂微火上煎
之三下三上膏成病在內以酒服如半棗在外摩之日三
神明青膏治鼻中干瀼之并摩服方

蜀椒	合五	皂莢		黃芩		石南	
黃連	雄黃		桂心		藜蘆	各三銖	
白朮	芍藥		大黃	各七銖	烏頭		
莽草	續斷	各五銖	澤瀉	七銖	半夏		
當歸	各十二銖	乾地黃	十一銖	萎蕤		細辛	各十銖
人參	五銖	戎鹽	杏子大一枚	附子		桔梗	各二銖
乾薑	六銖						

右二十五味咬咀以苦酒一斗漬之羊髓一斤爲東南三
隅竈內諸藥炊以葦薪作叁聚新好土藥沸即下置土聚

上三沸三下訖藥成以新布絞去滓病在外火灸摩之在
內溫酒服如棗核曰三稍稍益以知為度
大傳白膏治百病傷寒喉咽不利頭項強痛腰脊兩脚疼有
風痺濕腫難屈伸不能行步若風頭眩鼻塞有附息肉生瘡
身體隱軫風搔鼠漏瘰癧諸疽惡瘡馬鞍牛領腫瘡及久寒
結堅在心腹痛胷痺煩滿不得眠飲食欬逆上氣往來寒熱
婦人產後餘疾耳目鼻口諸疾悉主之亦曰太一神膏方

蜀椒一外 附子三兩 升麻切一升 巴豆 苦藭冬卜三錄
杏人五合 狸骨 細辛格一兩半 白芷半兩 甘草二兩
白朮六兩 壹方用當歸三兩

右十二味咬咀苦酒淹漬一宿以豬脂四斤微火煎之先
削附子一枚以繩繫著膏中候色黃膏成去滓傷寒心腹
積聚諸風腫疾頸項腰脊強偏枯不仁皆摩之曰壹癰腫
惡瘡鼠瘻瘻癧灸手摩之耳聾取如大豆灌之目痛灸鄒
縹白瞽如珠當瞳子視無所見取如糝米傳白上令其人
自以手掩之須臾即愈便以水洗視如平復且勿當風三
十日後乃可行鼻中痛取如大豆內鼻中并以摩之齲齒
痛以綿裹如大豆著痛齒上咋之中風面目鼻口喎僻以
摩之若晨夜行辟霜露眉睫落數數以鐵漿洗用膏摩之
曲魚膏治風濕疼痺四肢躄弱偏跛不仁并癰腫惡瘡方

大黃 黃芩 莽草 巴豆 野葛
牡丹 蠷蠋 芫花 蜀椒 皂莢
附子 藜蘆酪一

右十二味咬咀以苦酒漬藥一宿以成煎豬膏三斤微火
煎三沸一下別內白芷一片三上三下白芷色黃藥成去
滓微火灸手摩病上日三

野葛膏治惡風毒腫疼痺不仁癮瘾惡瘡癰疽腫脛脚弱偏枯百病方

野葛　犀角　烏頭　桔梗　蜀椒　乾薑　巴豆豁一　丹參三兩　躑躅花一升　蛇銜　莽草外臺作茵芋　外麻　防風　鼈甲　雄黃

右十五味咬咀以苦酒四升漬之一宿以成煎猪膏五斤微火煎三上三下藥色小黃去滓以摩病上此方不可施之猥人慎之胡洽無丹參躑躅有細辛又蘇恭以白芷防巳吳茱萸附子當歸代巴豆雄黃蛇銜防風鼈甲

蒼梧道士陳元膏主一切風濕骨肉疼痺方

當歸　細辛豁一兩　生地黃三斤　白芷一兩半　芎藭一兩　乾薑十累　烏頭三兩　桂心五寸　天雄三十枚　丹砂二兩　松脂八兩　猪肪十斤

右十二味咬咀以地黃汁漬藥一宿煎猪肪去滓內藥煎十五沸去滓內丹砂末熟攪用火炙手摩病上日千偏差胡洽有人參防風各三兩附子三十枚雄黃二兩爲十五味肘後千金翼有附子二十二銖雄黃二兩半大酢三升爲十五味崔氏千金翼同

裴公八毒膏主卒中風毒腹中絞刺痛飛尸入藏及魘寐不寤尸厥奄忽不知人宿食不消溫酒服如棗核大得下止若毒氣甚咽喉閉塞不能語者折齒內葱葉口中以膏灌葱葉中令下病腫者向火摩腫上若歲中多溫欲省病及行霧露中酒服之內鼻中亦得方

蜀椒　當歸　烏頭　巴豆豁一　雄黃　丹砂各二兩　蓯白斤一　莽草四兩

右八味咬咀苦酒三升漬一宿用猪脂五斤東向竈薪火煎之五上五下候薤白黃色絞去滓研雄黃丹砂如粉

內之攪至凝乃止膏成盛不津器中諸吳蚣蛇蜂等毒著
以膏置瘡上病在外悉傳之摩之以破除日合一方用礬
石一兩吳蚣二枚是名入毒膏肘後不用巴豆
備急千金要方卷第七 葬草名五毒膏

備急千金要方卷第八 諸風

朝奉郎守太常少卿兼秘閣校理判登聞檢院護軍賜緋魚袋臣林億等校正

論雜風狀第一 痺痙附

諸風第二 風热風寒附

賊風第三 歷節附

偏風第四 猥退緩弱 謇脚痛附 謇急

風痱第五

風懿第六 口噤 口喎 失音 尸厥附

角弓反張第七

風痙第八

論雜風狀第一

岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痱三曰風懿四曰
風痙夫諸急卒病多是風初得輕微人所不悟宜速與續命

湯依輸穴灸之夫風者百病之長岐伯所言四者說其最重也

偏枯者半身不隨肌肉偏不用而痛言不變智不亂病在分腠之間温卧取汗益其不足損其有餘乃可復也甲乙經云温卧取汗則巨瘕之

風痱者身無痛四肢不收智亂不甚言微可知則可治甚即不能言不可治

風懿者奄忽不知人咽中塞窒窒然巢源作噫噫然有聲舌彊不能言病在藏腑先入陰後入陽治之先補於陰後寫於陽發其汗赤吐沫者不可治身轉輾者生汗不出身直者七日死巢源作眼下及鼻人中左右白者可治一黑一

風痺濕痺周痺筋痺脉痺肌痺皮痺骨痺胞痺各有證候形如風狀得脉別也脉微澀其證身體不仁

凡風多從背五藏輸入諸藏受病肺病最急肺主氣息又冒諸藏故也肺中風者其人偃卧而胷滿短氣冒悶汗出者肺風之證也視目下鼻上兩邊下行至口色白者尚可治急灸肺輸百壯服續命湯小兒減之若色黃者此為肺已傷化為血矣不可復治其人當妄言掇空指地或自拈衣尋縫如此數日死若為急風邪所中便迷漠恍惚狂言妄語或少氣惙惙不能復言若不求師即治宿昔而死即覺便灸肺輸及膈輸肝輸數十壯急服續命湯可救也若涎唾出不收者既灸當並與湯也諸陽受風亦恍惚妄語與肺病相似然著緩可經久而死

肝中風者其人但踞坐不得低頭繞兩目連額上色微有青者肝風之證也若脣色青面黃尚可治急灸肝輸百壯服續命湯若大青黑面一黃一白者此為肝已傷不可復治數日

而死

心中風者其人但得偃卧不得傾側悶乱冒絶汗出者心風之證也若脣正赤尚可治急灸心輸百壯服續命湯若脣或青或白或黄或黒者此爲心已壞爲水面目亦時悚動者不可復治五六日死一云旬日死

脾中風者其人但踞坐而腹滿身通黄吐鹹汁出者尚可治急灸脾輸百壯服續命湯若目下青手足青者不可復治

腎中風者其人踞坐而腰痛視脊左右未有黄色如餅粢大者尚可治急灸腎輸百壯服續命湯若齒黄赤鬚髮直面土色者不可復治

大腸中風者卧而腸鳴不止灸大腸輸百壯可服續命湯

賊風邪氣所中則傷於陽陽外先受之客於皮膚傳入於孫脉孫脉滿則輸於絡脉絡脉滿則輸於大經中成病歸於

陸腑則爲熱不時卧止爲啼哭其脉堅大爲實實有外堅充滿不可按之按之則痛也經絡諸脉傍支去者皆爲孫脉也

凡風之傷人或爲寒中或爲熱中或爲厲風或爲偏枯或爲賊風故以春甲乙傷於風者爲肝風以夏丙丁傷於風者爲心風以四季戊己傷於風者爲脾風以秋庚辛傷於風者爲肺風以冬壬癸傷於風者爲腎風風中五藏六腑之輸亦爲藏腑之風各入其門戸所中則爲偏風風氣循風府而上則爲腦風風入頭則爲目風眼寒飲酒中風則爲酒風入房汗出中風則爲内風新沐中風則爲首風久風入房中風則爲腸風外在腠理則爲泄風故曰風者百病之長也至其變化乃爲他病無常方焉是知風者善行而數變在人肌膚中内不得泄外不得散因人動靜乃變其性有風遇寒則食不下遇熱則肌肉消而寒熱有風遇陽盛則不得汗遇陰盛則汗

自出肥人有風肌肉厚則難泄喜爲熱中目黃瘦人有風肌
肉薄則常外汗身中寒自淚出有風遇於虛腠理開則外出
淒淒然如寒狀覺身中有水淋狀時如竹管吹處此是其證
也有風遇於實腠理閉則內伏令人熱悶是其證也
新食音取風爲胃風其狀惡風頸多汗膈下塞不通食飲不
下脹滿形瘦腹大失衣則憤滿食寒即洞泄新熱食音入水
自漬及浴者令人大腹爲水病
因醉取風爲漏風其狀惡風多汗少氣口乾善渴近衣則身
如火燒臨食則汗流如雨骨節懈墮不欲自勞
新沐浴音取風爲首風其狀惡風而汗多頭痛新房室音取
風爲內風其狀惡風汗流沾衣勞風之爲病法在肺下使人
僵上而目脫唾出若涕惡風而振寒候之三日及五日中不
精明者是也索捌曰微有青黃膿涕如彈丸大從口鼻出爲
善若不出則傷肺
風邪客於肌膚虛癢成風胗瘙癢風邪入深寒熱相搏則肉
枯邪客半身入深真氣去則偏枯邪客關機中即攣筋中亦
然邪淫於藏夢藏大形小淫於腑夢藏小形大邪隨目系入
腦則目轉眩邪中精則散視見兩物風邪入藏寒氣客於中
不能發則瘖痓喉痺苦緩不時服藥針灸風逐脉流入藏使
人卒然瘖緩縱噤痙致死也風入陽經則狂入陰經則癲陽
邪入陰病則靜陰邪入陽病則怒
若因熱食汗浴通腠理得開其風自出則覺肉中如針刺步
行運力欲汗亦如此也
凡覺肌肉中如刺皆由腠理閉邪氣在肌中閉因欲出也宜
解肌湯則安
夫眼瞤動口脣動偏喎皆風入脉故須急服小續命湯將入

風散摩神明白膏丹參亦依經針灸之

諸痺由風寒濕三氣併客於分肉之間迫切而爲沫得寒則聚聚則排分肉肉裂則痛痛則神歸之則熱熱則痛解痛解則厥厥則他痺發發則如是此內不在藏而外未發於皮膚居分肉之間真氣不能周故爲痺也其風最多者不仁則腫爲行痺走無常處其寒多者則爲痛痺其濕多者則爲著痺冷汗濡但隨血脉上下不能左右去者則爲周痺也痺在肌中更發更止左以應左右以應右者爲偏痺也

夫痺其陽氣少而陰氣多者故令身寒從中出其陽氣多而陰氣少者則痺且熱也

諸痺風勝者則易愈在皮間亦易愈在筋骨則難痊也久痺入深令榮衛澀經絡時疎則不知痛

風痺病不可已者足如履冰時如入湯腹中股脛淫濼煩心頭痛傷脾腎時嘔眩時時汗出傷心目眩傷肝悲恐短氣不樂傷肺不出三年死一云三日

太陽中風重感於寒濕則變痓也痓者口噤不開背彊而直如發癎之狀搖頭馬鳴腰反折須臾十發氣息如絶汗出如雨時有脫易得之者新產婦人及金瘡血脉虛竭小兒臍風大人涼濕得痓風者皆死温病熱盛入腎小兒癎熱盛皆痓痓痙厥癲皆相似故久厥成癲審察之其重者患耳中築築痛皆風入腎經中也不治流入腎則喜卒然躰痓直如死皆宜服小續命湯兩三劑也若耳痛腫生汁作癰節者乃死宫也

惟風宜防耳針耳前動脉及風府神良

諸風第二十方二十九首灸法四十首

小續命湯治卒中風欲死身躰緩急口目不正舌強不能語奄奄忽忽神情悶乱諸風服之皆驗不令人虛方

麻黃　防已（崔氏不用防已）　人參　黃芩
桂心　甘草
杏人（酪一）　附子（枚一）　芍藥　芎藭
右十二味㕮咀以水一斗二升先煮麻黃三沸去沫內諸藥煮取三升分三服甚良不差更合三四劑必佳取汗隨人風輕重虛實也有人脚弱服此方至六七劑得差有風疹家天陰節變輒合服之可以防瘖一本去恍惚者加茯苓（古今錄驗有白朮不用杏人止十味延年無杏人救急無防風）

大續命湯治肝厲風卒然瘖啞依古法用大小續命二湯通治五藏偏枯賊風方

麻黃（兩）　石膏（四兩）　桂心　乾薑
黃芩（酪一）　杏人（七十枚）　芍藥（酪二）　當歸

荊瀝（一升）

右九味㕮咀以水一斗先煮麻黃兩沸掠去沫下諸藥煮取四升去滓又下荊瀝煮數沸分四服能言未差後服小續命湯舊無荊瀝今增之效如神（千金翼有甘草）

小續命湯治中風冒昧不知痛處拘急不得轉側四肢緩急遺失便利此與大續命湯同偏宜產後失血并老小人方

麻黃　桂心
生薑（五兩）　人參
白朮　附子
芍藥　黃芩（各一兩）
右十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升分三服（古今錄驗無桂）

治風歷年歲或歌或哭大笑言語無所不及宜服小續命湯方（名續命湯胡洽千金翼同）

麻黃三兩　人參　桂心　白朮各二兩

芍藥　甘草　防已　黃芩

苓薑　當歸各一兩

右十味㕮咀以水一斗二升煮取三升分三服日三覆取汗

大續命湯治大風經藏奄忽不能言四肢垂曳皮肉痛癢不自知方

獨活　麻黃各三兩　苓薑　防風

生薑　桂心各一兩　當歸　葛根

茯苓　附子　細辛　甘草各一兩

右十二味㕮咀以水一斗二升煮取四升分五服老小半之若初得病便自大汗者減麻黃不汗者依方上氣者加吳茱萸二兩厚朴一兩乾嘔者倍加附子一兩啘者加橘皮一兩若胸中吸吸少氣者加大棗十二枚心下驚悸者加茯苓一兩若熱者可除生薑加葛根初得風未須加減便且作三劑停四五日以後更候視病虛實平論之行湯行針依穴灸之

西州續命湯治中風瘖一作入藏身躰不知自收口不能言語冒昧不識人拘急背痛不得轉側方

麻黃六兩　石膏四兩　桂心二兩　甘草

苓薑　乾薑　當歸各一兩

杏人三十枚

右九味㕮咀以水一斗二升煮麻黃再沸掠去上沫後下諸藥煮取四升初服一升猶能自覺者勿熟眠也可卧厚覆小汗出已漸減衣勿復大覆可眠矣前服不汗者後服一升汗後稍稍五合一服安穩乃服勿頓服也汗出則

愈勿復服飲食如常無禁忌勿見風并治上氣欬逆若面目大腫但得卧服之大善凡服此湯不下者人口噓其背湯則下過矣病人先患冷汗者不可服此湯若虛羸人但當稍與五合爲佳有輒行此湯與產婦及羸人喜有死者皆爲頓服三升傷多且湯濁不清故也但清澄而稍稍服微取汗者皆無害也胡洽方古今録

大續命湯治與前大續命湯同宜產婦及老小等方

麻黃 芎藭 各三兩 乾薑 石膏 各三兩 人參 當歸 桂心 甘草 各一兩 杏人四十枚

右九味㕮咀以水一斗煮取三升分三服外臺名續命湯汪同云是張仲景方本欠兩味

續命煮散主風無輕重皆治之方

麻黃 芎藭 獨活 防己 甘草 杏人 各三兩 桂心 附子 茯苓 升麻 細辛 人參 防風 各二兩 石膏 五兩 白朮 四兩

右十五味麤篩下以五方寸匕內小絹袋子中以水四升和生薑三兩煮取二升半分三服日日勿絕慎風冷大良

吾嘗中風言語蹇澁四肢疼曳處此方日服四服十日十夜服之不絕得愈

大續命散主八風十二痺偏枯不仁手足拘急疼痛不得伸屈頭眩不能自舉起止顛倒或卧苦驚如墮狀盜汗臨事不起婦人帶下無子風入五藏甚者恐怖見鬼來收録或與鬼神交通悲愁哭泣忽忽欲走方

麻黃 烏頭 防風 桂心

甘草　蜀椒
人參　杏人　石膏
芍藥　當歸　茵茹 千金翼作芎藭
黃芩　乾薑 各一兩　茯苓

右十五味治下篩以酒服方寸匕日再稍加以知爲度

排風湯治男子婦人風虛濕冷邪氣入藏狂言妄語精神錯亂其肝風發則面青心悶亂吐逆嘔沫脅滿頭眩重耳不聞人聲偏枯筋急曲拳而卧也其心風發則面赤翕然而熱悲傷嗔怒目張呼喚也其脾風發則面黃身體不仁不能行步飲食失味夢寐倒錯與亡人相隨也其肺風發則面白欬逆唾膿血上氣奄然而極也其腎風發則面黑手足不遂腰痛難以俛仰痺冷骨疼也諸有此候令人心驚志意不定恍惚多忘服此湯安心定志聰耳明目通臟腑諸風疾悉主之方

白鮮皮　白朮　芍藥　桂心　苓蔹　當歸　杏人　防風　麻黃　茯苓 各三兩　獨活　生薑 四兩

右十三味㕮咀以水一斗煮取三升每服一升覆取微汗可服三劑

大八風湯主毒風頑痺攣曳手脚不遂身體偏枯或毒弱不任或風入五藏恍恍惚惚多語喜忘有時恐怖或肢節疼痛頭眩煩悶或腰脊彊直不得俛仰腹滿不食欬嗽或始遇病時卒倒悶絶即不能語使失瘖半身不隨不仁沉重皆由體虛恃少不避風冷所致治之方

當歸 一兩半　升麻　五味子 各二兩半　烏頭
黃芩　芍藥　遠志　獨活
防風　苓蔹　麻黃　秦艽

石斛　人參　茯苓　石膏
黃耆　紫菀　各一兩　杏人　四十枚　甘草
桂心　乾薑　各三兩　大豆　一升　去皮二合

右二十三味㕮咀以水一斗三升酒二升合煮取四升彊人分四服羸人分六服

八風散主八風十二痺猥退半身不遂歷節疼痛肌肉枯燥皮膚瞤動或筋緩急痛不在一處卒起目眩失心恍惚妄言倒錯身上瘡瘰面上疱起或黃汗出更相染漬或燥或濕顏色乍赤乍白或青或黑角弓反張乍寒乍熱方

麻黃　白朮　烙　桔梗　桂心　甘草
藥荊　天雄　白芷　防風
芍藥　石膏　天門冬　各十兩　羌活　二斤
山茱萸　食茱萸　蠷蠷　各五兩　茵芋　十四兩

黃芩　一斤五兩　附子　三十枚　大黃　半斤　細辛
乾薑　桂心　各五兩　雄黃　朱砂
丹參　各六兩

右二十五味治下篩酒服方寸匕日一三十日後日再服五十日知百日差一年平復長服不已佳先食服

小八風散治迷惑如醉狂言妄語囈悸恐怖恍惚見鬼喜怒悲憂煩滿顛倒邑邑短氣不得語語則失忘或心痛徹背不嗜飲食惡風不得去帷帳時復疼熱惡聞人聲不知痛癢身悉振搖汗出猥退頭重浮腫爪之不知痛頸項強直口面喎戾四肢不隨不仁偏枯攣掣不得屈伸悉主之方

天雄　當歸　人參　各五分　附子
防風　天門冬　蜀椒　獨活　各四分
烏頭　秦艽　細辛
白朮

乾薑各三分　麻黃　山茱萸　五味子

桔梗　白芷　柴胡　莽草各二分

右二十味治下篩合相得酒服半方寸匕漸至全匕日三服以身中覺如針刺者則藥行也

烏頭湯主入風五尸惡氣遊走胷心流出四肢來往不住短氣欲死方

烏頭　芍藥　乾薑　桂心

細辛　乾地黃　當歸　吳茱萸各一兩

甘草二兩

右九味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

治諸風蔓耳散方

當以五月五日午時乾地刈取蔓耳葉洗暴燥擣下篩酒若漿服一方寸匕日三作散若吐逆可蜜和爲丸服十九準前計一方寸匕數也風輕易治者日再服若身體有風處皆作粟肌出或如麻豆粒此爲風毒出也可以鈹針刺潰去之皆黃汁出盡乃止五月五日多取陰乾之著大甕中稍取用之此草辟惡若欲看病省疾者便服之令人無所畏若時氣不和舉家服之若病胃脹滿心悶發熱即服之并殺三蟲腸痔能進食一周年服之佳七月七九月九皆可採用

治心風虛熱發即恍惚煩悶半身不仁攣急方

荊瀝五升　竹瀝五升　枸杞根白皮升

香豉三合　生麥門冬一升　人參　茯苓

梔子人　黃芩　芍藥　桂心

細辛　杏人　白鮮皮　防風各二兩

生薑　石膏　甘草各三兩

右十八味㕮咀以水二斗和瀝煮取三升分四服相去如
人行六七里九五劑間三日服一劑 一本用防已三兩
治虛熱恍惚驚邪恐懼方
荊瀝三升 竹瀝二升 牛黃絲八 人參
生麥門冬各三兩 香豉三合 升麻 鐵精各壹兩
龍齒 天門冬 茯苓 梔子各二兩
右十二味㕮咀以水二斗煮取三升去滓下牛黃鐵精更
煎五六沸取一升七合分溫三服相去十里久
地黃煎主熱風心煩悶及胞胃間熱不下食冷補方
生地黃汁二升 生薑汁壹升 枸杞根汁三升
荊瀝 竹瀝各五升 酥三升
人參 天門冬各八兩 茯苓六兩
梔子人 大黃酪四兩

右十一味擣篩五物爲散先煎地黃等汁成煎次內散藥
攪調一服一匕日三漸加至三匕覺利減之
又方
羚羊角五兩 乾藍 黃芩 芍藥
鼠尾草各三兩 生葛 梔子人各六兩 豉一升綿裹
治積熱風方
地骨皮 菱蕤 丹參 黃耆
澤瀉 麥門冬酪三合 清蜜一合 生地黃汁一升
薑汁一合
右九味㕮咀以水六升煮取二升去滓內地黃汁更煎火
煮減一升內蜜及薑汁又煮一沸藥成溫服三合日再
大防風湯治中風發熱無汗肢節煩腹急痛大小便不利方

防風　當歸　麻黃　白朮
甘草各八銖　黃芩一兩　茯苓三十銖　乾地黃一兩
附子　山茱萸一兩

右十味㕮咀以水九升煮取二升半一服七合大小便不利內大黃入參各十八銖大棗三十枚生薑三兩煮取三升分三服深師加天門冬一兩

治中風發熱大戟洗湯方

大戟　苦參

右二味等分末之以藥半升白酢漿一斗煮三沸適寒溫洗之從上下寒乃止立差小兒三指撮漿水四升煮洗之舉身動轉側行步跛躃不能收攝又暴口噤失音言語不正四肢背脊筋急腫痛流走不常勞冷積聚少氣乍寒乍熱三焦不調脾胃不磨飲澼結實逆害飲食酢咽嘔吐食不生肌醫所不能治者悉主之方

金牙碎如米粒用小絹袋盛　細辛

附子

葫蕾根各四兩

右十味㕮咀盛以絹袋以酒四斗瓷瑿中漬密閉頭勿令洩氣春夏三四宿秋冬六七宿酒成去滓日服一合此酒無毒及可小醉常令酒氣相接不盡一劑病無不愈又令人肥健酒盡自可加諸藥各三兩惟蜀椒五兩用酒如前勿加金牙也冷加乾薑四兩服此酒勝灸剌起三十年諸風癱曳神驗肘後備急用外麻乾薑各四兩人參二兩石斛牛膝各五兩不用地黃爲十三味一方用外麻乾薑各四兩人參二兩石不用續斷四兩爲十一味千金翼用茵芋四兩黃耆三兩胡洽

地膚子無子用蛇牀子

乾地黃

防風

莽草一斤胡洽獨活

蜀椒四合　羌活

常山太守馬灌酒除風氣通血脉益精華定六腑明耳目悅澤顏色頭白更黑齒落更生服藥二十日力勢倍六十日志

氣充盈八十日能夜書百日致神明房中強壯如三十時力能引弩年八十人服之亦當有子病在腰膝藥悉主之方

天雄二兩生用　蜀椒　桂心　白斂　附子五枚　蹲躅一兩　商陸根各一兩　烏頭一枚大者　茵芋　乾薑各一兩

右十味㕮咀以絹袋盛酒三斗漬春夏五日秋冬七日去滓初服半合稍加至兩三合擣滓爲散酒服方寸匕日三以知爲度夏日恐酒酸以油單覆之下井中近水令不酸也千金翼無商陸桂心爲八味

蠻夷酒主女風枯攣三十年著牀及諸惡風眉毛墮落方

獨活　丹參　附子　麥門冬各二兩去心　烏頭　人參　蠻石　乾地黃各一兩　白芷　烏喙　狼毒　蜀椒　防風　細辛　寒水石　牛膝　麻黃　當歸　柴胡　芎藭　桔梗　牡蠣　金牙　署預　白朮　石南　款冬各十八銖　杜仲　山茱萸　牡荊子各八銖　蕪荑各一兩　石斛　桂心各六銖　甘遂二兩　赤石脂二兩半　蘇子一升　右四十五味㕮咀以酒二斗漬夏三日春秋六日冬九日一服半合蠶室中合藥勿令女人六畜見之三日清齋乃千金翼無芎藭去加大棗四十枚更佳

合千金翼無茵芋蜀椒十枚更佳

蠻夷酒治八風十二痺偏枯不隨宿食久寒虛冷五勞七傷

及婦人產後餘疾月水不調皆主之方

礬石　桂心　白朮　狼毒
半夏　石南　白石脂　龍膽
續斷　芫花　白石英　代赭
蘭茹　石韋　玄參　天雄
防風　山茱萸　桔梗　藜蘆
卷柏　細辛　寒水石　烏頭
蠷螋　蜀椒　白芷　秦艽
蹶蹶　石膏二兩半　附子　遠志各二兩
菖蒲各一兩　礬石　蜈蚣二枚

右三十四味㕮咀以酒二斗漬四日服一合日再十日後去滓暴乾擣篩爲散酒服方寸匕日再以知爲度胡洽四十二味

無桂心辛烏頭蹶蹶蜀椒而有芫消恒山黃芩黃連大黃麻黃地黃前胡甘草菟絲子芍藥紫菀各一兩杏人二十枚同擣篩絹袋盛用水三斗麪三斤黍米三斗作飯依如酒法以藥袋釀中春秋七日冬十日夏三日酒成服半雞子殼日三并暴藥末之酒服方寸匕以身體暖爲度

魯望酒治風眩心亂耳聾目暗淚出鼻不聞香臭口爛生瘡風齒瘡瘻喉下生瘡頭熱厥逆上氣胸脅肩胛痛手不上頭不自帶衣腰脊不能俛仰腳酸不仁難以久立八風十二痺五緩六急半身不遂四肢偏枯筋攣不可屈伸賊風咽喉閉塞喘嗽不利或如錐刀所刺行人皮膚中無有常處久久不治入人五藏或在心下或在膏肓遊走四肢偏有冷處如風所吹又寒積聚風濕五勞七傷虛損百病悉主之方

茵芋　烏頭　蹶蹶各三十銖　天雄
防巳　石斛各二十四銖　細辛　柏子人
牛膝　甘草　通草　桂心
山茱萸　秦艽　黃芩胡洽作黃耆　茵蔯

附子　矍麥　杜仲　澤瀉
王不留行　胡洽作天門冬　石南　防風
千金翼作王孫
遠志　乾地黃各十八銖

右三十五味㕮咀以酒四升漬之十日一服一合加至四五合以知爲度　千金翼名此爲魯公酒有乾薑胡洽無防已以絡囊盛藥用水二斗法麴二斗同漬三四宿出藥囊炊二斗黍米內汁釀之酒熟飲如雞子大日二稍稍飲之以知爲度

魯公釀酒主風偏枯半死行步不自勝衣攣躄是五緩六急婦人帶下產乳中風五勞能行步不自勝得風若鬼所擊四肢不遂不

十傷方

乾薑　蹲躅　桂心　甘草
芎藭　續斷　細辛　附子
秦艽　天雄　石膏　紫菀各五兩
葛根　石龍芮　石斛　通草

石南　栢子人　防風　巴戟天
山茱萸各四兩　牛膝　天門冬各八兩　烏頭二十枚

右二十五味㕮咀以水五升漬三宿法麴二斤合漬秫米二斗合釀三宿去滓炊糯米一斗醞三宿藥成先食服半合日再待米極消盡乃去滓暴乾末服

獨活酒治八風十二痺方

獨活　石南各四兩　防風三兩　附子
烏頭　天雄　茵芋各二兩

右七味㕮咀以酒二斗漬七日服半合日三以知爲度

偏鵲云治卒中惡風心悶煩毒欲死急灸足大指下橫文隨年壯立愈

若筋急不能行者內踝筋急灸內踝上四十壯外踝筋急灸

外踝上三十壯立愈
若眼戴精上插灸目兩眥後二七壯
若不能語灸第三椎上百壯
若不識人灸季肋頭七壯
若眼反口噤腹中切痛灸陰囊下第一橫理十四壯灸卒死
亦良
治久風卒風緩急諸風卒發動不自覺知或心腹脹滿或半
身不隨或口噤不言涎唾自出目閉耳聾或舉身冷直或煩
悶恍惚喜怒無常或脣青口白戴眼角弓反張始覺發動即
灸神庭一處七壯穴在當鼻直上髮際是
次灸曲差二處各七壯穴在神庭兩傍各一寸半是
次灸上關二處各七壯一名客主人穴在耳前起骨上廉陷
者中是
次灸下關貳處各柒壯穴在耳前下廉動脉陷者中是
次灸頰車貳穴各柒壯穴在曲頰陷者中是
次灸廉泉壹處柒壯穴在當頭直下骨後陷者中是
次灸凶會壹處柒壯穴在神庭上貳寸是
次灸百會壹處柒壯穴在當頂上正中央是
次灸本神貳處各柒壯穴在耳正直上入髮際貳分是 叉作四分
次灸天柱貳處各柒壯穴在項後兩大筋外入髮際陷者中是
次灸陶道壹處柒壯穴在大椎節下間是
次灸風門貳處各柒壯穴在第貳椎下兩傍各壹寸半是
次灸心輸貳處各柒壯穴在第伍椎下兩傍各壹寸半是
次灸肝輸貳處各柒壯穴在第玖椎下兩傍各壹寸半是
次灸腎輸貳處各柒壯穴在第拾肆椎下兩傍各壹寸半是
次灸膀胱輸貳處各柒壯穴在第拾玖椎下兩傍各壹寸半是

次灸曲池貳處各柒壯穴在兩肘外曲頭陷者中屈肘取之是
次灸肩髃貳處各柒壯穴在兩肩頭正中兩骨間陷者中是
次灸支溝貳處各柒壯穴在手腕後臂外叁寸兩骨間是
次灸合谷貳處各柒壯穴在手大指虎口兩骨間陷者中是
次灸間使貳處各柒壯穴在掌後叁寸兩筋間是
次灸陽陵泉貳處各柒壯穴在膝下外尖骨前陷者中是
次灸陽輔貳處各柒壯穴在外踝上絕骨端陷者中是
次灸崑崙貳處各柒壯穴在外踝後跟骨上陷者中是
治風灸上星貳百壯前頂貳百肆拾壯百會貳百壯腦戶叁百壯
風府叁百壯
治大風灸百會柒百壯
治百種風灸腦後項大椎平處兩廂量貳寸叁分須取病人指
寸量兩廂各灸百壯得差
治風耳鳴從耳後量八分半裏許有孔灸一切風得差狂者
亦差兩耳門前後各灸一百壯
治卒病惡風欲死不能語及肉痺不知人灸第五椎名曰藏輸
百五十壯三百壯便愈
心輸穴在第五節一云第七節對心橫三間
寸主心風腹脹滿食不消化吐血酸削四肢羸露不欲食飲
鼻衄目眴眩眩不明肩頭脇下痛小腹急灸二三百壯
大腸輸在十六椎兩邊相去一寸半治風腹中雷鳴腸澼泄
利食不消化小腹絞痛腰脊疼彊或大小便難不能飲食灸
百壯三日一報
掖門在掖下攢毛中一寸名太陽陰一名掖間灸五十壯主風
絕骨在外踝上三寸灸百壯治風身重心煩足脛疼

治肝虛寒卒然瘖啞不聲踞坐不得面目青黑四肢緩弱遺失便利厲風所損桂枝酒主之方

桂枝　芎藭　獨活　牛膝
署預　甘草各三兩　附子二兩　防風
茯苓　天雄　茵芋　杜仲
白朮　蒴藋根各四兩　乾薑五兩　大棗四十枚
躑躅一升　猪椒葉根皮各一升

右十八味㕮咀以酒四斗漬七日服四合曰二加至五六合肝風占候其台不能言當灸鼻下人中次灸大椎次灸肝輸第九椎下是五十壯餘處隨年壯眼暗人灸之得明二三百壯良

心氣虛悸恍惚大定心湯主之方在第十四卷中

治心虛寒風半身不遂骨節離解緩弱不收便利無度口面喎邪乾薑附子湯方

乾薑　附子各八兩　桂心
麻黃各四兩　芎藭三兩

右五味㕮咀以水九升煮取三升分三服三日後服一劑

治心寒或笑或呻口歌側子酒主之方在第七卷中

芎藭湯主卒中風四肢不仁善笑不息方

芎藭一兩半　黃芩
秦艽　麻黃
乾薑　甘草各一兩
右十味㕮咀以水九升煮取三升分三服

治心虛寒陰氣傷寒損心驚制悸語聲寬急混濁口喎冒昧好自笑厲風傷心荊瀝湯主之方

白朮　芎藭各四兩
荊瀝三升　麻黃

防風　桂心
遠志　人參
毋薑切一外取汁　防已
右十五味咬咀以水一斗五升煎麻黃兩沸去沫次下諸藥煮取三升去滓下荊瀝薑汁煎取四升分四服日三夜一治心虛寒氣性反常心手不隨語聲冒昧其所疾源厲風損心具如前方所說無窮白朮釀酒補心志定氣方

白朮切　地骨皮
右四味以水三石五斗去滓澄清取汁釀米一石用麴如常法酒熟多少隨能飲之常取半醉勿令至吐凡心風寒炙心輸各五十壯第五節兩邊各一寸半是治脾虛寒厲風所傷舉體消瘦語音沈澀如破鼓之聲舌強不轉而好咽唾口噤唇黑四肢不舉身重大小便利無度依

升麻　茯苓
羌活　當歸
甘草　炙二兩
毋薑切一外取汁　防已
右十五味咬咀以水一斗五升煎麻黃兩沸去沫次下諸藥煮取三升去滓下荊瀝薑汁煎取四升分四服日三夜一治心虛寒氣性反常心手不隨語聲冒昧其所疾源厲風損心具如前方所說無窮白朮釀酒補心志定氣方

白朮切　地骨皮
右四味以水三石五斗去滓澄清取汁釀米一石用麴如常法酒熟多少隨能飲之常取半醉勿令至吐凡心風寒炙心輸各五十壯第五節兩邊各一寸半是治脾虛寒厲風所傷舉體消瘦語音沈澀如破鼓之聲舌強不轉而好咽唾口噤唇黑四肢不舉身重大小便利無度依

源麻黃湯主之方在第七卷中　方本闕
治脾寒言聲憂懼舌本卷縮嗢喜無度悵悶恍惚脹滿溫中下氣半夏湯方

半夏　生薑各一外
桂心　橘皮
白朮四兩　甘草二兩
右十二味咬咀以水一斗二升煮取三升去滓下大麻脂更上火一沸入乃三服

治脾虛寒身重不舉言音沈鼓厲風傷痛便利無度補脾安胃調氣止痛當歸丸方

當歸八兩　天雄六兩
黃耆　地骨皮各七兩　苦蘘
桂心　防風
乾薑　酸棗人各八兩
附子　白朮各五兩

甘草　厚朴
吳茱萸五合　秦椒葉四兩
右十八味末之蜜丸如梧子酒服三十丸至四十丸日再服
脾風占候聲不出或上下手當灸手十指頭次灸人中次灸
大椎次灸兩耳門前脉去耳門上下行一寸是次灸兩大指
節上下各七壯
治脾風灸脾輸俠脊兩邊各五十壯凡人脾輸無定所隨四
季月應病即灸藏輸是脾穴此法甚妙脾風者摠呼爲風
治肺虛寒厲風所中噓吸戰掉聲嘶塞而散下氣息短憊四
肢痺弱面色青黯遺失便利冷汗出依源麻黃續命湯方
麻黃六兩　大棗五十枚　杏人十　白朮
石膏各四兩　桂心
茯苓各三兩　當歸
人參
乾薑
甘草一兩
苦參

右十二味㕮咀以水一斗二升煮麻黃去沫次下諸藥煎
取三升去滓分三服舊方無朮茯苓今方無黃芩轉以依
經逐病增損
治肺寒虛傷言音嘶下拖氣用力戰掉緩弱虛瘠厲風入肺
八風防風散方
防風　獨活
乾薑　黃耆
麻黃　石膏
秦艽　桂心
當歸　防巳
甘草十銖　貫衆二枚
右二十四味治下篩每服方寸匕酒調進至兩匕日再服
治肺虛寒羸瘦緩弱戰掉虛吸肩滿肺痿溫中生薑湯方

秦艽各四兩　秦椒四兩
大棗三十枚
乾薑
甘草各一兩
苦參
附子各四十銖　天雄
五味子　山茱萸各三十六銖
署預　細辛
人參　杜仲各三十銖
紫菀各二十四銖

生薑一斤　桂心四兩
橘皮四兩　甘草
麻黃各三兩

右五味㕮咀以水一斗煮取三升半分三服先煎麻黃兩沸去沫然後入諸藥合煮

治肺寒灸肺輸百壯

治腎寒虛爲厲風所傷語音蹇吃不轉偏枯胅脇偏跛蹇緩弱不能動口喎言音混濁便利佈人耳偏龍耳蹇要脊相引腎瀝湯依源增損隨病用藥方

羊腎一具　磁石五兩
芍藥各四兩　芎藭
人參　防風
黃耆各三兩　地骨皮二升切
生薑八兩　玄參
桂心　茯苓
甘草　五味子

右十五味㕮咀以水一斗五升煮羊腎取七升下諸藥取三升去滓分三服可服三劑

治耳聾口歌等茵芊酒主之方在第七卷中

治腎虛呻吟喜恚怒反常心性陽氣弱腰脊彊急髓冷乾地黃丸方

乾地黃一兩半　茯苓
杜仲　牛膝
桂心　續斷
松脂　遠志
署預　甘草各二兩
天雄　鍾乳各二兩
蒐蕙　栢子人各四十二銖
山茱萸　天門冬各一兩半
乾薑各三十銖　昌蒲

右十八味末之蜜丸梧子大酒服三十九日二服加至四十丸

治腎寒灸腎輸百壯

大嶽蜜湯主賊風腹中絞痛并飛尸遁注發作無時發即搶

心脹滿脅下如錐刀刺并主少陰傷寒方

梔子十枚　甘草　乾地黃　細辛

右十一味㕮咀以水八升煮取三升去滓内脂令烊温分三服相去如人行十里頃若痛甚者加羊脂三兩當歸芍藥人參各一兩心腹脹滿堅急者加大黃三兩胡洽不用梔子羊脂

小巖蜜湯主惡風角弓反張飛尸入腹絞痛悶絶往來有時筋急少陰傷寒口噤不利方

茯苓桂心巖蜜湯

大黃二兩　雄黃　當歸　乾地黃　芍藥　甘草　青羊脂各一兩　吳茱萸二兩　乾薑　桂心　細辛各四兩

右十一味㕮咀以水一斗煮取六升分六服重者加藥用水三升煮取九升分十服

排風湯主諸毒風邪氣所中口噤悶絶不識人及身體疼煩面目暴腫手足腫者方

犀角　羚羊角　貝子　升麻各一兩

右四味治下篩爲麤散以水二升半内四方寸匕煮取一升去滓服五合殺藥者以意增之若腫和雞子傳上日三老小以意加減之神良亦可多合用之

烏頭湯主寒疝腹中絞痛賊風入腹攻五藏拘急不得轉側叫呼發作有時使人陰縮手足厥逆方

烏頭十五枚要略用五枚　芍藥四兩　甘草二兩　大棗十枚　老薑一斤　桂心六兩

右六味㕮咀以水七升煮五物取三升去滓別取烏頭去

皮四破蜜二升微火煎令減五六合內湯中煮兩小沸去
滓服一合日三閒食彊人三合以如醉狀爲知不知增之
治賊風所中腹內攣急方
麻黃四兩　甘草一尺　石膏雞子大　鬼箭羽雞子大
右四味㕮咀以東流水二升煮取一升頓服之
論曰夫歷節風著人久不治者令人骨節蹉跌變成癩病不
可不知古今已來無問貴賤往往苦之此是風之毒害者也
治之雖有湯藥而竝不及松膏松節酒若羈旅家貧不可急
辦者宜服諸湯猶勝不治但於痛處灸三七壯佳
防風湯治身體四肢節解如墮脫腫按之皮陷頭眩短氣溫
溫悶亂欲吐者方
防風　梟
知母酪四兩　生薑
半夏酪五兩　芍藥
杏人　甘草
芍藥酪三兩　桂心四兩
右十味㕮咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一古今錄驗
肪附子二枚炙去皮為八味
羌活湯治中風身躰疼痛四肢緩弱不遂及產後中風方
羌活　桂心
麻黃　乾地黃酪三兩　芍藥
右八味㕮咀以清酒三升水五升煮取三升温服五合日
三服
防己湯治風歷節四肢疼痛如槌鍛不可忍者方
防己　茯苓
生薑酪四兩　烏頭七枚
右八味㕮咀以苦酒一升水一斗煮取三升半一服八合
日三夜一當覺焦熱痺忽忽然憤憒悒也若不覺復合服

以覺乃止凡用烏頭皆去皮熬令黑乃堪用不然至毒人

宜慎之 莢不用 苦酒

治濕風躰痛欲折肉如錐刀所刺方

附子 乾薑 人參 甘草 芍藥 茯苓

右八味㕮咀以水八升煮取三升日三服

大棗湯治歷節疼痛方

大棗 十五枚 黃耆 四兩 附子 一枚 生薑 二兩

麻黃 五兩 甘草 一尺 桂心 各三兩 白朮 四兩 一方去桂用乾地黃三兩

右六味㕮咀以水七升煮取三升服一升日三服

犀角湯治熱毒流入四肢歷節腫痛方

犀角 二兩 羚羊角 一兩 前胡 一兩 梔子人 各三十枚

黃芩 射干 各三兩 大黃 四兩 升麻 各四兩

豉 一升

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服

治歷節諸風百節酸痛不可忍方

松脂三十斤鍊五十遍酒煮十遍不能五十遍二十遍亦可鍊酥三升溫和松脂三升熟攪令極調勻旦空腹以酒服方寸匕日三數食麪粥爲佳慎血腥生冷物醋果子百日已後差

松節酒主歷節風四肢疼痛由如解落方

松節 三十斤細剉 水四石煮取一石 猪椒藥 三十斤剉煮如松節法

右二味㕮咀漬清合漬乾麴五斤候發以糯米四石五斗釀之酒依家醞法肆酘勿令傷冷熱第一酘時下後諸藥

菖蒲 雄黃 各五兩 獨活 十五兩 秦艽 六兩 防風 十兩 人參 四兩 柏子人 天雄

菌芋 四兩 礦石 十二兩未

右十味㕮咀內飯中炊之如常酘法酘足訖封頭四七日押取清適性服之勿至醉吐

治歷節風方

松膏一升酒三升浸七日服一合日再數劑愈

又方

松葉三十斤酒二石五斗漬三七日服一合日五六度

逐風毒石膏湯方

石膏雞子大三枚 麻黃三兩 雞子二枚 甘草一尺 杏人四十枚

右五味㕮咀以水三升破雞子內水中烊令相得內藥煮取一升服之覆取汗汗不出燒石熨取汗出

偏風第四方十二首 鍼灸法五首

防風湯主偏風甄權處療安平公方

防風 芎藭 牛膝 白芷 白朮 酪二合 羌活 生薑 五兩 石膏 麻黃 四兩 杏人 酪二合 桂心 酪三兩 葛根 附子 外臺作人參 薏苡人 狗脊 革薤

右十六味㕮咀以水二斗三升煮取三升分三服服一劑覺好更進一劑即一度鍼九劑九鍼即差灸亦得

針風池一穴 肩髃一穴 曲池一穴 支溝一穴 五樞一穴 陽陵泉一穴 巨虛下廉一穴 凡鍼七穴即差

仁壽宮備身患脚奉勑

針鍰銚 陽陵泉 巨虛下廉

陽輔即起行

大理趙卿患風腰脚不隨不能跪起　行
上窌一穴　鐍銚一穴　陽陵泉一穴
巨虛下廉一穴即得跪
庫狄欽患偏風不得挽弓
針肩髃一穴即得挽弓甄權所行
治猥退風半身不遂失音不語者方
杏人去雙人及皮尖三斗洗入臼擣二斗令碎研如
寒食粥法取汁八升煎取六升第二酘也次一炊準第
及此爲不熟惟熟爲妙停極冷然後內好麴一斗六
升煎取八升第一遍酘饋也次一炊復取杏人三升
研取一斗二升汁煎取四升更
二酘取杏人汁多少爲第三酘也若疑米不足別更
取二升杏人研取八升汁煎取四升更斟酌炊米酘

之若猶不足更研杏人二升取八升汁煎取四升更
酘之以熟爲限壹石米杏人三斗所以節次研杏人
者恐併煎汁酢故也若冬日任意併煎準計三斗杏
人取汁壹石陸斗煎取八斗四升漬麴以分之酘饋
酒熟封四七日開澄取清然後押糟糟可乾末和酒
服之大驗秘方
又方
蜱麻子脂一升酒一斗銅鉢盛著酒中一日煮之令
熟服之
猥退風半身不遂失音不語者灸百會次灸本神次灸承漿
灸手少陽次灸肩髃次灸心輸次灸手五冊次灸手髓孔次
灸大風半身不遂方

蚕沙兩石熟蒸作直袋參枚各受柒斗熱盛一袋著
患處如冷即取餘袋一依前法數數換百不禁差止
須羊肚釀粳米葱白薑椒豉等混煮熱喫日食一枚
拾日止千金不傳
又方
蒸鼠壤土袋盛熨之差即止
治四肢緩弱身躰疼痛不遂婦人産後中柔風及氣滿葛根
湯方
葛根　乾地黃　芍藥　桂心
麻子湯治大風周身四肢攣急風行在皮膚身勞彊服之不
虛人又主精神蒙昧者方
麻黃　甘草各三兩　生薑六兩
右八味㕮咀以清酒三升水五升煮取三升温服五合日三
秋麻子三升淨擇水漬一宿　防風　桂心
生薑　石膏用綿裹　橘皮各二兩　麻黃三兩
竹葉一握　蔥白一握　香豉一合
右十味㕮咀先以水二斗半煮麻子令極熟漉去滓取九
升別煮麻黃兩沸掠去沫內諸藥汁中煮取三升去滓空
腹分三服服訖當微汗汗出以粉塗身極重者不過三兩
劑輕者一兩劑差有人患大風賊風刺風加獨活三兩比
仲景三黃湯方
麻黃三十銖　黃耆十二銖　黃芩十八銖　獨活一兩
細辛十二銖
右五味㕮咀以水五升煮取二升分二服一服小汗兩服

大汗心中熱加大黃半兩脹滿加枳實六銖氣逆加人參
十八銖心悸加牡蠣十八銖渴加栝樓十八銖先有寒加
八角附子一枚此方秘不傳

白斂　薏苡仁　芍藥　桂心
牛膝　酸棗仁　甘草　外各一
附子三枚　乾薑

右九味㕮咀以淳酒二斗漬一宿微火煎三沸服一升日
三扶杖起行不耐酒服五合千金翼有車前子

治腎背痛獨活寄生湯夫腎背痛者皆猶腎氣虛弱卧冷濕
地當風所得也不時速治喜流入脚膝爲偏枯冷痺緩弱疼
重或腰痛攣脚重痺宜急服此方

獨活三兩　寄生古今録驗用續斷　杜仲　牛膝
細辛　秦艽
防風　苦蘛
當歸　芍藥
茯苓　桂心
人參　甘草
乾地黃各二兩

右十五味㕮咀以水一斗煮取三升分三服溫身勿冷也
喜虛下利者除乾地黃服湯取葫蕾葉火燎厚安席上及
熱眠上冷復燎之冬月取根舂取莖敷卧之佳其餘薄熨
不及葫蕾蒸也諸處風濕亦用此法新產竟便患腹痛不
得轉動及腎脚攣痛不得屈伸痺弱者宜服此湯除風消
血也肘後有附子一枚大者無寄生人參甘草當歸各一

菊花酒主男女風虛寒冷腰背痛食少羸瘦無色噓吸少氣
去風冷補不足方

菊花　杜仲　附子　黃耆
乾薑　桂心　當歸　石斛各四兩

紫菀　蔥蕘各五兩　鍾乳各八兩　茯苓三兩　防風四兩　千金翼不用乾薑

右十五味㕮咀以酒七斗漬五日一服二合稍稍加至五合日三

杜仲酒主腰脚疼痛不遂風虛方

杜仲八兩　石南二兩　羌活四兩　大附子五枚

右四味㕮咀以酒一斗漬三宿服二合日再偏宜冷病婦人服

風痱第五　論三首　灸法一首　方八首

論曰夫風痱者卒不能語口噤手足不遂而彊直者是也治之以伏龍肝五升末冷水八升和攪取其汁飲之能盡為善（附後此方治心煩恍惚腹中痛滿絕而復蘇）自此已下九方皆是主此風用之次第宜細尋之

論曰凡欲醫此病知先後次第不得漫授湯藥以失機宜非但殺人因茲遂為痼疾亦既得之當進三味竹瀝飲少似有勝於常更進湯也竹瀝飲子患熱風者必失用於此制其熱毒竹瀝湯主四肢不收心神恍惚不知人不能言方

竹瀝二升　生薑汁一升　生薑汁三合

右三味相和温暖分三服平旦日晡夜各一服服訖覺四體有異似好次進後湯方

麻黃　防風各一兩半　附子　人參　甘草　桂心各一兩　杏人四十枚　竹瀝一升

右十六味㕮咀以水七升煮減半內瀝煮取二升五合分三服取汗間五日更服一劑頻與三劑漸覺少損仍進後方

菖蒲　防己　芍藥　黃芩　生薑四兩　石膏六兩　羚羊角二兩　生葛汁五合

竹瀝三升　防已　升麻　桂心
苦參　羚羊角各二兩　麻黃三兩　防風二兩
右八味咬咀以水四升合竹瀝煮取二升半分三服兩日
服一劑常用加獨活三兩最佳此方神良頻進三劑若手
足冷者加生薑五兩白朮二兩若未除更進後湯方
防風　麻黃　芍藥各一兩半　防已
桂心　黃芩　白朮　附子一本作杏人四十枚
芍藥一兩　獨活　甘草一本作葛根二兩　人參
石膏碎二兩　升麻一兩　生薑
右十七味咬咀以水八升煮減半內瀝煮取二升半　分三
服相去如人行十里更服若有氣者加橘皮牛膝五加皮
各一兩

凡風雜服前湯得差訖可常服煮散除餘風方
防風　獨活　防已　秦艽
黃耆　芍藥　人參　白朮
茯神　苦蘘　遠志　升麻
石斛　牛膝　羚羊角　丹參
甘草　厚朴　天門冬　五加皮
桂心　黃芩千金翼作署預　地骨皮各一兩一云各四兩　橘皮
生薑　麻黃　乾地黃各三兩　檳榔千金翼作甘草
菜本千金翼作附子　杜仲千金翼作麥門冬　烏犀角各二兩千金翼作山茱萸
蘘荷一升　石膏六兩一云三兩
右三十三味擣篩爲麤散和攪令勻每以水三升藥三兩
煮取一升綿濾去滓頓服之取汗日一服若覺心中熱煩
以竹瀝代水煮之

凡患風人多熱常宜服荆瀝方

荆瀝　竹瀝　生薑汁各三合

右三味相和暖之爲一服每日旦服煮散午後服此平復好差乃止

獨活煮散主諸風痱方

獨活兩　苦蘞　芍藥　茯苓

防風　防己　葛根各一兩　當歸

人參　桂心　羚羊角　石膏

麥門冬各四兩　礜石十兩　甘草三兩　白朮三兩

右十六味各切如豆分三十四分分安生薑生地黃切一升杏人二七枚以水二升煮取七合日晚或夜中服之日一服間日服無所忌

凡風服湯藥多患虛熱翕翕然五補丸除熱方

防風　人參　乾地黃

羚羊角　麥門冬　天門冬各一兩半　芍藥

獨活　乾薑　白朮　丹參

食茱萸一本云山茱萸　甘草　狄神　升麻

黃芩各一兩　寒水石三兩　地骨皮　五加皮

黃耆　甘菊花　署預各三十銖　秦艽

石斛　牛膝　桂心　防己

苦蘞　生薑屑　附子十八銖　石膏三兩

右三十二味末之白蜜和生薑蜜湯服如梧子大二十九日三稍加至三十丸忌油麪蒜生冷酢滑豬羊雞魚等

論曰古人立方皆準病根冷熱制之今人臨急造次尋之即用故多不驗所以欲用方者先定其冷熱乃可檢方用無不效也湯酒既爾丸散亦然凡此風之發也必由熱盛故有竹瀝

葛汁等諸冷藥焉後之學者不能子細識其方意故有玆論具而述之其人無密室者不得與療風彊人居室不密尚中風況服藥人

治風痱不能語手足不遂灸法

度病者手小指內岐間至指端爲度以置臍上直望心下以丹注度上端畢又作兩度續所注上合其下開其上取其本度橫置其開上令三合其狀如到作△字形男度左手女度右手嫵不分了故上丹注三處同時起火各一百壯愈

風懿第六 論三首 針灸法六首 方二十三首

治風懿不能言四肢不收手足躽曳獨活湯方

獨活 四兩　桂心　芍藥　栝樓根

生葛 各二兩　生薑 六兩　甘草 三兩

右七味㕮咀以水五升煮取三升分三服日三

論曰脾脉絡胃俠咽連舌本散舌下心之別脉係舌本今心脾二藏受風邪故舌強不得語也

治中風口噤不能言方

防已　桂心　麻黃 各二兩　葛根 三兩

甘草　防風　芍藥 各一兩　生薑 四兩

右八味㕮咀以水六升煮取二升半分三服瘥痙不語皆治之

石南湯治六十四種風注走入皮膚中如蟲行賁脊彊直五緩六急手足拘攣隱胗搔之作瘡風尸身癢卒風面目腫起手不出頭口噤不能言方

石南　乾薑　黃芩　細辛

人參 各一兩　桂心　麻黃　當歸

苓薷各一兩半　乾地黃一銖八甘草二兩　食茱萸一銖十
右十二味㕮咀以水六升酒三升煮取三升分三服大汗
勿悋
治中風口噤不知人方
白朮四兩以酒三升煮取一升頓服之
又方　服荊瀝一升
又方　服淡竹瀝一升
又方
芥子一升　酢三升
右二味煮取一升薄頭以布裹之一日一度附後以治卒不得語
又方
豉一升　吳茱萸一升
右二味以水七升煮取三升漸漸飲之附後以治不能語

卒中風口噤不得開灸機關千金翼名頰車二穴穴在耳下八分小近前灸五壯即得語又灸隨年壯僻者逐僻左右灸之中風失音不能言語緩縱不隨先灸天窗五十壯者始發先灸百會則風炙百會五十壯畢還灸天窗五十壯息火仍移氣不得泄內攻五藏喜閉伏仍失音也所以先灸天窗次百會佳一灸五十壯悉泄火勢復灸之視病輕重重者一處三百壯大較凡中風服藥益劇者但是風穴悉皆灸之三壯無不愈也神良決定勿疑惑也不至心者勿浪盡灸

論曰風寒之氣客於中滯而不能發故瘖不能言及喑痙失聲皆風邪所為也入藏皆能殺人故附之於治風方末凡尸厥而死脉動如故此陽脉下墜陰脉上爭氣閉故也針百會入三分補之灸尸尻兩胯下又竈突墨彈丸大漿水和飲之又針足中指頭去甲如韭葉又刺足大指甲下內側去甲三分

桂湯治卒失音方

濃煮桂汁服一升覆取汗亦可末桂著舌下漸漸嚥汁

又方　濃煮大豆汁含亦佳無豆用豉

治卒不得語方

酒五合和人乳汁中半分為二服

論曰夫眼瞤動口脣偏喎皆風入脉急與小續命湯附子散摩神明膏丹參膏依穴灸之喉痺舌緩亦然風入藏使人瘖痙卒死口眼相引牙車急舌不轉喎僻者與伏龍肝散和雞冠血及鼈血塗乾復塗并灸吻邊橫文赤白際逐左右隨年壯報之至三報三日不差更報之

附子散主中風手臂不仁口面喎僻方

附子　桂心　細辛　防風　人參　乾薑　各五兩

右六味治下篩酒服方寸匕日三稍增之

甘草湯治偏風積年不差手脚枯細面口喎僻精神不定言語倒錯方

甘草　桂心　芎藭　麻黃　當歸　芍藥　各一兩　附子二枚　獨活　防己　各三兩　生薑　石膏　茯神　各四兩　白朮　黃芩　細辛　各一兩　秦艽　防風　兩各一半　側子三枚　菊花一升　淡竹瀝四升

人參二兩

右二十一味㕮咀以水一斗先煮麻黃去沫取七升內竹瀝及藥煮取三升分四服服三服訖間一盃粥後更服待藥勢自汗愼生冷酢滑麪乳酪魚等

治凡風著人面引口偏著耳牙車急舌不得轉方

生地黃汁一升　竹瀝一升　獨活三兩

右三味合煎取一升頓服之即愈

治中風面目相引口偏僻牙車急舌不可轉方

牡蠣　礬石　雷下黃土　附子各等分

右四味末之取三歲雄雞冠血和藥傅其上預持鏡候之纔欲復故便急洗去之不速去便過不復還也（千金翼云偏右塗左偏左塗右）

又方

青松葉一斤擣令汁出清酒一升漬三宿近火一宿初服半升漸至一升頭面汗出即止

又方

竹瀝三升　防風　防己　升麻

桂心　菖蒲各三兩　羚羊角三兩　麻黃四兩

右八味㕮咀以水四升合竹瀝煮取一升半分三服日服一劑常用效

又方

酒煮糂取汁以故布搦病上正則止左喎搦右右喎搦左秘不傳余常用大效

治口耳僻方

防風二兩　柏實三兩　麻黃三兩　杏人三十枚

右八味㕮咀以水一斗酒二升煮取三升分四服

治口喎不止方

獨活　生薑各四兩

治卒中風口喎方

取空青末如豆一枚含之即愈

炒大豆三升令焦以酒三升淋取汁頓服之（肘後以治口噤不開）

又方

大皂莢一兩去皮子下篩以三年大酢和左喎塗右右喎塗左乾更塗之

枳茹酒主諸藥不能差者方

枳實上青刮取末欲至心止得茹五升微火炒去濕氣以酒一斗漬微火煖令得藥味隨性飲之主口僻眼急大驗治緩風急風立佳（肘後以治身直不得屈伸反覆者枳樹皮亦得）

治卒中風口喎方

以葦筒長五寸以一頭刺耳孔中四畔以麵密塞之勿令泄氣一頭内大豆一顆并艾燒之令燃灸七壯即差患右灸左患左灸右千金不傳耳病亦灸之中風口喎灸手交脉三壯左灸右右灸左其炷如鼠屎形橫安之兩頭下火

角弓反張第七方六首

治卒半身不遂手足拘急不得屈伸身體冷或智或癡或身強直不語或生或死狂言不可名狀角弓反張或欲得食或不用食或大小便不利皆療之方

人參　桂心　當歸　獨活

黃芩　乾薑　甘草（各十八銖）　石膏（一兩半）

杏人（四十枚）

右九味咬咀以井華水九升煮取三升分三服日二覆取汗不汗更合加麻黃五兩合服（古今錄驗名八風續命湯）

倉公當歸湯主賊風口噤角弓反張痙者方

當歸　防風（各八銖）　細辛（一兩半）　附子（一枚）　獨活（一兩半）　麻黃（三十銖）

右六味咬咀以酒五升水三升煮取三升服一升口不開者格口內湯一服當蘇二服小汗三服大汗

又方　單服荊瀝良

又方

酒一斗膠二斤煮令烊得六升一服一升稍服愈

秦艽散治半身不遂言語錯亂乍喜乍悲角弓反張皮膚風癢方

秦艽　獨活胡洽烏頭洽用　黃耆　人參

甘菊花各二兩胡洽用蜀椒　茵芋十八銖胡洽用菌草　防風　石斛胡洽用革解

桂心　山茱萸各二兩半　附子　苦藭胡洽用桔梗

細辛　當歸

白朮　乾薑

麻黃　天雄

遠志各一兩胡洽用防已

白鮮皮胡洽用白斂各三十銖

右二十二味治下篩酒服方寸匕日再漸漸加至二匕又云治風無新久并補

吳秦艽散治風注甚良角弓反張手足酸疼皮膚瞤習身體都痛眉毛墮落風注入肢體百脉身腫耳聾驚悸心滿短氣魂志不定陰下濕癢大便有血小便赤黃五勞七傷萬病皆主之方

秦艽　蜀椒　人參　茯苓

牡蠣　細辛　麻黃　栝樓根各十八銖

乾薑　附子　桔梗

桂心　獨活　當歸各一兩　黃芩

柴胡　牛膝各一兩半　芎藭　防風各一兩半

石南　杜仲　葬草　烏頭

天雄酪半兩　甘草一兩半

右二十六味治下篩盛以韋袋食前温酒一升服方寸匕
日三服急行七百步更飲酒一升忌如常法

風痺第八 論一首 方九首

論曰血痺病從何而得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛因疲勞汗出卧不時動搖加被風遂得之形如風狀但以脉自微澁澁在寸口關上緊宜針引陽氣令脉和緊去則愈

治風濕脉浮身重汗出惡風方

漢防己四兩　甘草二兩　白朮各三兩　大棗十二枚　黄耆五兩　生薑四兩

右六味㕮咀以水六升煮取三升分三服服了坐被中欲解如蟲行皮中卧取汗

治三陰三陽厥逆寒食膏脅支滿病不能言氣滿胷中急眉息四肢時寒熱不隨喘悸煩亂吸吸少氣言輒飛颺虚損鐵精湯方

黄鐵三十斤以流水八斗揚之三千遍　炭五十斤燒鐵令赤投冷水復燒七徧如此澄清取汁二斗煮藥　半夏　黄芩　甘草　大棗二十枚　石膏五兩　麥門冬升洛一　白薇　芍藥各四兩　人參三兩　生薑二兩

右十味㕮咀内前汁中煮取六升服一升日三兩日令盡黄耆湯治血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風狀方

蜀黄耆　人參　大棗十二枚　生薑二兩　芍藥　桂心洛二兩

右六味㕮咀以水六升煮取二升服七合日三服盡要略五物無人參

治遊風行走無定腫或如盤大或如甌或著腹背或著臂或著脚悉主之方

海藻　茯苓　防風　獨活
附子　白朮各三兩　大黃五兩　鬼箭
當歸各二兩一本作當陸

右九味㕮咀以酒二斗漬之五日初服二合加之以知為度白斂散治風痺腫筋急展轉易常處方

白斂半兩　附子六銖

右二味治下篩酒服半刀圭日三不知增至一刀圭身中熱行為候十日便覺

治風痺遊走無定處名曰血痺大易方

蕳蘞　署預
白朮　地膚子各半兩　乾漆　牛膝　澤瀉各二兩
蠐螬

車前子各十銖　茵芋六銖　天雄　狗脊
山茱萸三十銖　乾地黃二兩半

右十四味末之蜜和酒下如梧子十九日三稍稍加之

治諸風痺方

防風　甘草　黃芩　桂心
當歸　茯苓各一兩　秦艽　葛根各二兩
生薑五兩　大棗三十枚　杏人五十枚

右十一味㕮咀以水酒各四升煮取三升分三服取汗

附子酒主大風冷痰癖脹滿諸痺方

大附子一枚重二兩者亦云二枚酒五升漬之春五日一服一合日二以痺為度

麻子酒主虛勞百病傷寒風濕及婦人帶下月水往來不調手足疼痺著牀服之令人肥健方

麻子一石　法麴一斗

右二味先擣麻子成末以水兩石著釜中蒸麻子極熟炊一石米須出滓隨汁多少如家醞法候熟取清酒隨性飲之

備急千金要方卷第八

金澤文庫

論脚氣以千金為宗以千金當詳玩索有得自當應手取效無事他求耳

凡瘧責于太陽故曰太陽中風重感于寒雖別有症也十二經脈以太陽為重觀瘧病之形皆太陽經脈所過之處可證也何以瘧傷太陽便能死人蓋太陽之裡候是少陰少陰之表法不虛筋脈有義而必遵此瘧現熱產婦換金憐出血過多及小兒血脈未盛者易安此症可知

風盡自下而上過小腹則危攻胃沖心則死蓋其勢急甚治不可後也

備急千金要方卷第九 傷寒上

朝奉郎守太常丞鄉充秘閣校理判登聞檢院上護軍賜紫袋臣林億等校正

傷寒例第一
辟温第二 治瘴霧氣附
傷寒膏第三
發汗散第四
發汗湯第五
發汗丸第六
宜吐第七
宜下第八
發汗吐下後第九

論曰易稱天地變化聖人效之陰陽不測神明之

功難測故有炎涼寒燠風雨晦冥水旱妖災蟲蝗恠異四時
八節種種施化不同七十二候日月運行各別終其晷度方
得成年是謂歲功畢矣天地尚且如然在人安可無事故人
生天地之間命有遭際時有否泰吉凶悔吝苦樂安危喜怒
愛憎存亡憂畏關心之慮日有千條謀身之道時生萬計乃
度一日是故天無一歲不寒暑人無一日不憂喜故有天行
温疫病者即天地變化之一氣也斯蓋造化必然之理不得
無之故聖人雖有補天立極之德而不能廢之雖不能廢之
而能以道御之其次有賢人善於攝生能知撙節與時推移
亦得保全天地有斯瘴癘還以天地所生之物以防備之命
曰知方則病無所侵矣然此病也俗人謂之横病多不解治
皆云日滿自差以此致枉者天下大半凡始覺不佳即須救
療迄至於病愈湯食競進折其毒勢自然而差必不可令病

氣自在恣意攻人拱手待斃斯為誤矣今博採群經以為上
下兩卷廣設備擬好養生者可得詳焉

小品曰古今相傳稱傷寒為難治之疾時行温疫是毒病之
氣而論治者不判傷寒與時行温疫為異氣耳云傷寒是雅
士之辭天行温疫是田舍間號耳不說病之異同也考之衆
經其實殊矣所宜不同方說宜辨是以略述其要經言春氣
温和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰洌此四時正氣之序也冬
時嚴寒萬類深藏君子周密則不傷於寒或觸冒之者乃為
傷寒耳其傷於四時之氣皆能為病而以傷寒為毒者以其
最為殺厲之氣也中而即病名曰傷寒不即病者其寒毒藏
於肌骨中至春變為温病暑病熱極重於温也是以辛苦之人春夏多温病熱病者皆由冬時觸冒寒冷之所致非時行之氣也凡時行者是春時應暖而反大寒夏

時應熱而反大冷秋時應寒而反大温此非其時而有其氣是以一歲之中病無長少多相似者此則時行之氣也傷寒之病逐日深淺以施方治今世人得傷寒或始不早治或治不主病或日數久淹困乃告師師苟依方次第而療則不中病皆宜臨時消息制方乃有效耳

華佗曰夫傷寒始得一日在皮當摩膏火灸之即愈若不解者二日在膚可依法針服解肌散發汗汗出即愈若不解至三日在肌復一發汗即愈若病困藜蘆丸不能吐者服在胷宜服藜蘆丸微吐之則愈若病困藜蘆丸不能吐者服小豆瓜蒂散吐之則愈也視病尚未醒醒者復一法針之五日在腹六日入胃入胃乃可下也若熱毒在外未入於胃而先下之者其熱乘虛入胃即爛胃也然熱入胃要須下去之不可留於胃中也胃若實熱為病三死一生皆不愈胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出候此候十死一生但論人有強弱病有難易得效相倍也得病無熱但狂言煩躁不安精彩言語不與人相主當者勿以火迫之但以猪苓散一方寸匕服之當逼與新汲水一升若二外強飲之令以指刺喉中吐之病隨手愈若不能吐者勿強與水水停則結心下也當更以餘藥吐之皆令相主不爾更致危矣若此病輩不時以猪苓散吐解之者其死殆速耳亦可先以去毒物及法針之尤佳夫飲膈實者此皆難治此三死一生也病者過日不以時下則熱不得泄亦胃爛斑出春夏無大吐下秋冬無大發汗發汗法冬及始春大寒時宜服神丹丸亦可摩膏火灸若春末及夏月始秋此熱月不宜火灸及重覆宜服六物青散若崔文行度瘴散赤散雪煎亦善若無丸散及煎者但單煮柴胡數兩傷寒時行亦可服以發

汗至再三發汗不解當與湯實者轉下之其脉朝夕駛者爲澼實也朝平夕駛者非澼也轉下湯爲可早與但當少與勿令大下耳少與當數其間也諸虛煩熱者與傷寒相似然不惡寒身不疼痛故知非裏實不可下也如此内外皆不可攻而強攻之必遂故知非裏實不可下也如此内外皆不可攻而強攻之必遂損竭多死難全也此虛煩但當與竹葉湯若嘔者與橘皮湯一劑不愈爲可重與也此法數用甚有效驗傷寒後虛煩亦宜服此湯

王叔和曰夫陽盛陰虛（外臺作表和裏病）汗之則死下之則愈陽虛陰盛（外臺作裏下之則死汗之則愈夫如是則神丹安可以誤發甘遂何可以妄攻虛盛之治（外臺作表裏之治）相背千里吉凶之機應若影響然則桂枝下咽陽盛則斃（外臺作表和則斃）承氣入胃陰盛以亡（外臺作裏平以亡）若此陰陽虛實之交錯其候至微發汗吐下之相反其禍至速而醫術淺狹不知不識病者殞沒自謂其分至令冤魂塞於冥路天死及盈於曠野仁愛鑒茲能不傷楚夫傷寒病者起自風寒入於腠理與精氣分爭榮衛否隔周行不通病一日至二日氣在孔竅皮膚之間故病者頭痛惡寒腰背強重此邪氣在表發汗則愈三日以上氣浮在上部塡塞胷心故頭痛胷中滿當吐之則愈五日以上氣沈結在藏故腹脹身重骨節煩疼當下之則愈明當消息病之狀候不可亂投湯藥虛其胃氣也經言脉微不可吐虛細不可下又夏月亦不可下也此醫之大禁也脉有沈浮轉能變化或人得病數日方以告醫雖云初覺視病已積日在身其疹瘵結成非復發汗解肌所除當診其脉隨時形勢救解求免也不苟以次第爲固失其機要乃致禍矣此傷寒次第病三日以内發汗者謂當風解衣夜卧失覆寒温所中并時有疾疫賊

風之氣而相染易爲惡邪所中也至於人自飲食生冷過多
腹臟不消轉動稍難頭痛身温其脉實大者便可吐下之不
可發汗也

陳廩丘云或問得病連服湯藥發汗汗不出如之何荅曰醫
經云連發汗汗不出者死病也吾思之可蒸之如蒸中風法
熱濕之氣於外迎之不得不汗出也後以問張苗苗云曾有
人作事疲極汗出卧單簟中冷得病但苦寒倦諸醫與丸散
湯四日之内凡八過發汗汗不出苗令燒地布桃葉蒸之即
得大汗於被中就粉傅身使極燥乃起便愈後數以此發汗
汗皆出也人性自有難汗者非惟病使其然也蒸之則無不
汗出也諸病發熱惡寒脉浮洪者便宜發汗温粉粉之勿令
遇風當發汗而其人適失血及大下利則不可大汗也數方
與桂枝湯使體潤黎黎汗出連日當自解也

論曰凡人有少苦似不如平常即須早道若隱忍不治冀望
自差須臾之間以成固疾小兒女子益以滋甚若時氣不和
當自戒勒若小有不和即須治療尋其邪由及在腠理以時
早治鮮不愈者患人忍之數日乃說邪氣入藏則難可制止
雖和緩亦無能爲也癰疽腫唉痺客忤尤爲其急此自養
生之要也凡作湯藥不可避晨夜時日吉凶覺病須臾即宜
便治不等早晚則易愈矣服藥當如方法若縱意違師不須
治之也凡傷寒多從風寒得之始表中風寒入裏則不消矣
未有温覆而當不消也凡得時氣病五六日而渴欲飲水飲
不能多不當與也所以爾者腹中熱尚少不能消之便更爲
人作病矣若至七八日大渴欲飲水者猶當依證而與之與
之勿令極意也言能飲一斗者與五升若飲而腹滿小便澀
若喘若噦不可與之忽然大汗出者欲自愈也人得病能飲

水欲愈也

凡温病可針刺五十九穴又身之穴六百五十有五其三十六穴灸之有害七十九穴刺之爲災

論曰夫尋方學之要以救速爲貴是以養生之家常須預合成熟藥以備倉卒之急今具之如左

辟温第二 方三十六首 濕暍病證一條

辟疫氣令人不染温病及傷寒歲旦屠蘇酒方

大黄十八銖 白朮十八銖 桔梗 蜀椒各十五銖 桂心十八銖 烏頭六銖 菝葜十二銖 一方有防風一兩

右七味㕮咀絳袋盛以十二月晦日日中懸沈井中令至泥正月朔日平曉出藥置酒中煎數沸於東向戶中飲之屠蘇之飲先從小起多少自在一人飲一家無疫一家飲一里無疫飲藥酒得三朝還滓置井中能仍歲飲可世無病當家內外有并皆悉著藥辟温氣太一流金散方

雄黄三兩 雌黄二兩 羖羊角二兩燒 礬石一兩半

右五味治下篩三角絳袋盛一兩帶心前并掛門戶上若逢大疫之年以月旦青布裹一刀圭中庭燒之温病人亦燒熏之

辟温氣雄黄散方

雄黄五兩 朱砂一作赤末 菖蒲 鬼臼各二兩

右四味治下篩以塗五心額上鼻人中及耳門

天氣不和疾疫流行預備一物柏枝散方

取南向社中柏東南枝暴令乾擣末酒服方寸匕神良

辟温病粉身散常用方

芎藭　白芷　蠟本各等分

右三味治下篩內米粉中以粉身

辟温氣殺鬼燒藥方

雄黃　丹砂　雌黃各一斤　羚羊角殺羊角亦得

蕪荑　虎骨　鬼臼　鬼箭羽

野丈人　石長生　猳猪屎　馬懸蹄各三兩

青羊脂　菖蒲　白朮各八兩　蜜蠟八斤

右十六味末之以蜜蠟和爲丸如彈許大朝暮及夜中戶前微火燒之

辟温虎頭殺鬼丸方

虎頭五兩　朱砂　雄黃　雌黃各一兩半

鬼臼　皂莢　蕪荑各一兩

右七味末之以蜜蠟和爲丸如彈子大絳袋盛繫臂男左女右及懸屋四角晦望夜半中庭燒一丸

辟温殺鬼丸熏百鬼惡氣方

雄黃　雌黃各三兩　羖羊角　虎骨各七兩

龍骨　龜甲　鮫鯉甲　蝟皮各三兩

樗雞十五枚　空青一兩　蚕蔹　眞朱各五兩

東門上雞頭一枚

右十三味末之烊蠟二十兩併手丸如梧子正旦門戶前燒一丸帶一丸男左女右辟百惡獨宿弔喪問病各吞一丸小豆大天陰大霧日燒一丸於戶牖前佳

漢建寧二年太歲在酉疫氣流行死者極衆即有書生丁季回從蜀青城山來東過南陽從西市門入見患疫癘者頗多遂於囊中出藥人各惠之一丸靈藥霑脣疾無不差市中疫鬼數百千餘見書生施藥悉皆驚怖而走乃有鬼王見書生

謂有道法兼自施藥感衆鬼等奔走若是遂詣書生欲求受其道法書生曰吾無道法乃囊中之藥呈於鬼王鬼王觀藥能除水怪蛟蜃雄黃丸方

雄黃　雌黃　曾青　鬼臼
眞珠　丹砂　虎頭骨　桔梗
右十八味末之蜜丸如彈子大絹袋盛男左女右帶之卒中惡及時疫吞如梧子一丸燒一彈丸戶內赤散辟溫疫氣傷寒熱病方

藜蘆　蹢躅花　附子　桂心
眞朱　細辛　乾薑　牡丹皮
皂莢　各六銖　各一兩　各八銖

右九味末之內眞朱合治之分一方寸匕置絳囊中帶之男左女右著臂自隨覺有病之時便以粟米大內著鼻中又酒服一錢匕覆取汗日三服當取一過汗耳

又方

正月旦取東行桑根大如指長七寸以丹塗之懸門戶上斷溫病令不相染著方

又令人帶之

汲水瓶綆長七寸盜著病人臥席下良

又方　以繩度所住戶中壁屈繩即斷之

治溫令不相染方

桃樹蟲屎末之水服方寸匕

又方　末豉等分酒漬服之妙

又方　正旦吞麻子赤小豆各二七枚又以二七枚投井中一外内井中一宿出服七枚

又方　新布袋盛大豆一外内井中三日出舉家服二七枚

又方　松葉末之酒服方寸匕日三服

又方　常以七月七日合家吞赤小豆向日吞二七枚

又方　常以七月七日男吞大豆七枚女吞小豆二七枚

又方

神仙教人立春後有庚子日温蕪菁葅汁合家大小並服不限多少

斷温疫轉相染著乃至滅門延及外人無收視者方

赤小豆　鬼箭羽　鬼臼　丹砂　雄黃各二兩

右五味末之以蜜和服如小豆一丸可與病人同牀傳衣

治疫病方

藥子二枚末水服之

又方

白蜜和上色朱砂粉一兩常以太歲日平旦大小勿食向東方立吞服三七丸如麻子大勿令齒近之并吞赤小豆七枚投井泉中終身勿忘此法

又方

凡時行疫癘常以月望日細剉東引桃枝煮湯浴之

治瘴氣方

蒜五子并皮碎之　豉心一升

右二味以三歲男兒尿二升煮五六沸去滓服之良

又方　青竹筒二升以水四升煮取三升分三服

治患霧氣者心內煩悶少氣頭痛項急起則眼眩欲倒身微

熱戰掉不安時復憎寒心中欲吐吐時無物方

新猪屎二升半內好酒一升攪令散以生布絞取汁更以綿濾頓服之取盡即地鋪暖卧覆蓋鋪前著火當汗出若得汗當細細去上衣勿使心寒寒即不差看汗自乾乃起慎風冷亦治瘧及風勞蠱毒

治肝腑藏温病陰陽毒頸背雙筋牽先寒後熱腰強急縮目中生花方

桂心一兩　白朮　芒消　大青

梔子擘各三兩　柴胡酥炙五兩　石膏　生薑各八兩

生地黃　香豉炒各一升

右十味㕮咀以水九升煮取三升分三服

治肝腑藏温病陰陽毒先寒後熱頸筋牽攣面目赤黃身中直強方

玄參一兩　細辛一兩　梔子　黃芩

升麻　芒消各三兩　石膏三兩　車前草暴切二升

竹葉切一斗

右九味㕮咀以水一斗半煮竹葉車前取七升去滓下諸藥煎至三升下芒消分三服

治心腑藏温病陰陽毒戰掉不安驚動方

大青　梔子　知母

芒消各三兩　麻黃去節四兩　玄參六兩　石膏

生葛根酌生地黃切一升

右十味㕮咀以水九升煮取三升去滓下芒消分三服

治脾腑藏温病陰陽毒頸重頸直皮肉痺結核隱起方

大青　羚羊角　升麻　射干

芒消各三兩　梔子四兩　寒水石五兩　玄參八兩

右八味㕮咀以水七升煮取三升分三服

治肺腑藏温病陰陽毒欬嗽連續声不絶嘔逆方

麻黄　梔子　紫菀　大青
玄參　葛根　桂心　甘草
杏人　前胡

右十一味㕮咀以水九升煮取三升分三服

治肺腑藏温病陰陽毒熱暴氣斑點方

梔子　大青　升麻　芒消
葱鬚　豉　石膏　生葛
右八味㕮咀以水七升煮取三升下芒消分三服

治腎腑藏温病身面如刺腰中欲折熱毒内傷方

茵蔯蒿　梔子　芒消　苦參
生葛　生地黄　石膏　葱白

豉
右九味㕮咀以水九升煮取二升半下消分三服

温風之病脉陰陽俱浮汗出體重其息必喘其形狀不仁嘿嘿但欲眠下之者則小便難發其汗者必讝言加燒針者則耳聾難言但吐下之則遺失便利如此疾者宜服萎蕤湯方

萎蕤　白薇　麻黄　獨活
杏人　芍藥　甘草　青木香
石膏

右九味㕮咀以水八升煮取三升去滓分三服取汗若一寒一熱加朴消一分及大黄三兩下之如無木香可用麝香一分

夫暍病與百合狐惑濕風温病鬼魅皆相類宜精察節氣其新故二氣相搏喜成此疾

摩之神效千金不傳此趙泉方也

白膏治傷寒頭痛向火摩身體酒服如杏核一枚温覆取汗

摩身當千過藥力乃行并治惡瘡小兒頭瘡牛領馬鞍皆治之先以鹽湯洗瘡以布拭之傅膏癰腫火炙摩千過日冊自消者方

天雄　烏頭　莽草　羊躑躅 各三兩

右四味㕮咀以苦酒三升漬一夕作東向露竈又作十二聚濕土各一升許大取成煎猪脂三斤著銅器中加竈上炊以葦薪令釋內所漬藥炊令沸下著土聚上沸定復上如是十二過令土盡徧藥成去滓傷寒咽喉痛含如棗核一枚日三摩時勿令近目

發汗散第四　一方十一首

度瘡發汗青散治傷寒敷色惡寒發熱頭痛項強體疼方

傷寒膏第三　一方三首

治傷寒頭痛項強四肢煩疼青膏方

當歸　芎藭　蜀椒　白芷
吳茱萸　附子　烏頭　莽草 各三兩

右八味㕮咀以醇苦酒漬之再宿以猪脂四斤煎令藥色黃絞去滓以温酒服棗核大三枚日三服取汗不知稍增可服可摩如初得傷寒一日苦頭痛背強宜摩之佳

大黃　附子　蜀椒　桂心 各一兩　巴豆五十枚　細辛　乾薑

右七味㕮咀以醇苦酒漬一宿以獐月猪脂一斤煎之調適其火三上三下藥成傷寒赤色發熱酒服梧子大一枚又以火摩身數百過兼治賊風絶良風走肌膚追風所在

麻黃二兩半　桔梗一兩半　細辛一兩　吳茱萸一兩
防風一兩六銖　白朮一兩六銖　烏頭一兩　乾薑一兩
右十味治下篩溫酒服方寸匕溫覆取汗汗出止若不得
汗汗少不解復服如法若得汗足如故頭痛發熱此爲內
實當服駛故丸若瞿氏丸如得便頭重者可以二大豆許
內鼻孔中覺燥涕出一日可三四度必愈兼辟時行病
五苓散主時行熱病但狂言煩躁不安精彩言語不與人相
主當者方
豬苓　白朮　茯苓各八銖　桂心十二銖
澤瀉三十銖
右五味治下篩水服方寸匕日三多飲水汗出即愈
崔文行解散治時氣不和傷寒發熱者方

桔梗　細辛各一兩　烏頭一枚
右四味治下篩若中傷寒服錢五匕覆取汗解若不覺復
小增之以知爲度若時氣不和旦服錢五匕辟惡氣欲省
病服一服皆酒服
六物青散治傷寒敷色惡寒方
附子　白朮各一兩六銖　防風一兩
桔梗　烏頭各三兩十八銖　細辛各一兩十八銖
右六味治下篩以溫酒服錢五匕不知稍增之服後食頃
不汗出者進溫粥一盃以發之溫覆汗出勢勢可也勿令
流離勿出手足也汗出止若汗大出不止者溫粉粉之微
者不須粉不得汗者當更服之得汗而不解者當服神丹
丸方出下臨發汗丸門
青散治春傷寒頭痛發熱方

苦參　厚朴
細辛各二兩　麻黃五兩　烏頭五枚
右七味治下篩覺傷寒頭痛發熱以白湯半升和藥方寸匕投湯中熟訖去滓盡服覆取汗汗出温粉粉之良久一服不除更重服之或當微下利者有大黃故也

詔書發汗白薇散治傷寒三日不解者方
白薇十二銖　杏人
右四味治下篩酒服方寸匕自覆卧汗出即愈

治傷寒頭痛身熱腰脊強引頸及風口噤瘧不絶婦人產後中風寒經氣腹大華佗赤散方
丹砂十二銖　蜀椒
細辛　黃芩
茯苓　人參
貝母各十八銖　麻黃一兩八銖
石膏各三十銖　大黃
烏頭五枚

女萎　烏頭各十八銖
雄黃二十四銖　吳茱萸三十銖

麻黃　代赭各二兩半
右十八味治下篩酒服方寸匕日三耐藥者二匕覆令汗出欲治瘧先發一時所服藥二匕半以意消息之細辛薑桂丹砂雄黃不熬餘皆熬之

赤散治傷寒頭痛項強身熱腰脊痛往來有時方
乾薑　防風
白朮　人參
麻黃　黃芩
吳茱萸一兩　附子一兩
烏頭一兩半　皂莢酥雄黃
沙參　細辛
茯苓
桔梗

桔梗　大黃酸各一兩

右六味治下篩清酒若井華水服一刀圭日三不知稍增以知爲度除時氣疫病若牛馬六畜中水行疫亦可與方寸匕人始得病一日時服一刀圭取兩大豆許吹著兩鼻孔中

治時行頭痛壯熱一二日水解散方

大黃　甘草　桂心　麻黃各二兩

右四味治下篩患者以生熟湯浴訖以煖水服方寸匕日三覆取汗或利便差丁強人服二方寸匕（甘草有芍藥治天行熱病生痘瘡疹痛解肌出汗）（延年秘錄有黃芩芍藥各二兩古今錄無）

治時病表裏大熱欲死方

大黃　寒水石　麻黃各一兩　芒消　石膏

升麻　葛根

右八味等分治下篩水服方寸匕日二

發汗湯第五（例一首　方十九首　桂枝證十三首）

例曰大法春夏宜發汗凡發汗欲令手足皆周至漐漐然一時間許益佳但不可令如水流離霶霈若病不解當更重發汗汗出多則亡陽陽虛不可重發汗也凡服湯藥發汗中病便止不必盡劑也凡云可發汗而無湯者丸散亦可用要以汗出爲解然不及湯隨證良驗凡病無故自汗出復發其汗愈衞復和故也

夫脉浮者病在外可發汗宜桂枝湯

夫陽脉浮大而數者亦可發汗爲宜桂枝湯

病常自汗出者此爲榮氣和榮氣和而外不解此爲衞氣不和也榮行脉中衞行脉外復發其汗衞和則愈宜桂枝湯

病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衞氣不和故

也先其時發汗則愈宜桂枝湯
太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故令汗出欲救邪風宜
桂枝湯
太陽病頭痛發熱汗出惡風寒宜桂枝湯
太陽病下之微喘者表未解也宜桂枝加厚朴杏人湯
太陽病外證未解者不可下宜桂枝湯
太陽病先發其汗不解而下之其脉浮者不愈浮為在外而
反下之故令不愈今脉浮故在外當須解其表則愈宜桂枝湯
太陽病下之氣上衝者可與桂枝湯不上衝不可與
凡桂枝本為解肌若脉浮緊發熱無汗者勿與之常知此勿
誤也
凡酒客勿與桂枝湯若服必嘔
凡服桂枝湯吐者後必吐膿血也

桂枝湯治中風其脉陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗
自出濈濈惡風淅淅惡寒翕翕發熱鼻鳴乾嘔方

桂枝　芍藥　生薑各三兩　甘草二兩

大棗十二枚

右五味㕮咀三物切薑擘棗以水七升煮棗令爛去滓乃
內諸藥水少者益之煮令微沸得三升去滓服一升日三
小兒以意減之初服少多便得汗出者小閣其間不得汗
者小促其間令藥熱相及汗出自護如法特須避風病若
重宜夜服若服一劑不解疾證不變者當復服之至有不
肯汗出服兩三劑乃愈服此藥食頃飲熱粥以助藥力

治傷寒頭及腰痛身體骨節疼發熱惡寒不汗而喘麻黃湯方

麻黃三兩　桂心　甘草各一兩　杏人七十枚喘不甚用五十枚

右四味㕮咀以水九升先煮麻黃減二升去沫內諸藥煮取

二升半絞去滓服八合覆令汗
大青龍湯治中風傷寒脉浮緊發熱惡寒身體疼痛汗不出而煩躁方

麻黃六兩　桂心　甘草各二兩　石膏如雞子一枚碎
生薑三兩　杏人四十枚　大棗十二枚

右七味㕮咀以水九升煮麻黃去沫乃內諸藥煮取三升分服一升厚覆當大汗出溫粉粉之即止不可再服服之則筋惕肉瞤此為逆也不汗出乃再服
陽毒湯治傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下之後變成陽毒身重腰背痛煩悶不安狂言或走或見鬼或吐血下痢其脉浮大數面赤斑斑如錦文咽喉痛唾膿血五日可治至七日不可治宜服升麻湯方

升麻　甘草各半兩　當歸　蜀椒

雄黃　桂心　鼈甲有鼈甲手大一片附後与千金六銖鼈甲如手一片　各六銖
右六味㕮咀以水五升煮取二升半分三服如人行五里進一服溫覆手足毒出則汗汗出則解不解重作服之得吐亦佳仲景無桂心有鼈甲手大一片附後与千金同古今録驗有旒子六銖鼈甲如手一片
陰毒湯治傷寒初病一二日便結成陰毒或服藥六七日已上至十日變成陰毒身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脉沈細緊數仲景云此陰毒之候身如被打五六日可治至七日不可治也甘草湯方

甘草　升麻各半兩　當歸　蜀椒各六銖
鼈甲一兩
右五味㕮咀以水五升煮取二升半分三服如人行五里頃更進一服溫覆取汗毒當從汗出汗出則愈若不汗則

不除重作服仲景方去蜀椒

陰旦湯治傷寒肢節疼痛內寒外熱虛煩方

芍藥　甘草各二兩　乾薑　黃芩各三兩
桂心四兩　大棗十五枚

右六味㕮咀以水一斗煮取五升去滓溫服一升日三夜再覆令小汗

陽旦湯治傷寒中風脈浮發熱往來汗出惡風頭項強鼻鳴乾嘔桂枝湯主之隨病加減如左

以泉水一斗煮取四升分服一升日三自汗者去荏枝加栝樓根三兩利者去芍藥桂加乾附子一枚渴者去桂加茯苓四兩虛勞悸者去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急正陽旦主之煎得二升內膠飴半斤爲再服若脈浮緊發熱者不可與之

六物解肌湯治傷寒發熱身體疼痛方

葛根四兩　茯苓三兩　麻黃一兩　黃芩　芍藥
生薑各二兩　甘草一兩　大棗十二枚

右六味㕮咀以水八升煮取三升分三服再服後得汗汗通即止古今錄驗無生薑甘草

解肌湯治傷寒溫病方

葛根四兩　麻黃一兩　黃芩　芍藥
甘草各二兩　大棗十二枚

右六味㕮咀水一斗煮取三升飲一升日三服三四日不解脈浮者宜重服發汗脈沈實者宜以馱吃丸下之有桂心一兩延年錄

治傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脈盛始得一二日者方

丹砂一兩末之以水一斗煮取一升頓服之覆取汗

治疫氣傷寒三日已前不解者方

好豉一升綿裹　小男兒尿三升

徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻　芍藥

甘草一兩　杏人三十枚

右七味㕮咀以水三升煮取一升盡服溫覆發汗便愈

葛根龍膽湯治傷寒三四日不差身體煩毒而熱方

葛根八兩　龍膽

石膏　菱蕤一兩

芍藥　黃芩

右十二味㕮咀以水一斗煮葛根取八升內餘藥煮取三

升分四服日三夜一

治傷寒四五日頭痛壯熱四肢煩疼不得飲食方

梔子人　黃連

好豉一升　葱白七莖

右六味㕮咀以水八升煮上四物六七沸內後葱白豉煮

得三升頓服一升日三服湯訖溫覆令汗出粉之得汗便

止後服勿復取汗不得汗者復服重發此藥無忌特宜老

小神良

治夏月傷寒四肢煩疼發熱其人喜煩嘔逆支滿劇如禍祟

寒熱相搏故令喜煩七物黃連湯方

黃連　茯苓

葛根一兩六銖　甘草一兩六銖　小麥三合

右各㕮咀以水七升煮取三升冷分三服不能一升者可

黃芩一兩八銖　芍藥

稍稍服之湯勢安乃卧藥圭毒氣服湯之後肖中熱及咽
咳痛皆差其明日復煮一劑如法服之服此湯無毒但除
熱下氣安病人小兒服者取三分之一以水四升煮得二
升稍稍服

三七湯治傷寒中風得之三日至七八日不解肖脅痛四肢
逆乾嘔水漿不下腹中有宿食不消重下血一日數十行方

茯苓（如雞子大） 黃芩（一兩） 人參（三兩） 括樓根（四兩）
芒消 乾地黃（一兩） 大黃 麻黃

寒水石（一斤）

右九味擣篩令相得以散三方寸匕水一升煮令三沸絞
去滓服之日三温覆汗出即愈病劇與六七七

五香麻黃湯治傷寒忽發腫或著四肢或在肖背虛腫浮如
吹狀亦著頭面脣口頸項劇者偏著脚脛外如軸大而不痛
不赤著四肢者乃欲不遂乘主之方

麝香（研） 薰陸香 雞舌香（一兩） 沈香
青木香 麻黃 防風 獨活
秦艽 茅朮 甘草（二兩） 白薇

枳實（洛二兩）

右十三味㕮咀以水九升煮取三升分三服覆取汗後外
摩防已膏

治傷寒三日外與前藥不差脉勢仍數者陽氣猶在經絡未
入藏腑方

桂枝 黃芩 甘草（二兩） 升麻
葛根 生薑（洛三兩） 芍藥（六兩） 石膏（八兩）
栀子（二七枚）

右九味㕮咀以水九升煮取二升七合分二服相去十里

久若前兩服訖即得汗後服即停不得汗更進一服得汗即止不得汗者明日去梔子加麻黃二兩足水二升再依方服

治傷寒雪煎方

麻黃 斤十 杏人 四斗 大黃 一斤十三兩 如金色者

右三味㕮咀以雪水五斛四斗漬麻黃於東向竈釜中三宿內大黃攪令調炊以桑薪煮得二斛汁去滓復內釜中擣杏人內汁中復炊之可餘六七斗汁絞去滓置銅器中又以雪水三斗合煎之攪令調得二斗四升藥成可丸冷凝丸如彈丸有病者以三沸白湯五合研一丸入湯中適寒溫服之立汗出若不愈者復服一丸密盛藥勿令泄氣

發汗丸第六 方二首

神丹丸治傷寒救濇惡寒發熱體疼者方

附子 烏頭 各四兩 人參 茯苓

半夏 各五兩 朱砂 一兩

右六味末之蜜丸以眞丹爲色先食服如大豆二丸生薑湯下日三須臾進熱粥二升許重覆汗出止若不得汗汗少不解復服如前法若得汗足應解而不解者當服桂枝湯此藥多毒熱者令飲水寒者溫飲解之治瘧先發服二丸 要略用細辛不用人參別有射罔條逆 棗大一枚名赤丸主寒氣厥逆水解丸方

治傷寒五六日以上不解熱在脅中口噤不能言惟欲飲水爲壞傷寒醫所不能治爲成死人精魂已竭心下纔溫以杖發其口開灌藥咽中藥得下則愈麥奴丸一曰黑奴丸二曰

釜底墨 竈突墨 梁上塵 大黃

麥奴 黃芩 芒消 各一兩 麻黃 二兩

右八味末之蜜丸如彈子大以新汲水五合研一丸破漬

置水中當藥消盡服之病者渴欲飲水極意不問外數欲
止復強飲能多飲爲善不欲飲水當強飲之服藥須臾當
寒寒竟汗出便解若服藥日移五尺許不汗復服如前法
不過再三服佳小麥黑豉名麥奴

宜吐第七 例一首 方五首 證五條

例曰大法春宜吐凡服吐藥中病便止不必盡劑也
病如桂枝證頭不痛項不強而脉寸口浮胸中鞕滿氣上衝
喉咽不得息者此以內有久痰宜吐之
病胸上諸寒胸中懨懨而痛不能食欲得使人按之按之反
有涎出下利日十餘行而其人脉遲寸脉微滑者此宜吐之
吐之利即止
少陰病飲食入口則吐心中愠愠然欲吐復不能吐者宜吐之
宿食在上管宜吐之

病手足逆冷脉乍結者客氣在胸中心下滿而煩飢不能食
者以病在胸中宜吐之
病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胸中痞堅氣上撞咽
喉不得息者此爲胸有寒也宜吐之瓜蒂散方

瓜蒂 赤小豆 酪一

右二味治下篩取一錢匕香豉一合熟湯七合煮作稀粥
去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止 張文仲以白湯三合和服

甘遂 兩半 白芷 一兩

右二味治下篩水服方寸匕須臾令病人飲冷水腹滿即
吐之小便當赤 一名濯腸湯 治大急者
藜蘆丸治湯寒不得吐方

藜蘆　附子　各一兩

右二味末之蜜和如豌豆大傷寒不食服二丸不知增之此謂得病一日已上四日已來服藥後日移三丈不吐進熱粥汁發之

治傷寒温病三四日肖中惡欲令吐者服酒膽方

醇苦酒半升　猪膽一具

右二味盡和飲之吐即愈

又方

取比輪錢一百五十七枚以水一斗煮取七升分服汁盡須臾復以水五升更煮錢令得一升復以水二升投中合三升出錢飲之當吐毒即愈

宜下第八例一首方八首　諸證十二條

例曰大法秋宜下凡下以湯勝丸散也中病便止不必盡劑也

傷寒有熱而小腹滿應小便不利者爲無血也小便不利令反利者此爲有血也當須下之宜抵當丸

太陽病身黃脉沈結小腹堅滿小便不利者爲無血也小便自利其人如狂者爲血證諦也屬抵党湯下之

太陽病不解熱結在膀胱其人如狂其血自下即愈其外不解尚未可攻當先解其外外已解但小腹結者可攻之

陽明病脉遲雖汗出不惡寒體必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足戞然汗出者大便已堅宜承氣湯若汗多而微熱惡寒者爲外未解也桂枝湯主之其熱不潮未可與承氣若腹大滿而不大便者可少與承氣湯微和其胃氣勿令大下

陽明病潮熱大便微堅者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與承氣湯腹中轉失氣者

爲有燥屎乃可攻之若不轉氣者此爲頭堅後溏不可攻之
也攻之必脹滿不能食欲飲水者即噦其後發熱者大便必
復堅宜與少承氣和之不轉氣者慎勿攻之
陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令
喜忘屎雖堅大便必黑宜抵當湯下之
陽明病發熱汗出者此爲越熱不能發黃但頭汗出身無汗
劑頸而還小便不利渴引水漿者此爲瘀熱在裏身必發黃
少陰病得之二三日口燥咽乾急下之宜承氣湯
少陰病得之六七日腹滿不大便者急下之宜承氣湯
夫實則讝語虛則鄭聲鄭聲重語也直視讝語喘滿者死下
痢者亦死
傷寒四五日脉沈喘滿沈爲在裏而反發汗津液越出大便
爲難表虛裏實久則讝語
大承氣湯主熱盛腹中有燥屎讝語者方
大黃四兩　厚朴八兩　枳實五枚　芒消五合
右四味�mark咀以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煎
取二升去滓下芒消更煎一兩沸分再服得快利止
抵當丸方
水蛭二十枚　桃仁二十枚　虻虫二十枚　大黃三兩
右四味末之蜜和合分爲四丸以水一升煮一丸取七合
頓服之睟時當下血不下更服
抵當湯方
水蛭三十枚　桃仁二十枚　虻虫二十枚　大黃三兩
右四味㕮咀以水五升煮取三升去滓服一升不下更服
承氣湯方

枳實五枚　大黃四兩　芒消半升

右四味㕮咀以水五升煮取二升去滓適寒溫分三服如人行五里進一服取下利爲度若不得利盡服之

生地黃湯治傷寒有熱虛羸少氣心下滿胃中有宿食大便不利方

生地黃斤三　大黃四兩　芒消二合　大棗二枚　甘草一兩

右五味合擣令相得蒸五升米下熟絞取汁分再服

傷寒七八日不解默默心煩腹中有乾糞讝語大柴胡加萎蕤知母湯方

柴胡半斤　黃芩　芍藥各三兩　半夏半升　生薑五兩　大黃　甘草各一兩　萎蕤　知母各二兩　人參三兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升去滓服一升日三取下爲效集驗用枳實四枚不用芍藥

傷寒頭痛壯熱百節疼痛方

柴胡四兩　升麻　芍藥各三兩　大青　黃芩　知母　梔子人各四兩

治傷寒留飲宿食不消駐鼓方

香豉一升　石膏八兩　杏人卒枚　黃芩　豆豉一升　巴豆三百枚今用二百枚　麻黃各二兩　芒消

右十味㕮咀以水九升煮取二升七合分溫三服若熱盛加大黃四兩

黃連　大黃　甘遂各三兩

右九味末之以蜜和丸如大豆服二丸不得下者增之崔氏

云此黃耆湯方

發汗吐下後第九 脈證七條 灸法一首 方十七首

傷寒已解半日許復悉煩熱其脈浮數者可更發汗宜桂枝湯
凡發汗後飲水者必喘宜愼也
治發汗後表裏虛煩不可攻者但當與竹葉湯方

竹葉 二把　人參　石膏 一斤　麥門冬 一升　生薑 四兩　甘草 二兩　半夏 半升

右七味㕮咀以水一斗煮取六升去滓內粳米半升米熟
去之分服一升日三 張文仲無生薑

服桂枝湯大汗後脈洪大者與桂枝湯若形如瘧一日再發
汗出便解者屬蜀桂枝二麻黃壹湯方

桂枝 一兩十七銖　麻黃 一兩十六銖　杏人 十六枚　大棗 十五枚　芍藥 一兩六銖　甘草 一兩二銖　生薑 一兩六銖

右七味㕮咀以水五升煮麻黃再沸去沫內諸藥煮取二
升適寒溫分再服取微汗而已
小青龍湯治傷寒表未解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴
或痢或噎或小便不利小腹滿或喘者小青龍湯方

桂心 三兩　半夏　五味子 半升　麻黃

甘草　乾薑　芍藥　細辛 各三兩

右八味㕮咀以水一斗煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮
取三升分三服相去十里頃復服之若渴者去半夏加栝
樓根三兩若微痢去麻黃加荛花如一雞子熬令赤色若
噎加附子一枚若小便不利小腹滿者去麻黃加茯苓四
兩若喘去麻黃加杏人半升數用神效

麻黃 四兩　杏人 五十枚　石膏 半斤　甘草 二兩
治傷寒發汗出而喘無大熱麻黃杏人石膏甘草湯方

右四味咬咀以水七升先煮麻黃令減二升內諸藥煎取
三升分三服
發汗若下後煩熱胷中窒氣逆搶心者梔子湯方
梔子十四枚 香豉四合綿裹
右二味以水四升煮梔子取二升半內豉煮取一升半分
二服温進一服得快吐止後服
治發汗後腹脹滿厚朴湯方
厚朴八兩 半夏半升 生薑八兩 甘草二兩
人參一兩
右五味咬咀以水一斗煮取三升分三服
太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振
振欲擗地屬玄武湯方
茯苓 芍藥 生薑各三兩 白朮二兩
附子一枚
右五味咬咀以水八升煮取二升温服七合
太陽病反下之利遂不止脉促者表未解喘而汗出者葛根
黃連湯方
葛根半斤 黃芩 黃連各三兩 甘草二兩
右四味咬咀以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取三
升去滓分再服
傷寒發汗吐下後心下逆滿氣上衝胷起即頭眩其脉沈緊
發汗則動經身爲振搖者茯苓湯方
茯苓四兩 桂心各三兩 甘草二兩
白朮
右四味咬咀以水六升煮取三升去滓分三服
凡寸口脉浮關上自沈爲結胷巢源作沈細
凡傷寒病發於陽而反下之熱入因作結胷

結胸病項亦強如柔痙狀下之即和宜大陷胸丸方

大黃八兩　芒消　杏人　葶藶各五合

右四味擣篩二物別研杏人芒消如脂和散取如彈丸大一枚甘遂末一錢匕白蜜二合水一升煮取八合溫頓服之病乃自下如不下更服取下爲效

傷寒六七日結胸熱實其脉沉緊心下痛按之正堅宜大陷胸湯

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上乾而渴日晡所小有潮熱心下至小腹堅滿而痛不可近宜大陷胸湯方

甘遂末一錢匕　大黃六兩切　芒消一升

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒消一沸內甘遂分再服一服得快利後服

傷寒中風醫反下之其人下痢日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞堅結滿乾嘔心煩不能得安師見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆使之然也宜甘草瀉心湯方

甘草四兩　黃芩　半夏半升　大棗十二枚

乾薑一兩　黃連一兩

治傷寒發汗後胃中不和心下痞堅乾噫食臭脅下有水氣腹中雷鳴下痢者屬生薑瀉心湯方

生薑四兩　甘草三兩　人參三兩　乾薑一兩　半夏半升　黃連一兩　黃芩三兩　大棗十二枚

右八味咬咀以水一斗煮取六升去滓分服一升日三

傷寒吐下後七八日不解結熱在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升宜白虎湯方

石膏一升　知母六兩　甘草二兩　粳米六合

右四味㕮以水一斗煮米熟去滓分服一升日三諸亡血及虛家不可與白虎湯若立夏後至立秋前得用之立秋後不可服春三月尚凜冷亦不可與之與之嘔利腹痛

傷寒無大熱而口乾渴心煩背微惡寒宜白虎湯

傷寒脉浮發熱無汗其表不解不可與白虎湯渴欲飲水無表證宜白虎湯

若渴欲飲水口燥舌乾者亦宜白虎湯

治傷寒後結熱在內煩渴青箱子丸方

青箱子五兩　黃芩　苦參　栝樓根各一兩　黃蘗二兩　龍膽　黃連　梔子人各三兩

右八味末之蜜丸先食服如梧子大柒丸日三不知稍加一本云餳和為丸

傷寒熱病十日已上發汗不解及吐下後諸熱不除及下利不止斑出皆治之大青湯方

大青四兩　甘草　阿膠各二兩　豆豉一升

右四味以水八升煮取三升去滓煮三沸去豉內阿膠令烊頓服一升日三服欲盡復作常使有餘渴者當飲

但除熱止吐下無毒深師治勞復肘後有赤石脂三兩胡洽集驗同

治傷寒後不了了朝夕有熱如瘧狀方

知母二兩　麻黃　黃芩　桂心各一兩　甘草　芍藥

右六味㕮以水七升煮取二升半服五合日三溫覆令微汗若心煩不得眠其人欲飲水當稍稍飲之令胃中和

則愈

江南諸師秘仲景要方不傳

初得病或先頭痛身寒熱或濇濇欲守火或腰背强直面目如飲酒狀此傷寒初得一二日但列火灸心下三處第一處去心下三寸名胃管各灸五十壯然或人形大小不同恐寸數有異可繩度隨其長短寸數最佳取繩從心頭骨名鳩尾頭度取臍孔中屈繩取半當繩頭名胃管又中屈半繩更分爲二分從胃管向上度一分即是上管又上度取一分即是巨闕大人可灸五十壯小兒可三壯亦隨其年灸之大小以意斟量也若病者三四日以上宜先灸胷上二十壯以繩度鼻正上盡髮際中屈繩斷去半便從髮際入髮中灸繩頭名曰天聰又灸兩顳顬又灸兩風池又灸肝輸百壯餘處各二十壯又灸大衝三十壯神驗

備急千金要方卷第十 傷寒 下

朝奉郎守太常少卿兼秘閣校理判登聞檢院護軍賜緋魚袋臣林億等校正

傷寒雜治第一 下利 熱毒 嘔噦 攻手足 毒腫 咽痛 口苦 口乾 汗不止 盜汗附 班出 跳豆瘡 鼻衄 唉閉 虛腫 食易 忌陰陽 理髮附

勞復第二

百合第三

傷寒不發汗變成狐惑第四

傷寒發黃第五

溫瘧第六

溪毒證第七

傷寒雜治第一 論一首 灸法一首 方五十一首

論曰凡除熱解毒無過苦酢之物故多用苦參青葙艾梔子

葶藶苦酒烏梅之屬是其要也夫熱盛非苦酢之物不解也

熱在身中既不時治治之又不用苦酢之藥此如救火不以水也必不可得脫免也又曰今諸療多用辛甘薑桂人參之屬此皆貴價難得常有比行求之轉以失時而苦參青葙萇蘼艾之屬所在盡有除熱解毒最良勝於向貴價藥也前後數參並用之得病內熱者不必按藥次也便以青葙苦參艾苦酒療之但稍與促其間無不解也偏鵲曰病在腠理湯熨之所及病在骨髓無可奈何而凡醫治病或言且待使病成乃頓去之此為妄矣當預約束家中及所部曲具語解此意使有病者知之為要

治溫氣病欲死方

苦參二兩以酒二升煮取一升盡飲之當吐則除諸毒病服之覆取汗皆愈 張文仲及肘後云治熱毒氣垂死破棺千金湯

治熱病五六日已上苦參湯方

苦參三兩 黃芩二兩 生地黃八兩

右三味㕮咀以水八升煎取三升適寒溫服一升日再

凝雪湯治時行毒病七八日熱積聚胷中煩亂欲死起死人

揖湯方

芫花一升以水三升煮取一升半漬故布薄胷上不過三薄熱即除當温煖四肢護厥逆也

治傷寒中風五六日已上但胷中煩乾嘔栝樓湯方

栝樓實一枚 黃芩 甘草各三兩 生薑四兩

大棗十二枚 柴胡半斤

右六味㕮咀以水一斗二升煮取五升絞去滓適寒溫服一升日三

治傷寒後嘔噦及胃及乾嘔不下食蘆根飲子方

生蘆根切 青竹筎各一升 粳米三合 生薑三兩

右四味以水七升先煮千里鞋底一隻取五升澄清下藥煮取二升半隨便飲不差重作取差

治傷寒後嘔噦方

通草三兩　生薑根切一升　橘皮一兩　粳米三合

右四味㕮咀以水五升煮取二升隨便稍飲不差更作取差止

治傷寒後虛羸少氣嘔吐方

石膏一升　竹葉二把　麥門冬一升　人參二兩　半夏一升

右五味㕮咀以水一斗煮取六升去滓內粳米一升米熟湯成飲一升日三服一方加生薑五兩（此方正是仲景竹葉湯方前卷汗後門中已有此方仍少甘草分兩小別）

治毒熱攻手足赤腫燃熱疼痛欲脫方

煮馬屎若羊屎汁漬之日三度

又方

猪膏和羊屎塗之亦佳

又方

濃煮虎杖根適寒溫以漬手足令至踝上一尺止

又方

取酒煮苦參以漬之

又方

稻穰灰汁漬之一名蒼耳

又方

取常思草絞取汁以漬之

瀉蠱連翹湯治時行熱毒變作赤色癮疹丹軫毒腫及眼赤痛生瘡腫膿方

瀉蠱　連翹　黃芩　麻黃　白斂　升麻

甘草 酪二 枳實 大黃 酪三
右九味㕮咀以水九升煮取三升分三服相去五里久更
服熱盛者可加芒消二兩
治傷寒五六日斑出猪膽湯方
猪膽 苦酒 各三 雞子 一枚
右三味合煎三沸強人盡服之羸人須煎六七沸分爲二
服汗出即愈
治久及六畜時氣熱病豌豆瘡方
濃煮黍穰汁洗之一並是穅穰即不差瘡若黑者搗
蒜封之
又方
煮甘草洗之
治熱病後發豌豆瘡方
黃連三兩以水二升煮取八合頓服之
又方
眞波斯青黛大如棗水服之差
又方
青木香二兩以水三升煮取一升頓服之
又方
若赤黑發如疥大痛(作)煞者煎羊脂摩傳之
又方
小豆屑雞子白和傅
又方
婦人月水帛拭之
又方
小兒著取月水汁和水浴之

治瘡出煩疼者木香湯方

青木香二兩　薰陸香丁香　礬石酪一　麝香半兩

右五味㕮咀以水四升煮取一升半分再服熱毒盛者加犀角一兩無犀角以升麻代病輕者去礬石神驗

又方

瘡上與芒消和豬膽塗勿動痂落無痕仍卧黃土末上良此病小便澀有血者內瘡瘡皆黑厭不出膿者死不治也

治內發瘡盛方

酢四合　大豬膽一具

右二味合煎三沸服一合日五服之良驗

治豌豆瘡初發覺欲作者方

煮大黃五兩服之愈

治時行病發瘡方

取好蜜徧身摩瘡上亦可以蜜煎升麻摩之并數數食之

熱病後發豌豆瘡灸兩手腕研子骨尖上三壯男左女右

治傷寒鼻衄肺間有餘熱故也熱因血自上不止用此方

牡蠣一兩半　石膏一兩六銖

右二味治下篩酒服方寸匕日三四亦可蜜丸服如梧子大用治大病差後小勞便鼻衄

治傷寒熱病唉中痛閉塞不通方

生烏扇一斤切　猪脂一斤

右二味合煎藥成去滓取如半雞子薄綿裹之內唉中稍稍咽之取差

又方

升麻三兩　通草四兩　射干二兩　芍藥　羚羊角各三兩
生蘆根切一升

右六味㕮咀以水七升煮取二升半分三服
治熱病口中苦下氣除熱喉中鳴煎方

石膏半斤　蜜一升

右二味以水三升煮石膏取二升乃內蜜復煎取如餳含
如棗核盡復含之大良
治傷寒熱病後口乾喜唾咽痛方

大棗二十枚　烏梅十枚

右二味合擣蜜和含如杏核大咽其汁甚驗
傷寒服湯藥而下利不止心下痞堅服瀉心湯竟復以他藥
下之利不止醫以理中與之而利益甚理中治中焦此利在
下焦赤石脂禹餘粮湯主之方

赤石脂禹餘粮各一斤碎

右二味以水六升煮取二升分三服若不止當利小便
治傷寒後下利膿血方

阿膠一兩　薤葉三兩　黃連四兩　梔子人廿四枚

右四味㕮咀以水六升煮取二升去滓內阿膠更煎令消
分為三服甲乙方无黃芩有黃芩

治赤白下膿小兒得之三日皆死此有蟲垂在下部方

麝香　礬石　巴豆　附子　真珠　雄黃

右六味等分治合取桑條如箭簳長三寸以綿纏頭二寸
唾濡綿展取藥著綿上內穀道中半日復易之日再神效
治傷寒六七日其人大下後脉沈遲手足厥逆下部脉不至
咽喉不利唾膿血泄利不止為難治麻黃升麻湯方

麻黃　知母　菱藕一作蒲　黃芩各三兩　升麻

芍藥 當歸 乾薑 石膏
白朮 桂心 甘草 麥門冬 各二兩 茯苓
右十四味㕮咀以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升分服一升微取汗愈

治温毒及傷寒內虛外熱攻胃下黃赤汁及爛肉汁赤滯下伏氣腹痛諸熱毒方
梔子 十枚 豉 一升 薤白 一握
右三味以水四升煮梔子薤白令熟內豉煮取二升半分三服頻服取差

治病後虛腫方
豉五升醇酒一斗者煮三沸及熱頓服不耐酒者隨性覆取汗

治汗不止方
地黃三斤切以水一斗煮取三升分三服

又方
白朮葉作飲飲之

又方
白朮方寸匕以飲服之

治卒得汗不止方
温酒服牛羊脂

又方
服尿亦止

治盜汗及汗無時方
韭根四十九枚水二升煮一升頓服

又方
豉一升以酒三升漬三日服不差更合服不過三劑止

又方

死人席緣灰煮汁洗身差

止汗方

杜仲　牡蠣　等分

右二味治下篩夜卧以水服五錢匕

又方

麻黃根　牡蠣　雷丸　各三兩　乾薑　甘草　各一兩

米粉二升

右六味治下篩隨汗處粉之

牡蠣散治卧即盜汗風虛頭痛方

牡蠣　白朮　防風　各三兩

右三味治下篩酒服方寸匕日二止汗之驗無出於此方

一切泄汗服之三日皆愈神驗

論曰凡熱病新差及大病之後食猪肉及羊血肥魚油膩等必當大下利醫所不能治也必至於死若食餅餌粢黍諸果物脯脩及堅實難消之物胃氣尚虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃氣虛冷大利難禁不下之必死下之復危皆難救也熱病及大病之後多坐此死不可不慎也

病新差後但得食糜粥寧少食令飢慎勿飽不得他有所食雖思之勿與之也引日轉多可漸食羊肉白糜若羹汁雉兎鹿肉不可食猪狗肉也新差後當靜卧慎勿早起梳頭洗面非但體勞亦不可多言語用心使意勞煩凡此皆令人勞復故督郵顧子獻得病已差未健詣華叟視脉曰雖差尚虛未得復陽氣不足慎勿勞事餘勞尚可女勞則死當吐舌數寸

其婦聞其夫差從百餘里來省之經宿交接中間三日發熱口噤臨死舌出數寸而死病新差未滿百日氣力未平復而以房室者略無不死有士蓋正者疾愈後六十日已能行射獵以房室則吐涎而死及熱病房室名爲陰陽易之病皆難治多死近者有一士大夫小腹急痛手足拘拳而死來自謂平復以房室即小腹急痛手足拘拳而死時病差後未滿五日食一切肉麪者病更發大困時病差後新起飲酒及韭菜病更復時病新差食生魚鮓下利必不止時病新差食生菜令顏色緑身不平復時病新汗解飲冷水者損心包令人虛不復時病新差食生棗及羊肉者必膈上作熱蒸時病新差食犬羊等肉者作骨中蒸熱

時疾新差食魚肉與瓜生菜令人身熱

時疾新差食蒜鱠者病發必致大困

黃龍湯治傷寒差後更頭痛壯熱煩悶方 仲景名湯

柴胡一斤　半夏半升　黃芩三兩　人參

甘草各二兩　生薑四兩　大棗十二枚

右七味㕮咀以水一斗煮取五升去滓服五合日三不嘔

補大病後不足虛勞方 萬病虛勞同用

取七歲已下五歲已上黃牛新生者乳一升以水四升煎

取一升如人體溫稍稍飲之不得過多十日服不絶爲佳

治傷寒溫病後勞復或食或飲或動作方

梔子人二十枚　石膏五兩　鼠屎大者二十枚

香豉一升

右四味㕮咀以水七升煮取三升分三服

治病後勞復或因洗手足或梳頭或食等勞復方

取洗手足汁飲一合又取頭中垢如棗核大吞一枚

枳實梔子湯治大病差後勞復者方

枳實三枚　梔子十四枚　豉一升綿裹

右三味㕮咀以酢漿七升先煎減三升次內枳實梔子煮取二升次內豉煮五六沸去滓分再服覆取汗如有宿食者內大黃如博棊子五六枚

治病新差遇美飲食食過多食復者方

取所食餘燒作末飲調服二錢匕日三服

治新差早起及食多勞復方

豉五合　鼠屎二十一枚

右二味以水二升煮取一升盡服之溫卧令小汗愈

子七枚尤良肘後有麻子八水一升亦可內枳實三枚葱白一虎口

治重病新差早起勞及飲食多致復欲死方

燒鼈甲末服方寸匕

治食大飽不消勞復脉實者方

豉一升　鼠屎二十枚　梔子七枚　大黃三兩

右四味㕮咀以水六升煮取二升分三服微取汗應小鴨

溏者止不溏者復作

治勞復垂死方

煖湯三合洗四五歲女子陰取汁內口中服即愈小

男兒亦得

治勞復起死人麥門冬湯氣欲絕用有效方

麥門冬一兩　京棗二十枚　竹葉切一升　甘草二兩

右四味㕮咀以水七升煮取三升去粳米一升令熟去米內諸藥煎

取三升分三服不能服者綿滴湯口中

治食勞方

麴一升煮取汁服之

又方

杏人五十枚以酢二升煎取一升服之取汗

又方

燒人屎灰水服方寸匕

欲令病人不復方

燒頭垢如梧子大服之不能食方

治傷寒差後一年心下停水不

生地黃五斤　白朮一斤　好麴二斤

右三味合擣相得暴乾下篩酒服方寸匕日三加至二匕

論曰婦人温病雖差未苦平復血脉未和尚有熱毒而與之

交接得病者名爲陰易之病其人身體重熱上衝胸頭重不能舉眼中生眵曐曐四肢腰一云膝脛拘急小腹絞痛手足拳皆即死其亦有不即死者病苦少腹裏急熱上衝胸頭重不欲舉百節解離經脉緩弱血氣虛骨髓竭便嘘嘘吸吸氣力轉少著牀不能動搖起止仰人或引歲月方死醫者張苗說有婢得病差後數十日有六人姦之皆死

婦人得病易夫夫丈夫得病亦易婦人治之方

取女人中褌近隱處燒服方寸匕日三小便即利陰頭微腫此爲愈矣女人病可取男褌一如此法

治交接勞復陰卵腫縮腹中絞痛便欲死方

取所交接婦人衣裳以覆男子立愈

令病人不復方

取女人手足爪二十枚女人中衣帶一尺燒以酒若

米飲汁服

治男子新病起近房內復者方

取女人月經赤帛燒服方寸匕亦治陰勿腫縮入腹

絞痛欲死

治病後頭亂不可理通頭法

生麻油二升將頭髮解開安銅沙羅中用油淹漬之髮斯須並自通

細細將釵子領髮斯須並自通

百合第三 論二首 方七首

論曰百合病者謂無經絡百脉一宗悉致病也皆因傷寒虛勞大病已後不平復變成斯病其狀惡寒而嘔者病在上焦也三十三日當愈其狀腹滿微喘大便堅三四日一大便時復小溏者病在中焦也六十三日當愈其狀小便淋瀝難者病在下焦也三十三日當愈各隨其證以治之百合之為病令人意欲食復不能食或有美時或有不用聞飲食臭時如有寒其實無寒如有熱其實無熱常默默欲卧復不得眠至朝口苦小便赤澀欲行復不能行諸藥不能治之即劇吐利如有神靈所為也百合病身形如和其脉微數其候每潟時即頭覺痛者六十日乃愈百合病候之潟時頭不覺痛漸然寒者四十日愈百合病候之潟時覺快然但覺頭眩者二十日愈百合病證其人或未病而預見其候者或已病四五日而出或病一月二十日後見其候者治之喜誤也依證治之

論曰百合病見在於陽而攻其陰則陽不得解也復發其汗為逆也見在於陰而攻其陽則陰不得解也復下之其病不愈（要略云見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法解之見陽攻陰復發其汗此為逆其病難治見陰攻陽乃復下之此亦為逆其病難治）治百合病已經發汗之後更發者百合知母湯方

百合 七枚 擘　知母 三兩

右二味以泉水先洗漬百合一宿當沫出水中明旦去水取百合更以泉水二升煮百合取一升汁合和百合汁中復煮取一升半分再服不差更依法合服

百合病已經下之後更發者百合滑石代赭湯方

百合 七枚 擘　滑石 三兩　代赭 一兩

右三味先以泉水漬百合一宿去汁乃以水二升煮百合取一升去滓又以水二升煮二物取一升內百合汁如前法復煎取一升半分再服

百合病已經吐之後更發者百合雞子湯方

百合七枚擘浸一宿去汁以泉水二升煮取一升取雞子黃一枚內汁中攪令調分再服

治百合病始不經發汗吐下其病如初者百合地黃湯方

百合七枚擘浸一宿去汁以泉水二升煮取一升內生地黃汁二升復煎取一升半分再服大便當去惡沫爲候也

治百合病經月不解變成渴者方

百合根一升以水一斗漬之一宿以汁先洗病人身也洗身後食白湯餅勿與鹽豉也渴不差可用栝樓根并牡蠣等分爲散飲服方寸匕日三

治百合病變而發熱者方

百合根 乾 一兩之　滑石 三兩

右二味治下篩飲服方寸匕日三當微利利者止勿復服熱即除一本云治百合病小便赤澁臍下堅急

治百合病變腹中滿痛者方

但取百合根隨多少熬令黃色擣篩爲散飲服方寸匕日三滿消痛止

傷寒不發汗變成狐惑病第四 論一首 方三首

論曰狐惑之病其氣如傷寒嘿嘿欲眠目不得閉起臥不安其毒在喉咽爲惑病在陰肛者爲狐病狐惑之病並惡食飲不欲食聞食臭其面目翕赤翕白翕黑毒食於上者則聲嗄也一作嗌毒食下部者則乾咽也此由溫毒氣所爲食於上者用雄黃三片稍置瓦鉢中炭火燒向肛熏之并服湯也治狐惑湯方

黃連 薰草 各四兩

右二味㕮咀白酢漿一斗漬之一宿煮取二升分爲三服其人脉數無熱微煩嘿嘿但欲臥汗出初得之三四日眼赤如鴆眼得之七八日其四眥黃黑黃黑能食者膿已成也赤小豆當歸散主之方

以赤小豆三升漬之令生芽足乃復乾之加當歸三兩爲末漿水服方寸匕日三服七日三即愈

其病形不可攻不可灸因火爲邪血散脉中傷脉尚可傷藏則劇并輸益腫黃汁出經合外爛肉腐爲癰膿此爲火疽醫所傷也夫脉數者不可灸因火爲邪即爲煩因虛逐實血走脉中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也應在瀉心瀉心湯兼治下痢不止腹中幅堅而嘔吐腸鳴者方

半夏 升半 黃芩 人參 乾薑 各三兩 黃連 一兩 甘草 三兩 大棗 十二枚

右七味㕮咀以水一斗煮取六升分服一升日三 仲景略用甘草瀉心

傷寒發黃第五 論一首 證五條 方三十四首 脈圖三首

論曰黃有五種有黃汗黃疸穀疸酒疸女勞疸黃汗者身體
四肢微腫胷滿不渴汗出如黃蘗汁良由大汗出卒入水中
所致黃疸者一身面目悉黃如橘由暴得熱以冷水洗之熱
因留胃中食生黃瓜熏上所致若成黑疸者多死穀疸者食
畢頭眩心忪怫鬱不安而發黃由失飢大食胃氣衝熏所致
酒疸者心中懊痛足脛滿小便黃面發赤斑黃黑由大醉當
風入水所致女勞疸者身見黃皆黃發熱惡寒小腹滿急小便
難由大勞大熱而交接竟入水所致但依後方治之
黃汗之為病身體洪腫發熱汗出不渴狀如風水汗染衣色
正黃如蘗汁其脉自沉從何得之此病以汗出入水中浴水
從汗孔入得之

治黃汗黃者芍藥桂苦酒湯方

黃耆五兩 芍藥三兩 桂心三兩

右三味咬咀以苦酒一升水七升合煎取三升飲三升當
心煩也至六七日稍稍自除心煩者苦酒阻故也

諸病黃疸宜利其小便假令脉浮當以汗解宜桂枝加黃耆
湯方

桂枝芍藥各三兩 甘草二兩 生薑三兩 大棗十二枚

黃耆五兩

右六味咬咀以水八升煎取三升去滓溫服一升覆
取微汗須臾不汗者飲稀熱粥以助湯若不汗更服湯

治傷寒熱出表發黃疸麻黃淳酒湯方

麻黃三兩以淳酒五升煮取一升半盡服之溫覆汗

出即愈冬月寒時用清酒春月宜用水

治黃疸方

瓜蒂 赤小豆 秫米 各二七枚

右三味治下篩病重者取如大豆二枚內著鼻孔中痛縮鼻須臾當出黃汁或從口中出汁升餘則愈病輕者如一豆不差間日復用又下里間以筒使人極吹鼻中無不死大慎之 刪繁療天行毒熱通貫藏腑沈伏胃髓之間或爲黃疸黑疸赤疸白疸穀疸馬黃等病喘息須臾不絕

治黃疸大黃丸方

大黃 蓽蘧子 各二兩

右二味末之蜜和丸如梧子未食服十丸日三病差止

又方

大黃 二兩 黃連 三兩 黃蘗 一兩 黃芩 一兩 麴衣 一合

右五味末之蜜和丸如梧子先食服三丸日三不知加至

五九

茵蔯湯主黃疸身體面目盡黃方

茵蔯 黃連 各三兩 大黃 二兩 黃芩 二兩 大黃 甘草

人參 各一兩 梔子 二七枚

右七味㕮咀以水一斗煮取三升分三服日三亦治酒疸

酒癖

治黃疸身體面皆黃三黃散方

大黃 黃連 黃芩 各四兩

右三味治下篩先食服方寸匕日三亦可爲丸

五苓散主黃疸利小便方

豬苓 茯苓 澤瀉 白朮 桂心 各三十銖

右五味擣篩爲散渴時水服方寸匕極飲水即利小便及汗出愈 此方與第九卷方相重以分兩不同故再出之

秦椒散主黃疸飲少溺多方寸匕日三 古今録驗用治膏癬

秦椒六銖 瓜蒂半兩

右二味治下篩水服方寸匕日三服有人常積嚏者小半夏湯主之方

半夏半斤 生薑半斤

右二味㕮咀以水七升煮取一升五合分再服有人常積氣結而死其心上暖以此半夏湯少許汁入口遂活

黃疸變成黑疸醫所不能治者方

土瓜根擣汁一小升頓服日一服平朝服至食時病人氣力不得多服力衰則起不得從小便出先須量病人氣力不得多服力衰則起不得

治黃疸方

取生小麥苗擣絞取汁飲六七合晝夜三四飲三四日便愈無小麥穬麥亦得用

治發黃身面眼悉黃如金色小便如濃煮蘗汁衆醫不能療者方

茵蔯 梔子各二兩

大黃各三兩

右七味㕮咀以水八升煮取二升七合分三服若身躰羸去大黃加梔子人五六兩生地黃一升 延年秘録無茵蔯有梔子四兩栝樓三兩 甚消二兩近效方加枳實二兩大黃發已久變作桃皮色心下有堅嘔逆不下飲食小便極赤少四肢逆冷脉深沉極微細運者不宜服此方得下必變吪也宜與大茵蔯湯除大黃與生地黃五兩服湯盡消息看脉小浮出形小見不甚沉微便可治也脉浮見者黃當明不復作桃皮色心下自寬也 大茵蔯湯方出次後十一味者是

黃芩 柴胡 升麻

龍膽二兩

治人無漸忽然振寒發黃皮膚黃麴塵出小便赤少大便時
鬱氣力無異食飲不妨已服柴胡諸湯散餘熱不除久黃者苦參
散吐下之方

苦參 黃連 瓜蒂 黃蘗 大黃
葶藶二兩 各一兩

右六味治下篩飲服方寸匕當大吐吐者日一服不吐日
再亦得下服五日知可消息不覺退更服之小折便消息之
瘀發黃方

茵蔯 黃蘗 梔子 大黃 黃連
五兩 各二兩 各三兩 各二兩

右五味㕮咀以水九升煮取三升分三服先服湯後服丸方

黃連 茵蔯 梔子 黃芩 黃蘗
各二兩 各三兩

右六味末之以蜜丸白飲服如梧子二十九令得微利

治傷寒瘀熱在裏身躰必發黃麻黃連翹赤小豆湯方

麻黃 連翹 甘草 赤小豆 生梓白皮 生薑 大棗
各二兩 各二兩 一升 切二升 三兩 十二枚

右八味㕮咀以勞水一斗先煮麻黃去沫內諸藥煎取三
升分三服

茵蔯湯下之方

茵蔯 梔子 大黃
六兩 十四枚 三兩

右三味㕮咀以水一斗二升煮茵蔯得五升去滓內梔子
大黃煎取三升分服一升日三小便當利如皂莢汁狀色
正赤當腹減黃悉隨小便去也范汪用療穀疸小方用石髓一斤
黃家腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實當下之大
黃黃蘗梔子芒消湯方

大黃三兩　黃蘗四兩　梔子十五枚　芒消四兩

右四味㕮咀以水六升煮取二升去滓內芒消復煎取一升先食頓飲之

治時行病急黃并瘴癘疫氣及瘧茵蔯方

茵蔯　梔子　芒消各三兩　杏仁各三兩　巴豆一兩

右九味末之以餳為丸飲服三丸如梧子以吐利為佳不知加一丸神方初覺躰氣有異急服之即差

治急黃熱氣骨蒸兩目赤脉方

大黃一兩半末　生地黃汁八合　芒消一兩

右三味合和一服五合日二以利為度不須二服

風疸小便或黃或白洒洒寒熱好卧不欲動方

三月生艾一束擣取汁銅器中煎如漆密封銅器之　大黃　黃連

凝水石　栝樓根　苦參　葶藶各六

右六味末之以艾煎和先食服如梧子五丸日二可至三十丸有熱加苦參渴加栝樓小便澁加葶藶小便多加凝水石小便白加黃連大便難加大黃

濕疸之為病始得之一身盡疼發熱面色黑黃七八日後壯熱熱在裏有血當下去之如狂狂肝狀其小腹滿者急下之亦一身盡黃目黃腹滿小便不利方

礬石　滑石各五

右二味治下篩大麥粥汁服方寸匕日三當先食服之便寸口脉浮而緩浮則為痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃瘀熱以行跗陽脉緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食則滿也尺脉浮為傷腎趺陽脉緊為傷脾風寒相薄

食穀即眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其
寒熱流腑胱身故盡黃名曰穀疸
治勞疸穀疸丸方
苦參 三兩 龍膽一兩
右二味末之牛膽和爲丸先食以麥粥飲服如梧子五丸日
三不知稍加之 繁方加梔子人三枚以猪膽和丸
夫酒疸其脉浮者先吐之沈弦者先下之夫人病酒疸者或
無熱靖言了了腹滿欲吐嘔者宜吐之方煎苦參散七味者
是酒疸必小便不利其候當悶心中熱足下熱是其證也夫酒
疸下之久久爲黑疸目青面黑心中如啖蒜薤狀大便正黑
皮膚爪之不仁其脉浮弱雖黑微黃故知之
治傷寒飲酒食少飲多痰結發黃酒疸心中懊憹而不甚熱
或乾嘔枳實大黃梔子豉湯方

枳實五枚 大黃三兩 豆豉半升 梔子七枚
右四味㕮咀以水六升煮取二升分三服心中熱痰懊憹皆主之
凝水石散治肉疸飲少小便赤是酒疸者方
凝水石 白石脂 菟絲子 知母各八銖 栝樓根 桂心各三銖
茯苓 茵蔯
枳實各三十銖 半夏
蜀椒 當歸各二十銖
右六味治下篩麥粥飲服五分匕日三服五日知十日瘥
茯苓圓治心下縱橫堅而小便赤是酒疸者方
乾薑各一兩 白朮
杏人各十八銖 甘遂六銖
右十味爲末蜜和丸如梧子大空腹服三丸日三稍稍加
以小便利爲度千金翼加黃連一兩大黃十八銖名黑疸身體闇黑小便澀
半夏湯治酒癖胸脅心脹滿骨肉沈重逆害飲食乃至小便

赤黃此根本虛勞風冷飲食衝心由脾胃內痰所致方

半夏一升 生薑 黃芩 茵蔯 當歸各一兩 前胡 枳實 甘草 大戟各二兩 茯苓 白朮各三兩

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

牛膽圓治酒疸身黃麴塵出方

牛膽一枚 芫花一升 大黃八兩

右五味四味㕮咀以清酒一斗漬一宿煮減半去滓內牛膽微火煎令可丸如大豆服一九日移六七尺不知復服一丸至八丸腸上吐腸下下或不吐而自愈

大茵蔯湯治內實熱盛發黃黃如金色脉浮大滑實緊數者夫發黃多是酒客勞熱食少胃中熱或溫毒內熱者故黃如

金色方

茵蔯 黃蘗各一兩半 大黃 白朮各三兩 黃芩

栝樓根 甘草 茯苓 前胡 枳實各一兩 梔子二十枚

右十一味㕮咀以水九升煮取三升分三服得快下消息三四日更治之

茵蔯丸治氣淋膿脹腹大身躰面悉黃及酒疸短氣不得息方

茵蔯 梔子 天門冬各四兩 大黃 桂心各三兩

通草 石膏各二兩 半夏半升

右八味蒸大黃通草天門冬半夏梔子暴令乾合擣篩蜜丸服如大豆三九日三忌生魚以豆羹服不得用酒一方去石膏內滑石二兩不知加至十九

黃家至日晡所發熱而反惡寒此為女勞得之當膀胱急小腹滿體盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹膿脹而滿如欲

作水狀大便必黑時溏泄此女勞疸非水也腹滿者難治
治女勞疸消石礬石散方
消石　礬石　各半兩
右二味治下篩大麥粥汁服方寸匕日三重衣覆取汗病
隨大小便出小便正黃大便正黑
黃疸之爲病日晡所發熱惡寒小腹急身體黃額黑大便溏
黑足下熱此爲女勞腹滿者難治治之方
滑石　石膏　各等分
右二味治下篩以大麥粥汁服方寸匕日三小便樞利則差
針灸黃疸法
正面圖第一　寅門　上斷裏　上腭　舌下　脣裏　顳顬
俠人中　俠承漿　巨闕　上管　陰縫
寅門穴從鼻頭直入髮際度取通繩分爲三斷繩取一分入
髮際當繩頭針是穴治馬黃黃疸等病

上斷裏穴正當人中及脣針三銍治馬黃黃疸等病
上腭穴入口裏邊在上縫赤白脉是針三銍治馬黃黃疸四
時等病
舌下穴俠舌兩邊針治黃疸等病
脣裏穴正當承漿裏邊遍齒齦針三銍治馬黃黃疸寒暑溫
疫等病
顳顬穴在眉眼尾中間上下有來去絡脉是針灸之治四時
寒暑所苦疸氣溫病等
俠人中穴火針治馬黃黃疸疫通身並黃語音已不轉者
俠承漿穴去承漿兩邊各一寸治馬黃急疫等病
巨闕穴在心下一寸灸七壯治馬黃黃疸急疫等病
上管穴在心下二寸灸七壯治馬黃黃疸等病
男陰縫穴拔陰反向上灸治馬黃黃疸等病

若女人玉門頭是穴男女針灸無在

覆面圖第二 風府 肝輸 熱府 脾輸 肺輸 腎輸 心輸 肺後跟

風府穴在項後入髮際一寸去上骨一寸針之治頭中百病馬黃黃疸等病

熱府穴在第一節下兩傍相去各一寸五分針灸無在治馬黃黃疸等病

肺輸穴從大椎數第三椎兩傍相去各一寸五分灸主黃疸

通治百毒病

心輸穴從肺輸數第二椎兩傍相去各一寸五分

肝輸穴從心輸數第四椎兩傍相去各一寸五分

脾輸穴從肝輸數第二椎兩傍相去各一寸五分

腎輸穴從脾輸數第三椎兩傍相去各一寸五分

脚後跟穴在白肉後際針灸隨便治馬黃黃疸寒暑諸毒等病

側面圖第三 耳中 腦石子頭 頰裏 錢孔 手太陽 太衝

耳中穴在耳門孔上橫梁是針灸之治馬黃黃疸寒暑疫毒等病

頰裏穴從口吻邊入往對頰裏去口一寸針主治馬黃黃疸寒暑溫疫等病頰兩邊同法

手太陽穴手小指端灸隨年壯治黃疸

腦石子頭穴還取病人手自捉臂從腕中太澤 澤當作湍文向上一夫接白肉際灸七壯治馬黃黃疸等病

錢孔穴度乳至臍中屈肋頭骨是灸百壯治黃疸

太衝穴針灸隨便治馬黃溫疫等病

温疕第六 論一首 方三十四首 灸刺法十九首 禳疕法一首 符三首

論曰夫疕者皆生於風夏傷於暑秋爲瘧疕也問曰疕先寒而後熱者何也對曰夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒

而後傷於風故先寒而後熱
熱也病以時作名曰寒瘧問曰先
熱而後寒者何也對曰先傷於
寒也亦以時作名曰溫瘧其但
獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰癉瘧問曰夫病溫瘧
與寒瘧而皆安舍舍於何藏對曰溫瘧者得之冬中於風寒
氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能自出因遇大
暑腦髓鎖肌肉消腠理發泄因有所用力邪氣與汗皆出此
病邪氣先藏於腎其氣先從內出之於外也如是則陰虛而
陽盛盛則病矣襄則氣復反入入則陽虛虛則寒矣故先熱
而後寒名曰溫瘧問曰癉瘧何如對曰癉瘧者肺素有熱氣
盛於身厥逆上衝中氣實而不外泄因有所用力腠理開風
寒舍於皮膚之內分肉之間發則陽氣盛陽氣盛而不衰則
病矣其氣不及於陰故但熱而不寒氣內藏於心而外舍於
分肉之間令人消爍脫肉故命曰癉瘧夫瘧之且發也陰陽
之且移也必從四末始也陽已傷陰從之故氣未并先其時
一食頃用細左索緊束其手足十指令邪氣不得入陰氣不
得出過時乃解

夫瘧脈自弦也弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者可下之
弦遲者可溫之若脈緊數者可發汗針灸之脈浮大者吐之
差脈弦數者風發也以飲食消息止之

瘧歲歲發至三歲或連月發不解者以脅下有痞也治之不
得攻其痞但得虛其津液先其時發其汗服湯已先小寒者
引衣自覆汗出小便利即愈瘧者病人形瘦皮上必粟起也
病瘧以月一日發當以十五日愈設不差當月盡解也今不
愈當云何師曰此病結為癥瘕名曰瘧母急當治之鼈甲
煎丸方

成死鼈十二斤治如食法 半夏 人參 大棗各十枚 瞿麥 阿膠 紫菀一作紫蕤 牡丹皮 石韋 乾薑 大黃 厚朴 桂心 芫蜓各二錄十 蜂窠 海藻 赤小豆各一升 烏羽燒一作烏扇 黃芩各八錄十 蜚蠊 蝱蟲各三十錄要略作閒婦 蛴螬 水蛭各一升 柴胡一兩半

右二十四味末之取鍛竈下灰一斗清酒一斛五斗以酒漬灰去灰取酒著鼈其中煮鼈盡爛泯泯如漆紋去滓下諸藥煎爲丸如梧子未食服七丸日三仲景方無大戟海藻

癉而發渴者與小柴胡去半夏加栝樓根湯方

柴胡八兩 黃芩 人參 甘草 生薑各三兩 大棗十二枚 栝樓根四兩

右七味㕮咀以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升

温服一升日三

牡疸者多寒牡蠣湯主之方

牡蠣 麻黃各四兩 蜀漆三兩無以恒山代之 甘草二兩

右四味先洗蜀漆三過去腥㕮咀以水八升煮蜀漆麻黃得六升去沫乃內餘藥煮取二升飲一升即吐出勿復飲之多寒者牡疸也蜀漆散主之方

蜀漆 雲母 龍骨

右三味等分治下篩先未發一炊頃以酢漿服半錢臨發服一錢温疸者加蜀漆半分雲母取火燒之三日三夜要略不用雲母實

有癉疸者陰氣孤絕陽氣獨發而脉微其候必少氣煩滿手足熱欲嘔但熱而不寒邪氣內藏於心外舍於分肉之間令人消爍脫肉也有温疸者其脉平無寒時病六七日但見熱

也其候骨節疼煩時嘔朝發暮解暮發朝解名溫疕白虎加
桂湯主之方
石膏一斤 知母六兩 甘草二兩 粳米六合
右四味㕮咀以水一斗二升者粳米爛去滓加桂心三兩煎
取三升分三服覆令汗先寒發熱汗出者愈
麻黃湯治疕須發汗方
麻黃 栝樓根 大黃 甘草 石膏 甘草 各一兩 秫米一百粒 石膏八兩
右四味㕮咀以水七升煮取二升半分三服未發前食頃
一服臨發一服服後皆厚覆取汗
右四味㕮咀以水八升銅器中漬藥露置星月下高淨處
橫刀其上明日取藥於病人房門以銅器緩火煎取三升

分三服清旦一服未發前一食頃一服臨欲發一服三服
訖靜室中卧莫共人語當一日勿洗手面及漱口勿進食
取過時不發乃澡洗進食并用藥汁塗五心肖前頭面藥
滓置頭邊曾用神驗救急方用烏梅二七枚
又方
先作羊肉臛麪餅飽食之并進少酒隨所能其令欣
欣有酒氣入密室裏燃炭火厚覆取大汗即差
又方
燒黑牛尾頭毛作灰酒服方寸匕日三
恒山丸治瘧瘧說不可具方
恒山 知母 甘草 大黃 各十八銖 麻黃一兩
右五味末之蜜和丸未食服五丸如梧子日二不知漸增
以差爲度 大黃肘後無

梔子湯主瘧經數年不差者兩劑差一月已來一劑差方

梔子枚十四　恒山三兩　車前葉二七枚乾　秫米十四粒

右四味㕮咀以水九升煮取三升分三服未發一服發時一服發後一服以吐利四五行爲差不止冷飯止之

丸方

恒山三兩末之以雞子白和併手丸如梧子置銅椀中於湯中煮之令勃勃熟殺腥氣則止以竹葉飲服二十丸欲吐但吐至發令得三服時早可斷食時晚不可斷食可竹葉汁煮之糜少食之

治老瘧久不斷者方

恒山三兩　鼈甲一升炙　麻附子烏賊骨各一兩

右五味㕮咀絹袋盛以酒六升漬之小令近火轉之一宿成一服一合比發可數服或吐下

治瘧無問新久者方

小便半升　蜜三七

右二味煮令沸頓服每發旦平旦時服自至發勿食重者漸退不過三服差

又方

鼠尾草　車前子各一虎口

右二味㕮咀以水五升煮取二升未發前服盡

又方

馬鞭草汁五合酒三合分三服

又方

服翹搖汁

又方

擣苴若根燒爲灰和水服一合量人大小強弱用之

又方

瓜蒂二七枚擣水漬一宿服之

又方

水服桃花末方寸匕

又方

常以七月上寅日採麻花酒服末方寸匕

又方

故鞋底去兩頭燒作灰井華水服之

治瘧方

鼈甲方寸 烏賊骨寸方 附子 甘草 各一兩

恒山三兩

右五味㕮咀以酒二升半漬之露一宿明日塗五心手足過發時瘧斷若不斷可飲一合許差

蜀椒圓治勞瘧并治積勞寒熱發有時似瘧者方

蜀椒 麥門冬 知母 白薇

地骨皮 升麻 十各 鼈甲 三銖

烏梅肉 萎蕤 各一兩 甘草 恒山 一兩半 石膏二兩

豉一合

右十三味爲末蜜和丸如梧子大飲服十丸日再服之稍加至二三十丸止神驗無不瘥也加光明砂一兩

烏梅圓治寒熱勞瘧久不瘥形體羸瘦痰結胷堂食飲減少或因行遠久經勞役患之積年不瘥服之神效方

烏梅肉 豆豉 各一合 升麻 地骨皮 柴胡 鼈甲

恒山 前胡 各一兩 玄參 百合 蜀椒

桂心 人參 知母 各半兩 葳蕤 半兩 人十八枚

右十六味爲末蜜丸空心煎細茶下三十丸日二服老少

孩童量力通用無所忌

治勞瘧積時不斷衆治無效者方

生長大牛膝一握切以水六升煮取二升分再服第一服取未發前食頃第二服取臨發時

大五補湯治時行後變成瘴瘧方

桂心三十銖　遠志　桔梗各三兩　茯苓

乾地黃　芍藥　人參　白朮　當歸　黃耆各五兩　大棗二十枚　生枸杞根

生薑各一斤　麥門冬各一升

右十八味㕮咀以水三斗煮竹葉枸杞取二斗次內諸藥煎取六升分六服一日一夜令盡

鯪鯉湯治乍寒乍熱無山瘴瘧方

鯪鯉甲十四枚　烏賊骨各一兩　鼈甲三兩炙　恒山

右五味㕮咀以酒三升漬一夕發前稍稍啜之勿絕吐也兼以塗身斷食良過時乃食良飲之

治肝邪熱爲瘧令人顏色蒼蒼氣息喘悶戰掉狀如死者或久熱勞微動如瘧積年不差烏梅丸方

烏梅肉　蜀漆　鼈甲　萎蕤　知母　苦參各一兩　恒山半兩　石膏二兩　甘草一兩　細辛八銖　香豉一合

右十一味末之蜜丸如梧子酒服十九日再飲服亦得

治心熱爲瘧不止或止後熱不歇乍來乍去令人煩心甚欲飲清水反寒多不甚熱者方

甘草一兩　蜀漆三兩　恒山四兩　石膏五兩　鼈甲四兩　香豉一升　梔子

右九味㕮咀以水九升煮取三升分三服

治脾熱爲瘧或渴或不渴熱氣內傷不泄令人病寒腹中痛

腸中鳴汗出恒山丸方

恒山三兩　甘草半兩　知母　鼈甲各一兩

右四味末之蜜丸如梧子未發前酒服十九臨發時一服

正發時一服

治肺熱痰聚胷中來去不定轉爲瘧其狀令人心寒甚則發熱熱間則善驚如有所見者恒山湯方

恒山三兩　秫米二百一十粒　甘草半兩

右三味�once取三升分三服至發時令三服盡

治腎熱發爲瘧令人淒淒然腰脊痛宛轉大便難目眴眴然身掉不定手足寒恒山湯方

恒山三兩　烏梅三七枚　甘草半兩　香豉一合　竹葉一把　葱白一握

右五味�once取三升分三服至發令盡

五藏並有瘧候六腑則無獨胃腑有之胃腑瘧者令人且病也善飢而不能食食而支滿腹大熱藍丸主之方

藜蘆　皂莢　恒山　牛膝各一兩　巴豆二十枚

右五味先熬藜蘆皂莢色黃合擣爲末蜜丸如小豆大旦服一丸正發時一丸一日勿飽食（肘後无恒山牛膝）

肝瘧刺足厥陰見血

心瘧刺手少陰

脾瘧刺足太陰

肺瘧刺手太陰陽明

腎瘧刺足少陰太陽

胃瘧刺足太陰陽明橫脉出血

凡灸瘧者必先問其病之所先發者先灸之從頭項發者於未發前預灸大椎尖頭漸灸過時止從腰脊發者灸腎輸百

壯從手腑發者灸三間
疟灸上星及大椎至發時令滿百壯灸艾炷如黍米粒俗人
不解取穴務大炷也
覺小異即灸百會七壯若後更發又七壯極難愈者不過三灸
以足踏地以線圍足一匝中折從大椎向百會灸線頭三七
壯炷如小豆
又灸風池二穴三壯
一切疟無問遠近正仰以線量兩乳間中屈從乳向下灸
度頭隨年壯男左女右
五藏一切諸疟灸尺澤七壯穴在肘中約上動脉是也
諸瘧而脉不見者刺十指間出血血去必已先視身之赤如
小豆者尽取之
瘧刺足少陰血出愈

瘧瘧上星主之穴在鼻中央直髮際一寸陷容豆是也灸七
壯先取譩譆後取天牖風池
瘧曰西而發者臨泣主之穴在目眥上入髮際五分陷者灸
七壯
瘧實則腰背痛虛則欬衄飛揚主之穴在外踝上七寸灸七壯
瘧多汗腰痛不能俛仰目如脫項如拔崑崙主之穴在足外
踝後跟骨上陷中灸三壯
禳瘧法
未發前抱大雄雞一頭著懷中時時驚動令雞作大
聲立差
治瘧符凡用二符
瘧小兒父字石拔毋字石鎖某甲著患人姓名患瘧人竊讀之曰
一切天地山水城隍日月五星皆敬竈君今有一瘧鬼小兒

罵竈君作黑面奴若當不信看文書急急如律令

右件符必須具書昌前後各留白紙一行擬著竈君額上瓦石壓之不得壓字上勿令人近符若得專遣一人看符大好亦勿令灰土傳符上致使字不分明出見著符次第如後若明日出後發須令人夜掃竈君前及額上令淨至發日旦令患人整衣帽立竈前讀符使人自讀必須分明讀符勿錯一字每一徧若患別人讀一徧患人跪一拜又以手捉患人一度若患人自讀自捉衣振云人姓某甲如此是凡三徧讀三拜了以淨瓦石壓兩角字向上著竈額上勿令壓字上若瘧日西發具如上法三徧讀符至午時更三徧讀如上法如夜發日暮更三徧讀並如上法其竈作食亦得勿使動此符若有兩竈大竈上著符若有露地竈屋裏竈上著止有露竈依法著仍須手捉符其符法如後若有客患會須客經停過三度發三度委曲著符如上法符亦云客姓名患瘧乞拘錄瘧鬼小兒如左凡治久患者一著符一漸差亦可五度著符

王良符張季伯書之急急如律令

右王良符依法長卷兩手握念佛端坐如須行動檢校插著肖前字頭向上

右二符各依法一時用不得闕一符萬一不差但得一發輕後發日更讀即差一一子細依法若字麥差即不差

診谿毒證第七

江東江南諸谿源間有蟲名短狐谿毒亦名射工其蟲無目而利耳能聽在山源谿水中聞人聲便以口中毒射人故謂

射工也其蟲小毒輕者及相逐者射著人影著皆不即作瘡先病寒熱身不喜冷體強筋急頭痛目疼張口欠欬呼吸悶亂朝旦少蘇醒晡夕輒復寒熱或似傷寒發石散動亦如中尸便不能語病候如此自非其土地人不常數行山水中不知其證便謂是傷寒發石散動作治乖僻毒盛發瘡復疑是瘧疽乃至吐下去血復恐疑蠱毒是以致禍耳今說其狀類以明其證與傷寒別也方在第二十五卷中

備急千金要方卷第十

金澤文庫

備急千金要方卷第十一　肝藏

朝奉郎守尚少卿究秘閣校理判登聞檢院上護軍賜緋魚袋臣林億等校正

金澤文庫

肝藏脉論第一

肝虛實第二　肝膽俱虛實附

肝勞第三

筋極第四　筋虛實附

堅癥積聚第五

肝藏脉論第一

論曰夫人稟天地而生故內有五藏六腑精氣骨髓筋脉外有四肢九竅皮毛爪齒咽喉脣舌肛門胞囊以此揔而成軀故將息得理則百脉安和役用非宜即爲五勞七傷六極之患有方可救雖病無他無法可遵奄然永往所以此之中秩卷卷皆備述五藏六腑等血脉根源循環流注與九竅應會

處所并論五藏六腑等輕重大小長短闊狹受盛多少仍列對治方法丸散酒煎湯膏摩熨及灸針孔穴並窮於此矣其能留心於醫術者可考而行之其冷熱虛實風氣淮藥性而用之則內外百病無所逃矣凡五藏在天為五星在地為五嶽約時為五行在人為五藏五藏者精神魂魄意也論陰陽察虛實知病源用補瀉應禀三百六十五節終會通十二經焉論曰肝主魂為郎官隨神往來謂之魂魂者肝之藏也目者肝之官肝氣通於目目和則能辨五色矣左目甲右目乙循環紫宮榮華於爪外主筋內主血肝重四斤四兩左三葉右四葉凡七葉有六童子三千女守之神名藍藍主藏魂號為魂藏隨節應會故云肝藏血舍魂在氣為語在液為淚肝氣虛則恐實則怒肝氣虛則夢見園苑生草得其時夢伏樹下不敢起肝氣盛則夢怒厥氣客於肝則夢山林樹木

凡人卧血歸於肝肝受血而能視足受血而能步掌受血而能握指受血而能攝

凡肝藏象木與膽合為腑其經足厥陰與少陽為表裏其脉弦相於冬王於春春時萬物始生其氣來濡而弱寬而虛故脉為弦濡即不可發汗弱則不可下寬者開開者通通者利故名曰寬而虛

春脉如弦春脉肝也東方木也萬物之所以始生也故其氣來濡弱輕虛而滑端直以長故曰弦反此者病何如而反其氣來實而弦此謂太過病在外其氣來不實而微此謂不及病在內太過則令人善忘怒忽忽眩冒而癲疾不及則令人胸痛引背兩脅滿

肝脉來濡弱招招如揭竿末梢曰平（巢源作綽綽如按琴瑟之弦如揭長竿）春以胃氣為本肝脉來盈實而滑如循長竿曰肝病肝脉來急

而益勁如新張弓弦曰肝死
真肝脉至內外急如循刀刃責責然（嘵嘵源作嘵嘵）如按琴瑟絃（絃作如張弓弦新）色青白不澤毛折乃死
春胃微弦曰平弦多胃少曰肝病但弦無胃曰死胃而有毛（狂妄不精不正當人）令人陰縮而攣筋兩脅肋骨舉（不舉作毛悴）色夭死于秋
足厥陰氣絕則筋縮引卵與舌厥陰者肝脉也肝者筋之合也筋者聚於陰器而脉絡於舌本故脉弗營則筋縮急筋縮急則引卵與舌卵縮則筋先死庚篤辛死金勝木也
肝死藏浮之弱按之中如索不來或曲如蛇行者死
春肝木王其脉弦細而長曰平反得沈濡而滑者是腎之乘

肝母之歸子為虛邪雖病易治反得浮大而洪者是心之乘
肝子之乘母為實邪雖病自愈反得微澀而短（千金冀云微浮而短澀）者是肺之乘肝金之剋木為賊邪大逆十死不治反得大而緩者是脾之乘肝土之陵木為微邪雖病即差忌乘肝必吐
利肺乘肝即為癰腫
左手關上陰絕者無肝脉也若瘥遺溺難言舌卷卵縮筋吐刺足厥陰
吐刺足少陽治陽
左手關上陰實者肝實也苦肉中痛動善轉筋吐刺足厥陰
治陰
肝脉來濯濯如倚竿如琴瑟絃再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡足厥陰脉也
肝脉急甚為惡言（妄誖微急為肥氣在脅下如覆杯緩甚為嘔微緩為水痕痺大甚為肝痺縮欬引善嘔血）微大為肝痺縮欬引

少腹小甚爲多飲微小爲消癉滑甚爲頗疝微滑爲遺溺濇
甚爲淡飲微濇爲瘈瘲筋攣
肝脉搏堅而長色不青當病墜若搏因血在脅下令人喘逆
其濡而散色澤者當病溢飲溢飲者渴暴多飲而溢入肌皮
腸胃之外也 素問溢入作易入
青脉之至也長而左右彈有積氣在心下支胠名曰肝癉得
之寒濕與汗同法腰痛足清頭痛
肩鵲云肝有病則目奪精虛則寒寒則陰氣壯壯則夢山樹
等實則熱熱則陽氣壯壯則夢怒
肝在聲爲呼在變動爲握在志爲怒怒傷肝精氣并於肝則
憂肝虛則恐實則怒怒而不已亦生憂矣
色主春病變於色者取之榮
病先發於肝者頭目眩脅脅痛支滿一日之脾閉塞不通身痛
體重三日之腎少腹腰脊痛脛痠十日不
已死冬日入夏早食
病在肝平旦慧下晡甚夜半靜
假令肝病西行若食雞肉得之當以秋時發病以庚辛日也
家有血腥死女子見之以明要爲災不者若感金銀物得之
凡肝病之狀必兩脅下痛引少腹令人善怒虛則目眩無
所見耳無所聞善恐如人將捕之若欲治之當取其經足厥
陰與少陽氣逆則頭目痛耳聾不聰頰腫取血者
肝脉沈之而急浮之亦然苦脅痛有氣支滿引少腹而痛時
小便難苦目眩頭痛腰背痛足爲寒時瘧女人月事不來時
亡時有得之少時有所墮
肝病其色青手足拘急脅下苦滿或時眩冒其脉弦長此爲
可治宜服防風竹瀝湯秦艽散春當刺大敦夏刺行間冬刺

曲泉皆補之季夏刺太衝秋刺中郄皆瀉之又當灸期門百壯背第九椎五十壯

邪在肝則兩脅中痛寒中惡血在內脥善癪節時腫取之行間以引脅下補三里以温胃中取血脉以散惡血取耳間青脉以去其癪

凡有所墮墜惡血留內若有所大怒氣上而不能下積于左脅下則傷肝

肝中風者頭目瞤兩脅痛行常偃令人嗜甘如阻婦狀

肝中寒者其人兩臂不舉舌本又作燥善太息肖中痛不得轉側時盜汗欬食已吐其汁

肝主肖中喘怒罵其脉沈澑肖中又窒欲令人推按之有熱鼻窒

肝傷其人脫肉又卧口欲得張時時手足青目瞑瞳人痛此爲肝藏傷所致也

肝水者其人腹大不能自轉側而脅下腹中痛時時津液微生小便續通

肝脹者脅下滿而痛引少腹

肝著其病人常欲蹈其肖上先未苦時但欲飲熱

診得肝積脉弦而細兩脅下痛邪氣走心下足脛寒脅痛引少腹男子積疝女子瘕淋身無膏澤善轉筋爪甲枯黑春差秋劇色青也肝之積名曰肥氣在左脅下如覆杯有頭足如龜鼈狀久久不愈發欬逆瘕連歲月不已以季夏戊巳日得之何也肺病傳肝肝當傳脾脾適以季夏王王者不受邪肝復欲還肺肺不肯受因留結爲積故知肥氣以季夏得之

肝病肖滿脅脹善恚怒叫呼身體有熱而復惡寒四肢不舉

面白身體滑其脉當弦長而急今反短濇其色當青而反白
者此是金之剋木爲大逆十死不治
襄公問扁鵲曰吾欲不診脉察其音觀其色知其病生死可
得聞乎荅曰乃聖道之大要師所不傳黃帝貴之過於金玉
入門見病觀其色聞其呼吸則知往來出入吉凶之相角音
人者主肝聲也肝聲呼其音琴其志怒其經足厥陰厥逆少
陽則榮衛不通陰陽交雜陰氣外傷陽氣內擊擊則寒寒則
虛虛則卒然喑啞不聲此爲厲風入肝續命湯主之方在第
八卷中但踞坐不得低頭面目青黑四肢緩弱遺失便利甚
則不可治賒則旬月之內桂枝酒主之方在第八卷中又呼
而哭哭而反吟此爲金克木陰擊陽陰氣起而陽氣伏伏則
實實則熱熱則喘喘則逆逆則悶悶則恐畏目視不明語聲
切急譫說有人此爲邪熱傷肝甚則不可治若唇色雖青向

眼不應可治地黃煎主之方在下肝虛實篇中
肝病爲瘧者令人色蒼蒼然太息其狀若死者烏梅丸主之
方在第十卷中若其人本來少於悲怒忽爾嗔怒出言反常
乍寬乍急言未竟以手向眼如有所畏若不即病禍必至矣
此肝病聲之候也若其人虛則爲寒風所傷若實則爲熱氣
所損陽則瀉之陰則補之青爲肝肝合筋青如翠羽者吉肝
主目目是肝之餘其人木形相比於上角蒼色小頭長面大
肩平背直身小手足有材好勞心小力多憂勞於事耐春夏
不耐秋冬秋冬感而生病足厥陰他他然脅廣合堅脫傾正
則肝應之正青色小理者則肝小小則藏安無脅下之病粗
理者則肝大大則虛虛則寒逼胃迫咽善膈中且脅下痛廣
脅反骸者則肝高高則實實則肝熱上支賁加脅下急爲實
合脅危一作骸骸者則肝下下則逼胃脅下空空則易受邪脅

堅骨者則肝堅堅則藏安難傷脅骨弱者則肝脆脆則善病
消癉易傷脅腹好相者則肝端正端正則和利難傷脅骨偏
舉者則肝偏傾偏則脅下偏痛凡人分部膞起者必有病
生膽少陽爲肝之部而藏氣通於內外部亦隨而應之沈濁
爲內浮清爲外若色從外走內者病從外生部處起若色從
內出外者病從內生部處膞內病前治陰後治陽外病前治
陽後治陰陰陽主外陰主內凡人死生休否則藏神前變形于
外人肝前病目則爲之無色若肝前死目則爲之脫精若天
中等分墓色應之必死不治看應增損斟酌賒促賒則不出
四百日內促則不延旬月之間肝病少愈而卒死何以知之
曰青白色如拇指大黵黤見顏頰上此必卒死肝絕八日死
何以知之面青目赤但欲伏眠視而不見人汗出如水不
止一日二日死面黑目青者不死青如草滋死青如草滋死吉凶之色在於分

部順順而見青白入目必病不出其年若年上不應三年之
中禍必應也

春木肝脉色青主足少陽脉也春取絡脉分肉春者木始治
肝氣始生肝氣急其風疾經脉常深其氣少不能深入故取
絡脉分肉之間其脉根本並在竅陰之間應在窻籠之前窻
籠者耳前上下脉以手按之動者是也其筋起於小指次指之上結外踝上循胕外廉結於膝外廉
其支者別起於外輔骨上走髀前者結伏兔之上後者結於
尻其直者上脇乘季脅上走腋前廉俠於膺乳結於缺盆直者
上出挾賁缺盆出太陽之前循耳後上額角交巔上下走頷
上結於鞕其支者結於目外皆爲外維
其脉起於目兌皆上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至
肩上却交出手少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳中出

走耳前至兌皆後其支者別兌皆下大迎合手少陽於頷下
加頰車下頸合缺盆以下肖中貫膈絡肝屬膽循脅裏出氣
街繞毛際橫入髀厭中以下循髀陽出膝外廉下外輔骨之前直下抵絶
骨之端下出外踝之前循足跗上出小指次指之端其支者
別跗上入大指之間循大指歧內出其端還貫入爪甲出參
毛合足厥陰爲表裏厥陰之本在行間上伍寸應在背輸同
會于手太陰

其足少陽之別名曰光明去踝半寸是也別走厥陰下絡足
跌上尸生病病實則膽熱熱則厥厥則陽病陽脉反逆大於
寸口壹倍病則肖中有熱心脅頭頷痛缺盆腋下腫虛則膽
寒寒則痿躄躄則陰病陰脉反小於寸口病則肖中有寒少
氣口苦身體無膏澤外至胕絶骨外踝前及諸節皆痛若陰

陽俱靜與其俱動如引繩俱頓者病也此盡是足少陽膽經脉支別爲病今取

足厥陰肝經附于陰後

足厥陰之脉起於大指聚毛之際上循足跌上廉去內踝一
寸上踝八寸交出太陰之後上膕內廉循股陰入毛中環陰
器抵少腹俠胃屬肝絡膽上貫膈布脅肋循喉嚨之後上入
頏顙連目系上出額與督脉會於巔一本云其支者從少腹與太陰少陽結於髀髑
下第三第四肋空中其支者從目系下頰裏環脣內其支者復從肝別
貫膈上注肺中是動則病腰痛不可以俛仰丈夫癪疝婦人
少腹腫甚則嗌乾面塵脫色是主肝所生病者肖滿欲逆洞
泄狐疝遺溺閉癃盛者則寸口大一倍於人迎虛者則寸口
反小於人迎也

足厥陰之別名曰蠡溝去內踝上五寸別走少陽其別者循
經上睾結於莖其病氣逆則睾腫卒疝實則挺長熱虛則暴

癢取之所別足厥陰之筋起於大指之上上結於內踝之前上循脛上結內輔之上下循陰股結於陰器結絡諸筋

春三月者主肝膽青筋牽病也其源從少陰而涉足少陽少陽之氣始發少陰之氣始衰陰陽怫鬱於腠理皮毛之病俱生表裏之病因起從少陽發動反少陰氣則藏腑受癘而生其病相反若腑虛則爲陰邪所傷腰背強急脚縮不伸脛中欲折目中生花若藏實則爲陽毒所塡牆牆前寒而後熱頸外雙筋牽不得屈伸頸直背強眼赤黃若欲轉動合身回側

扁鵲曰炙肝肺二輸主治丹毒牽病當依源處治調其陽理其陰藏腑之疾不生矣

肝實熱

肝虛實第二 脉四條 方十一首 灸法一首

左手關上脉陰實者足厥陰經也病苦心下堅滿常兩脅痛息忿忿如怒狀名曰肝實熱也

治肝實熱陽氣伏邪熱喘逆悶恐目視物無明狂悸非意而言竹瀝泄熱湯方

芍藥 各四分 大青 竹瀝一升 麻黃三分 石膏八分 生薑

梔子人 升麻

茯苓 玄參

知母 各三分 生葛八分

右十二味㕮咀以水九升先煮取二升半去滓下竹瀝煮兩三沸分三服須利下莫消三分去芍藥加生地黃五分 方無石膏生薑芍藥生葛用人參三分 繁刪

治肝實熱目痛胃滿氣急塞瀉肝前胡湯方

前胡 秦皮 細辛 梔子人

黃芩 升麻 豉人 決明子 各三兩

苦竹葉 切一升 車前葉 切一升 芒消三兩

右十一味咬咀以水九升煮取三升去滓下芒消分三服
又一方有柴胡三兩共十二味
治肝實熱夢怒虛驚防風煮散方
防風　茯苓　萎蕤　白朮　橘皮
丹參各一兩　細辛二兩　甘草一兩　升麻　黃芩各一兩半
大棗三十枚　射干一兩　酸棗人三分
右十三味治下篩爲麤散以方寸兩匕帛裹以井花水二升分服之日二
治肝邪熱出言反常乍寬乍急遠志煮散方
遠志　射干　杏人　大青各一兩半　茯神
葛根　甘草　麥門冬各一兩　芍藥二兩三分
桂心三分　石膏二兩　知母　升麻各五分
右十三味治下篩爲麤散以水二升五合煮竹葉一升取
汁用煮藥壹匕半煎取捌合爲壹服日貳以綿裹散煮之
治邪熱傷肝好生悲怒所作不定自驚恐地黃煎方
生地黃　淡竹葉　車前草
乾藍各一切外　丹參　玄參各四兩　茯苓二兩
石膏五兩　赤蜜壹升
右拾味咬咀以水玖升煮取參升去滓停冷下蜜更煎參
兩沸分參服
肝膽俱實
左手關上脉陰陽俱實者是厥陰與少陽經俱實也病苦胃
脹嘔逆食不消名曰肝膽俱實也
肝虛寒
左手關上脉陰虛者是厥陰經也病苦脅下堅寒熱腹滿不
欲飲食腹脹悒悒不樂婦人月經不利腰腹痛名曰肝虛寒也

治肝氣不足兩脅下滿筋急不得大息四肢厥冷發搶心腹痛目不明了及婦人心痛乳癰膝熱消渴爪甲枯口面青者補肝湯方

甘草　桂心　山茱萸各一兩千金翼作烏頭　細辛　桃人千金翼作麩人　茯苓　防風兩各二　大棗二十枚

右玖味㕮咀以水玖升煮取伍升去滓分參服

補肝散治左脅偏痛久宿食不消并目瞇瞇昏風淚出見物不審而逆風寒偏甚消食破氣止淚方

山茱萸　桂心　署預　天雄　茯苓　人參兩五　苦蓼　白朮　獨活　五加皮　大黃兩七　防風　乾薑　丹參　厚朴　細辛　桔梗兩半　甘菊花　甘草兩半

貫衆兩半　橘皮三分　陳麥麴　大麥蘗各一升

右二十三味治下篩酒下方寸匕日二若食不消食後服若止痛食前服之

補肝酒治肝虛寒或高風眼淚等雜病釀松膏酒方

松脂十斤細剉以水淹浸一周日煮之細細接取上膏水竭更添之脂盡更水煮如前煙盡去火停冷脂當沈下取一斤釀米一石水七斗好麴末二斗如家常釀酒法仍冷下飯封一百日脂米麴並消盡酒香滿一室細細飲之此酒須一倍加麴

又方

取枸杞子擣碎先內絹袋中率一斗拘杞子二斗酒漬訖密封泥甕勿泄暴乾天陰勿出三七日滿且温酒服任性飲忌酢

治肝虛寒目眩視物不明諦視生花防風補煎方

防風 細辛 苦蘘 白斂皮 獨活 甘草各三兩 橘皮二兩 大棗三十枚 甘竹葉一把 蜜五合

右十味㕮咀以水一斗二升先煮九味取四升去滓下蜜更煎兩沸分四服日三夜一若五六月以爆器貯冷水藏之治肝虛寒脅下痛脹滿氣急目晾濁視物不明檳榔湯方

檳榔二十四枚 毋薑二兩 桂心各三兩 桔梗 白朮各四兩 吳茱萸五合 附子七枚 茯苓 橘皮各七兩

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓分温三服若氣喘者加苦蘘三兩半夏四兩甘草二兩

肝虛目不明炙肝輸二百壯小兒斟酌可灸一二七壯

肝膽俱虛

左手開上脉陰陽俱盛者足厥陰與少陽經俱虛也病如恍惚尸厥不知人妄見少氣不能言時時自驚名曰肝膽俱虛也

肝勞第三 論一首 方二首

論曰肝勞病者補心氣以益之心王則感於肝矣人逆春氣則足少陽不生而肝氣內變順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂關格病則生矣

治肝勞虛寒關格勞澀閉塞不通毛悴色夭猪膏酒方

猪膏 薑汁各四升

右二味以微火煎取三升下酒五合和煎分為三服

治肝虛寒勞損口苦關節骨疼痛筋攣縮煩悶虎骨酒補方

虎骨一升炙令焦碎如雀頭 丹參八兩 乾地黃七兩 地骨皮 乾薑 五加皮 枳實 苦蘘各四兩 猪椒根 白朮各五兩

右十味㕮咀絹袋盛以酒四斗浸四日初服六七合漸加至

一升日再服

筋極第四 論三首 灸法七首 方七首

論曰夫六極者天氣通於肺地氣通於嗌風氣應於肝雷氣動於心穀氣感於脾（素問作谷）兩氣潤於腎六經爲川腸胃爲海九竅爲水注之氣所以竅應於五藏五藏邪傷則六腑生極故曰五藏六極也

論曰凡筋極者主肝也肝應筋筋與肝合肝有病從筋生又日以春遇病爲筋痺筋痺不已復感於邪內舍於肝則陽氣入於內陰氣出於外若陰氣出則虛虛則筋虛筋虛則善悲色青蒼白見於目下若傷寒則筋不能動十指爪皆痛數好轉筋其源以春甲乙日得之傷風風在筋爲肝虛風也若陽氣內發發則實實則筋實筋實則善怒嗌乾傷熱則筋攣下痛不能轉側又脚下滿痛故曰肝實風也然則因其輕而揚之因其重而減之因其衰而彰之審其陰陽以別柔剛陽病治陰陰病治陽善治病者病在皮毛肌膚筋脉而治之次治六腑若至五藏則半死矣

扁鵲云筋絶不治九日死何以知之手足爪甲青黑呼罵口不息筋應足厥陰氣絶則筋縮引卵與舌筋先死矣治筋實極則筋筋縮痛痛甚則不可轉動橘皮湯下縮痛痛甚則不可轉動橘皮湯通氣湯方

橘皮四兩　白朮　當歸　桂心　石膏碎五　細辛　茯苓碎二　香豉升

右八味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服

治筋實極則兩脚下滿滿而痛不得遠行脚心如割筋斷折痛不可忍丹參煮散方

丹參三兩　芍藥　杜仲　續斷

地骨皮 各二兩 當歸 通草 乾地黃
麥門冬 升麻 禹餘粮 麻黃 各一兩
牛膝 二兩六銖 生薑 切炒焦乾取 各一兩六銖 桂心 牡蠣 各二兩
甘草

右十七味治下篩爲麄散以絹袋子盛散二方寸匕以井花水二升煮數動袋子煮取一升頓服日二

治筋實極手足爪甲或青或黃或黑烏黯四肢筋急煩滿地黃煎方

生地黃汁 三升 生葛汁 生玄參汁 各一升 大黃 升麻 各二兩 栀子人 麻黃 犀角 各三兩 石膏 五兩 芍藥 四兩

右十味㕮咀以水七升煮七物取二升去滓下地黃汁煎一兩沸次下葛汁等煎取三升分三服日再

治筋虛極筋痺好悲思顏色蒼白四肢噓吸脚手拘攣伸動縮急腹中轉痛五加酒方

五加皮 一斤 枳刺 升二 大麻人 升三 猪椒根皮 丹參 八兩 桂心 當歸 甘草 各三兩 天雄 秦椒 乾薑 薏苡人 各一升 芎藭 五兩 白鮮 通草 各四兩

右十五味㕮咀以絹袋盛清酒四斗漬春夏四日秋冬六七日初服六七合稍稍加以知爲度

治筋虛極則筋不能轉十指爪皆痛數轉筋或交接過度或病未平復交接傷氣內筋絡絕舌卷脣青引卵縮脇脉疼急腹中絞痛或便欲絕不能飲食人參酒方

人參 防風 茯苓 細辛 秦椒 黃耆 當歸 生牛膝 桔梗 各一兩半 乾地黃

丹參　署預　鍾乳　礬石　酪三　山茱萸
芎藭　酪二　白朮
生薑　切乾　炒　烏麻　碎　酪二　升各
右二十二味㕮咀鍾乳別以小袋子盛以清酒二斗半浸
五宿温服三合日再無所聞隨意增進一本無烏麻用杜
仲二兩半
治交接損卩縮筋攣方
燒婦人月經衣灰服方寸匕
治筋絶方
熬蟹腦足髓内瘡中筋即續
勞冷氣逆腰髖冷痺脚屈伸難灸陽蹻一百壯在外踝下容爪
腰背不便轉筋急痺筋攣灸第二十一椎隨年壯
轉筋十指筋攣急不得屈伸灸脚外踝骨上七壯

失精筋攣陰縮入腹相引痛灸下滿各五十壯老人加之小
宛宛中
失精筋攣陰縮入腹相引痛灸中封五十壯在内踝前筋裏
兒隨年壯又云此二穴喉腫厥逆五藏所苦鼓脹並悉主之
轉筋脛骨痛不可忍灸屈膝下廉横筋上三壯
腹脹轉筋炙臍上一寸二十壯

堅癥積聚第五　論一首　灸法六首　方四十四首

論曰病有積有聚何以別之荅曰積者陰氣也聚者陽氣也
故陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚
故積者五藏之所生聚者六腑之所成故積者陰氣也其始
發有常處其痛一作病不離其部上下有所終始左右有所窮
已聚者陽氣也其始發無根本上下無所留止其痛無常處
謂之聚也故以是別知積聚也

經絡受病入於腸胃五藏積聚發伏梁息賁肥氣奔豚
積聚之始生至其已成柰何曰積之始生得寒乃生厥止乃
成積人之善病腸中積者何以候之曰皮薄而不澤肉不堅
而淖澤如此則腸胃傷惡惡則邪氣留止積聚乃作腸胃之
積寒温不次邪氣稍止至其畜積留止大聚乃起病有身體
腰髀股腨皆腫環臍而痛是為何病曰病名伏梁此風根也
不可動動之為水溺濇之病少腹盛左右上下皆有根者伏
梁也果膿血居腸胃之外不可治治之每切按之致死此下
則因陰必下膿血上則迫胃管生王氷云當作出膈俠胃管內癰此
久病也難療居臍上為逆慎勿動亟奪其氣溢於大腸而著
於肓肓之原在臍下故環臍而痛
三台丸治五藏寒熱積聚臚脹腸鳴而噫食不生肌膚甚者
嘔逆若傷寒寒瘧已愈令不復發食後服五丸飲多者吞十

丸常服令人大小便調和長肌肉方

大黃熬 前胡 酪各二兩 消石 葶藶 杏人 外各一
厚朴 附子 細辛 半夏 酪各二兩 茯苓 酔
右十味末之蜜和擣五千杵服如梧子五丸稍加至十丸
以知為度

治男子女人百病虛弱勞冷宿寒久癖及癥瘕積聚或嘔逆
不下食并風濕諸病無不治之者五石烏頭丸方

鍾乳 鍊紫石英 硫黃 赤石脂 礬石
枳實 甘草 白朮 紫菀 山茱萸
防風 白薇 桔梗 天雄 皂莢
細辛 蒞蓉 人參 附子
藜蘆盡各一兩銖 乾薑 吳茱萸 蜀椒
桂心 麥門冬酪二兩半 烏頭三兩 厚朴 遠志

茯苓 各一兩半 當歸 二兩 棗膏 五合 乾地黃 一兩八銖

右三十二味末之蜜和擣五千杵酒服如梧子十九日三稍加之

治男子女人寒冷腹內積聚邪氣往來厥逆搶心心痛痺悶吐下不止婦人產後羸瘦烏頭丸方

烏頭 十枚五 吳茱萸 蜀椒 乾薑 桂心 各二兩半 人參 苦蘑 白朮 各一兩六銖 前胡 細辛 白薇 芍藥 各十八銖 乾地黃 一兩半 皂莢 紫菀

右十五味末之蜜丸酒下如梧子十九日三稍加之以知爲度

治心腹疝瘕脅下及小腹滿堅痛有積寒氣入腹使人腹中冷發甚則上搶心氣滿食飲喜嘔方

大黃 茯苓 各一兩半 吳茱萸 桂心 黃芩 細辛 人參 蜀椒 乾薑 各一兩六銖 牡丹 甘草 苦蘑 防葵 蜈蟲 各十八銖 芍藥

右二十味末之以蜜丸服如梧子五丸日再漸加之

恒山丸治脅下邪氣積聚往來寒熱如溫瘧方

恒山 蜀漆 白朮 附子 貝齒 一兩半 白薇 桂心 鮀甲 鼈甲 蜚蠊 六銖 蠐螬 半兩 厚朴 半夏 各一兩 男髮灰

右十一味末之蜜丸如梧子以米汁服五九日三

又方

蒸鼠壤土尉熨之冷即易腹中切痛炒臨半升令焦內湯中飲之大吐差若手足痛者燒青布內小口器中熏痛處

神明度命丸治久患腹內積聚大小便不通氣上搶心腹中脹滿逆害飲食服之甚良方

大黃　芍藥各二兩

右二味末之蜜丸服如梧子四丸日三不知可加至六七丸以知為度

治萬病積聚方

七八月收葵藥子不限多少以水煮過熟取滓暴令乾擣篩蜜丸酒服如梧子七丸以知為度其汁煎如飴服之

治胃中心下結積食飲不消腸胃湯方

大黃　栝樓實　黃連各二兩　甘遂一兩

右四味㕮咀以水五升煮取二升五合分三服

太一神明陌冰丸治諸疾破積聚心下支滿寒熱鬼注長病

欬逆嗌噫辟除衆惡殺鬼逐邪氣鬼擊客忤中惡胃中結氣咽中閉塞有進有退繞臍惻惻隨上下按之挑手心中愠愠如有蟲狀毒注相染滅門方

雄黃油煮一日曝　丹砂　礬石　當歸　大黃各三兩

巴豆一兩　芫青五枚　桂心三兩　眞珠　附子各一兩

蜈蚣一枚　烏頭一枚　黎蘆各一兩　麝香　犀角　鬼臼　射罔

蜥蜴一枚　斑猫七枚　牛黃　人參各半兩　杏人四十枚

樗雞三七枚　地膽三七枚

右二十四味末之蜜和擣三萬杵丸如小豆先食飲服二丸日二不知稍加之以藥二九安門戶上令衆惡不近傷寒服之無不即差若至病家及視病人夜行獨宿服二九

蜥蜴丸治癥堅水腫蜚尸遁尸百注尸注骨血相注惡氣鬼

忤蠱毒邪氣往來夢寤存亡留飲結積虎狼所齧猶犬所
咋鴆毒入人五藏服藥已消殺其毒食不消婦人邪鬼忤亦
能遣之方

蜥蜴二枚　蜈蚣二枚　地膽五十枚　蠭蟲三十枚
蜣蜋十四枚　土蟲蟲三十枚　朴消一兩十八銖　杏人三十枚
犀角　鬼督郵　桑赤雞各十八銖　芍藥
甘草一兩　巴豆一兩十八銖　款冬花十八銖　甘遂一兩六銖　乾薑一兩　虎骨各一兩半

右二十味末之別治巴豆杏人如膏內藥末研調下蜜擣
二萬杵丸如麻子先食飲服三丸日一不知加之不敢吐
下者一丸日一服有人風冷注癖堅二十年者得差此方與第十七卷尸注篇方重

大五明狼毒丸治堅癖痞在人脅脅或在心腹方

狼毒　乾地黃各四兩　附子　大黃　蓯蓉

人參　當歸各壹兩　半夏貳兩　乾薑
桂心各壹兩半　細辛　五味子　蜀椒
蘭茹熬令煙盡各壹兩　芫花　莽草　厚朴
防已　旋復花各半兩　巴豆貳拾肆枚　杏人叁拾枚

右二十一味末之蜜和服如梧子二丸日二夜一以知為度
小狼毒丸治病與前同方

狼毒叁兩　旋復花貳兩　附子
半夏　白附子　蘭茹各貳兩

右六味末之蜜和擣五千杵飲服如梧子三丸加至十
丸日三附子方無半夏白只三味

狼毒九治堅癖方

狼毒伍兩　半夏　杏人酪叁　桂心肆兩
附子　蜀椒　細辛各貳兩

右七味末之別擣杏人蜜和飲服如大豆二丸

治暴堅久痞腹有堅甘遂湯方

甘遂　黃芩　芒消　桂心　細辛各壹兩　大黃叁兩

右六味㕮咀以水八升煮取二升半分三服

治卒暴癥腹中有物堅如石痛如斫刺晝夜啼呼不治百日必死方

牛膝二斤㕮咀暴杀之令乾以酒一斗浸之密塞器口煎取半服半升一服便吐去宿食神效

治卒暴癥方

取商陸根擣碎蒸之以新布籍腹上以藥鋪著布上以衣物覆其上冷復易之數日用之旦夕勿息

又方

蒜拾片取五月五日戶上者去皮　桂壹寸匕　鼈中黃土如雞子大壹枚

右三味合擣以淳苦酒和塗布上以掩病處不過三日消

凡蒜亦佳肘後方不用桂

野葛膏治暴癥方

野葛一尺　當歸　附子　雄黃油煮一日

細辛各一兩　烏頭二兩　巴豆一百枚　蜀椒半兩

右八味㕮咀以大醋浸一宿猪膏二斤煎附子色黃去滓內雄黃粉攪至凝傅布上以掩癥上復以油重布上復安十重紙以熨斗盛火著上常令熱日三夜二須膏乾益良消石大丸治十二癥瘕及婦人帶下絶產無子并欲服寒食散而腹中有癥瘕實者當先服大丸下之乃服寒食散大丸不下水穀但下病耳不令人困方

消石六兩杵消亦得　大黃八兩　人參　甘草各二兩

右四味末之以三年苦酒三升置銅器中以竹筋柱器中

一升作一刻凡三升作三刻以置火上先内大黄常攪不
息使微沸盡一刻乃内餘藥又盡一刻有餘一刻勿令小兒女
使可丸如雞子中黄欲合藥當先齋戒一宿勿令小兒女
人奴婢等見之欲下病者用二丸若不能服大丸者可分
作小丸不可過四丸也欲令大不欲令細能不分爲善若
人羸者可少食強者不須食二十日五度服其和調半日
乃下若婦人服之下者或如雞肝或如米汁正赤黑或一
升或三升下後慎風冷作一杯粥食之然後作羹臛自養
如産婦法六月則有子禁生魚猪肉辛菜若寒食散者自
如藥法不與此同日一服

土瓜丸治諸藏寒氣積聚煩滿熱飲食中蠱毒或食生物及
水中蠱卵生入腹而成蟲蛇若爲魚鼈留飲宿食婦人産瘕
帶下百病陰陽不通利大小便不節絶傷墮落寒熱交結腐

口焦黑身體消瘦嗜卧少食多厭産乳胞中餘疾股裏熱心
腹中急結痛引陰中方

土瓜根 末 桔梗 末各 大黄 一斤蒸二斗米下暴乾 杏人 一升外

右四味末之蜜丸如梧子空腹飲服三丸日三不知加之
以知爲度

治凡所食不消方

取其餘類燒作末酒服方寸匕便吐去宿食即差有
食桃不消作病者以時無桃就樹間得槁桃燒服之
登時吐病出甚良

治卒食不消欲成癥積方

前艾汁如飴取半升一服之便刺吐去宿食神良 古今録驗方 白艾五尺 大把二 擣取汁一東煎

治食魚肉等成癥結在腹内并諸毒氣方

狗屎五升燒末綿裹之以酒一斗浸再宿濾取清分
十服日三服三日使盡隨所食癥結即便出矣

治雜中食瘀實不消心腹堅痛者方

以水三升煮白鹽一升令消分三服刺吐去食也并

治暴癥

治癥堅心下有物大如杯不得食食則腹滿心腹絞痛方

葶藶子　大黃各二兩　澤漆四兩

右三味末之別研葶藶爲膏下二味擣五百杵入蜜更擣
千杵服如梧子五丸不知加之日三服

治少腹堅大如盤胷中脹食不消婦人瘦瘠者方

煖水服髮灰一方寸匕日再服并灸肋端

又方

飲服上好麴末方寸匕日三差又灸三焦輸隨年壯

治伏梁氣方

白馬尿銅器中承取昌服之取知病動若下減之

治癥瘕方

搌樹白皮煎令可丸服之

治患癥結病及瓜病似瓜形日月形或在臍左右或在臍上
下若鼈在左右肋下或當心如合子大復有手脚治之法先
針其足以椒熨之方

取一新盆子受一斗者盆底鑽二百二十孔孔上著
椒三合上著一重紙紙上著冷灰一升灰上著熱灰
半升上著剛炭火一斤經一食頃盆底熱徹當病上
初安穫一重即安火盆大熱以漸更加一重若
火更熱不可忍加至三重暫歇一口冷飲還上火消
二分許即停經三日勿著及至七日決得頓差然後

食美食自補若小不差作露宿丸服之方在第十六卷中

治腹中積癖方

甚蘼子一升敷酒五升浸七日服三合日三

治蛇癖方

白馬尾切長五分以酒服方寸匕大者自出更服三分以酒服方寸匕中者亦出更服三分者一方寸匕小者復出不可頓作一服殺人馬尾一本作馬毛

治蛇癖大黄湯方

大黄　茯苓各半兩一本作黄芩　烏賊骨二枚　皂莢六銖炙去皮子　甘草如指大一尺　芒消如雞子大一枚

右六味㕮咀以水六升煮三沸去滓内消適寒温尽服之十日一劑作如上法欲服之宿無食平旦服當下病根也

治鼈癖腹堅硬腫起大如盤睡卧不得方

取藍一斤擣水三升絞取汁服一升日二

又方

萌藿根白皮一握研取汁以水和頓服之

又方

白馬尿一升雞子三枚取白合煎取二合空腹頓服之不移時當吐病出

治食中得病爲鼈癖在心下堅強方

雞屎一升炒令黄取五合以酒一升浸更取半擣爲末以所浸酒服方寸匕日三

治蛟龍病開皇六年三月八日有人食芹得之其人病發似癲癎面色青黄因食寒食餳過多便吐出蛟龍有頭及尾從茲有人患此疾令服寒食餳三斗大驗

山野人有齧蟲在腹生長爲蟲癥病治之方

故敗篦子枚

故敗梳枚

右二物各破爲兩分各取一分以水五合取一分燒爲末又取一分以水五合煮取一升以服前燒末頓服斯須出矣

治米癥常欲食米若不得米則胃中清水出方

雞屎白米五合

右二味合炒令米焦擣末以水二升頓服取盡須臾吐出病如研米若無米當出痰永憎米不復食

治肉癥思肉不已食訖復思者方

空腹飲白馬尿三升吐肉出肉不出必死

治鬄癥由人因食而入久即胃閒如有虫上下去來惟欲飲油一日之中乃至三二升不欲飲食者方

油一升以香澤煎之大鐘勞貯之安病人頭邊令口

臯臨油上勿令得飲傳臯面令有香氣當叫喚取飲不得與之必當疲極大睡其鬄癥當從口出飲油人專守視之并置石灰一裹見癥出以灰粉手捉癥抽出須臾抽盡即是鬄也初從腹中出形如不流水中濃菜隨鬄長短形亦如之

又方

酒三升煮猪脂二升三沸一服一升日二白馬尿服之亦佳無馬白牛亦得

癥瘕灸內踝後宛宛中隨年壯又灸氣海百壯

久冷及婦人癥瘕腸鳴泄利遶臍絞痛灸天樞百壯三報之

万勿針穴在俠臍兩邊各二寸

積聚堅滿灸脾募百壯穴在章門季肋端

心下堅積聚冷脹灸上管百壯三報之穴在巨闕下一寸許

積聚堅大如盤冷脹灸胃管二百壯三報之穴在巨闕下二寸

備急千金要方卷第十一

備急千金要方卷第十二 膽腑

朝奉郎守秘書省校理判登聞檢院護軍賜緋魚袋臣林億等校正

膽腑脉論第一

膽虛實第二 虛煩不得眠附

咽門論第三

髓虛實第四

風虛雜補澀煎第五 食治附

吐血第六

萬病丸散第七

膽腑脉論第一

論曰膽腑者主肝也肝合氣於膽膽者中清之腑也 難經云膽者清淨之腑甲乙云中精之腑號將軍決曹吏重三兩三銖長三寸三分在肝短葉間下貯水精汁二合 難經作三合能怒能喜能剛能柔目下

果大其膽乃橫凡膽附髓骨脉女子胞此六者地氣之所生也皆藏於陰而象於地故藏而不瀉名曰奇恒之腑若胃大腸小腸三焦膀胱此五者天氣之所生也其氣象天故瀉而不藏此受五藏濁氣名曰傳化之腑此不能久留輸瀉者也所謂五藏者藏精氣（甲乙作神）而不瀉故滿而不能實六腑者傳化物而不藏故實而不能滿所以然者水穀入口則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛故曰實而不滿滿而不實也

左手関上陽絶者無膽脉也苦膝疼㿗中苦眯目善畏如見鬼多驚少力刺足厥陰治陰在足大指間或刺三毛中

左手関上陽實者膽實也苦腹中不安身軀習習也刺足少陽治陽在足上第二指本節後一寸是

膽病者善太息口苦嘔宿汁心澹澹恐如人將捕之咽中介介然數唾候在足少陽之本末亦見其脉之陷下者灸之其

寒熱刺陽陵泉若善嘔有苦長太息心中澹澹善悲恐如人將捕之邪在膽逆在胃膽液則口苦胃氣逆則嘔苦汁故曰嘔膽刺三里以下胃氣逆刺足少陽血絡以閉膽却調其虛實以去其邪也

膽脹者脅下痛脹口苦太息

肝前受病移於膽肝欬不已則嘔膽汁

厥氣客於膽則夢鬬訟（甲乙云夢鬬訟自刻）

肝應筋爪厚色黃者膽厚爪薄色紅者膽薄爪堅色青者膽急爪枯色白無約者膽直爪惡色黑多敗者膽結

痛鵲云足厥陰與少陽爲表裏表清裏濁其病若實極則傷熱熱則驚動精神而不守卧起不定若虛則傷寒寒則恐畏頭眩不能獨卧發於玄水其根在膽先從頭面起腫至足方

在治水篇

膽有病則眉爲之傾病人眉系傾者七日死

足少陽之脉是動則病口苦善太息心脅痛不能反側甚則面微塵體無膏澤足外反熱是爲陽厥是主骨所生病者頭痛角額痛目兌皆痛缺盆中腫痛掖下腫馬刀挾瘿汗出振寒瘧胠中脅肋髀膝外至脛絶骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用盛者則人迎大一倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也（其經脉綱領支別已具第十一卷肝藏部中脉二條灸法二首）方九首

膽虛實第二

膽實熱

左手關上脉陽實者足少陽經也病苦腹中氣滿飲食不下咽乾頭痛洒洒惡寒脅痛名曰膽實熱也

治膽腑實熱精神不守瀉熱半夏千里流水湯方

半夏　宿薑各三兩　生地黃五兩　酸棗人五合

黃芩一兩　遠志

右八味㕮咀以長流水五斗煮藥取三斗半分三服

偏澄清取九升煮藥取三斗半分三服（集驗方治虛煩悶不得眠無地黃遠志有麥門冬桂心各二兩甘草人參各二兩）茯苓各二兩　秫米一升

胃中膽病灸濁浴隨年壯穴在俠膽輸傍行相去五寸

膽虛寒

左手關上脉陽虛者足少陽經也病苦眩厥痿足指不能搖躄不能起僵仆目黃失精睛睆名曰膽虛寒也

治大病後虛煩不得眠此膽寒故也宜服溫膽湯方

半夏　竹茹　枳實各二兩　橘皮三兩　生薑四兩　甘草一兩

右六味㕮咀以水八升煮取二升分三服

膽虛炙三陰交各二十壯穴在內踝上一夫
千里流水湯治虛煩不得眠方

半夏 麥門冬 酸棗人 茯苓 甘草 桂心 人參 蒲薤 黃芩 遠志

右十二味㕮咀以千里流水一斛煮米令蟹目沸揚之萬過澄清取一斗煮藥取三升半分三服
酸棗湯治虛勞煩擾奔氣在胷中不得眠方

酸棗人三升 人參 石膏四兩 茯苓 知母各三兩 甘草一兩半 桂心 生薑各二兩

右八味㕮咀以水一斗先煮酸棗人取七升去滓下藥煮取三升分三服日三
治虛勞煩悶不得眠方

大棗二十枚 葱白七莖 大梔子十四枚 豉七合 生地黃 枸杞白皮各五兩 茯苓 麥門冬 甘草 前胡各五兩 人參二兩 豉 粟米各五合 茯苓 知母各四兩

右十味㕮咀以水八升煮取三升七合分三服
汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子湯主之
治大下後虛勞不得眠劇者顛倒懊憹欲死梔子湯方仲景云發
右二味以水三升煮取一升去滓頓服
治煩悶不得眠方
加生薑二兩
滓一服一升安者勿更服若上氣嘔逆加橘皮二兩亦可

治虛勞不得眠方

酸棗　揀葉　各等分

右二味末之蜜丸服如梧子十五丸日再

又方

乾薑四兩末湯和頓服覆取汗病愈

咽門論第三

論曰夫咽門者應五藏六腑往還神氣陰陽通塞之道也喉嚨胞囊舌者並津液調五味之氣本也不可不研乎咽門者肝膽之候也其重十兩廣二寸五分至胃管長一尺六寸主通五藏六腑津液神氣應十二時若藏熱咽門則閉而氣塞若腑寒則咽門破而聲嘶母薑酒主之方在第六卷中熱則通之寒則補之若寒熱調和病不生矣

髓虛實第四論二首

論曰髓虛者腦痛不安髓實者勇悍凡髓虛實之應主於肝膽若其腑藏有病從髓生熱則應藏寒則應腑

治髓虛腦痛不安膽腑中寒羌活補髓丸方

羌活　芎藭　防風　各三兩　當歸　各三兩　桂心　二兩

人參　四兩　棗肉　研如脂　羊髓　二升熬研如脂　酥　各一升

牛髓　二升　大麻人　研如脂

右十味先擣五種乾藥爲末下棗膏麻人又擣相濡爲一家下二髓并酥內銅鉢中重湯煎之取好爲丸如梧子酒服三十九日二服稍加至四十九

治髓實勇悍驚熱主肝熱柴胡發泄湯方

柴胡　黃芩　細辛　枳實　梔子人　生地黃　各一兩　芒消　各三兩　淡竹葉　澤瀉　四兩

右十味㕮咀以水九升煮取三升去滓下消分三服

風虛雜補酒前煎第五方十八首

巴戟天　牛膝　各三斤　枸杞根皮

巴戟天　麥門冬　地黃　各二斤　防風

右六味並生用無可得用乾者亦得㕮咀以酒一石四斗浸七日去滓温服常令酒氣相及勿至醉吐愼生冷猪魚油蒜春六日秋冬二七日夏勿服先患冷者加乾薑桂忌各一斤好忘加遠志一斤大虛勞加五味子蓯蓉各一斤陰下濕加五加根皮一斤有石斛加一斤佳每加一斤藥則加酒七升此酒每年入九月中旬即合入十月上旬即服設服餘藥以此酒下之大妙滓暴乾擣末以此酒服方寸匕日三益佳常加甘草十兩佳虛勞加黃耆一斤

又方

巴戟天　生牛膝　各三斤

右二味㕮咀以酒五斗浸之服如前法

治虛勞不足五加酒方

五加皮　枸杞根皮　各一斤

右二味㕮咀以水一石五斗煮取汁七斗分取四斗浸麴一斗餘三斗用拌飯下米多少如常釀法熟壓取服之多少任性禁如藥法倍日將息

天門冬大煎治男子五勞七傷八風十二痺傷中六極二氣極則多寒痺腹痛喘息驚恐頭痛二肺極則寒痺腰痛心下堅有積聚小便不利手足不仁三脉極則顏色苦青逆意喜恍惚失氣狀似悲泣之後苦舌強咽喉乾寒熱惡風不可動不嗜食苦眩喜怒妄言四肢極則拘攣手少腹堅脹心痛膝寒

冷四肢骨節皆疼痛五骨極則肢節厥逆黃疸消渴癰疽發重病浮腫如水病狀六內極則發疰如得擊不復言甚者至死復生衆醫所不能治此皆六極七傷所致非獨房室之爲也憂恚積思喜怒悲懽後隨風溫結氣欬時嘔吐食以變大小便不利時泄利重下溺血上氣吐下冷寒冬熱卧不安席小便赤黃時時惡夢魘興死人共食飲入冢神室魂飛魄散筋極則傷肝傷肝則腰背相引難可俛仰氣極則傷肺傷肺則小便有血目不明髓極則陰痿不起佳而不交骨極則傷腎傷腎則短氣不可久立陰痠惡寒甚者卵縮陰下生瘡濕痒搔之不欲住汁出此皆爲腎病甚者多遭風毒四肢煩痺手足浮腫名曰脚弱一名脚氣醫所不治此悉主之方

天門冬 切三升半擣壓取汁盡 枸杞根 切三升煮取汁淨洗以水二石五斗煮取一斗三升澄清 生地黃 切三斗半擣如門冬

麞骨一具碎以水一石煮取五斗澄清 酥 三升 煉 外 白蜜 三升 煉

右六味並大斗銅器中微火先煎地黃門冬汁減半乃合煎取大斗二斗下後散藥煎取一斗內銅器重釜煎令隱掌可丸平旦空腹酒服如桐子二十丸日二加至五十丸慎生冷醋滑猪雞魚蒜油麪等擇四時王相日合之其合和一如第一卷合和篇說散藥如左

茯苓 柏子人 桂心 白朮 菱蕤
昌蒲 遠志 澤瀉 署預 人參
石斛 牛膝 杜仲 細辛 獨活
枳實 芎藭 黃耆 薤蓉 續斷
狗脊 蕳蘞 白芷 巴戟天 五加皮
覆盆子 橘皮 胡麻人 大豆黃卷 茯神
石南 各三兩 甘草 六兩 蜀椒 薏苡人 各一外

阿膠十兩　大棗煮一百枚膏　鹿角膠五兩　蔓荊子三兩

右三十八味治下篩內煎中有牛髓鹿髓各加三升大佳

小便澀去柏子人加秦艽二兩乾地黃六兩陰痿失精去

萎蕤加五味子二兩頭風去柏子人加菊花防風各二兩

小便利陰氣弱去細辛防風加山茱萸二兩腹中冷去防

風加乾薑三兩無他疾依方合之凡此煎九月下旬採藥

立冬日合而服之至五月上旬止若十二月臘日合者經

夏至七月下旬止若停經夏不壞當於舍北陰處入地深

六尺填沙置藥中上加沙覆之則經夏不損也女人先患

熱者得服患冷者勿服

填骨萬金煎治內勞少氣寒疝裏急腹中痛逆腰脊痛除百

病方

生地黃三十斤取汁　甘草　阿膠　肉蓯蓉各一斤

桑根白皮切八兩　麥門冬　乾地黃各三

石斛一斤五兩　牛髓三　白蜜十斤　清酒四斗

麻子人三升　大棗二百五十枚當歸十四兩　乾漆二十兩

蜀椒四兩　桔梗　五味子　附子各五兩

乾薑　茯苓　桂心各八兩　人參五兩

右二十三味先以清酒二斗六升內桑根白皮麻子人棗

膠為刻識之又加酒一斗四升煮取至刻絞去滓內蜜髓

地黃汁湯上銅器煎內諸藥末半日許使可丸止大甕盛

飲吞如彈丸一枚日三若夏月暑熱者煎轉味可以蜜地

黃汁和諸藥成末為丸如梧子服十五丸不知稍加至三

十丸

治男子風虛勞損兼時氣方

甘草一斤　石斛　防風　蓯蓉　山茱萸

茯苓　人參　署預各四兩　桂心　牛膝
五味子　菟絲子　巴戟天　苦蓑各三兩並爲末
生地骨皮切一升　生地黃汁三升　丹參二兩　胡麻二升以水二斗煮取四升去滓
白蜜三升　生麥門冬汁三升　生薑汁一升

右二十二味先煎地黃地骨皮胡麻汁減半內牛髓蜜薑門冬等汁微火煎餘八升下諸藥散和令調內銅鉢中湯上煎令可丸酒服三十丸如梧子日二加至五十丸

小鹿骨煎（一云麞骨）治一切虛羸皆服之方

鹿骨碎一具　枸杞根切二升

右二味各以水一斗別器各煎汁五升去滓澄清乃合一器共煎取五升日二服盡好將愼皆用大斗地黃小煎治五勞七傷羸瘦乾削方

乾地黃末一升　蜜升二　豬脂二斤　胡麻油半升

右四味以銅器中煎令可丸飲服三九如梧子日三稍加至十九久久常服弥有大益瘦黑者肥充

治虛冷枯瘦身无精光虛損諸不足陸抗膏方

牛髓　羊脂各三升　白蜜　生薑汁　酥各三升（經心錄用豬脂）

右五味先煎酥令熟次內薑汁次內蜜次內羊脂牛髓後微火煎之三上三下令薑汁水氣盡即膏成攪令凝止溫酒服之隨人能否不限多少令人肥健發熱也（經心錄云治百病勞損老神驗方）

枸杞煎補虛羸久服輕身不老神驗方

九月十日取生濕枸杞子一升清酒六升煮五沸出取研之熟濾取汁令其子極淨暴子令乾擣末和前汁微火煎令可丸酒服二方寸匕日二加至三匕亦

可九服五十九

夏姬杏人方

杏人三升內湯中去皮尖雙人熟擣盆中水研取七八升以鐵釜置煻火上取羊脂四斤摩釜消之內杏人汁温之四五日色如金狀餌如彈子日三百日肥白易容人不識

治枯瘦方

杏人熬黃棗去皮尖擣服如梧子日三令人潤澤无所禁忌逆上氣喉中百病心下煩不得咽者得茯苓數冬紫菀併力大良生熟熟冷其藥喉中如有息肉者亦服

桃人煎方

桃人一斤末　胡麻一升末　酥胖

牛乳五升　地黃十斤取汁所　蜜一斤

石六味合煎如餳旋服

治五勞七傷方

白羊頭蹄一具淨治更以草火燒令黃急搥鼻及腦孔　胡椒一合　畢撥　乾薑各二兩　葱白一升　豉二升

右七物先以水煮羊頭蹄半熟即內藥物煮令極爛去藥冷煖任性食之日一具七日用七具禁生冷酢滑五辛陳臭等物

治虛勞補方

羊肚一具切　白朮一斤　豉一升蒸

右二味以水二斗煮取六升一服二升日三服

又方

豉一升三編　薤白一斤切

右二味以水七升煮取三升分三服小取汗

治羸瘦喜煎方

不中水猪肪煎取一升内葱白一握煎令黃出内盆中看如人肌平旦空腹服訖暖覆卧晡時食白粥粥不得稀過三日服補藥方如左

羊肝一具　羊脊肉一條　麴末半斤　枸杞根十斤

右四味以水三斗煮枸杞取一斗去滓細切肝等内汁中煮葱豉鹽著如羹法合煎看如稠糖即好食之七日禁如藥法

猪肚補虚方

猪肚一具　人參五兩　蜀椒一兩

乾薑二兩半　葱白七兩　白粱米半升　豉半升

右六味㕮咀諸藥相得和米内肚中縫合勿洩氣取四斗半水緩火煮爛空腹食之大佳兼下少飯

吐血第六　論一首　方三十首　灸法十五首

論曰廩丘云吐血有三種有内衄有肺疽有傷胃内衄者出血如鼻衄但不從鼻孔出是近從心肺間津液出還流入胃中或如豆羹汁或如切蔥血凝停胃中因即滿悶便吐或去數斗至于一石者是也得之於勞倦飲食過常所爲也肺疽者或飲酒之後重再滿悶吐之時血從吐後出或一合半升一升是也傷胃者因飲食大飽之後胃中冷則不能消化不能消化便煩悶強嘔吐之所食之物與氣共上衝蹙因傷裂嗇口吐血色鮮正赤腹絞痛白汗出其脉緊而數者為難治也問曰病胷脅支滿妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血枯此得之年少時有所大奪血若醉以入房中氣竭而肝

傷故使月事衰少不來也治以烏賊骨藘茹二物并合九以
雀卵大如小豆以五九爲後飯飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也
凡吐血之後體中但自煩躁心中悶亂紛紛嘔吐顛倒不安醫工又與黃土湯阿膠散
益加悶亂卒至不濟如此悶者當急吐之方
瓜蒂三分 杜衡 人參各一分
右三味治下篩服一錢匕水漿無在得下而已嬴入小減
之吐去青黃或吐血二二升無苦
黃土湯治吐血方
伏龍肝雞子大二枚 芍藥 桂心 乾薑 當歸
白芷 甘草 阿膠
細辛半兩 生地黃二兩 吳茱萸二升
右十二味咬咀以酒七升水三升合煮取三升半去滓內
膠煮取三升分三服亦治衄血
生地黃汁 大棗五十枚 阿膠 甘草各三兩
右四味咬咀以水一斗煮取四升分四服日三夜一
堅中湯治虛勞內傷寒熱嘔逆吐血方
飴糖三斤 芍藥 半夏 生薑
甘草各三兩 桂心二兩 大棗五十枚
右七味咬咀以水二斗煮取七升分七服日五夜二 千金翼無
治噫止唾血方
石膏四兩 厚朴三兩 麻黃 生薑
甘草桂心生地黃有 半夏 五味子 杏人各二兩 小麥一升
右八味咬咀以水一斗煮麻黃去沫澄取七升內藥煮取

二升半分再服

治吐血肖中塞痛方

芍藥　乾薑　茯苓　桂心
當歸　大黃　芒消各三兩　阿膠
甘草　人參各二兩　麻黃一兩　乾地黃四兩
蟲蟲　水蛭各十枚　大棗二十枚　桃人百枚

右十六味咬咀以水一斗七升煮取四升分五服日三夜二

治吐血內崩上氣面色如土方

乾薑　阿膠　柏葉各二兩　艾一把

右四味咬咀以水五升煮取一升內馬通汁一升煮取一升頓服仲景名柏葉湯小品不用柏葉肘後阿膠同

治吐血酒客溫疫中熱毒乾嘔心煩者方

蒲黃　栝樓根　犀角　甘草各二兩

桑寄生　葛根各二兩

右六味咬咀以水七升煮取三升分三服

澤蘭湯治傷中裏急肖脇攣痛欲嘔血時寒時熱小便赤黃此傷於房勞也主之方

澤蘭　糖各一斤　桂心　人參各三兩

遠志二兩　生薑五兩　麻人一升　桑根白皮三兩

右八味咬咀以淳酒一斗五升煮取七升去滓內糖未食服一升日三夜一勿勞動

治忽吐血一兩口或是心劒或是內崩方

蟑蟟五枚　牛膝　牡丹　王不留行

麥門冬各二兩　乾地黃　蕳蘇　芍藥各四兩

續斷　阿膠各三兩

右十味咬咀以生地黃汁五升赤馬通汁三升煮取三升

分三服不差更合數劑取差

又方

熟艾三雞子許水五升煮取二升頓服

又方

燒亂髮灰水服方寸匕日三 集驗云治舌上忽出血如簪孔者亦治小便出血

治吐血方

生地黃肥者五升擣以酒一升煮沸三上三下去滓頓服之

又方

凡是吐血服桂心末方寸匕日夜可二十服 肘後云亦療下血

治虛勞吐血方

生地黃五斤絞取汁微火煎之三沸投白蜜一升又煎取三升服半升日三主肺痛百病久服佳

又方

槐葉一斤以水六升煮取三升分三服

又方

生地黃汁半升 川大黃末一方

右二味溫地黃汁一沸內大黃攪之空腹頓服日三差

犀角地黃湯治傷寒及溫病應發汗而不汗之內畜血者及鼻衄吐血不盡內餘瘀血面黃大便黑消瘀血方

犀角兩 生地黃八兩 芍藥三兩 牡丹皮二兩

右四味咬咀以水九升煮取三升分三服喜妄如狂者加大黃二兩黃芩三兩其人脉大來遲腹不滿自言滿者爲無熱但依方不須加也

治五藏熱結吐血衄血方

伏龍肝如雞子一枚大 生竹茹一升 芍藥 當歸

黃芩　芍藥　甘草各二兩　生地黃一斤
右八味㕮咀以水一斗三升先煮竹筎減三升下藥取三升分三服千金翼有桂心
治衄血吐血當歸湯方
當歸　乾薑
右五味㕮咀以水六升煮取二升分三服
黃土湯治卒吐血及衄血方
乾薑仲景作地黃　黃芩各三兩　芍藥　阿膠各二兩　黃芩三兩
伏龍肝半升　甘草　白朮　阿膠
右六味㕮咀以水一斗煮取三升去滓下膠分三服仲景有附子三兩為七味
治上焦熱膈傷吐血衄血或下血連日不止欲死並主之方
艾葉一把　阿膠如手掌大　竹筎一升　乾薑二兩
右四味㕮咀以水三升煮取一升去滓內馬通汁半升煮取一升頓服之取新馬屎與少水和絞取汁一方不用竹筎加乾薑成七兩
治虛勞崩中吐血下血上氣短氣欲絕面黑如漆方
黃耆　芍藥　芍藥　甘草各四兩　生薑一斤
右五味㕮咀以酒五升浸一宿明旦更以水五升煮取四升分四服日三夜一下陰中毒如湯沃雪也凡夏月不得宿浸藥酒客勞熱發疼下血穀道熱者去生薑用生地黃代之凡進三兩劑
治吐血汗血大小便下血竹筎湯方
竹筎二升　甘草　芍藥　白朮
右九味㕮咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一
人參　桂心各一兩　芍藥　黃芩　當歸各六分

治九孔出血方

搗荊葉汁酒服二合（一作荊芥）

治吐血蟲毒痔血女子腰腹痛大便後出清血者方

取東向蕺荷根搗絞取汁二升頓服之立差

諸下血先見血後見便此爲遠血宜服黃土湯（方見次前）血此爲近血宜服赤小豆散（黃土湯茶味仲景方是）

赤小豆散方

赤小豆三合（令坼）熬

右二味治下篩服方寸匕日三

乾地黃丸治血虛勞胃腹煩滿疼痛瘀血往來藏虛不受穀氣逆不得食補中理血方

乾地黃（三兩）當歸 乾薑 甘草 麥門冬（一作荊芥）

黃芩（各二兩）厚朴 乾漆 枳實 防風

大黃 細辛

人參（五分）蟲蟲

右十八味末之蜜丸先食服如梧子十九日三稍加之

治凡下血虛極麥門冬湯方

麥門冬 白朮（各一兩）茯苓（五兩）前胡（六分）

白朮（各一兩）甘草（一兩）牡蠣 芍藥

阿膠（各三兩）大棗（二十枚）蠐蟲（各五十枚）

右七味咬咀以水八升煮取二升分再服

肾中瘀血搐滿脅膈痛不能久立膝痠寒三里主之

心膈下嘔血上管主之

嘔血肩脅痛呂乾心痛與背相引不可欬欬引腎痛不容主之

嘔血太陵及郄門主之

嘔血上氣神門主之

內傷唾血不足外無膏澤刺地五會
虛勞吐血灸胃管二百壯亦主勞嘔逆吐血少食多飽多唾
百病修多唾多睡
吐血唾血灸胃堂百壯不針
吐血腹痛雷鳴灸天樞百壯
吐血唾血上氣欬逆灸肺輸隨年壯
吐血酸削灸肝輸百壯
吐血嘔逆灸手心主五十壯千金翼云太陵是
凡口鼻出血不止名腦戶灸上星五十壯入髮際一寸是
大便下血灸第二十椎隨年壯

萬病丸散第七論述三首方十三首

論曰聖人之道以慈濟物博求衆藥以戒不虞倉卒之際應手皆得故有萬病方焉余以此方散在羣典乃令學者難用討尋遂鳩撮要妙以為斯品庶其造次可得好事君子安不忘危無事之暇可預和合以備痾瘵也

芫花散治一切風冷痰飲癥癖痞脹萬醫所不治者皆治之一名登仙酒一名三建散方

芫花　桔梗　紫菀　大戟　烏頭
蠷螋　麻黃　白朮　莞花　狼毒
石斛　車前子　王不留行　栝樓根　藥荊
五加皮　莽草　白芷　荊芥　茵芋各十分
附子　天雄　人參　石長生　石南各七分
蓮蘞　牛膝　蛇牀子　菟絲子　狗脊
蒺藜　秦艽各四分　藜蘆五分　署預　細辛
當歸　薏苡人　乾地黃　芎藭　杜仲
厚朴　黃耆　乾薑　芍藥　山茱萸

桂心　吳茱萸　防巳　五味子
柏子人　遠志　蜀椒　獨活　牡丹
橘皮　通草　柴胡　蔓本　昌蒲
茯苓　續斷　巴戟天　食茱萸各二分

右六十四味千金翼中有麻花半夏赤車使者高良薑紫蘇無白朮食茱萸並不治不擇不炙不熬但擣去塵土擣以麪羅下之即與人服無所忌九是猪雞五辛生冷酢滑任意食之彌佳惟不得食諸豆皆殺藥故不得食

藥散三兩　糯米三升　細麴末二升　眞酒五升

先以三大斗水煮米作粥極熟冬月揚去火氣春月稍涼夏月揚絶大冷秋稍温次下麴末搦使和柔相得重下藥末搦使突突然好熟乃下眞酒重搦使散盛不津器中以一淨杖攪散經宿即飲直以布蓋不須密封凡服藥旦空心服之以知爲度覺發動流入四肢頭面習習然爲定勿更加之如法服之常常内消非理加增必大吐利服散者細下篩服一方寸匕和水酒漿飲無在稍增以知爲度服丸者細下篩蜜丸如梧子一服七丸但服此藥者丸及散等並得惟不得作湯若欲得補不令吐瀉但取内消甚大補益勝於五石兼逐諸痾功効一等然作酒服佳於丸散美而易服流行迅疾若有患人抱病多時積蔭宿食大塊久氣癥瘕積聚一切痼結者即須一兩度增令使吐下泄去惡物盡後少服内消便爲補益凡服藥慎勿早食早食觸藥必當大吐吐亦無損須臾還定但令人咽喉痛三兩日後始差服者宜知之平旦服藥至午時待藥勢定宜先食冷飯葅飲冷漿水午後藥勢好定任食熱食無忌若藥勢未定時不得強起行行即運悶旋倒眼花暗然迷絶

此是逐風所致不須疑怪風盡乃後縱令多服更佳不然
悶時但臥須臾酣然不異於常若其定後在意所之
若必便旋當策杖如廁少覺悶亂即須坐住坐住即醒醒
乃可行病在膈上久冷痰癊積聚癥結疝瘕宿食堅塊欬
逆上氣等一切痼結重病終日吐唾逆氣上衝胷喉此皆
胃口積冷所致三焦腸間宿冷以成諸疾如此例便當吐
却此等惡物輕者一度下轉藥令吐却若重者三五度下
之令盡其吐狀法初吐冷氣沫次吐酢水須臾吐黃汁大
濃甚苦似牛涎病若更多者當吐出紫痰似紫草汁非常
齒齦有此者例入死道不久定死若有疰者吐血陳久黑
血新者鮮血吐罷永差一世不發下此吐藥當時大悶須
臾自定即不虛憒得冷飲食已耳不虛聾手足不瘃若胃
口有前件等病勢久成者正當吐時有一塊物塞胷喉吐復
不出咽復不入當有異種大悶更加一二合藥酒重投藥
下少時即當吐出塊物如拳大眞似鴈雞子中黃著地以
刀斫碎重者十塊輕者三五枚凡人有上件等病若服藥
時不吐却者當時雖得漸損一二年後還發爲此故須下
吐藥欲服取吐者當以春三月服之春宜吐故也凡膈上
冷少腹滿腸鳴膀胱有氣冷利多者須加利藥於此酒內
服之便去惡物利法出泔淀如清水如黃汁如靑泥輕者
一兩度下利藥得利以盡病源重者五度下利藥令使頻
得大利以盡病根利法旦起服藥比至晡時可得兩三行
即斷後服凡長病人瘦弱虛損老人貴人此等人但令少
服積日漸漸加令多內消差除久病不加吐利也藥若傷
多吐利困極不止者服方寸匕生大豆末水服之即定及
藍葉烏豆葉嚼以咽之登時即定此據大困時用之小小

時不須凡在世人有虛損陽衰消瘦骨立者服之非常補
益旬月之間肌膚充悅顏色光澤髓溢精滿少壯一等凡
衆痾萬病皆除之治一切風病癖節風二十兩和酒五斗
賊風熱風大風上同偏風瘓癋風癱緩風十二兩和酒三
斗此七種並帶熱須加冷藥押使常數便利賊風掣瘛八
兩和酒二斗濕風周痺八兩和酒二斗腰脚攣痛十二兩
和酒三斗筋節拘急八兩和酒二斗重病後汗不流初覺
三服一服一盞年久服一升食熱食如錐刀刺者八兩和
酒二斗口喎面戾一眼不合者初得四兩和酒一斗半心
十二兩和酒三斗頭面風似虫行又似毛髮在面上者八
兩和酒二斗起即頭旋良久始定者四兩和酒一斗心悶
嘔逆項強者風在心藏欲風欲雨便即先發者八兩和酒
二斗因瘡得風口強脊脉急者五服即定一服一盞治一

切冷病積冷癥瘕瘦者四兩和酒一斗強者六兩和酒一斗
半痰飲疝瘕六兩和酒一斗半宿食嘔吐四兩和酒一斗
癥瘕腸鳴噫八兩和酒二斗癩痔塊堅冷噉上氣二十兩
和酒五斗奔豚冷氣六兩和酒一斗半噎六兩和酒一斗
半久痃八兩和酒二斗冷痢六兩和酒一斗半久勞八兩
和酒二斗卒中惡注忤心腹脹氣急欲死者三服定一服
一盞大吐出鮮血瘴氣三服定一服一盞蠱毒五服定一
服一盞温瘧五服定一服一盞瘡瘧五服永差一服一盞
治婦人諸風諸病等並依前件帶下十二兩和酒三斗崩
中六兩和酒一斗半月閉不通六兩和酒一斗半冷病不
產六兩和酒一斗半斷緒不產八兩和酒二斗月水前後
不調乍多乍少亦令人絶產四兩和酒一斗產後風冷不
產六兩和酒二斗若重者八兩和酒二斗甚者十六兩和

酒三斗大重者子宮下垂十六兩和酒四斗

論曰暇覽前古莫覩此方有高人李孝隆者自云隋初受之於定州山僧惠通道人此後用之大有效驗秘而不傳但得其藥其方不可得而聞始吾得之於靜智道人將三紀於茲矣時俗名醫未之許也然比行之極有神驗其用藥殊不倫次將服節度大不近人情至於救急其驗特異方知神物效靈不拘常制至理關感智不能知亦猶龍吟雲起虎嘯風生此其不知所然而然雖聖人莫之辨也故述之篇末以貽後嗣好學君子詳之非止救物兼深抑亦庶幾於博見矣

耆婆萬病丸治七種癖塊五種癲病十種症忤七種飛尸十二時瘧疾十種水病八種大風十二種蠱毒五種黃病十二種癇痺并風入頭眼暗漠漠及上氣欬嗽喉中如水雞聲不得眠臥飲食不作肌膚五藏滯氣積聚不消擁閉不通心腹脹滿及連脊背鼓氣堅結流入四肢或復乂心膈氣滿時定時發十年二十年不差五種下痢疳蟲寸白諸蟲上下冷熱久積痰飲令人多睡消瘦無力蔭入骨髓便成滯患身體氣腫飲食嘔逆腰脚酸疼四肢沈重不能久行立婦人因產冷入子藏藏中不淨或閉塞不通胞中瘀血冷滯出流不盡時時疹痛為患或因此斷產并小兒赤白下痢及胡臭耳聾鼻塞等病此藥以三丸為一劑服藥不過三劑萬病悉除說無窮盡故稱萬病丸以其牛黃為主故一名牛黃丸以耆婆良醫故名耆婆丸方

牛黃　麝香　犀角一方云一銖今各一分　朱砂

雄黃　黃連　禹餘粮　大戟　芫花

芫青六枚　人參　石蜥蜴一寸　茯苓　乾薑

桂心　當歸　芎藭　甘遂　芍藥　甘遂

黃芩　桑白皮　蜀椒　細辛　桔梗
巴豆　前胡　防風各一分　蜈蚣三枝　紫菀　蒲黃　葶藶
右三十一味崔氏無黃芩桑白皮桔梗防風爲二十七味並令精細牛黃麝香犀角朱砂雄黃禹餘粮巴豆別研餘者合擣重絹下之以白蜜和更擣三千杵密封之破除日平旦空腹酒服三丸如梧子取微下三升惡水爲良若卒暴病不要待平旦無問早晚即服以吐利爲度若不吐利更加一丸或至三丸五丸須吐利爲度不得限以丸數病强藥少即不吐利更非他故若其發遲以熱飲汁投之若吐利不止即以醋飯兩三口止之服藥忌陳臭生冷酢滑粘食大蒜猪魚雞狗馬驢肉白酒行房七日外始得一日服二日補之得食新米韭骨汁作羹粥臛飲食之三四頓大良亦不得全飽產婦勿服之吐利以後常須閉口少語於無風處温牀暖室將息若旅行卒暴無飲以小便送之佳若一歲以下小兒有疾者令乳母服兩小豆亦以吐利爲度近病及卒病皆用多積久疾病即少服常取微溏利爲度

卒病欲死服三丸如小豆取吐利即差

卒得中惡口噤服二丸如小豆煖水一合灌口令下微利即差

五症鬼刺客忤服二丸如小豆不差後日更服三丸

男女邪病歌哭無時腹大如甕脹服二丸如小豆日二夜一間食服之

猫鬼病服三丸如小豆不差後日更服二丸如小豆不差更服

蠱毒吐血腹痛如刺服二丸如小豆未差更服

瘧病未發前服一丸如小豆不差後日更服

諸有痰飲者服三丸如小豆
冷癖服三丸如小豆日三皆間食常令微溏利
宿食不消服二丸如小豆日三服皆間食以利差止
癥瘕積聚服二丸如小豆取利
拘急心腹脹滿心痛服三丸如小豆不差更服
上氣喘逆腎滿不得卧服二丸如小豆不差更服
大痢服一丸如小豆日三
疳濕以一丸如杏人和酢二合灌下部亦服二丸如小豆
水病服三丸如小豆日二皆間食服之差止人弱隔日服
頭痛惡寒服二丸如小豆覆取汗
傷寒時行服三丸如小豆日三間食服之
小便不通服二丸如小豆不差明日更服
大便不通服三丸如小豆又內一丸下部中即通

耳聾聤耳以綿裹一丸如小棗核塞之差
鼻齆服二丸如小豆即差
癰腫丁腫破腫內一丸如麻子日一傳其根自出差
犯丁腫血出猪脂和傅有孔內孔中差止
脊背腰脅腫以酢和傅腫上日一易又服二丸如小豆
癩瘡以酢泔洗之取藥和猪脂傅之
瘻瘡有孔以一丸如小豆內孔中日別易差止
痔瘡塗綿筋上內孔中即差
瘰癧以酢和傅上差
諸冷瘡積年不差者以酢和傅上日別一易立差
癬瘡以布揩令汁出以酢和塗其上亦餅貼差
惡刺以一丸內瘡孔中即差
蝮蛇螫取少許內螫處若毒入腹心悶欲絶者服三丸如

小豆
蠐螬螫以少許傅螫處
蜂螫以少許傅螫處
婦人諸疾胞衣不下服二丸如小豆取吐利即出
小兒客忤服二丸如米和乳汁傅乳頭令嘬之
小兒驚癎服二丸如米塗乳頭令嘬之看兒大小量之
小兒乳不消心腹脹滿服二丸如米塗乳頭令嘬之不差
更服
治一切蠱毒妖邪鬼疰病者有進有退積聚堅結怱痛如錐鑿
不得坐卧及時行惡氣溫病風熱瘴氣相染滅門或時熱如
瘖瘧咽喉腫塞不下食飲或煩滿短氣面目時赤或目中赤
黃或乾嘔或吐逆或下痢赤白或熱氣如雲或欲狂走自殺
或如見鬼或手足清冷或熱飲冷水而不知足或使手掇空
或面目癰腫生瘡或耳目龔暗頭項背脊強不得屈伸或手
足卒攣或百鬼惡疰狐魅走入皮膚痛無常處方
麝香
馬齒礬
馬目毒公 特生礬石 丹砂
右八味末之別擣巴豆如膏合擣五千杵內蜜更擣一萬
杵丸如小豆強人服二丸弱人一丸入腹雲行四布通徹
表裏從頭下行周徧五藏六腑魂魄靜定情性得安病在
膈上吐膈下利或蛇蟲諸毒五色熱水或不吐下便微漸
除差萬蠱妖精狐狸鬼魅諸久固癖堰皆消散在表汗出
在裏直下忌名其藥故此方無名也
仙人玉壺丸方
雄黃 藜蘆
巴豆 八角附子
丹砂 礬石

右六味先擣巴豆三千杵次內礬石又擣三千杵次內藜蘆三千杵內蜜又擣萬杵佳若不用丹砂者內眞朱四兩無在每內藥輒治五百杵內少蜜恐藥飛揚治藥用王相吉日良時童子齋戒為良天晴明日無雲霧白書藥成密器中封之勿泄氣著清潔處大人九如小豆服藥欲下病者宿勿食旦服二九不知者以煖粥飲發之令下下不止飲冷水以止之病在膈上吐膈下利或但噫氣而已即若欲漸除及將服消病者服如麻子九二九

卒中惡欲死不知人以酒若湯和二九強開口灌喉中鬼疰病百種不可名狀無常或腹大絕經狀如妊娠漿服二男女與鬼交通歌哭無常或腹大絕經狀如妊娠漿服二九如胡豆大日三夜一又苦酒和之如粉旦旦傅手間使

心主心主在手腕後第一約橫文當中指至暮又傅足三陰三陽及鼻孔柒只愈又漿服麻子大一九日三三十日止

惡風逆心不得氣息服二九

若腹中如有蟲欲鑽齕出狀急痛一正一作此是惡風服二九

憂恚氣結在胷心苦連噫及欬胷中刺痛服如麻子三九日三

心腹切痛及心中熱服一九如麻子日三五日差

腹痛脹滿不食服一九

澼飲痰飲旦服一九

風疝寒疝心疝弦疝每發腹中急痛服二九

卒上氣氣但出不入并逆氣衝喉胃中暴積聚者服二九

日再

癥結堅痞服一九日三取愈
積寒熱老痞服二九立愈
食肉不消腹堅脹服一九旦進牛羊炙三臠須臾便服三九如
腹中三蟲宿勿食明旦中不下更服二九必有爛蟲下
胡豆日中當下蟲過日中不下更服二九必有爛蟲下
卒關格不得大小便欲死服二九
卒霍亂心腹痛煩滿吐下手足逆冷服二九
下痢重下者服一九取斷
瘧未發服一九已發二九便斷
若寒熱往來服一九
傷寒敕潘時氣熱病溫酒服一九厚覆取汗若不汗更服
要取汗
若淋瀝瘦瘠百節酸疼服一九日三

頭卒風腫以苦酒若膏和傅之絮裹之
癰疽痤瘭瘰癧及欲作癰以苦酒和傅之
若惡瘡不可名瘑疥疽以膏若苦酒和先以塩湯洗瘡去
痂拭乾傅之
鼠瘻以猪脂和傅瘡取駮舌狗子舐之
中水毒服二九若已有瘡苦酒和三九傅瘡
耳聾膿血汁出及卒聾以赤穀皮裹二九內之
風目赤或痒視物漠漠淚出爛眥蜜解如粉塗注目眥
齒痛綿裹塞孔中
若為蠱毒所中吐血腹內如刺服一九如麻子稍加之如
胡豆亦以塗鼻孔中又以膏和通塗腹背亦燒之熏口鼻
若蛇蝮諸毒所中吐血腹內如刺服一九如麻子稍加之如
婦人產後餘疾及月水不通往來不時服二九日再

婦人胥中苦滯氣息不利少腹堅急繞臍絞痛漿服如麻子一丸稍加之如小豆大

小兒百病驚癇癖痞塞及有熱百日半歲者以一丸如黍米大置乳頭與服之一歲以上如麻子一丸日三以飲服

小兒大腹及中熱惡毒食物不化結成積聚服一丸如麻子

小兒寒熱頭痛身熱及吐哯服一丸如麻子

小兒羸瘦丁奚不能食食不化漿水服二丸日三又苦酒和如梧子傅腹上良

一切萬病量之不過一二丸莫不悉愈

欲行問孝省病服一丸二丸繫頸上行無所畏至喪家帶一丸辟百鬼若獨止宿山澤冢墓社廟叢林之中燒一丸百鬼走去不敢近人以蠟和一丸如彈丸著絳囊繫臂上男左女右山精鬼魅皆畏之

張仲景三物備急丸司空裴秀為散用治心腹諸卒暴百病方

大黃　乾薑　巴豆　各等分

右皆須精新多少隨意先擣大黃乾薑下篩為散別研巴豆如脂內散中合擣千杵即爾用之為散亦好下蜜為丸密器貯之莫令歇氣若中惡客忤心腹脹滿刺痛口噤氣急停屍卒死者以煖水若清酒服大豆許三枚老小量之扶頭起令得下喉須臾未醒更與三枚腹中鳴轉得吐利便愈若口已噤可先和成汁傾口中令從齒間得入至良

治萬病大理氣丸方

牛膝　甘草　人參　茯苓　遠志

恒山　苦參　丹參　沙參　龍膽

芍藥　牡蒙　半夏　杏人　紫菀

龍骨　天雄　附子　葛根　橘皮

巴豆 狼牙 各二兩 大黃 牡蠣 白朮 各三兩

白薇 六分 玄參 十分 菴蕳一枚大者 生薑 屑五兩

右二十九味擣篩二十七味生藥令熟爻擣巴豆杏人如膏然後和使相得加白蜜擣五千杵丸如梧子空腹酒服七九日三疝瘕癖結五十日服永差吾常用理氣大覺有效大麝香丸治鬼疰飛尸萬病皆主之方

麝香 三分 牛黃 附子 鬼臼 眞珠

莽草 犀角 礬石 細辛 桂心

獺肝 藜蘆 各三分 蜈蚣 各一枚 丹砂 二兩

雄黃一兩 巴豆 杏人 各五十枚 地膽外臺作蜚蠊蟲 各一枚

元青 亭長 斑猫 各七枚 礬石 八分

右二十三味末之蜜和更擣三千杵飲服如小豆一丸日二漸加至三九蟲毒所螫摩之以知爲度若欲入毒疫癘鄉死喪病處及惡鬼塚墓閒絳袋盛之男左女右肘後繫之又以少傅鼻下人中及卧不厭

小麝香丸治病與大麝香丸同方

麝香 三分 雄黃 當歸外臺不用 丹砂 各四分 乾薑

桂心 芎藭 各五分 莽草 犀角 梔子人 各三分

巴豆 五十枚 附子 烏頭 各五枚 蜈蚣一枚

治諸熱不調紫葛丸方

右十四味末之加細辛五分蜜和合擣千杵服如小豆三九日三可至五九一切尸疰痛悉皆主之

紫葛 石膏 人參 丹參

細辛 紫參 苦參 玄參

齊鹽 代赭 蒻蓉 巴豆

烏頭 各三分 乾薑 桂心 獨活 各五分

右十六味末之蜜和更擣一萬杵服如小豆六丸食前三
丸食後三丸忌五辛猪雞魚蒜餘不在禁限若覺體中大
熱各減一丸服之令人肥悅好顏色强陽道能食服藥後
十日得利黃白汁大佳婦人食前食後只服二丸兩歲以
下兒服米粒大令人能飲酒除百病藥之功能損益備述
如左

腹中積聚心腹滿　心下堅　宿食　痰飲　食吐逆
上氣　欬嗽　咽喉鳴　短氣　黃疸　久瘧　面腫
四肢煩重　身浮腫　坐起體重　熱病濕暍下部痒
大腸出　熱淋　關格不通　下利　顏色不定羸瘦無力
弱房少精精冷　體瘡痒　身體斑駁　從高墮下絶傷
墮胎後傷損　皮肉焦爛　月水不定或後或前
月水斷心下悶滿　肩膊沈重　小兒百病　小兒癖氣

乳不消小兒身常壯熱腹内有病所録諸病皆紫葛丸治
之若積日服之未愈消息準方服之取差止秘不傳藥性
毒妖魅溫瘧但是一切惡毒無所不治方
冷尤宜患熱人服之

太一神精丹主客忤霍亂腹痛脹滿尸疰惡風癲狂鬼語蠱

丹砂　曾青　雌黃　雄黃
礜石各四兩　金牙二兩半

右六味各擣絹下篩惟丹砂雌黃雄黃三味以醯醋浸之
曾青用好酒銅器中漬紙密封之日中曝之百日經憂急
五日亦得無日以火煖之訖各研令如細粉以醯酢拌使
乾濕得所内土釜中以六一泥固際勿令泄氣乾然後安
鐵環施脚高一尺五寸置釜上以漸放火無問軟硬炭等
皆得初放火取熟兩秤炭各長四寸置於釜上待三分二

分盡即益如此三度盡用熟火然後用益生炭其過三上
熟火巳外皆須加火漸多及至一伏時其火巳欲近釜即
便滿其釜下益炭經兩度即罷火盡極冷然後出之其藥
精飛化凝著釜上五色者上三色者次一色者下雖無五
色但色光明皎潔如雪最佳若飛上不盡更令與火如前
以雄雞翼掃取或多或少不定研和棗膏丸如黍粒一本云丹
砂曾青雄黃雌黃各二斤丹砂以大醋蔕罌中漬曾青美酒漬紙密封閉日暴一百日雄黃各油煎九日九夜雌黃皆勿研之別以大醋拌之令浥浥在下次下雌黃次曾青次丹砂以去油膩訖更擣數千杵內藥土訖更擣數千杵以雄雞翼掃取或多或少不定研和棗膏丸如黍粒一本云丹
釜中土泥塗勿令餘毫毛許乾以剛炭火燒之九日三九夜二十七日冷之一日一夜以刀子於釜際利著一匝開之取
丹成訖細研如粉以棗膏和一切丸丹不得用蜜皆用棗
膏學者宜知此術舊不用之

治偏風大風惡疾癩瘤癰節鬼
打等最良服之法平旦空腹服一丸如黍米爲度其瘡病
積久百方不差又加心腹脹滿上氣身面脚等並腫垂死
者服二丸吐即差亦有不吐差者若不吐復不差者更服
一丸半仍不差者後日增半丸漸服無有不差氣亦定當
吐出青黃白物其因瘡兩脅下有癖堀者亦當消除若心
腹不脹滿者可與一丸日日加之以知爲度不必專須吐
亦可一丸即差勿併與服亦可三日一服皆須以意斟酌
量得其宜或腹內有水便即下者勿怪若患瘡日近精神
健亦可斟酌病人藥性併與兩丸作一丸頓服之皆至午
後食勿使冷勿使熱豉漿粥任意食之若病瘡盜汗虛弱
者日服一丸三日吐即止若患瘡不汗氣復不流脚冷者
服一丸至三日若不汗氣復脚即暖有潤汗不至三日吐
即止若患瘡無顏色者服藥後三日即有顏色亦有須吐
差者亦有服少許而差者亦有殺藥強人服三四丸始覺
藥行者凡人稟性不同不可一槩與之但作黍米大服之

爲始漸加以知爲度藥力驗壯勿併多服特愼油麪魚肉
蒜當清淨服之若有患久不差在牀羸瘦并腹脹滿及腫
或下痢者多死但與藥救之十人中或差三四人也又一
說癥瘕積聚服一刀圭以飲漿水送之治諸卒死中惡客
忤霍亂腹滿體帶五尸疰惡風疰忤大病相易死亡滅門
狂癲鬼語已死氣絶心上微暖者扶起其頭以物校開口
不可開琢去兩齒以漿飲送藥藥下即活諸久病者日服
一刀圭覆令汗汗出即愈不愈者不過再服亦有不汗而
差復有不汗不愈者服如上法加半刀圭以差爲度常以
絳囊帶九刀圭散男左女右小兒繫頭上辟瘴毒惡時氣
射公小兒患可以苦酒和之塗方寸紙上著兒心腹上令
藥在上治之亦有已死者冬二日夏一日與此藥服得藥
下便活若不得入腹不活若加金牙礜石者服至五服內

必令吐逆下利過此即自定其藥如小豆大爲始從此
漸小不得更大大風惡癩可二十服偏風歷節諸惡病者皆止一二服量人輕重強
病等可二十服自餘諸惡病者皆止一二服量人輕重強
弱不得多與若欲解殺藥但爛煮食肥猪肉服此藥後小
應頭痛身熱一二日來大不能得食味後自漸漸得氣味
五日後便能食若貪食過多者宜節之若服藥下悶亂可
煮木防已湯服之即定凡言刀圭者以六粟爲一刀圭一
說云三小豆爲一刀圭
作土盆法取兩箇瓦盆各受二大斗許以甘土塗其內令極
乾又一法作一瓦盆作一熟鐵盆各受九升瓦在上鐵在下
其狀大小隨藥多少不必依此說一本云擣好甘土絹篩水
一外內細紙均停可受十斤亦可隨藥多少作之陰乾三十
日置日中暴之三十日夕收轉向日乾說以糠五斗內盆
糠中四向上欄擁之令糠厚七寸以火從下放之五日夜勿令人近遍盆周回上下各一日一夜乃取掃去灰待冷

拭冷淨以黃丹醋和如稀粥掃其中令厚一分乃內藥凡合九丹八石招魔太清神仙諸大丹皆用此釜作之乃成終不落節其古盆六一泥及鐵釜皆除去之勿更用也此釜一具前後數十回用不動久久轉牢此法師甚秘之余訣令當来天下學士得解之所以委曲具而述之

作六一泥法

赤石脂　牡蠣　滑石　礬石

黃礬　蚯蚓屎　鹵土　各二兩

右取驗醋以足為度若無鹵土以蓋代之先作甘土泥以泥各別裹前黃礬等五種作團裹之勿令泄氣以火燒周三日最好一日亦得出火破團取藥各擣碎綃篩然後與蚯蚓屎鹵土等分以醋和之如稠粥既得好醋可用二分醋一分水和用取前乙盆以此泥塗之曾青如蚯蚓屎如黃連佳世少此者好嵐嵓碌亦得差病丹砂亦勘粟砂亦得蒼不用礜石金牙今加之

用治萬種惡風神良凡有患連年積歲不可治者宜須合此一篇皆以王相日天晴明齋戒沐浴如法合之

述曰古之仙者以此救俗特為至秘余以大業年中數以合和而苦雄黃曾青難得後於蜀中遇雄黃大賤又於飛烏玄武大獲曾青蜀人不識曾青令須識者隨其大小但作蚯蚓屎者即是如此千金可求遂於蜀縣魏家合成二釜以之治病神驗不可論宿癥風氣百日服者皆得痊愈故叙而述焉

凡雄黃皆以油煎九日九夜乃可入丹不爾有毒慎勿生用之丹必熱毒不堪服慎之

倉公散方

特生礬石　皁莢　雄黃　藜蘆　各等分

右四味治下節主卒鬼擊鬼屍鬼刺心腹痛如刺下血便死不知人及臥魘齘脚腫不覺者諸惡毒毋氣病取前散如

大豆內管中吹病人鼻得嚏則氣通便活若未嚏復更吹之以得嚏爲度此藥起死人漢文帝時太倉令淳于意方

小金牙散治南方瘴癘疫氣腳弱風邪鬼疰方

金牙分五　雄黃　革薤　蜀椒
由跋　桂心　莽草　天雄　朱砂
麝香　烏頭分各三　牛黃一分　蜈蚣一枚六寸者
細辛　菱蕤　犀角　乾薑分各三　黃連四分

右十九味治下篩合牛黃麝香擣三千杵溫酒服錢五匕日三夜二以知爲度絳袋盛帶男左女右一方寸匕省病問孝不避夜行塗人中晨昏霧露亦塗之

大金牙散主一切蠱毒百疰不祥醫所不治方

金牙　鸛骨　石膏分各八　大黃　鼈甲
梔子人　鬼督郵　龜甲　桃白皮　銅鏡鼻

乾漆分各四　桂心　芍藥　射干　升麻
徐長卿　蔦尾　蜂房　細辛　乾薑
芫消　由跋　馬目毒公　羚羊角
犀角　升草　狼毒　蜣螂　龍膽
狼牙　雄黃　眞朱分各三　地膽　樗雞
芫青枚各七　桃奴　巴豆七枚各二　雷丸　龍牙
白朮　胡蔞實　活草子分各六　鐵精
赤小豆合各二　烏梅分各一　蛇蛻皮尺一　斑猫七分
芫花　莽草　射罔

右五十味治下篩服一刀圭稍加至二刀圭帶之辟百邪

金澤文庫

朝奉郎守太常少卿充秘閣校理醫官院護軍賜緋魚袋臣林億等校正

心藏脉論第一
心虛實第二 心小腸俱虛實附
心勞第三
脉極第四
脉虛實第五
心腹痛第六
胃痺第七
頭面風第八 頭眩生髮 面風白赤禿 髮白

金澤文庫

論曰心主神神者五藏專精之本也爲帝王監領四方夏王七十二日位在南方離宮火也有生之來謂之精兩精相搏

謂之神所以任物謂之心神者心之藏也舌者心之官故心氣通於舌舌和則能審五味矣心在竅爲耳夫心者火也腎者水也水火相濟心氣通於舌舌非竅也其通於竅者寄見於耳左耳丙右耳丁循環炎宮上出脣口知味榮華於耳外主血內主五音息重十二兩中有三毛七孔盛精汁三合神名呴呴主藏神號五神居隨節應會故云忘藏脉脉舍神在氣爲吞在液爲汗心氣虛則悲不已實則笑不休心氣盛則夢救火陽物得其時則夢燔灼心氣盛則夢喜笑及恐畏厥氣客於心則夢丘山煙火凡心藏象火與小腸合爲腑其經手少陰與太陽爲表裏其脉洪相於春王於夏時萬物洪盛垂枝布葉皆下垂如曲故名曰鉤心脉洪大而長洪則衛氣實實則氣無從出大則榮氣萌萌洪相薄可以發汗故名曰長長洪相得即引水漿漱灌經絡津液皮膚太陽洪大皆是毋軀幸得戊巳用牢

根株陽氣上出汗見於頭五內乾枯胞中空虛醫又下之此爲重虛脉浮有表無裏陽無所使不但危身并中其毋

夏脉如鉤夏脉心也南方火也萬物之所以盛長也故其氣來盛去衰故曰鉤反此者病何如而反其氣來盛去亦盛此謂太過病在外其來不盛去反盛此謂不及病在內太過則令人身熱而膚痛爲浸淫不及則令人煩心上見欬唾下爲氣泄

心脉來累累如連珠如循琅玕曰平夏以胃氣爲本心脉來喘喘連屬其中微曲曰心病心脉來前曲後居如操帶鉤曰心死

真心脉至堅而搏如循薏苡子累累然色赤黑不澤毛折乃死夏胃微鉤曰平鉤多胃少曰心病但鉤無胃曰死胃而有石曰冬病石甚曰今病

心藏脉脉舍神怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破脳脫
肉毛悴色夭死于冬
手少陰氣絶則脉不通少陰者心脉也心者脉之合也脉不
通則血不流血不流則髮色不澤面黑如漆柴者血先死壬
篤癸死水勝火也
心死藏浮之實如豆麻擊手按之益躁疾者死夏心火王其脉
浮大而散洪一作曰平反得弦細而長者是肝之乘心子之乘母
子爲虛邪雖病易治反得大而緩者是脾之乘心母之歸
爲實邪雖病自愈反得沈濡而滑者是腎之乘心水之剋火
爲賊邪大逆十死不治反得微澁而短者是肺之乘心金之
陵火爲微邪雖病即差腎乘心必瘧
左手開前寸口陰絶者無心脉也苦心下熱痛掌中熱時時
善歐口中傷爛刺手少陽治陽左手開前寸口陰實者心實

也是心下有水氣憂恚發之刺手心主治陰
心脉來累累如貫珠滑利再至日平三至日離經病四至脫
精五至死六至命盡手少陰脉也
心脉急甚爲瘈瘲微急爲心痛引背食不下緩甚爲狂笑微
緩爲伏梁在心下上下行有時唾血大甚爲喉介微大爲心
痺引背善泪出小甚爲善噦微小爲消癉滑甚爲善渴微滑
爲心疝引臍少腹鳴濇甚爲瘡微濇爲無溢維厥耳鳴癲疾
心脉搏堅而長當病舌卷不能言其濡而散者當病消渴自
巳一作偈環
赤脉之至也喘而堅診曰有積氣在中時害於食名心痺得
之外疾思慮而心虛故邪從之扁鵲曰心有病則口生瘡腐爛
心在聲爲笑在變動爲憂在志爲喜喜傷心精氣并於心則喜
心虛則悲悲則憂實則笑笑則喜

時主夏病者時間時甚知其源取其輸觀其應審其
病先發於心者心痛一日之肺肺喘欬三日之肝脇痛支滿五
日之脾閉塞不通身痛體重三日不已死冬夜半夏日中
病在心日中慧夜半甚平旦靜
假令心病北行若食豚魚得之不者當以冬時發得病以壬
癸日也
凡心病之狀肖內痛脅支滿兩脅下痛膺背肩甲間痛兩臂
內痛虛則肖腹大脅下與腰背相引而痛取其經手少陰太
陽舌下血者其變病刺郄中血者
心脉沈之小而緊浮之不喘苦心下聚氣而痛食不下喜咽
唾時手足熱煩滿時忘不樂喜太息得之憂思
心病其色赤心痛短氣手掌煩熱或啼笑罵詈悲思愁慮面
赤身熱其脉實大而數此為可治宜服關藥春當刺中衝

夏刺勞宮季夏刺大陵皆補之秋刺間使冬刺曲澤皆瀉之
此是手心主心胞胳經
又當灸巨闕五十壯背第五椎百壯
邪在心則病心痛善悲時眩仆視有餘不足而調之其輸
愁憂思慮則傷心心傷則苦驚喜忘善怒
心中風者翕翕發熱不能起心中飢而欲食食則嘔
心中寒者其人病心如懸狀劇者心痛徹背背痛徹心
如蟲注其脉浮者自吐乃愈
心傷其人勞倦頭面赤而下重心中痛徹背自煩發熱當臍
跳手其脉弦此為心藏傷所致也
邪哭使魂魄不安者血氣少也
其人即畏合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰氣衰者
魂魄飛揚者主五藏空虛也即邪神居之神靈所使鬼而下之脉

短而微其藏不足則魄不安魄屬於肝魄屬於肺肺主津液即爲涕泣出肺氣養者即泣出肝氣養者魄則不安肝主善怒甚者呼
心水者其人身體腫重一作而少氣不得臥煩而躁其陰大腫
真心痛手足清至節心痛甚且發夕死夕發旦死
心腹痛懊憹發作腫聚往來上下行痛有休作心腹中熱善
渴涎出者是蚘咬也以手聚而堅持之無令得移以大針刺
之久持之蟲不動乃出針肌肉中有蟲蚘咬皆不可取以小針
心脹者煩心短氣臥不安凡心脉急名曰心疝少腹當有形
使故少腹當有形
診得心積沈而乾時上下無常處痞脅滿悸腹中熱面赤咽
乾心煩掌中熱甚則唾血身瘙瘡主血厥夏差冬劇色赤也
心之積名曰伏梁起於臍上至心大如臂久久不愈病煩

心心痛以秋庚辛日得之何也腎病傳心心當傳肺肺適以
秋王王者不受邪心復欲還腎腎不肯受因留結爲積故知
伏梁以秋得之
心病煩悶少氣大熱熱上湯心嘔欬吐逆狂語汗出如珠身
體厥冷其脉當浮今反沈濡而滑其色當赤而反黑者此是
水之尅火爲大逆十死不治
徵音人者主心聲也心聲笑其音竽其志喜其經手少陰厥
逆太陽則榮衛不通陰陽反錯陽氣外擊陰氣內傷傷則寒
寒則虛虛則驚掣心悸定心湯主之方在第十四卷中語聲
前覺後急後聲不續前混後濁口喎冒昧好自笑此爲厲風
入心荊瀝湯主之方在第八卷中心虛風寒半身不遂骨節
離解緩弱不收便痢無度口面喎邪薑附湯主之方在第八
卷中此病不盈旬日宜急治之又笑而呻呻而反憂此爲水

剋火陰擊陽陰起而陽伏則實實則傷熱熱則狂悶亂冒
昧言多謬誤不可採聽此心已傷若其人口脣正赤可療其
青黃白黑不可療也
心病爲癲者令人心煩甚欲得清水反寒多不甚熱亏在第
十卷中若其人本來心性和雅而忽躁急反於常白朮酒主
之方在第八卷中或言未音便佐以手剔脚爪此人必死禍
雖未及名曰行尸此心病聲之候也虛則補之實則瀉之不
可治者明而察之
赤爲心心合脉赤如雞冠者吉心主舌舌是心之餘其人火
安地疾行搖肩背肉滿有氣輕財少信多慮見事明了好顧
急心不壽暴死耐春夏不耐秋冬秋冬感而中病主手少陰
敦敦然髆肝長短傾正則心應之正赤色小理者則心小小

則邪弗能傷易傷以憂粗理者則心大大則虛虛則寒寒則
憂不能傷易傷於邪無髆肝者則心高高則實實則熱熱則
滿於肺中悶而善忘難開以言髆肝小短舉者則心下下則
藏外易傷於寒易恐以言髆肝長者則心堅堅則藏安守固
髆肝弱以薄者則心脆脆則善病消癉熱中髆肝直下不舉
者則心端正端正則和利難傷髆肝向一方者則心偏傾偏
傾則操持不一無守司也一云諾髆肝小短薄弱而下則心下下則虛虛則傷寒病憂恚內損心暴痛而好唾清涎口臭虫齒痛侵脣齒若髆肝高起則心高高則實實則熱熱則蒲於心悶而善忘恐悸喉燥口痛牙齒痛舌
凡人部分陷起者必有病生小腸太陽爲心之部其處陷起
沉濁屬內浮清居外若外病內入小腹蒲起內病裏出所部
陷沒外入內前治陽後補陰內出外前補陰後瀉陽陽則實
熱陰則虛寒在陽主外在陰主內凡人死生休咎則藏神前

變形于外人心前病則口爲之開張若心前死則枯黑語聲不轉若天中等分墓色應之必死不治看應增損斟酌賒促賒則不出四百日內促則不延旬月之間心病少愈而卒死何以知之曰赤黑色黯黯如博碁見頗度年上此必卒死絶一日死何以知之兩目回回直視肩息立死凡面赤目白憂恚思慮氣內索面色反好急求棺槨不過十日死又面黃目赤不死赤如衄血死吉凶之色若在於分部脁脁而見赤黑入口此必死不出其年名曰行尸若年上無應三年之中病必死矣

夏火心脉色赤主手太陽也夏取盛經分腠夏者火始治心氣始長脉瘦氣弱陽氣留溢熱熏分腠內至於經故取盛經分腠絶膚而病去者邪居淺也所謂盛經者陽脉也

其脉本在外踝之後應在命門之上三寸命門者在心上一寸也脉根在少澤少澤在手小指端

其筋起於小指之上結於腕上循臂內廉結肘內兌骨之後彈之應小指之上入結腋下其支者後走腋後廉上繞肩甲循頸出足大陽之筋前結於耳後完骨其支者入耳中直出耳上下結於頷上屬目外眥

其脉起於小指之端循手外側上腕出踝中直上循臂骨下廉出肘內側兩骨之間上循臑外後廉出肩解繞肩甲交肩上入缺盆向腋絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支者從缺盆循頸上頰至目兌眥却入耳中其支者別頰上頗抵鼻至目內眥斜絡於顴合手少陰爲表裏少陰本在兌骨之端應在背後同會于手太陰

其手太陽之別名曰支正上腕五寸內注少陰其別者上走肘絡肩髃主心生病病實則小腸熱熱則節弛弛則陽病陽

脉大反逆於寸口再倍病則嗌痛頷腫耳聾目黃卧不能言悶則急坐虛則小腸寒寒則生胣胣則陰病陰脉反小於寸口過於一倍病則短氣百節痛筋急頸痛轉顧不能(此盡是手太陽小腸經筋脉支別為病今取心主包胳少陰心經附於後)手心主之別名曰內關去腕五寸(甲乙作二寸)出於兩筋間循經以上繫於心包絡心系氣實則心痛虛則為煩心取之兩筋間手心主之脉起於胷中出屬心包下膈歷絡三焦其支者循胷出脇下腋三寸上抵腋下循臑內行太陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端其支者別掌中循小指次指出其端是動則病手心熱肘臂攣急腋(乃)腫甚則胷脇支滿心中澹澹大動面赤目黃善笑不休是(大)主脉所生病者煩心心痛掌中熱為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則灸之不盛不虛以(正)經取之盛者則寸口大一寸反小於人迎手少陰之脉起於心中出屬心系上膈絡小腸其支者從心系上俠咽系目系(循胷出脊)壹作其直者復從心系却上肺出腋下下循臑內後廉行太陰心主之後下肘內廉循臂內後廉抵掌後兌骨之端入掌後內廉循小指之內出其端是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是為臂厥是主心所生病者目黃脊滿痛臑臂內後廉痛厥掌中熱痛為此諸病盛則瀉之虛則補之盛者則寸口大再倍於人迎虛者則寸口反小於人迎手少陰之脉獨無輸何也曰少陰者心脉也心者五藏六腑之大主也為帝王精神之所舍其藏堅固邪不能容容之則

傷心傷則神去神去則身死矣故諸邪在於心者皆在心之包胳包胳者心主之脉也故少陰無輸也少陰無輸心不病乎曰其外經腑病藏不病故獨取其經於掌後兌骨之端也夏參月主心小腸赤脉攢病也其源從少陰太陽之氣相搏而停則榮衛不通皮肉痛起太陽動發少陰淫邪之氣因而作則藏腑隨時受夏疫病也其病相若腑虛則陰邪氣所傷咽塞聲嘶故曰赤脉攢病方在傷寒卷中

扁鵲云久腎肝心三輸主治丹溪作毒病當依源爲治表治陰陽調和藏腑疾不生矣

心虛實第二 脉四條 灸法一首 方十一首

心實熱

左手寸口人迎以前脉陰實者手少陰經也病苦閉大便不利腹滿四肢重身熱名曰心實熱也

治心熱實或欲吐而不出煩悶喘急頭痛石膏湯方

石膏一斤 地骨皮五兩 梔子人三十枚 淡竹葉一升 茯苓三兩 小麥三升 香豉一升

右七味㕮咀先以水二斗五升煮小麥竹葉取八升澄清下諸藥煮取二升去滓分三服外臺名瀉心湯

治老小下痢水穀不消腸中雷鳴心下痞滿乾嘔不安瀉心湯方

人參一兩 半夏三兩 黃連二兩 黃芩甘草一兩 乾薑一兩半 大棗十二枚

右七味㕮咀以水八升煮取二升半分三服并治霍亂若寒加附子一枚若渴加栝樓根二兩嘔加橘皮一兩痛加

當歸二兩客熱以生薑代乾薑
心小腸俱實
左手寸口人迎以前脉陰陽俱實者手少陰與巨陽經俱實
也病苦頭痛身熱尺便難心腹煩滿不得卧以胃氣不轉水
穀實也名曰心小腸俱實也
治心實熱躁煩多喜笑恐畏悸懼不安竹瀝湯方
淡竹瀝一升　石膏八兩　芍藥　白朮
梔子人　人參各三兩　知母　茯神
赤石脂　紫菀各二兩　生地黃汁一升
右十一味㕮咀以水九升煮十味取三升去滓下竹
瀝更煎取三升若須利入芒消二兩去芍藥分三服
治心實熱口乾煩渴眠卧不安茯神煮散方
茯神　麥門冬洛三十六銖　通草

昇麻洛三十銖　桂心洛十八銖　知母一兩
赤石脂四十二銖　大棗二十枚　淡竹筎雞子大一枚
右十味治下篩爲麤散以帛裹方寸匕井華水二升半煮
瀉心湯治心氣不定吐血衄血方
大黃二兩　黃連　黃芩洛一兩
右三味㕮咀以水三升煮取一升服之亦治霍亂
治心熱煩悶驚恐安心煮散方
遠志　白芍藥　宿薑洛二兩　茯苓
知母　紫菀　赤石脂　石膏
麥門冬洛四十二銖　桂心　麻黃
黃芩二洛三十六銖　菱蕤三十六銖　人參二十四銖　甘草十一銖
右十五味治下篩爲麤散先以水五升淡竹葉一升煮取

三升去滓煮散一方寸匕牢以絹裹煮時動之煎取八合
爲一服日再
不能食胃中滿膈上逆氣悶熱灸心輸二七壯小兒減之
心虛寒
左手寸口人迎以前脉陰虛者手少陰經也病苦悸恐不樂
心腹痛難以言心如寒恍惚名曰心虛寒也
治心氣不足善悲愁慼怒劒血面黃煩悶五心熱或獨語不
覺喉咽痛古本強冷涎出一作衍嘔善忘恐走不定婦人崩中面
色赤茯苓補心湯方
茯苓四兩　桂心二兩　大棗二十枚
紫石英二兩　甘草二兩　人參二兩
赤小豆一十四枚　麥門冬三兩
右八味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

治心虛寒心中脹滿悲憂或夢山丘平澤半夏補心湯方
半夏六兩　宿薑五兩　橘皮各三兩　白朮四兩
右九味㕮咀以水一斗煮取三升分三服
牛髓丸通治百病虛瘵羸乏等方
牛髓　羊髓　棗膏各一升　茯苓一云茯神　麥門冬
桂心　當歸　乾薑　乾地黃各六銖二十　甘草
五味子　防風一兩　細辛十八銖　白朮四十二銖　人參
右十九味切擣十四味再篩別研棗膏和散次與諸髓
蜜和散攪令相得內銅鉢中於釜湯中銚之取堪爲丸酒
服丸如梧子大三十丸稍加至四十丸日再服

心小腸俱虛

左手寸口人迎以前脉陰陽俱虛者手少陰與巨陽經俱虛也病苦洞泄若寒少氣四肢厥腸澼名曰心小腸俱虛也大補心湯治虛損不足心氣弱悸或時妄語四肢損變氣力顏色不榮方

黃芩　附子　各一兩　甘草　茯苓
桂心　各三兩　石膏
生薑六兩　大棗二十枚
阿膠　麥門冬　各三兩

右十四味㕮咀以水一斗五升煮取五升分四服湯成下糖補心丸治藏虛善恐怖如魘狀及女人產後餘疾月經不調方

當歸　防風　芍藥　甘草
蜀椒　乾薑　附子

細辛　桂心　半夏　厚朴
大黃　猪苓　各一兩　茯苓　一方用扶神　遠志　各二兩

右十六味末之蜜丸如梧子酒服五丸日三不知加至十丸冷極加熟藥

心勞第三論一首方論一首

論曰心勞病者補脾氣以益之脾王則感於心矣人逆夏氣則手太陽不長而心氣內洞順之則生逆之則死順之則治治心勞熱口爲生瘡大便苦難閉澁不通心滿痛小腸熱大黃泄熱湯方

大黃　澤瀉　芒消　各三兩　桂心二兩
通草二兩　大棗三十枚

黃芩　梔子人　石膏八兩　甘草一兩

右十味㕮咀以水九升先以水一升別漬大黃一宿以餘八升水煮諸藥取二升五合去滓下大黃煮兩沸去滓下芒消令烊分三服

脈極第四　論一首　灸法二首　方一首

論曰凡脈極者主心也心應脈脈與心合心有病從脈起又曰以夏遇病爲脈痺脈痺不已復感於邪內舍於心則食飲不爲肌膚欬脫血色白不澤其脈空虛口脣見赤色凡脈氣衰血焦髮墮以夏丙丁日得之於傷風損脈爲心風心風之狀多汗惡風若脈氣實則熱熱則傷心使人好怒口爲色赤甚則言語不快血脫色乾燥不澤食飲不爲肌膚若脈氣虛則寒寒則欬欬則心痛喉中介介如哽甚則咽腫喉痺故曰心風虛實候也若陽經脈病治陰胳陰胳脈病治陽經定其血氣各守其鄉脈實宜瀉氣虛宜補善治病者定其虛實治之取痊病在皮毛肌膚筋脈則全治之若至六腑五藏則半死矣

扁鵲云脈絕不治三日死何以知之脈氣空虛則顏焦髮落脈應手少陰手少陰氣絕則脈不通血先死矣

治脈熱極則血氣脫色白乾燥不澤食飲不爲肌膚生地黃消熱止極強胃氣煎方

生地黃汁各一升　芍藥　白朮各三兩　甘草二兩　生麥門冬去心一升　人參　茯苓　若膏六兩　生姜絞四兩　乾地黃三兩　遠志二升　生蜜各一升

右十三味㕮咀以水一斗二升煮十一味取三升七合去滓下地黃蜜更煎取三升五合分四服

肾中痛引腰背心下嘔逆面無滋潤炙上門隨年壯穴在俠

巨闕兩邊相去各半寸云顏色焦枯勞氣失精宥髀痛不得上頭炙宥髑百壯穴在宥外頭近後以手按之有解宛宛中

脉虛實第五論一首 針灸法二首 方三首

論曰凡脉虛者好驚跳不定脉實者洪滿凡脉虛實之應主于心小腸若其腑藏有病從熱生則應藏寒則應腑也治脉虛驚跳不定乍來乍去主小腸腑寒補虛調中防風丸方

防風 桂心 甘草 人參 麥門冬 茯神 遠志 各三兩 菖蒲 通草

右九味末之白蜜和丸如梧子大酒服三十丸日再加至四十丸

治脉實洪滿主心熱病升麻湯方

升麻 枳子仁 子芩 澤瀉 淡竹葉 芒消 各三兩 生地黃 切一升

右七味㕮咀以水九升煮取三升去滓下芒消分二服治心脉厥大寸口小腸熱齒齲嗌痛麻黃調心淺熱湯方

麻黃 芒硝 各四兩 茯苓 芍藥 各五兩 生地黃 切一升

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓下芒消分二服

治心脉厥大寸口小腸熱齒齲嗌痛麻黃調心淺熱湯方

麻黃 芒硝 各四兩 茯苓 芍藥 各五兩 生地黃 切一升

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓下芒消分二服須利加芒消三兩

脉不出針不容穴在幽門兩傍各二寸五分

心腹痛第六論二首 灸法二十九首 方二十九首 灸法二十五首

論曰寒氣卒客於五藏六腑則發卒心痛胃痺感於寒微者為欬甚者為痛為泄厥心痛與背相引善瘈如物從後觸其心身傴僂者腎心痛也厥心痛腹脹滿心痛甚者胃心痛也

厥心痛如以針錐刺其心心痛甚者脾心痛也厥心痛色蒼蒼如死灰狀終日不得太息者肝心痛也厥心痛卧若從心間痛動作痛益甚色不變者肺心痛也真心痛手足清至節心痛甚旦發夕死夕發旦死蚘心心痛心腹中痛發作腫聚往來上下行痛有休止腹中熱甚涎出是蚘咬也以手按而堅持之勿令得移以大針刺之久持之蟲不動乃出針怱下不可刺中有成聚不可取於輸腸中有蟲蚘咬皆不可取以小針治寒氣卒客於五藏六腑中則發心痛方

大黃　芍藥　蓼苓　桔梗　柴胡 各四兩　升麻　鬼臼　桂心　朱砂 各三兩　鬼箭羽　朴消 各三兩

右十一味咬咀以水九升煮取二升七合分三服先分朱砂作三分一服內朱一分攪令勻服之得快利痛不止宜服後方

赤芍藥 陸兩　桔梗　杏人 各伍兩

右參味咬咀以水陸升煮取參升分參服

九痛丸治九種心痛壹蟲心痛貳注忤痛參風心痛肆悸心痛伍食心痛陸飲心痛柒冷心痛捌熱怱痛玖去來心痛此方悉主之并療冷衝上氣落馬墮車血疾等方

附子　乾薑 各二兩　巴豆　人參　生狼毒 肆兩　吳茱萸 貳合

右陸味末之蜜和空腹服如梧子壹丸卒中惡腹脹痛口不能言者貳丸日壹服連年積冷流注心胷者亦服之好好將息神驗

治九種心痛方

取當太歲上新生桃枝壹握去兩頭咬咀以水參升

煮取壹升頓服

治心中痞諸逆懸痛桂心參物湯方

桂心貳兩　膠飴壹升　生薑貳兩

右㕮咀以水陸升煮取參升去滓內飴分參服（用膠飴用枳實伍枚不用飴兩爲伍味　仲景用枳實伍枚白朮貳兩爲伍味）

治心痛徹背背痛徹心烏頭丸方

烏頭陸銖　附子　蜀椒各半

赤石脂　乾薑各壹兩

右伍味末之蜜丸先食服如麻子參丸日參不知稍增之（范汪不用附子服如梧子丸崔氏用桂半兩爲陸味　崔氏用療疰心痛）

治心痛方

桃白皮煮汁空腹以意服之

治暴心痛或如中惡口中涎出不可禁止面皰欲吐方

苦參拾斤以水壹石煮取貳斗去滓下苦酒貳斗更煎取伍升內大豆黃末熬和汁中煎取可丸併手丸如梧子大酒壹升進參肆拾丸日壹服當倒腹吐不吐下利更酒漬貳斤苦參進丸彌佳非止腹痛心暴痛骭骨等痛凡是腹中之疾皆悉主之又治冷血宿結癥癖澼頻用有效非復壹條大良

治中惡心痛腹脹大便不通走馬湯方

巴豆兩（拍）　杏人貳枚

右貳味綿裹推令細以熱湯貳合著小柸中以兩指搦取白汁令盡頓服壹食頃下去即愈老小量之亦治卒疝飛尸鬼擊

治卒中惡心痛方

苦參叁兩咬咀以好酢壹升半煮取捌合強人頓服

老小貳服

又方

桂心捌兩㕮咀以水肆升煮取壹升半分貳服

論曰心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止多熱喜涎出是蚘蟲咬也並宜溫中當歸湯服兩參劑後若不効有異宜改方增損服取差

溫中當歸湯方

當歸　人參　乾薑　茯苓　厚朴

木香　桂心　桔梗　芍藥　甘草貳兩

右拾味㕮咀以水捌升煮取參升分溫伍服日參不耐木香者以犀角壹兩代之增損當歸湯方

當歸三兩　黃芩　朴消　桔梗

柴胡各四兩　升麻三兩　芍藥一兩半

右七味㕮咀以水八升煮取二升半分三服一方有厚朴一兩

治蟲心痛方

鶴蝨末之蜜和梧子大服四十九日三服愼酒肉蜜湯下可加至五十九

又方

鶴蝨一兩末之空腹溫酢一盞和服之蟲當吐出

又方

服漆一合方在第二十七卷養生服餌篇中凡蟲心痛皆用漆主之

治心腹冷痛五辛湯方

蜀椒　細辛　桂心　乾薑　吳茱萸

芍藥　防風　苦參　乾地黃　甘草　當歸各一兩　梔子　烏梅　大棗各二七枚

右十四味㕮咀以水九升煮取三升分四服

治久心痛腹痛積年不定不過一時間還發甚則數日不能食又便出乾血窮天下方不能差甄立言處此方數日即愈

犀角丸方

犀角　麝香　鬼臼　桂心　光明砂六銖　赤足蜈蚣一枚　具齒五枚　巴豆二十枚

右十四味末之蜜丸如梧子飲服一丸日二漸加至三丸以微利爲度古今録驗無雄黃

治卒心腹絞痛如刺兩脅支滿煩悶不可忍高良薑湯方

高良薑五兩　厚朴二兩　當歸　桂心各三兩

右四味㕮咀以水八升煮取一升八合分三服日二若一服痛止便停不須更服若強人爲二服劣人分三服

治心腹絞痛諸虛冷氣滿痛當歸湯方

當歸　芍藥　厚朴　半夏各二兩　桂心　甘草　黃耆　人參各三兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升三合分四服羸劣人分六服小品方云大冷加附子一枚

治心腹蘊蘊然痛方

芍藥六兩　黃芩　柴胡各四兩　當歸　升麻各三兩　朴消　桂梗

右七味㕮咀以水八升煮取二升半分三服

治虛冷腹痛不下飲食良復不消臚脹當歸湯方

當歸 茯苓 各五分 黃耆 紫菀 各四分
高良薑 乾薑 各六分 肉蓯蓉 鹿茸
桂心 昆布
桃人一百枚 地骨皮
烏頭一兩 大棗四十枚
右十八味㕮咀以水一斗五升煮取四升二合分爲五服
下利加赤石脂龍骨各三分渴加麥門冬一升
治腹冷絞痛羊肉當歸湯方
當歸四分 乾薑
芍藥 苦蔘
防風一分 人參
乾地黃 桑葉黃
羊肉半斤 茯苓 各一分 生薑六分 大棗三十枚
右十七味㕮咀以水二斗半煮肉取一斗二升出肉內諸藥煮取三升分三服日三覆取温煖
治寒冷腹中痛當歸湯方
當歸二兩 吳茱萸二升 甘草 人參
桂心 各一兩 生薑五兩
右八味㕮咀以水二斗五升煮取三升分服日三
產後虛冷小品名吳茱萸湯
當歸 乾薑 各三兩 附子 人參
芒消 各二兩 大黃五兩 甘草二兩
右七味㕮咀以水七升煮取三升分服日三
治冷氣脅下往來衝肓膜痛引脅背悶當歸湯方
當歸 吳茱萸 桂心 人參

甘草　芍藥　大黃各二兩　茯苓
枳實各一兩　乾薑三兩
右十味咬咀以水八升煮取二升半分三服日三治尸疰
亦佳外臺仲景方茯苓枳實
治久寒疾胷腹中痛時下痢當歸湯方
當歸二兩　甘草
附子一兩　乾薑四兩　柑皮各二兩
右五味咬咀以水八升煮取二升分三服日三
治久寒宿疾胷腹中痛短氣時滯下痢當歸湯方
當歸　桂心各三兩　乾薑四兩　附子五兩
右四味咬咀以水八升煮取二升分三服日三范汪無附子甘草二兩云虛冷激痛甚者加黃芩各二兩
治胃腹中卒痛生薑湯方
生薑一斤取汁　食蜜八兩　醍醐四兩
右三味微火上耗令相得適寒温服參合日三
凡心腹卒痛熬鹽一斗熨熬鹽沙燒埳石烝熨取其裏温暖止烝土亦大佳
邪在心則病心痛善悲時眩仆視有餘不足而調其輸
腎心痛先取京骨崑崙發針不已取然谷
胃心痛取大都太白
脾心痛取然谷太谿
肝心痛取行間太衝
肺心痛取魚際太淵
心痛引腰脊欲嘔刺足少陰
心痛引背不得息刺足少陰不已取手少陰
心痛腹脹滿滿然大便不利取足太陰

心痛少腹上下無常處溲便難刺足厥陰
心痛短氣不足以息刺手太陰
心痛不可按煩心巨闕主之
心痛有三蟲多涎不得反側上管主之
心痛身寒難以俛仰心疝衝冒死不知人中管主之
心痛如針錐刺然谷及太谿主之
心腹中卒痛石門主之
心疝暴痛取足太陰
心懊憹微痛煩逆灸心輸百壯
心痛如錐刀刺氣結灸膈輸七壯
心痛冷氣上灸鳩尾頭上行一寸半不可刺
心痛惡氣上脇急痛灸通谷五十壯在乳下二寸
心痛暴絞急絕欲死灸神府百壯在鳩尾正心有忌

心痛暴惡風灸巨闕百壯
心痛堅煩氣結灸太倉百壯
心痛灸臂腕橫文三七壯又灸兩虎口白肉際七壯

肖痺第七 論二首 灸法五首 方十三首

論曰肖痺之病令人心中堅滿痞急痛肌中苦痺絞急如刺不得俛仰其肖前皮皆痛手不得犯肖中悗悗而滿短氣欬唾引痛咽塞不利習習如蠅飛喉中乾燥時欲嘔吐煩悶白汗出或徹引背痛不治之數日殺人

論曰夫脉當取太過與不及陽微陰弦即肖痺而痛所以然者責其極虛故也今陽虛知在上焦所以肖痺心痛者以其人脉陰弦故也平人無寒熱短氣不足以息者實也治肖痺心中痞氣結在肖肖滿脇下逆搶心枳實薤白桂枝湯方

枳實四兩 厚朴三兩 薤白一斤
栝樓實一枚 桂枝一兩
右五味㕮咀以水七升煮取二升半分再服仲景方厚朴用四兩薤白半斤水五升煮取二升外
肾痺之病喘息欬唾肾背痛短氣寸脉沉而遲關上小緊數栝樓湯主之方
栝樓實一枚 薤白半斤 半夏半升
生薑四兩 枳實二兩
右五味㕮咀以白酒醬漿二斗煮取四升服一升日三仲景肘後不用生薑半夏
肾痺之候肾中幅幅如滿喘喧塞習習如奪唉中澁燥唾沫宜此方
橘皮一斤 枳實四枚 生薑半斤

右三味㕮咀以水五升煮取二升去滓分再服
治肾痺治中湯方出第二十卷中
茯苓三兩 甘草一兩 杏人五十枚
右三味㕮咀以水一斗三升煮取六升去滓爲六服日三未差再合服
治肾滿短氣喧塞通氣湯方
半夏八兩 生薑六兩 橘皮三兩
吳茱萸四十枚
右四味㕮咀以水八升煮取三升分三服一方用桂三兩無橘皮
治肾痺達背痛短氣細辛散方
細辛 甘草 酪三
枳實 生薑

白朮　括樓實　乾地黃各三兩
桂心　茯苓各三兩

右九味治下篩酒服方寸匕日三

治胷痺達背蜀椒散方

蜀椒　食茱萸各一合　桂心　桔梗各三兩　烏頭半兩　豉六錢

右六味治下篩食後酒服方寸匕日三

前胡湯主胷中逆氣悶痛徹背少氣不食方

前胡　甘草　半夏　芍藥各三兩
黃芩　當歸　人參　桂心各一兩
生薑三兩　大棗三十枚　竹葉一升

右十一味㕮咀以水九升煮取三升分四服

又方

前胡　人參　半夏　芍藥各三兩
生薑　麥門冬　餳　半夏　甘草　芍藥
茯苓各三兩　桂心　黃芩　當歸各一兩
大棗三十枚

右十三味㕮咀以水一斗四升煮取三升去滓分爲三服

治胷背疼痛而悶熨背散方

烏頭　細辛　附子　羌活
蜀椒　桂心各五兩　芎藭一兩六銖

右七味治下篩帛裹微火炙令煖以熨背上取差乃止慎生冷如常法

治胷腹背閉滿上氣喘息下氣湯方

大腹檳榔二七枚　杏人四七枚

右二味㕮咀以童子小便三升煎取一升半分再服曾患氣發輒合服之

破胷背惡氣音声塞閉檳榔湯方

檳榔四枚極大者　檳榔八枚小者

右二味㕮咀以小兒尿二升半煮減一升去滓分三服頻與五劑永定

胷痺引背時寒間使主之

胷痺心痛天井主之

胷痺心痛不得息痛無常處臨泣主之

胷痺心痛灸亶中百壯穴在鳩尾上一寸忌針

胷脇滿心痛灸期門隨年壯穴在第二肋端乳直下一寸半

頭面風第八　方一百二首拔白法一首

治腦風頭重頸項強眼瞤眡淚出善欠目欲眠睡憎風劇者耳鳴滿眉眼疼悶吐逆眩倒不自禁諸風乘虛經五藏六腑皆爲癲狂諸邪病悉主之芎藭酒方

芎藭　辛夷　天雄　人參

磁石　石膏　茵芋　桂心

秦艽　天門冬　柏子人　山茱萸

白頭翁各三兩

署預　羚羊角　昌蒲　甘草各二兩

雲母一兩燒之令赤末之爲粉　防風四兩

右二十一味㕮咀以酒二斗漬之七日初服二合漸加至五合日三有女人少時患風眩發則倒地爲婦積年無兒服此酒并將紫石門冬丸服之眩差生兒子平復也紫石門冬丸方出婦人方中

治頭眩屋轉眼不得開方　翼名人參湯

人參　當歸　防風　黃耆

芍藥　麥門冬各二兩　獨活

桂心 各三兩

右九味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

防風湯治風眩嘔逆水漿不下食輒嘔起即眩倒發有時手足厥冷方

防風　防巳　附子　乾薑
甘草 各一兩　蜀椒　桂心 各二兩

右七味㕮咀以水四升煮取二升分三服日三古今錄驗用白朮一兩

治風虛眩眼暗茵芊湯方

茵芊一分　人參
薑耆　茯苓
防風十兩　烏喙二兩　甘草　薤蓉
松實　山茱萸 各三兩

右十二味㕮咀以水一斗煮取二升半分三服強人令日夜盡劣人分五服二日盡

治頭風眩欲倒眼旋屋轉腦痛防風湯方

防風　枳實　杏人　芎藭 各三兩
茯神　麻黃　前胡　生薑
半夏 四合　細辛 二兩　竹瀝三升

右十一味㕮咀以水六升合竹瀝煎取二升七合分三服頻服三兩劑

治風頭眩轉面上遊風鴟頭酒方

飛鴟頭 五枚　防風　芎藭　署預
茯神 各四兩　桂心　細辛
方無　葛根　乾薑　枳實
人參　天雄
貫衆　蜀椒
石南 各五兩 一作石膏　山茱萸一升　獨活二兩
麥門冬 一作天門冬　附子二兩　白朮一兩

右十八味㕮咀絹囊盛清酒四斗漬六宿初服二合日

再服稍加以知為度

治頭風眩口喎目斜耳聾大三五七散方

天雄 細辛 各三兩 山茱萸 乾薑 各五兩 署預 防風 各七兩

右六味治下篩清酒服五分匕日再不知稍加 翼云亦治面骨疼

治頭風目眩耳聾小三五七散方

天雄 三兩 山茱萸 五兩 署預 十兩

右三味治下篩以清酒服五分匕日再不知稍增以知為度

治風眩倒屋轉吐逆惡聞人聲茯神湯方

茯神 獨活 各四兩 生薑 三兩 甘草

牡蠣 白朮 人參 當歸 各三兩 薤蓉 附子 各二兩

右十三味㕮咀以勞水五斗煮二升者�mark取三升服五合晝夜盡

治頭面風在眉間得熱如蟲行或頭眩目中淚出防風散方

防風 五兩 桂心 天雄 細辛 朱砂

乾薑 人參 烏頭 附子 各二兩 茯苓 當歸 各三兩 茵芋草

右十二味治下篩酒服方寸匕日三

治風頭眩惡風吐冷水心悶防風散方

防風 二兩 澤瀉 一本作澤蘭 細辛 附子

署預 茯苓 天雄 各一兩 翼 白朮 二兩半 桂心 一兩半 乾薑 半兩

右十味治下篩酒服方寸匕當令酒氣相接則脫巾幘解髮梳頭百過復投一升酒便洗手足須臾自熱解髮以粉粉之快然便熟眠愈亦可洗頭面汗出 翼云如服寒食散法

治風眩飜倒無定方

獨活 六兩　枳實 三兩一方用枳實　石膏 鞠芳雀 各四

右四味咬咀以清酒八升煮取四升頓服之以藥滓熨頭

覆眠取汗覺冷又內鐺中炒令熱熨之

治患頭眩運經久得差後四體漸羸食無味好食黃土方

白朮 三斤　麴 二斤

右二味末之酒和餅手丸如梧桐子暴乾飲服三十丸日

三斷食土為效

治頭中五十種病方

巴戟　菊花　芎藭　乾薑　防風

石南　白朮　烏頭　附子　細辛

署預　蜀椒　人參　桔梗　秦艽

栝樓根　澤瀉　甘草　山茱萸　乾地黃

天雄　羌活 各等分

右二十二味治下篩以酒服方寸匕日三

治頭面脹滿腦瘈偏枯發作有時狀似刀刺失聲陰陰然疼

面目變青入頂散方

山茱萸　芎藭　防風　獨活 各一兩半

細辛　莽草　白朮　署預

牛膝　石南　甘草 各一兩　烏頭

通草　昌蒲　附子　麻黃

天雄　蜀椒　桔梗 各一兩六銖

右十九味治下篩酒服方寸匕日三

治上氣頭面風頭痛肩中氣滿貫脇氣上下往來心下煩熱

產婦金瘡百病杏人膏方

杏人一升擣研以水一斗濾取汁令盡以銅器煻火

上從旦煮至日入當熟如脂膏下之空腹酒服一方

寸匕日三不飲酒者以飲服之

治頭風大豆酒方

大豆三升炒令無聲先以一斗二升瓶盛清酒九升
乘豆熱即傾著酒中密泥頭七日温服之

治中風頭痛發熱耳頰急方

麻黃　葛根　石膏　桂心　各三兩
附子　芍藥　甘草　秦艽　各二兩
防風　生薑　五兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服覆取汗

治頭目有風牽引目睛疼痛偏視不明署預散方

署預三兩　細辛一兩半　秦艽　天雄　各二兩
獨活　桂心　山茱萸　各二兩半

右七味治下篩酒服方寸匕日三服

治頭中痛身熱風熱方

竹瀝二升　外麻　生薑　杏人　各三兩
芍藥　柴胡　酪各四兩　石膏　生葛根　酪各八兩

右八味㕮咀以水六升合煮取二升瀝著煮取二升七合分三服

治頭面遊風菊花散方

菊花一兩　細辛　附子　桂心
乾薑　巴戟　人參　石南
天雄　茯苓　秦艽　防巳　各二兩
防風　山茱萸　白朮　署預　各三兩
蜀椒五合

右十七味治下篩酒服方寸匕日三

治頭風方

服荆瀝不限多少取差止

又方

擣薤根一升酒二升漬服汗出止

又方

末蔓荆子二升酒一斗絹袋盛浸七宿温服三合日三

又方

臘月烏雞屎一升炒令黄末之絹袋盛以酒三升浸温服任性常令醺醺酣

又方

七月七日麻勃三斗麻子一石末相和蒸之沸湯一石五斗釀之熟封三七日服清一升百日身中澁皮八風骨臑五藏骨髓伏風百病悉去

治頭中五十種病摩頭散方

蜀椒 各六分 烏頭 八分 附子 七分 細辛 各一兩

簡茹 半夏 莽草 四分 桂心 十分

右八味治下篩以大酢和摩頭記日數三日頭膚痛四五日後一著藥如前十日以酢漿洗頭復摩藥即愈若生息肉并喉咽中息肉大如棗欲塞以藥摩之即愈耳鼻齒有疾並用之良

頭風散方

附子 一枚中形者 鹽 如附子大

右二味治下篩沐頭竟以方寸匕摩頂上日三

治頭面上風方

松脂 石鹽 杏人 蜜臘 各一兩

薰陸香 二兩 茧麻人 三兩

右六味熟擣作餅淨剉百會上髮貼膏上安紙三日一

易若癢刺藥上不久風定

治卒中惡風頭痛方

擣生烏頭以大酢和塗故布上薄痛上須臾痛止日夜五六薄逐痛處薄之去皮擣烏頭

又方

油二升鹽一升末油煎一宿令消盡塗頭石鹽尤良一周時

又方　芥子末酢和傅頭生白屑搔癢不堪然肺爲五藏之蓋其勞損傷肺氣衝頭頂致使頭癢多生白屑搔之隨手起人多患此皆從肺來世呼爲頭風也沐頭湯方

大麻子　秦椒外各三　皂莢屑五合

右三味熟研內泔中一宿漬去滓木匕攪百遍取勞乃用沐頭髮際更別作皂莢湯濯之然後傅膏肘後無皂莢

又方

菊花　獨活　茵芋　防風　細辛

蜀椒　皂莢　杜蘅　莽草　桂心各等分

風頭沐湯方

猪椒根三兩　麻黃根　防風各三兩　細辛

茵芋各一兩

右五味㕮咀以水三升煮取一升去滓溫以沐頭

又方　葶藶子煮沐不過三四度愈

又方　蜀椒二升以水煮取汁沐髮良

又方　以桑灰汁沐頭去白屑神良

治頭項強不得顧視方

蒸好大豆一斗令變色內囊中枕之

又方　常以九月九日取菊花作枕袋枕頭良
又方　八月後取荊芥鋪床又作枕枕頭亲春日去之
又方
穿地作小坑燒令赤以水沃之令小冷內生桃葉滿其上布席臥之令項當藥上以衣著項兩邊令氣蒸病上汗出良久愈若病大者作地坑亦大
治風毒熱頭面腫犀角湯方
犀角　生薑各三兩　括樓根　苦參各一兩
石膏六兩　竹葉兩撮　黃芩　升麻
青木香各三兩　防巳一兩半　防風一兩
右十一味㕮咀以水七升煮取二升分三服相去十里久
內消不利
治頭面遍身風腫防風散方

防風二兩　白芷一兩　白朮三兩
右三味治下篩酒服方寸匕日三服
治卒中風頭面腫方
搗杏人如膏以雞子黃合搗令相得傅帛上厚裹之
自乾不過八九傳差
令白髮還黑方
烏麻九蒸九暴末之以棗膏丸服之佳
又方
隴西白芷　旋復花　秦椒各一升　桂心一尺
治頭髮落不止石灰酒方
石灰三升細篩水拌令濕極熟蒸之炒令至焦以木

札投之火即著為候停冷取三升絹袋貯之以酒三
斗漬三宿初服半合日三四夜二稍加至一合甚神驗
治脉極虛寒鬚髮墮落令髮潤澤沐頭方
桑根白皮切三升以水五升淹漬煮五六沸去滓洗
沐髮數數為之自不復落
又方
麻子三升碎 白桐葉切一把
右二味以米泔汁二斗煮五六沸去滓以洗沐則鬚不落
而長甚有驗
鬚髮墮落令生長方
生柏葉切一物 附子四枚 猪膏三升
右三味末之以膏和為三十九用布裹一九內前沐頭泔
汁中沐髮長不落甚藥密收貯勿令泄氣

又方
麻葉 桑葉
右二味以泔煮去滓沐髮七遍長六尺
又方 羊糞灰淋汁洗之三日一洗不過十洗大生
治頭中二十種病頭眩髮禿落面中風以膏摩之方
蜀椒 莽草 酪三兩半 桂心 茵芋 酪一兩半 半夏 乾薑 酪一兩
附子 細辛
右八味咬咀以猪生肪二十兩合擣令肪消盡藥成沐頭令
淨以藥摩頭上日一即愈如非十二月合則用生烏麻油
和塗頭皮沐頭令淨乃指之一頓生如昔也必效方無蜀椒莽草半夏乾薑
治頭中風癢白屑生髮膏方
蔓荊子 附子 細辛 續斷 皂莢
澤蘭 零陵香 防風 杏人 藿香

白芷 兩各二　松葉　石南 兩各三　莽草 兩一　松膏
馬鬣膏　猪脂 各二升　熊脂二升
右十八味咬咀以清醋三升漬藥一宿明旦以馬鬣膏
等微火煎三上三下以白芷色黃膏成用塗澤髮
治頭風養白屑生髮膏方
烏喙 三兩　莽草　石南　細辛
皂莢　澤蘭　白芷 各二兩　竹葉　松葉　白朮　辛夷　防風
右十五味咬咀以清酢三升漬一宿明旦微火以脂煎三
上三下白芷色黃膏成去滓濾取沐髮了塗之一方用生
油三大升 千金翼無石南用杏人不用白芷灰汁洗頭去白屑神良
生髮膏方
丁香　甘松香 各一兩　零陵香　吳藿香

細辛　蜀椒 酢各二兩　白芷　澤蘭
大麻子　桑白皮　桑寄生　牡荊子
苜蓿　辛夷各人　杏人　芎藭
防風　芜荑草 酢各一兩　胡麻油一升　竹葉
松葉　柏葉 搗各半升　臘猪膏一升　烏雞肪
鴈肪 各一合
右二十五味咬咀以酢漬一宿內油膏中微火三上三下
白芷色黃膏成去滓塗頭上髮生日二夜一
鬚髮墮落令生長方
附子　蔓荊子　柏子人 各三分
右三味以烏雞膏和擣三千杵貯新瓷器中封百日出
以馬鬣膏和以傅頭訖巾裹之勿令見風日三即生 肘後不用
柏子人以酒漬澤沐

髮鬚禿落生髮膏方

莽草一兩　防風　升麻　白芷

薺苨一兩絡二　蜣螂四个　驢鬚膏　豹膏一作雄雞膏　熊膏　馬鬚膏　猪膏

右十一味諸膏成煎各半升合煎諸藥沸則下停冷復上火三五沸止絞去滓傳頭當澤用之

髮落生髮方

白芷　附子　辛夷　細辛

蔓荊子一升　蜀椒一兩

右十二味㕮咀以馬鬚膏五合臘月猪膏三升合諸藥微火煎白芷色黃膏成先洗頭後用膏傳如常澤法勿近面面生毛也亦治眉落

治風頭毛髮落不生方

鐵上生衣研以臘月猪脂和塗之日參亦治眉毛落

髮落不生令長方

麻子壹升熬黑壓取脂以傳頭長髮妙

又方　鴈肪傳之

又方

多取烏麻花瓷甕盛密蓋深埋之百日出用塗髮令髮易長而黑

生眉毛方

墻上青衣　鐵生衣

右貳味等分末之以水和塗即生

又方

七月烏麻花陰乾末之以生烏麻潤漬之貳日壹塗

眉毛鬚髮火燒瘡瘢毛不生方

蒲灰正月狗腦和傅即生

治禿頂方

蕪菁子末酢和傅之日三

又方

東行棗根長三尺以中央安甑中心蒸之以器承兩頭汁塗頭髮即生 肘後作桑根

又方

麻子三升熬焦末之以猪脂和塗之髮生爲度

拔白髮良日

正月四日　二月八日　三月十二日

四月十六日　五月二十四日　六月二十四日

七月二十八日　八月十九日　九月二十五日 一作十五日

十月十日　十一月十日　十二月十日

右並以日正午拔之當日不飲酒食肉五辛經一拔黑者更不變

令髮不生方

除日自拔毛以鼈脂塗之又猪狗膽塗之又狗乳亦塗之

又方　用白蜜傅髮孔即不復生也

又方

蜂灰鼈脂相和新拔毛即塗毛孔上永不生

染鬚髮方

胡粉三兩　石灰六兩 一作十 絹篩

右二味以榆皮作湯和之如粉先以皂莢湯洗髮令極淨不得令有膩氣好暴乾夜即以藥塗髮上令勻訖取桑葉

相綴著頭巾上遍以裹髮一夜至旦取醋漿熱煖三遍淨洗髮又以醋泔熱煖洗髮又取生胡麻萬擣取三升汁和水煮一二沸淨濾以濯髮乾又用油湯濯之百日黑如漆

又方　生油漬烏梅常用傅頭良

又方　黑椹水漬之塗髮令黑

又方　以鹽湯洗沐生麻油和蒲葦灰傅之

髮黃方

臘月猪脂和羊屎灰蒲灰等分封頭三日一為之

又方　大豆五升酢漿水二斗煮取五升沐之

治鬚髮黃赤方

燒梧桐作灰用乳汁和塗傅鬚并膚肉髮鬚即黑

鬚黃方

剪爪甲搔令毛孔少血出以蜜塗之生黑毛

治頭瘡及白禿松瀝煎方

松瀝七合　丹砂　礬石一兩一云峭粉　黃連三兩　雄黃　水銀研各二兩

右六味治下篩內瀝中攪研令調以塗之先以泔清洗髮及瘡令無痂然後傅藥二日一傅三傅後當更作膿膿訖更洗之九經三度膿出訖以甘草湯洗去藥毒前後十度許洗即差

治白禿髮落生白痂終年不差方

五味子　遠志各三分　菟絲子五分　蛇牀子　雄黃　雌黃　蓖蓉　松脂各二分　白蜜各一分　雞屎白半分

右十味治下篩以猪膏一升二合先內雄黃次內雌黃次內諸藥煎令膏成先以桑灰洗內雞屎白次內蜜松脂次

頭燥傅之

治白禿及頭面久瘡去蟲止痛王不留行湯方

王不留行　桃東南枝　東引茱黃根皮各五兩　蛇牀子　牡荊子　苦竹葉　蒺藜子各三升　大麻人一升

右八味㕮咀以水二斗半煮取一斗洗瘡旦冉并療癬疽妬乳月蝕瘡爛

治白禿及癬疽百瘡松脂膏方

松脂六兩　礬石　杜蘅一作牡荊　雄黃　附子　大黃　石南　秦艽　眞朱　苦參　水銀　木蘭酪一兩

右十二味㕮咀以醋漬一宿猪膏一斤半煎之以附子色黃去滓乃內礬石雄黃水銀更著火三沸安濕地待凝以

傅上日三

白禿方

羊肉濕脯炙令香及熱速搭上不過三四度養勿搔之牛肉亦得

又方

新破猪肚去糞及熱速搭上養愼勿搔當縛兩手日中卧半日去之

又方

皂莢湯淨洗乾拭以陳久油滓塗之日三

又方　臨湯洗之生油和故蒲葦灰傅之日三

治白禿方

煮桃皮汁飲之并洗

又方　麴豆豉兩種治下篩酢和薄上

又方
炒大豆令焦末之和臘月猪脂熱煖塗抄封上遍即
裹著勿見風
又方
桃花末之和猪脂封上必效方與桑椹
禿無髮者方
黑熟椹二升內甕中日中暴三七日化爲水洗瘡上
三七日髮生神効
治赤禿方
擣黑椹取三升服之日三
又方 桑灰汁洗頭擣椹封之日中暴頭睡
又方 燒牛角灰和猪脂傅
又方 馬蹄灰末臘月猪脂和傅之

治鬼舐頭方
燒猫兒桑臘月猪脂和傅
又方 猫兒毛灰膏和傅之
又方 塼末和蒜擣傅曰一

備急千金要方卷第十四 小腸腑

朝奉郎守尚藥奉御充秘閣校理醫官院護軍賜紫金魚袋臣林億等校正

小腸腑脉論第一

小腸虛實第二

舌論第三

風眩第四

風癲第五 狂邪附針灸圖訣

心風驚悸第六

好忘第七

小腸腑脉論第一

論曰小腸腑者主心也舌是其候也心合於小腸小腸者受盛之腑也號監倉吏重二斤十四兩長三丈四尺廣三寸四分 難經甲乙云長二丈二尺大二寸半徑八分分之少半 後附脊左回疊積其注於回

腸者外傳臍上回運環反十六曲常留水穀二斗四升其一斗二升是水一斗二升是穀應主二十四氣也（四乙云外水六外三合之太半甲外三合之太半甲）脣厚人中長以候小腸

小腸病者少腹痛腰脊控睾而痛時窘之復耳前熱若寒甚獨肩上熱及手小指次指之間熱若脉滑者（脉經甲乙經作陷）此其候也

少腹控睾引腰脊上衝心邪在小腸者連睾系屬於脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃動肝肺散於肩結於臍故取之肩原以散之刺太陰以卑之與之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之

左手關前寸口陽絕者無小腸脉也苦臍痺小腹中有疝瘕主月即冷上搶心刺手心主治陰心主在掌後橫文中入一分左手關前寸口陽實者小腸實也苦心下急熱痺小腸內熱小便赤黃刺手太陽治陽手太陽在手小指外側本節陷中小腸有寒其人下重便膿血有宿食常暮發熱明日復止小腸有宿食常暮發熱明日復止

小腸脹者少腹膨脹引腹而痛心前受病移於小腸心教不已則氣與教俱出厥氣客於小腸夢聚邑衝衢心應皮皮厚者脉厚脉厚者小腸厚皮薄者脉薄脉薄者小腸薄皮緩者脉緩脉緩者小腸大而長皮薄而脉沖小者小腸小而短諸陽經脉皆多紆屈者小腸結

扁鵲云手少陰與太陽為表裏所以表清裏濁清實濁虛故食下腸實而胃虛故腑實而不滿實則傷熱熱則口張口為之生瘡虛則傷寒寒則便泄膿血或發裏水其根在小腸先從腹起方在治水篇中

小腸絶不治六日死何以知之髮直如乾麻不得屈伸白汗不止

手太陽之脉是動則嗌痛頷腫不可以顧肩似拔臑似折是主液所生病者耳聾目黃頰頷腫頸肩臑肘臂外後廉痛（經脉文別以見心藏部中）

小腸虛實第二（脉二條方三首 灸法三首）

小腸實熱

左手寸口人迎以前脉陽實者手太陽經也病苦身熱來去汗不出心中煩滿身重口中生瘡名曰小腸實熱也

治小腸熱脹口瘡柴胡澤瀉湯方

柴胡　澤瀉　枳實　旋復花　生地黃（切一升）　橘皮（一方用桔梗）　黃芩　芒消（各二兩）　升麻

右九味㕮咀以水一斗煮取三升去滓下芒消分三服

大黃丸調小腸熱結蒲不通方

大黃　芍藥　杜消（各三兩）　杏人（伍拾枚）　巴豆（柒枚）　葶藶（各二兩）　大戟

右七味末之蜜和丸飲服如梧子大大人七丸小兒二三丸日二熱去日一服

小腸熱滿灸陰都隨年壯穴俠中管兩邊相去二寸小腸泄痢膿血灸魂舍二百壯小兒減之穴在俠膂兩邊相去各一寸（冀云相去一寸）

又灸小腸腧七壯

小腸虛寒

左手寸口人迎以前脉陽虛者手太陽經也病苦顱際偏頭痛耳頰痛名曰小腸虛寒也

小腸虛寒痛下赤白腸滑腸中懊憹補之方

乾薑參兩　當歸　黃蘗　地榆各肆兩

黃連　阿膠各貳兩　石榴皮參枚

右七味㕮咀以水七升煮取二升五合去滓下膠煮取膠烊盡分三服

舌論第三

論曰九舌者心主小腸之候也舌重十兩長七寸廣二寸半善用機衡能調五味也凡有所啖若多食鹹則舌脉凝而變色多食苦則舌皮槁而外毛焦枯多食辛則舌筋急而爪枯乾多食酸則舌肉肥而脣揭多食甘則舌根痛而外髮落又曰心欲苦肺欲辛肝欲酸脾欲甘腎欲鹹此五味內合五藏之氣也若藏熱則舌生瘡引脣揭赤若腑寒則舌本縮口噤脣青寒宜補之熱宜瀉之不寒不熱依藏腑調之舌縮口噤脣青升麻煎主之方在第六卷中

風眩第四 前第四卷既有頭面風方風眩不當分出恩逸蓋以此是徐嗣伯方不可以餘方相雜故此特立風眩方條專出徐氏方恩寫敘論三首方十首灸禁法二首

徐嗣伯曰余少承家業頗習經方名醫要治備聞之矣自謂風眩多途諸家未能必驗至於此術鄙意偏所究也少來用之百无遺策今年將衰暮恐奄忽不追故顯明證論以貽於後云尒

夫風眩之病起於心氣不定肖上妄畜實故有高風面熱之所為也痰熱相感而動風心相亂則悶瞀故謂之風眩大人曰癲小兒則為癎其實是一此方為治万無不愈但恐證候不審或致差違大都忌食十二屬肉而貴豚為患發多氣急氣急則死不可救故此一湯是輕重之宜勿因此便謂非患所治風眩湯散丸煎凡有十方凡人初發宜急與續命湯也

困急時但慶灸穴便火針之無不差者初得針竟便灸最良灸法次列於後余葉之以來三十餘年所救活者數十百人無不差矣後人能曉得此方幸勿參以餘術焉

治風眩發則煩悶無知口沫出四躰角弓目反上口噤不得言續命湯方

竹瀝二升二合　生地黃汁一升　龍齒　生薑各四兩　防風　麻黃各四兩　石膏七兩　桂心二兩　防已三兩　附子三分

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服有氣加附子成二兩紫蘇子五合橘皮半兩已服續命湯口開四肢尚未好定悉中尚不除者紫石湯主之方在下第五篇紫石湯方煮散是也

治氣奔急欲絕者貫豚湯方

吳茱萸一升　桂心　芍藥　生薑各四分　石膏　人參　半夏各三分　茯苓各六分　生葛根　當歸四兩　李根皮一斤

右十二味㕮咀以水七升清酒八升煮取三升分作三服

治語狂錯眼目霍霍或言見鬼精神昏亂防已地黃湯方

防已二兩　生地黃一斤別切　桂心　防風各三兩　甘草二兩

右五味㕮咀以水一升漬之一宿絞汁著一面取其滓著竹簀上以地黃著藥滓上於三斗米下蒸之以銅器承取之分再服

汁飲熟以向前藥汁合絞取之分再服

治心中驚悸而四肢緩頭面熱心胃痰滿頭目眩冒如欲搖動者署預湯方

署預　人參　麥門冬各四兩　前胡

芍藥　生地黃各八分　枳實　遠志
生薑各三分　茯苓六分　半夏五分　甘草
黃芩一　竹葉各一分　茯神大分　秫米三合

右十六味㕮咀取江水高舉手揚三百九十下量取三斗煮米熟一斗內半夏復熟九升去滓下藥煮取四升分四服無江水處以千里東流水代之按手令上頭也秦中無江涇渭可用諸舊灌劒曰尚取之

服前湯後四體尚不涼冷頭目眩動者防風湯主之此湯大都宜長將服但藥中小消息之隨冷暖耳仍不除差者依此方

防風　赤石脂
生薑　白石脂
茯苓各三分　桂心二分　石膏　人參
寒水石　龍骨
紫石一分

右十一味㕮咀以水八升煮取三升分三服凡用井華水者取清淨也今用江水無泥又無砂穢源泉遠涉順勢歸海不逆上流用以治頭必歸於下故也

署預煎方

署預二十分　甘草十四分　澤瀉　人參
黃芩各四分　當歸　白斂　桂心
防風　麥門冬各三分　大豆黃卷　桔梗
芍藥　山茱萸　紫菀　白朮
苦蕒　乾薑　蜀椒　乾地黃各二分已上三味搗篩
生地黃十八斤搗絞汁煎令餘半取　麻子人三升研　大棗八十枚
蜜二升　麋鹿雜膿八兩　鹿角膠八兩
桑根皮五升忌阿膠蘺屋垣下溝瀆邊者皆不中用自出土者大毒大忌近

右二十七味以清酒二斗四升煮桑白皮麻子棗得一斗

去滓乃下地黃汁膠髓蜜煎減半內前諸藥末煎之令可
丸如雞子黃飲服一枚日三稍加至三丸
治頭目眩冒心中煩鬱驚悸狂顛署預丸方
署預 二十八分　桂心　大豆黃卷　鹿角膠 各七
當歸　神麴　人參　乾地黃 各十
防風　黃芩　麥門冬　芍藥
白朮 各六分　甘草 二十分　柴胡　桔梗
茯苓　杏人
乾薑 各三　大棗 一百枚取膏　芎藭 各五分　白斂
右二十二味末之合白蜜棗膏丸如彈丸先食服一丸日
三服
治頭目眩運屋轉旋倒者天雄散方
天雄　防風　芎藭　人參
獨活　桂心　葛根 各三分　白朮
遠志　署預　茯神　山茱萸 各六分
菴草 四分
右十三味治下篩先食以菊花酒服方寸匕日三漸加至
三匕以知為度
菊花酒法
九月九日取鄧州甘菊花暴乾作末以米饘中蒸作酒
治心中時恍惚不定者人參丸方
上黨人參　鐵精　牛黃　丹砂
雄黃　昌蒲　防風　大黃 各一兩
赤足蜈蚣　蜥蜴 各一枚　鬼臼 一兩
右十一味末之蜜丸如梧子一服七丸日三夜一稍增之
合藥皆忌見婦人青衣人犬鼠勿用青紙丸合藥皆忌濁

穢雞犬六畜喪孝不具足人見之用前菊花酒下佳
灸法以繩橫度口至兩邊既得口度之寸數便以其繩一頭更度鼻盡其兩邊兩孔間得鼻度之寸數中屈之取半合於口之全度中屈之先置頭上廻髮當廻髮灸之以度度四邊左右前後當繩端而灸前以面為正並依年壯多少一年凡三灸皆須瘡差又灸壯數如前若連灸火氣引上其數處廻髮者則灸其近當鼻也若廻髮近額者亦宜灸若指面為瘢則關其面處然病重者亦不得計此也
食禁

虎兔龍蛇馬羊猴雞犬猪鼠牛
右十二相屬肉物皆不得食及以為藥牛黃龍骨齒用不可廢

嗣伯啓嗣伯於方術豈有效益但風眩最是愚衷小差者常自寶秘誓不出手而為作治亦不令委曲得法凡有此病是嗣伯所治未有不差者若有病此而死不逢嗣伯故也伏願問人立知非嗣伯之自誇殿下既須此方謹封上呈嗣伯鄙志尚存謹自書寫年老目闇多不成字伏願恕亮謹啓

風癲第五 論鍼

論曰黃帝問曰人生而病癲疾者安所得之岐伯對曰此得之在腹中時其母有所數大驚也氣上而不下精氣并居故令子發為癲疾病在諸陽脉且寒且熱諸分且寒且熱名曰狂刺之虛脉視分盡熱病已而止病癲初發歲一發不治月一發不治四五日一發名曰癲疾刺諸分其脉尤寒者以鍼補之病已止癲疾始生先不樂頭重直視舉目赤其作極已而煩心候之於顏取手太陽陽明太陰血變而已癲疾始發而反強因而眷痛候之足太陽陽明太陰手太陽血變而已癲疾

始作而引口喘呼甲乙作喘悸者候之手陽明太陽右強者攻其左左強者攻其右血變而止治癲疾者常與之居察其所當取之處病至視之有過者即寫之置其血於瓠壺之中至其發時血獨動矣不動灸窮骨三十壯窮骨者尾骶也

骨癲疾者頷齒諸輸分肉皆滿而骨倨強直汗出煩悶嘔多涎沫氣下泄不療

筋癲疾者身拳攣急脈大刺項大經之本杼嘔多涎沫氣下洩不療

脉癲疾者暴仆四肢之脉皆脹而從滿脉盡剌之出血不滿一升

俠項灸太陽又灸帶脉於署相去三寸諸分肉本輸嘔多涎沫無知若強掠起如狂及遺糞者難療

凡癲發則卧地吐涎沫無知若強掠起如狂及遺糞者難療

癲疾脉搏大滑久自已脉沈小急實死不療小牢急亦不可治脉虛可療實則死矣厥成爲癲疾五藏不平六腑閉塞之所生也厥成爲癲故附厥於此條也陰衰發熱厥陽衰發寒厥

論曰黃帝問曰厥之寒熱者何也岐伯對曰陽氣衰於下則爲寒厥陰氣衰於下則爲熱厥問曰熱厥必起於足下者何也對曰陽氣起於足五指之裏集於膝而上於膝者何對曰陰氣起於五指至膝上寒其寒也不從外皆從內也厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人者何也陰氣盛於上則下虛下虛則腹滿腹滿則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂亂則不知人巨陽之厥腫首頭

重足不能行發爲眴仆陽明之厥癲疾欲走呼腹滿不得卧面赤而熱妄見而妄言少陽之厥暴聾頰腫而熱脇痛髀不可以運太陰之厥腹滿膜脹後不利不欲食食則嘔不得卧少陰之厥舌乾溺赤腹滿心痛厥陰之厥少腹腫痛腹脹涇溲不利好卧屈膝陰縮腫脈內（一作外）熱盛則瀉之虛則補之不盛不虛以經取之上寒下熱先刺其項太陽久留之已則火熨頂與肩甲令熱下冷乃止所謂推而上之者也上熱下寒視其虛脉而陷下於經絡者取之氣下而止所謂引而下之者二陰一陽刺寒厥者二陽一陰所謂二陽者二刺陽也

論曰温病熱入腎中亦爲痙凡風瘡小兒病癇熱盛亦爲痙凡風瘡暴尸厥參服厥鬼不寤皆相似當粉察之故經言久厥則成癲是以知似也

論曰癲病有五一曰陽癲發時如死人遺溺有頃乃解二曰陰癲坐初生小時臍瘡未愈數洗浴因此得之三曰風癲發時眼目相引牽縱反急強羊鳴食頃方解由執作汗出當風因以房室過度醉飲飽滿行事令心氣逼迫短氣脉悸得之四曰濕癲眉頭痛身重坐熱沐髮濕結腦汗未止得之五曰馬癲發時反目口噤手足相引身皆熱坐小時冒氣腦熱不和得之

治五癲方

銅青　雄黄　空青　水銀各一兩

石長生　茯苓　白芷

白斂　白薇　猪苓

烏扇酪半兩　硫黄一兩半　人參各二兩　卷柏

東門上雞頭一兩

右十五味末之以青牛膽和著銅器中於斛中五斗大豆上蒸之藥成服如麻子三十九日再夜一服者先食治風癲掣瘛口眼張大口中出白沫或作聲或死不知人虎睛九方

虎睛一具酒浸炙之　防風　秦艽
龍齒　黃芩　防葵
山茱萸　茯苓　雄黃
人參　乾地黃一方云乾薑大黃　銀屑
牛黃分各四　獨活　遠志　細辛
貫衆　麝香　鬼臼
白鮮皮各三兩　茯神　白斂一作白薇　升麻
鬼箭羽　露蜂房各三分　寒水石六分　蛇蛻一尺
右三十二味末之蜜和酒服十五丸梧子大日再稍加至二十五丸神方千金藥名主諸癲所不鎮心療者

凡癲發之候其狀多端口邊白沫動無常者方

秦艽　人參　防葵一作防風　茯神一作牡丹
甘草兩各三　鉛丹二兩　貫衆一枚
右七味㕮咀以水九升煮取三升半分三服

治風癲失性顛倒欲死五癲驚癎雄雌此丸方

雄黃　雌黃　真珠兩各一　鉛二兩熬令成屑
丹砂一分　水銀八分
右六味末之以蜜搗三萬杵丸如胡豆先食服二九日二稍加以知為度古今錄駁云療五癲牛癲則牛鳴馬癲則馬鳴狗癲則狗鳴羊癲則羊鳴雞癲則雞鳴病五癲狂病者腑藏相反不識人氣靜癡癎吐沫久而得蘇者

續命風引湯治中風癲眩不知人狂言舌腫出方

麻黃　芍藥　人參　石膏

防風 各三兩　甘草　桂心　獨活 各三兩
防已　附子　當歸 各一兩　杏人 三十枚
陳薑 五兩一本無陳字

右十三味㕮咀以酒三升水一斗合煎取四升分四服日三夜一

紫石煮散治大人風引小兒驚癇夜啼日數十發醫所不藥者方

紫石英　滑石　白石脂　凝水石
石膏　赤石脂 各六兩　大黃　龍骨
乾薑 各四兩　甘草　桂心　牡蠣 各三兩

右十二味治下篩為麤散盛以韋囊懸於高涼處欲用取三指撮以新汲井水三升煮取一升三合大人頓服未百日兒服一合未能者綿沾著口中熱多者日四五服以意消息之 深師方只用龍骨赤石脂牡蠣滑石白石脂五味

治百二十種風癲癇驚狂及發即吐沫不識人者四月五月宜服煮散方

紫石英　芍藥　龍骨 一本用黃芩　麻黃
青石脂　當歸　甘草　桂心
人參　栝樓根　白鮮皮 各二兩　牡蠣 三兩
大黃 五兩

右十三味治下篩為麤散分作七裹每以大棗十枚水三升煮取二升半下一裹大棗汁中煎取一升去滓頓服相去七日一服服訖即差

治癲癎厥時發作方

防葵　代赭　鈎藤　茯神
人參　鉛丹　雷丸　虎骨

遠志　桂心　防風　白殭蚕
生猪齒各六分　卷柏　莧若子　光明砂
升麻　附子　牛黃二分　蚱蟬十四枚
白斂四分　牡丹　龍齒各一分
蛇蛻皮　白馬眼睛各一具

右二十五味治下篩酒服方寸匕日二亦可爲丸服良驗
芎藭湯治風癲引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴方
芎藭　蔓本　蘭茹各五兩
右三味㕮咀內酒一斗煮取三升頓服之贏者分再服取大汗

治風癲方
葶藶子　鉛丹　栝樓根　虎掌
烏頭各三分　白朮一分　蜀椒　大戟

甘遂　天雄各三分　鴟頭一枚　鐵精
蘭茹各一兩　鴟頭九
右十三味末之蜜丸如梧子服二丸日三湯酒下之（經心錄名）

治癲癇痌瘵方
飛鴟頭二枚　鉛丹一斤
右二味末之蜜丸先食服三丸日三劇者夜一稍加之

治風癲方
葶藶子三升擣篩酒一斗漬半日絞去之湯中煎之
可丸先食服如小豆三丸加至梧子二丸以知爲度
額上手中從文理中赤起是知也無此候且服病日
發者三日愈間日發者十日愈五日發者二十日愈
半歲發者一月愈

又方

天門冬十斤　地黃三十斤

右二味擣取汁作煎服之差

天門冬酒通治五藏六腑大風洞泄虛弱五勞七傷癥結滯氣冷熱諸風癮瘕惡疾耳聾頭風四肢拘攣猥退歷節萬病皆主之久服延年輕身齒落更生髮白更黑方

天門冬與百部相似天門冬味甘兩頭方百部細長而味苦令人利擣絞取汁一斗漬麴三升麴發以糯米二斗准家醞法造酒春夏極冷下飯秋冬溫如人肌酸之酒熟取清服一盞常令酒氣相接勿至醉吐愼生冷酢滑雞猪魚蒜特愼鯉魚亦忌油膩此是一斗汁法餘一石二石亦准此以爲大率服藥十日覺身體隱疹大癢三十日更大癢三十日乃漸止此皆是風氣出去故也四十日即覺身心朗然大快似有所得五十日更覺大快當風坐卧覺風不著人身中諸風悉盡用米法先淨淘米暴炕令乾臨欲用時更別取天門冬汁漬米乾漉炊之餘汁拌飯甚宜密封取天門冬汁法淨洗天門冬去心皮乾漉去水切擣壓取汁三四遍令淳乾如草乃止此酒初熟味酸仍作臭泔腥氣但依式服之久停則香美餘酒皆不及也封四七日佳凡八月九月即少少合至十月多合擬到來年五月三十日以來相續服之春三月亦得合入四月不得合服酒時若得散服得力更倍速散方如左

天門冬去心皮暴乾擣篩作末以上件酒服方寸匕日三加至三匕久服長生凡酒亦得服

大人癲小兒驚癇灸脊第二椎及下窮骨兩處以繩度中折繩端一處是脊骨上也凡三處畢復斷繩作三折令各等而參合如厶字以一角抹中央灸下二角俠脊兩邊便灸之凡五處也故畫圖法以丹注所灸五處各百壯削竹皮爲度勝繩也

卒癲灸陰莖上宛宛中三壯得小便通即差千金翼方當是孔穴

又灸陰莖頭三壯

又灸足大指上聚毛中七壯

又灸囊下縫二七壯

又灸兩乳頭三壯

又灸督脉三十壯三報穴在直鼻中上入髮際

又灸天窻百會各漸灸三百壯炷惟小作

又灸耳上髮際各五十壯

論曰黃帝問曰有病怒狂者此病安生岐伯對曰生於陽曰陽何以使人狂曰陽氣因暴折如難決故善怒病名曰陽厥問曰何以知之對曰陽明常動太陽少陽不動不動而動大疾此其候也曰治之奈何曰衰其食即已夫食入於陰長氣於陽故奪之食即已使之服以生鐵落爲後飯夫生鐵落者下氣疾

論曰凡發狂則欲走或自高賢稱神聖皆須備諸火灸乃得永差耳若戚悲泣呻吟者此爲邪非狂自依邪方治之邪入於陽則爲狂邪入於陰則爲血痺邪入於陽傳即爲癲癎邪入於陰傳則爲痛瘖陽入於陰病靜陰入於陽病怒

竈甲湯治邪氣夢寐寤時涕泣不欲聞人聲體中酸削乍寒乍熱腰脊強痛腹中拘急不欲飲食或因疾病之後勞動疲極或觸犯忌諱衆諸不節婦人產生之後月經不利時下青

赤白肌體不生肉虛羸瘦小便不利或頭身發熱旋復解散或一度交接彌日困極藥皆主之方

鼈甲七枚　甘草　白薇一作薏貝母　黃芩各三兩　防風三兩　麻黃　芍藥

白朮各二兩半　凝水石　桂心　茯苓

知母各四兩　石膏六兩

右十四味㕮咀以水二斗煮取四升溫服一升日三夜二

治男子得鬼魅欲死所見驚怖欲走時有休止皆邪氣所為不能自絕九物牛黃丸方

牛黃土精一云火精　荊實人精　曾青蒼龍精　玉屑白虎精

雄黃地精　空青天精　赤石脂朱雀精　玄參玄武精

龍骨水精各一兩

右九味名曰九精上通九天下通九地下篩蜜和服如小豆先食吞一丸日三服稍加以知為度千金翼云九邪病當服五邪湯九精丸差

十黃散治五藏六腑血氣少亡魄失魄五藏覺不安忽忽喜悲心中善恐怖如有鬼物此皆發於大驚及當風從高墮下落水所致惡主之方

雄黃　戈參各五分　黃芩　大黃

桂心　黃蘗　細辛各三分

黃連　蒲黃　麻黃各一分

黃環　澤瀉　山茱萸各二分

右十五味治下篩未食溫酒服方寸匕日三不知加至二匕羸劣者更加人參五分合十分一方有生黃二分雀氏蜀椒九分乾薑四分一方

別離散治男女風邪男夢見女女夢見男悲愁憂慼怒喜無常或半年數月一發動者方

桑上寄生 白朮 各三兩 桂心 茵芋
天雄 菖蒲 細辛 茜根
附子 乾薑 各一兩

右十味治下篩酒服方寸匕日三合藥勿令婦人雞犬及病者病者家人知見令邪氣不去禁之爲驗

治鬼魅四物爲頭散方

東海爲頭是由跋根 黃牙石名金牙 莨菪子 防葵 各一分

右四味治下篩酒服方寸匕訣令病人見鬼加防葵一分欲令知鬼主者復增一分立有驗防葵莨菪菪並令人迷惑恍惚如狂不可多服

五邪湯主邪氣啼泣或歌或哭方

禹餘粮 防風 桂心 芍藥
遠志 獨活 甘草 白朮
人參 石膏
防巳 昌蒲
蛇蛻 酪各一 牡蠣 秦艽 各二兩
雄黃 深師作黃丹 茯神

右十七味㕮咀以水二斗煮取四升分四服亦可如煮散法服之

茯神湯主五邪氣入人體中見鬼妄語有所見聞心悸跳動恍惚不定方

茯神 人參 昌蒲 茯苓 各三兩 赤小豆 四十枚

右五味㕮咀以水一斗煮取二升半分三服

人參湯主風邪鬼氣往來發作有時或無時節方

人參 防風
澤瀉 狗脊
栝樓根 千金翼作桔梗 黃芩
遠志 烏頭 乾薑
獨活 各五分 附子 秦艽

牡蠣　五味子　前胡　細辛
石膏　莒蘭　蜀椒　牛膝
甘草　石南　桂心　麻黃
竹皮　白朮　山茱萸　橘皮
桑根白皮各十八銖　茯苓　鬼箭各十二銖　金罍作澤蘭　大棗十六枚
右三十二味㕮咀以水六升酒六升合煮取四升分五服
日三夜二
虎睛湯主狂邪發無常被頭大喚欲殺人不避水火方
虎睛一具　茯苓　桂心　防風各三兩
獨活　甘草　人參　天雄各一兩
露蜂房一具　鴟頭一具　石長生十分　楓上寄生五分
右十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升分四服日參夜一
又方

防葵　人參　貫衆各五兩　防風　桂心各三兩
右五味㕮咀以水一斗煮取三升分四服亦可稍服
又方
單服苦參五斤蜜和丸如酸棗十丸
治風邪方
商陸根三十斤去皮細切以水八斗東向竈煎減半
去滓更煎令可丸服如梧子一丸勿令一切人見合
時莧菪方亦良又服大豆紫湯汗出佳　出第八卷中　莧菪方出此篇前紫湯方
又方
燒蝦蟇末水服方寸匕日三
又方
燒人屎灰酒服愼生冷酢滑猪雞魚蒜等

又方

以水服伏龍肝方寸匕日三

治百邪鬼魅方

服頭垢小豆大

治魅方

水服鹿角末方寸匕日三

又方

水服獺肝末日三

治狐狸諸色精魅與人作種種惡怪令人恐怖狂癲風邪方

雄黃六�mm 油一斗二升

右二味破雄黃如碁子大鐺中以盆合頭作竈微火九日九夜煎之不得少時火絕亦不得火冷火熱火微不絕神驗

治卒發狂方

臥其人著地以冷水淋其面終日淋之良

治諸橫邪癲狂針灸圖訣

論曰凡諸百邪之病源起多途其有種種形相示表癲邪之端而見其病或有默默而不聲或復多言而謾說或歌或哭或吟或笑或眠坐溝渠噉食糞穢或裸形露體或晝夜遊走或嗔罵無度或是鬼蠱精靈擾亂目急如斯種類癲狂之人今針灸與方藥並主治之凡占風之家亦以風爲鬼斷

偏鵲曰百邪所病者針有十三穴也凡針之體先從鬼宮起次針鬼信便至鬼壘又至鬼心未必須併針止五六穴即可知矣若是邪蠱之精便自言說論其由來往驗有實立得精靈未必須盡其命求去與之男從左起針女從右起針若數處不言便遍穴針也依訣而行針灸等處並備主之仍須依掌訣捻目治之萬不失一黃帝掌訣別是術家秘要縛鬼禁

効五岳四瀆山精鬼魅並悉禁之有目在人兩手中十指節間
第一針人中名鬼宮從左邊下針右邊出第二針手大指爪
甲下名鬼信入肉三分第三針足大指爪甲下名鬼壘入肉
二分第四針掌後橫文名鬼心入半寸（即太淵穴也）第五針外踝
下白肉際足太陽名鬼路火針七鋌鋌三下（即神脉穴也）第六針
髮際宛宛中耳垂下五分名鬼枕火針七鋌鋌三下第七針耳前
大推上入髮際一寸名鬼枕火針七鋌鋌三下第八針
承漿名鬼市從左出右第九針手橫文上三寸兩筋間名鬼
路（即勞宮穴也）第十針直鼻上入髮際一寸名鬼堂火針七鋌鋌
三下（即上星穴也）第十一針陰下縫灸三壯女人即玉門頭名鬼
藏第十二針尺澤橫文外頭接白肉際名鬼戶火針七鋌鋌
三下此即曲池第十三針舌頭一寸當舌中下縫刺貫出舌
上名鬼封仍以一枝橫口吻安針頭令舌不得動已前若是
手足皆相對針兩穴若是孤穴即單針之
邪鬼妄語灸懸命十四壯穴在口脣裏中央絃絃者是也一
名鬼禄又用剛力決斷絃絃乃佳
邪病卧瞑瞑不自知風府主之一名鬼穴
邪病大喚罵詈走灸十指端去爪甲分一名鬼城
邪病鬼癲四肢重恩上主之一名鬼門
邪病大喚罵走遠三里主之一名鬼邪
邪病四肢重痛諸雜候尺澤主之尺中動脉一名鬼受
邪病語不止及諸雜候人中主之一名鬼客廳凡人中惡
先押鼻下是也
狂癎不識人癲病眩亂灸百會九壯
狂走掣癡灸玉枕上三寸（法頂後一寸）灸百壯
狂走癲疾灸頂後二寸十二壯

狂邪鬼語灸天窓九壯
狂癇哭泣灸手逆注三十壯穴在左右手腕後六寸
狂走驚癇灸河口五十壯穴在腕後陷中動脉是此與陽明同也
狂癲風癇吐舌灸胃管百壯不針
狂走癲疾灸大幽百壯
狂走癲癇灸季肋端三十壯
狂言恍惚灸天樞百壯
狂邪發無常被頭大喚欲殺人不避水火及狂言妄語灸間使三十壯穴在腕後五寸臂上兩骨間亦灸驚恐歌哭
狂走喜怒悲泣灸目覺一作攬隨年壯穴在背上甲內側及手所不及者骨芒穴上捻之痛者是也
狂邪鬼語灸伏兔百壯

悲泣鬼語灸天府五十壯
悲泣邪語鬼忙歌哭灸慈門五十壯
狂邪驚癇病灸承命三十壯穴在內踝後上行三寸動脉上亦灸驚走
狂癲風驚厥逆心煩灸巨陽五十壯
狂癲鬼語灸足太陽四十壯
狂走驚恍惚灸足陽明三十壯
狂癲癇易疾灸足少陽隨年壯
狂走癲厥如死人灸足大指三毛中九壯一云灸大敦
狂走易罵灸八會隨年壯穴在陽明下五分
狂癲驚走風恍惚嘆喜罵笑歌哭鬼語悉灸腦戶風池手陽明太陽太陰足陽明陽蹻少陽太陰陰蹻足跟皆隨年壯
驚怖心忪少力灸大橫五十壯

狂風罵詈擲斫人名爲熱陽風炎口兩吻邊聶口處赤白
際各一壯
又灸陰囊縫三十壯令人立以筆正注當下已卧核卯上
炎之勿令近前中卯核恐害陽氣也
狂走刺人或欲自死罵詈不息稱神鬼語炎口吻頭赤白
際一壯又灸兩肘內屈中五壯又灸背胛中間三壯報灸
之倉公法神效
卒狂言鬼語以甄帶急合縛兩手大指便灸左右脇下對屈
肋頭兩處火俱起各七壯須臾鬼自道姓名乞去徐徐問
之乃解其手焉
卒中邪魅恍惚振噤灸鼻下人中及兩手足大指爪甲本令
艾丸半在爪上半在肉上各七壯不止十四壯炷如雀矢大
卒狂鬼語針其足大拇指爪甲下入少許即止

風邪炎間使隨年壯又灸間使手心各五十壯
里七壯
鬼魅炎入髮一寸百壯又灸承漿七壯又灸心輸七壯及灸三
狐魅合手大指縛指炎合間三七壯當狐鳴即差
風虛驚悸第六方二十三首
遠志湯主心氣虛驚悸喜忘不進食補心方
遠志　乾薑　鐵精　桂心
黃耆　紫石各兩　參　防風　當歸
人參　茯苓　甘草　芎藭
茯神　羌活各貳兩　麥門冬　半夏各肆兩
五味子貳　大棗拾貳枚
右十八味㕮咀以水一斗三升煮取三升半分五服日三夜一
遠志湯治中風心氣不足驚悸言語謬誤恍惚憒憒心煩悶

耳鳴方

遠志　黃耆　茯苓　甘草
芍藥　當歸　桂心　麥門冬
人參 各貳兩　獨活 肆兩　生薑 伍兩　附子 壹兩

右十二味㕮咀以水一斗二升煮取四升服八合人羸可
服五合日三夜一一方無桂

茯神湯治風經五藏大虛驚悸安神定志方

茯神　防風 各參兩　人參　遠志
甘草　龍骨　桂心　獨活 各貳兩
細辛　乾薑 各陸兩　白朮 壹兩　酸棗 一升

右十二味㕮咀以水九升煮取三升分三服
治風虛蒲頸項强心氣不定不能食茯神湯方

茯神　麥門冬 各肆兩　人參　羌活

遠志　當歸　甘草　紫石
五味子 各一兩　半夏　防風　黃耆 各三兩
生薑 五兩　酸棗 三升

右十四味㕮咀以水一斗三升煮酸棗取一斗去棗內餘
藥煎取三升半一服七合日三夜二

補心湯主心氣不足其病苦驚悸汗出心中煩悶短氣喜怒
悲憂悉不自知常苦咽喉痛口脣黑嘔吐血舌本強不通水
漿方

紫石英　茯苓　人參　遠志
當歸　茯神 深師作桂　甘草　紫菀 各二兩
麥門冬 一升　赤小豆 三合　大棗 三十枚

右十一味㕮咀以水一斗二升煮取三升分三服
補心湯主心氣不足多夢不自覺咽喉痛

時吐血舌本強水漿不通方

紫石英 研 茯苓 人參 桂心 各二兩 麥門冬 三兩 紫菀 甘草 各一兩 赤小棗 二十四枚 大棗 七枚

右九味�mark咬咀以水八升煮取二升半分三服春夏服之佳

補心湯治奄奄忽忽朝差暮劇驚悸心中憧憧肖滿不下食陰陽氣衰脾胃不磨不欲聞人聲定志下氣方

人參 甘草 枳實 當歸 龍齒 桔梗 各三兩 半夏 桂心 各五兩 黃耆 四兩 生薑 六兩 茯神 二兩 茯苓 遠志 各三兩 大棗 二十枚

右十四味㕮咬咀以水一斗二升先煮粳米五合令熟去滓內藥煮取四升分服八合日三夜二

補心湯主心氣不足心痛驚恐方

遠志 蒲黃 一方用菖蒲 人參 茯苓 各四兩

右四味㕮咬咀以水一斗煮取三升半分三服

傷心湯治心氣不足腹脅相引痛不能俛仰方

茯神 黃芩 甘草 阿膠 附子 桂心 麥門冬 各四兩 大棗 三十枚

右十四味㕮咬咀以水一斗煮取三升去滓內糖阿膠更煎取二升二合分三服 此方與前卷心虛實篇大補心湯方相重分兩不同

小定心湯治虛羸心氣驚弱多慮方

茯苓 四兩 桂心 三兩 乾薑 遠志 甘草 芍藥 人參 各二兩 大棗 十五枚

右八味㕮咀以水八升煮取二升分四服日三夜一

大定心湯治心氣虛悸恍惚多忘或夢寤驚魘志少不足方

人參　茯苓　茯神　遠志
龍骨　乾薑　當歸　甘草
白朮　芍藥　桂心　紫菀
防風　赤石脂各二兩　大棗二十枚

右十五味㕮咀以水一斗二升煮取二升分五服日三夜二

治驚勞失志方

甘草　桂心各二兩　龍骨　麥門冬
防風　牡蠣　遠志各一兩　茯神五兩
大棗二十枚

右九味㕮咀以水八升煮取三升分三服相去如行五里許

治心虛驚悸不定羸瘦病服荊瀝方一

荊瀝二升　白鮮皮　茯神各三兩　人參二兩　白銀十兩（水一斗煮取三升）

右五味㕮咀以荊瀝銀汁中煮取一升四合分三服相去如人緩行十里更進一服

又方

荊瀝二升緩火煎之取一升六合分溫一服四合日三夜一

鎮心湯主風虛勞冷心氣不足喜恐怖神志不定方

防風　當歸　大黃各五分　澤瀉四分
白斂四分一云三兩　昌蒲　人參　桔梗各三分
白朮　甘草各十分　紫菀　茯苓各二分一云各三兩
秦艽六分　桂心　遠志　署預
石膏各三分　大豆卷四分　麥門冬五分一云五兩　粳米五合

大棗十五枚　乾薑二分　附子一枚　茯神各二兩

右二十四味㕮咀以水一斗二升先煮粳米令熟去滓內藥煮取四升分服八合日三夜一劑不用粳米蜜丸酒服梧子大十丸加至二十九

大鎮心散治心虛驚悸夢寤恐畏方

紫石英　茯苓　甘草　澤瀉各八分　署預　白斂各六分　防風　人參　桂心　遠志　桔梗　柏子人各四分　秦艽　白朮　乾薑　細辛各三分　麥門冬　當歸各五分

右二十四味治下篩酒服二方寸匕日三服一方無紫石英　伏苓澤瀉乾薑有大棗四分蜜丸如梧子酒下十五丸日三

天鎮心散治風虛心氣驚弱恍惚失常忽嗔恚悲志意不樂方

紫石英　白石英　朱砂　龍齒　人參　細辛　天雄　附子　遠志　乾薑　乾地黃一本無　茯苓　白朮　桂心　防風各二兩

右十五味治下篩酒服兩方寸匕日三

小鎮心散治心氣不足虛悸恐畏悲思恍惚心神不定惕惕然而驚方

人參　遠志　白朮　附子　桂心　黃耆　細辛　乾薑　龍齒　防風　昌蒲　乾地黃　赤小豆各三兩　茯苓四兩

右十四味治下篩酒服二方寸匕日三

鎮心丸治男子婦人虛損夢寤驚悸或失精神婦人赤白注

漏或月水不利風邪鬼注寒熱往來腹中積聚憂恚結氣諸
病皆悉主之方

紫石英　茯苓　昌蒲　菱蕤
遠志　大黃　大豆卷　爽門冬
當歸　細辛　卷柏　乾薑各三分
防風　人參　乾薑各三分　秦艽
丹參各六分　石膏　澤瀉　柏子人各三分
烏頭　桂心　芍藥　甘草
署預各七分　白斂　桔梗　秦艽
前胡　牛黃各二分　鐵精　銀屑
乾地黃十二分　麋蟲十二枚　白朮　半夏各八分
右三十五味末之蜜棗和擣五千杵酒服如梧子五丸日
三加至二十丸一本無大豆卷大棗　大棗五十枚

大鎮心丸所治與前方大同凡是心病皆悉主之方

乾地黃六分　牛黃五分一方用牛膝　杏人　蜀椒各五分
澤瀉　黃耆　茯苓　大豆卷
署預　茯神　前胡　鐵精
柏子人各二分　羌活　桂心　秦艽
苦蘘　人參　麥門冬　遠志
丹砂　阿膠　甘草　大黃
銀屑各八分　桑螵蛸十二枚　大棗四十枚　白斂
當歸　乾薑　紫石英　防風各八分
右三十二味末之白蜜棗和丸酒服七丸日三加至二十丸
小鎮心丸治心氣少弱驚虛振悸胸中逆氣厭寐夢參錯謬志
恍惚方

紫石英　朱砂　茯神　銀屑

雄黃　昌蒲　人參　桔梗
乾薑　遠志　甘草　當歸
桂心 各三兩　防風　細辛　鐵精
防己 各一兩

右十七味末之蜜丸飲服十九如大豆日三漸加至二十
丸一方用茯苓二分爲十八味
定志小丸主心氣不定五藏不足甚者憂愁悲傷不樂忽忽
喜忘朝差暮劇暮差朝發狂眩方
昌蒲　遠志 各二兩　茯苓　人參 各三兩

右四味末之蜜丸飲服如梧子大七九日三加茯神爲茯
神丸散服亦佳
紫石酒主久風虛冷心氣不足或時驚怖方
紫石英斤　鍾乳 四兩　麻黃　茯苓

白朮 各三兩　防風　遠志　桂心 各四兩
甘草三兩

右九味咬咀以酒三斗漬春三日服四合日三亦可至醉
常令有酒氣
好忘第七方十六首
孔子大聖知枕中方
龜甲　龍骨

右四味等分治下篩酒服方寸匕日三常服令人大聰翼云
令人不忘方
昌蒲二分　茯苓　茯神　人參 各五分　遠志 七分

右五味治下篩酒服方寸匕日三夜一五日後知神良
又方

蓯蓉　續斷各一分　遠志　昌蒲　茯苓各三分

右五味治下篩酒服方寸匕日三至老不忘

開心散主好忘方

遠志　人參各四分　茯苓二兩　昌蒲一兩

右四味治下篩飲服方寸匕日三

昌蒲益智丸方

昌蒲　遠志

牛膝各五分　桂心三分　茯苓七分　附子四分

右八味末之蜜丸如梧子一服七丸加至二十丸日二夜一主治喜忘恍惚破積聚止痛安神定志聰明耳目禁如藥法

養命開心益智方

乾地黃　人參　人參　桔梗

茯苓各三兩　蓯蓉

遠志　菟絲子酒各三兩　蛇牀子二分

右七味治下篩服方寸匕日二忌兔肉餘無忌

北平太守八味散方

天門冬六分　乾地黃四分　桂心　茯苓各一兩

右治下篩酒水任服方寸匕後食服三十日力倍六十日氣力強志意足

治健忘方

天門冬　遠志　茯苓　乾地黃等分

右四味末之蜜丸酒服二十丸如梧子日三服加至三十丸常服之勿絕

治好忘久服聰明益智方

龍骨　虎骨　遠志各等分

右三味治下篩食後服方寸匕日二

又方

七月七日取昌蒲酒服三方寸匕飲酒不醉

又方

常以甲子日取石上昌蒲一寸九節者陰乾百日治合下篩服方寸匕日三耳目聰明不忘出衢州石橋寺南山

又方

七月七日麻勃一升人參三兩末之蒸令氣遍夜欲卧服一刀圭盡知四方之事

又方

戊子日取東邊桃枝三七枚縛著卧牀中枕之不忘

又方

常以五月五日取東向桃枝日未出時作三寸木人著衣帶中令人不忘

又方

丁酉日自至市買遠志裏著衣中角頭還家服之不復忘

治人心昏塞多忘喜誤方

七月七日取蜘蛛網著衣領中勿令人知不忘

備急千金要方卷第十五上 脾藏 上

朝奉郎守尚藥奉御臣孫兆重校理 朝奉郎守尚藥奉御臣高保衡 朝奉郎行尚藥奉御臣林億等校正
朝奉郎守光祿卿充秘閣校理判登聞檢院上護軍賜緋魚袋臣林億等奉勅新校正

脾藏脉論第一
脾虛實第二 脾胃俱虛實消食附
脾勞第三
肉極論第四
肉虛實第五
秘澀第六 大便失禁 小便不通附
熱痢第七
冷痢第八
疳濕痢第九 蝕瘡附
小兒痢第十
脾藏脉論第一

論曰脾主意脾藏者意之舍意者存憶之志也爲諫議大夫並四藏之所受心有所憶謂之意意之所存謂之志因志而存變謂之思因思而遠慕謂之慮因慮而處物謂之智意者脾之藏也口脣者脾之官脾氣通於口口和則能別五穀味矣故云口爲戊舌脣爲已循環中宮上出頤頰次候於脣下迴脾中榮華於舌外主肉內主味脾重二斤三兩扁廣三寸長五寸有散膏半斤主裹血温温五藏神名俾俾主藏營一作意秩祿號爲意藏隨節應會故曰脾藏營營金意在氣爲噫在液爲涎脾氣虛則四肢不用五藏不安實則腹脹涇溲不利脾氣虛則夢飲食飲不足得其時則夢築墻蓋屋脾氣盛則夢歌樂體重手足不舉厥氣客於脾則夢丘陵大澤壞屋風雨凡脾藏象土與胃合爲腑其經足太陰與陽明爲表裏其脉緩相於夏王於季夏脾者土也敦而福敦者厚也萬物衆色不同故名曰得福者廣萬物懸根佳華其葉在巔蛸蛭蠕動蚊蠅喘息皆蒙土恩德則爲緩恩則爲遲故令太陰緩而遲尺寸不同酸鹹苦辛大妙而生五行其時而以各行皆不羣行盡可常服土寒則温土熱則涼土有一子名之曰金壞挾抱之不離其身金乃畏火恐熱來熏遂棄其母逃於水中水爲金子而藏火神閉門塞戶內外不通此謂冬時土失其子其氣衰微水爲洋溢浸漬其地走擊皮膚面目浮腫歸於四肢愚醫見水直往下之虛脾空胃水遂居之肺爲喘浮肝反畏肺故下沈沒下有荊棘恐傷其身避在一邊以爲水流心衰則伏肝微則沈故令脉伏而沈上醫遠一作來占因轉孔穴利其溲便遂通水道甘液下流停其陰陽喘息則微汗出正安聲其味爲鹹倚坐毋敗溝臭如腥土得其子即成爲山金

得其母名曰丘矣
四時之序逆順之變異也然脾脉獨何主脾脉者土也孤藏以灌四傍者也其善者不可得見惡者可見惡者何如其來如水之流者此謂太過病在外如鳥之喙者此謂不及病在中太過則令人四肢沈重不舉不及則令人九竅壅塞不通名曰重強

脾脉來而和柔相離如雞踐地曰平長夏以胃為本脾脉來實而盈數如雞舉足曰脾病脾脉來堅銳如雞之喙（雞一作鳥）如鳥之距如屋之漏如水之流曰脾死

眞脾脉至弱而乍疎乍散（乍一作數）色黃青不澤毛折乃死

長夏胃微濡弱曰平弱多胃少曰脾病但代無胃曰死濡弱有石曰冬病石甚曰今病

脾藏營營舍意愁憂不解則傷意意傷則悶亂四肢不舉毛悴色夭死于春足太陰氣絕則脉不營其口唇肌肉之本也脉弗營則肌肉濡肌肉濡則人中滿人中滿則唇反唇反者肉先死甲篤乙死木勝土也

脾死藏浮之大緩堅按之中如覆杯絜絜狀搖者死六月季夏建未也坤未之間土之位脾王之時其脉大阿阿而緩曰平反得浮大而洪者是心之乘脾母之歸子為虛邪雖病易治反得微濇而短者是肺之乘脾木之剋土為賊邪大雖病自愈反得弦而長者是肝之乘脾木之剋土為賊邪大逆十死不治反得沈濡而滑者是腎之乘脾水之陵土為微邪雖病即差

右手関上陰絕者無脾脉也苦少氣下利腹滿身重四肢不欲動善歐刺足陽明治陽

右手関上陰實者脾實也苦腸中伏伏如堅狀大便難刺足
太陰治陰
脾脉長長而弱来踈去穐正作再至曰平三至曰離經病四
至脫精五至死六至命尽足太陰脉也
脾脉急甚為瘈瘲微急為風中滿食飲入而還出後沃沫緩
甚為痿厥微緩為風痿四肢不用心慧然若無疾大甚為擊
仆微大為脾疝氣裏大膿血在腸胃之外小甚為寒熱微小
為消癉滑甚為癲疾微滑為蟲毒蛕腸鳴熱滿甚為腸癲
微濇為内潰多下膿血
脾脉搏堅而長其色黄當病少氣其而大而散色不澤者當病
足骭腫若水狀
黄脉之至也大而虚有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝女子
同法得之疾使四肢汗出當風

扁鵲曰脾有病則色萎黄實則舌本強直虚則多癖善呑
注利其實若陽氣壯則夢飲食之類
脾在聲為歌在變動為噫在志為思思傷脾精氣并於脾則飢
音主長夏病變於音者取之經恐懼而不解則傷精精傷則
骨痠痿厥精時自下則病精是故五藏主藏精者也不可傷
傷則守失而陰虚虚則無氣無氣則死
病先發於脾閉塞不通身痛體重一日之胃而腹脹二日之腎
少腹腰脊痛脛痠三日之膀胱背膂筋痛小便閉十日不已
死冬人定夏晏食
病在脾日昳慧平旦甚日中持下晡靜素問作日出甚王冰
云日中持者繆也
假令脾病東行若食雉兎肉及諸木果實得之不者當以春
時發得病以甲乙日也
凡脾病之狀必身重善飢足痿不收素問作善肌肉痿足不
收甲乙作善飢肌肉痿

足不收行善瘛脚下痛虛則腹滿腸鳴飧泄食不化取其經足太陰陽明少陰血者

脾脉沈之而濡浮之而虛苦腹脹煩滿胃中有熱不嗜食食而不化大便難四肢苦痺時不得之房內月使不來來而頻併脾病其色黃飲食不消腹苦脹滿體重節痛大便不利其脉微緩而長此為可治宜服平胃九瀉脾丸茱萸丸附子湯春當刺隱白冬刺陰陵泉皆瀉之夏刺大都季夏刺公孫秋刺商丘皆補之又當灸章門五十壯背第十一椎百壯

邪在脾胃肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中善飢陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛陰陽俱有餘若俱不足則有寒有熱皆調其三里

有所擊仆若醉飽入房汗出當風則傷脾脾傷則中氣陰陽離別陽不從陰故以三分候死生

脾中風者翕翕發熱形如醉人腹中煩重皮肉瞤瞤而短氣也

脾中寒

脾水者其人腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難

脾脹者善噦四肢急一作實體重不能衣一作收

跌陽脉浮而澁浮則胃氣強澁則小便數浮澁相搏大便則堅其脾為約脾約者其人大便堅小便利而反不渴

脾氣弱病利下白腸垢大便堅不能更衣汗出不止名曰脾氣弱或五液注下青黃赤白黑

寸口脉弦而滑弦則為實痛即為急實即為踊痛踊相搏即胷脇搶急

跌陽脉浮而澁浮即胃氣微澁即脾氣褰微褰相搏即呼吸不得此為脾家失度

寸口脉雙緊即為入其氣不出無表有裏心下落堅

跌陽脉微而濇微即無胃氣澀則傷脾寒在於膈而反下之寒積不消胃微脾傷穀氣不行食已自噫寒在胃膈上虛下實穀氣不通爲秘塞之病

寸口脉緩而遲緩則爲陽其氣長遲則爲陰榮氣促不足榮衛俱和剛柔相得三焦相承其氣必強

跌陽脉滑而緊滑即胃氣實緊即脾氣傷得食而不消者此脾不治也能食而腹不滿此爲胃氣有餘腹滿而不能食心下如飢此爲胃氣不行心氣虛也得食而滿者此爲脾家不治

病人鼻下平者胃病也微赤者病發癰微黑者有熱青者有寒白者不治脣黑者胃先病微燥而渴者可治不渴者不可治臍反出者此爲脾先落一云終

凡人病脉以解而反暮微煩者人見病者差安而強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈

診得脾積脉浮大而長飢則減飽則見脹起與穀爭減心下累累如桃李起見於外腹滿嘔泄腸鳴四肢重足脛腫厥不能卧是主肌肉損色黃也

脾之積名曰痞氣在胃管覆大如盤歨歨不愈病四肢不收黃癉食飲不爲肌膚以冬壬癸日得之肝病傳脾脾當傳腎腎適以冬王王者不受邪脾復欲還肝肝不肯受因留結爲積故知痞氣以冬得之

脾病其色黃體青失溲直視脣反張瓜甲青飲食吐逆體重節痛四肢不舉其脉當浮大而緩今反弦急其色當黃而反青者此是木之剋土爲大逆十死不治

宮音人者主脾聲也脾聲歌其音鼓其志愁其經足太陰厥逆陽明則榮衛不通陰陽翻祚陽氣內擊陰氣外傷傷則寒寒則虛虛則舉體消瘦語音沈澀如破鼓之聲舌強不轉而

好咽唾口噤脣黑四肢不舉身重如山便利無度甚者不可治依源麻黃湯主之方在第八卷中又言聲憂懼舌本卷縮此是木剋土陽擊陰陰氣伏陽氣起起則實實則熱熱則悶亂體重不能轉側語聲拖聲氣深不轉而心急此為邪熱傷脾甚則不可治若脣雖萎黃語音若轉可治

脾病為瘧者令人寒腹中痛則腸中鳴鳴已汗出恒山九主之方在第十卷中若其人本來少於瞋怒而忽反常瞋喜無度正言而鼻笑不荅於人此脾病聲之候也不盈旬月禍必至矣陰陽之疾經絡之源究尋其病取其所理然後行治萬無遺一也

黃為脾脾合肉黃如鮒腹者吉脾主口脣脣是脾之餘其人土形相比於上宮黃色大頭圓面美肩背大腹好股胻小手足多肉上下相稱行安地舉足心平好利人不喜權埶喜附

耐秋冬不耐春夏春夏感而生病主足太陰敦敦然腥應月月有虧盈脾小大隨人脣大小上脣厚下脣薄無腭斷脣缺破此人脾不正揭徨脣者則脾下下則虛虛則危危則寒寒脇痛滿脣垂而大不堅者則脾下下則虛虛則危危則寒寒則身重不能行步脣堅者則脾堅堅則藏安安則不病脣上下好者則脾端正端正則脾胃和利人無病脣偏舉者則脾偏痛好脹凡人分部中陷起者必有病生胃陽明為脾之部而藏氣通於內外部亦隨而應之沈濁為內浮清為外若表病外入所部則起起則前瀉陽後補陰若裏病內出所部則陷陷則前治陰後治陽陽則實熱陰則虛寒寒主外熱主內凡人死生休否則藏神前變形于外人脾前病脣則焦枯無潤若脾前死脣則乾青白漸縮急齒噤不開若天中等分墓色應之必死不治看色厚薄決判賒促賒則不盈四百日內

促則旬朔之間脾病少愈而卒死何以知之曰青黑如拇指
黶黯見顏頰上此必卒死脾絕十二日死何以知之口唇足腫
腹熱臚脹泄利不覺其出時一日死五日死面青目黃者五日死病
人著牀心痛氣短脾竭內傷百日復愈欲起傍徨因坐於地
其亡倚牀能治此者可謂神良又面黃目赤不死黃如枳實
死吉凶之色在於分部霏霏而見黑黃入脣必病不出其年
季夏土脾脉色黃主足太陰脉也其脉本在中封前上四寸
之中應在背輸與舌本中封在內踝前一寸大筋裏宛宛中
脉本從中封上四寸是也其脉根于隱白隱白在足大指端
內側是也
其筋起於足大指之端內側上結於內踝其直者上結於膝
內輔骨上循陰股結於髀聚於陰器上腹結於臍循腹裏
結於脇散於胥中其內者著於脊
其脉起於足大指之端內側白肉際過核骨後上內踝
前廉上腨內循脛骨後交出厥陰之前上循膝股內前廉入
腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本散舌下其支者復從胃別上
膈注心中合足陽明為表裏陽明之本在厲兌足趺上大指
間上三寸骨解中也同會于手太陰
其足太陰之別名曰公孫去本節後一寸別走陽明其別者
入絡腸胃主脾生病實則胃熱熱則腹中切痛痛則陽病陽
脉反大於寸口三倍病則舌強筋轉卵縮牽陰股引髀痛腹
脹身重食飲不下煩心心下急注脾脾病虛則胃寒寒則腹
中鼓脹脹則陰病陰脉反小於寸口一倍病則泄水不能卧而
煩強立股膝內痛若筋折紐之紐之者脉時緩緩動也發動甚
者死不治

四季之月各餘十八日此為四季之餘日主脾胃黃肉隨病
也（一作內陽病）其源從太陰陽明相格節氣相移三焦寒濕不調
四時關格而起則藏腑傷痾隨時受癘陽氣外泄陰氣內伏
其病相反若腑虛則陰邪所加頭重頸直皮肉強痺若藏實
則陽疫所傷蘊而結核起於喉頸之側布毒熱於皮膚分肉
之中上散入髮際下貫鬲隱隱而熱不相斷離故曰黃肉
隨病也

扁鵲曰炙肝脾二輸主治毋毒四時隨病當依源補瀉虛實
之痾皮肉隨熱則須鎌破薄貼方呪促治疾無逃矣

脾實第二（論一首 方二十三首 脉四條 灸法一首）

脾實熱

右手關上脉陰實者足太陰經也病苦足寒脛熱腹脹滿煩
擾不得卧名曰脾實熱也

治舌本強直或夢歌樂而體重不能行宜瀉熱湯方

前胡（四兩） 茯苓 龍膽 細辛（各三兩） 芒消（各三兩） 大青（各三兩） 苦竹葉（切一升）

右九味㕮咀以水九升煮取三升分三服食後服

射干煎方主治同前

射干（八兩） 大青（三兩） 赤蜜（一升）

右四味㕮咀以水五升煮取一升五合去滓下蜜煎取二
升分三服

治脾熱面黃目赤季脅痛滿方

半夏（八兩） 枳實 石膏（作一斤） 梔子 茯苓

芒消（各三兩） 紫菀（五兩） 淡竹葉（切一升） 白朮 杏人（各四兩）

生地黃（切一斤） 母薑（八兩）

右十一味㕮咀以水九升煮取三升去滓下芒消分三服

治脾橫方

若赤黑發如瓜大煎羊脂摩之

又方　末赤小豆和雞子白傅之

四肢寒熱腰疼不得俛仰身黃腹滿食嘔舌根直灸第十一推上及左右各一寸五分三處各七壯

脾胃俱實

右手關上脉陰陽俱實者足太陰與陽明經俱實也病苦脾脹腹堅檢胷下痛胃氣不轉大便難時反泄利腹中痛上衝肺肝動五藏立喘鳴多驚身熱汗不出喉痺精少名曰脾胃俱實也

瀉熱方

大黃　麻黃　黃芩各四兩　杏仁

赤茯苓　甘草　橘皮　芒消

澤瀉　茯苓各三兩

右九味㕮咀以水九升煮取三升絞去滓內大黃煮兩沸去滓下芒消分三服

治脾脉厥逆大腹中熱切痛舌強腹脹身重食不下心注脾急痛大黃瀉熱湯方

大黃三兩細切水一升半別漬一宿　澤瀉

黃芩　細辛

甘草三兩　橘皮二兩

右八味㕮咀以水七升煮取三升合去滓下大黃更煎兩沸去滓下芒消分三服

治脾熱脅痛熱滿不歇目赤不止口唇乾裂方

石膏一斤碎　生地黃汁　赤蜜各一升　淡竹葉切五升

右四味先以水一斗二升煮竹葉取七升去滓澄清煮石

膏取一升五合去滓下地黃汁兩沸次下蜜煎取三升細
細服之

治脾熱偏一邊痛腎滿脇偏脹方

茯苓　橘皮　澤瀉各三兩　芍藥
白朮各八兩　人參　桂心各二兩　石膏八兩
半夏六兩　生薑切一升　桑根白皮一升

右十一味㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服若
須利下加芒消二兩佳

脾虛冷

右手關上脉陰虛者足太陰經也病苦泄注腹滿氣逆霍乱
嘔吐黃癉心煩不得卧腸鳴名曰脾虛冷也

治虛脹脅痛肓息有時發作悉補之方

五加根皮一斤　猪椒根皮一斤　丹參　橘皮各一斤

地骨皮　乾薑
苦蔕　附子各五兩
大棗五十枚　甘草三兩

白朮各八兩　乾地黃
桂心　桔梗各四兩

右十四味㕮咀以酒四斗漬五七日服七八合加至一升
日再服

治脾寒飲食不消勞倦氣脹噫滿憂恚不樂檳榔散方

檳榔八枚子並用皮　人參
厚朴　麥蘗
茯苓　陳麴
白朮　吳茱萸各三兩

右八味治下篩食後酒服二方寸匕日再一方用橘皮一
兩半

温脾丸治久病虛羸脾氣弱飲食不消喜噫方

黃蘗　大麥蘗　吳茱萸　桂心
乾薑　細辛　附子　當歸

大黃　麴　黃連各一兩

右十一味末之蜜丸如梧子每服十五丸空腹酒服日三麻豆散主脾氣弱不下食飢此以當食方

大豆黃二升　大麻子三升　令香熬

右二味治下篩飲和服一合日四五任情多少

脾胃俱虛

右手閧上脉陰陽俱虛者足太陰與陽明經俱虛也病苦胃中如空狀少氣不足以息四逆寒泄注不已名曰脾胃俱虛也治腹脹善噫食則欲嘔泄瀉溏下㠯乾四肢重好怒不欲聞人聲忘誤喉痺補之方

黃連一兩　禹餘粮一兩　白术三兩　大麻子五兩

乾薑三兩　桑白皮八兩　大棗二十枚

右七味�once以水一斗二升煮取二升分四服

治脾胃俱虛苦飢寒痛方

人參　當歸　桂心　茯苓

桔梗　苦蘞各五兩　厚朴　甘草

橘皮　吳茱萸各二兩　白术五兩　麥蘖一升

右十二味�once以水一斗二升煮取三升分三服

治脾胃俱虛冷白术散方

白术　厚朴　人參　吳茱萸

茯苓　麥蘖　麴　苦蘞各三兩

右八味治下篩酒服方寸匕食後日三一方加大腹橘皮

凡身重不得食食無味心下虛滿時時欲下喜卧者皆針胃管太倉服建中湯及服此平胃九方　建中湯方出第十九卷中

杏人五十枚　丹參三兩　玄參各二兩　苦蘞

桂心各一兩　葶藶

右七味末之蜜丸如梧子酒服五丸日三以知為度

崔文行平胃丸治丈夫小兒食實不消胃氣不調或温壯熱結大小便不利者有病冷者服露宿丸熱藥後當進此丸

調胃方

大黃二兩　小草一兩絡　甘草　芍藥

芎藭　杏人五十枚　半夏

右七味末之蜜丸飲服如梧子五丸日三一歲兒二丸漸加之（千金翼有昌蒲當歸茯苓麥門冬細辛為十三味乾薑無杏人）

論曰凡病宿食在上管當吐之脉數而滑者實也有宿食不消下之愈胃中有澼食冷物即痛不能食有熱物即欲食大腹有宿食寒慄發熱如瘧狀宿食在小腹者當暮發熱明旦復止寸脉緊即頭痛風寒或腹中宿食不化寸口脉緊者如轉索左右無常脾胃中有宿食不消寸口脉浮而大按之反澀尺中微而澀故知宿食

大麴蘗丸主消穀斷下温和又寒冷者長服不患霍亂方

大麥蘗　麴（絡一）　附子　乾薑

當歸　人參（絡三兩）　赤石脂一兩　桔梗

女萎（絡二兩）　吳茱萸　皂莢（絡五兩，）　蜀椒二兩半

烏梅五十枚

右十三味末之蜜酢中半漬梅一宿蒸三斗米下去核擣如泥和藥蜜和擣三千杵服十九日三下甚者加龍骨阿膠艾各三兩

消食斷下丸寒矜者常服之方

麴　大麥蘗（絡一）　吳茱萸四兩

右三味末之蜜和服十五丸如梧子日三

乾薑散治不能食心意冥然忘食方

法麴　乾薑　豉　蜀椒　大麥蘗 各一升

右五味合治下篩食後服五方寸匕日三以能食爲度
消食丸治數年不能食方

小麥蘗　麴 各一升　乾薑　烏梅 各四兩

右四味末之蜜和服十五丸日再加至四十丸寒在胷中及
反胃噫不消穀能食除腸中水氣臚脹方

法麴　杏人　麥蘗 各五兩

右三味治下篩食後酒服一合日三

脾勞第三 論一首 方二首

論曰凡脾勞病者補肺氣以益之肺王則感於脾是以聖春
夏養陽氣秋冬養陰氣以順其根本矣肝心爲陽脾肺腎
爲陰逆其根則伐其本陰陽四時者萬物之終始也

治脾勞實四肢不用五藏乖及脹滿肩息氣急不安承氣泄
實熱半夏湯方

半夏　宿薑 各八兩　茯苓　白朮
杏人 各三兩　竹葉 切一升　橘皮
芍藥 各四兩

大棗 二十枚

右九味咬咀以水一斗煮取三升分四服

治脾虛寒勞損氣脹噫滿食不下通噫消食膏酒方

豬膏 三升　宿薑 汁五升

吳茱萸 一升　白朮 一斤

右四味擣茱萸朮等二物細細下篩爲散內薑汁膏中煎
取六升溫清酒一升進方寸匕日再

肉極第四 論一首 方六首

論曰凡肉極者主脾也脾應肉肉多肌合若脾病則肉變色又
曰至陰遇病爲肌痺肌痺不已復感於邪內舍於脾體癢淫

淫如鼠走其六身上津液脫腠理開汗大泄鼻端色黃是其
相也凡風氣藏於皮膚肉色則敗以季夏戊巳日傷於風爲
脾風脾風之狀多汗陰動傷寒寒則虛虛則體重意墮四肢
不欲舉不嗜飲食食則欬欬則右脅下痛陰陰引肩背不可
以動轉名曰厲風裏虛外實若陽動傷熱熱則入身
上如鼠走唇口壞皮膚色變身癢津液脫腠理開汗大泄
名曰惡風而須臾其綱紀知其終始陰陽動靜肉之虛實實
則瀉之虛則補之能治其病者風始入肉皮毛肌膚筋脉之
間即須決之若入六腑五藏則半死矣
扁鵲曰肉絕不治五日死何以知之皮膚不通外不得泄凡肉
應足太陰太陰氣絕則脉不營其肌肉脣反者氣盡則肉先
死使良醫妙藥終不治也
治肉熱極肌痺淫淫如鼠走身上津液脫腠理開汗大泄爲

脾風風氣藏於皮膚肉色敗鼻見黃色麻黃止汗通肉解風
痺湯方

麻黃　枳實　細辛　白朮
防巳 作各三兩 防風　生薑　附子 各四兩　甘草
桂心 各三兩　石膏 八兩

右十味㕮咀以水九升煮麻黃去沫下諸藥煮取三升分
三服

治肉極虛熱肌痺淫淫如鼠走身上津液開泄或痺不仁四肢
急痛西州續命湯方

麻黃　生薑 各三兩　當歸　石膏 各三兩
苦蘭　甘草　桂心　黃芩
防風　芍藥 各一兩　杏人 四十枚

右十一味㕮咀以水九升先煮麻黃除沫下諸藥煮取三

外去滓分四服日再

治肉極熱則身體津液脫腠理開汗大泄厲風氣下焦脚弱越婢湯方出第七卷中

治肉熱極則體上如鼠走或如風痺脣口壞皮膚色變石南散主諸風大病方

石南 三十銖　署預 一兩　天雄 一兩半　桃花 一作桃人 一兩十八銖

甘菊花　芍藥 一兩一作甘草　黃耆 十八銖　山茱萸 一兩十八銖

眞朱 十八銖　石膏 二兩　外麻 二兩　菱蕤 一兩半

右十二味治下篩酒服方寸匕日再食後服

治肉極虛寒爲脾風陰動傷寒體重怠墮四肢不欲舉關節疼痛不嗜飲食虛極所致大黃耆酒方

黃耆　桂心　巴戟天　石斛

澤瀉　茯苓　柏子人　乾薑

蜀椒 一兩三　防風　獨活　人參 一兩二

天雄　芍藥　附子　烏頭

茵芊　半夏　細辛　白朮

黃芩　栝樓根　山茱萸 一兩

右二十三味咬咀絹袋貯以清酒三斗漬之秋冬柒日春夏三日初服三合漸漸加微痺爲度日再

治肉極虛寒卒中風口噤不能言四肢緩縱偏攣急痛注五藏恍惚悲喜怒無常手脚不隨方

獨活　茵芊　黃芩 一兩三　甘草

防風　芍藥　苦參　麻黃

葛根 一兩二　人參 一兩　烏頭 三枚

右十一味咬咀以水一斗竹瀝四升合煮取四升分四服日三夜一

肉虛實第五論一首 方二首

論曰夫肉虛者坐不安席身危變動肉實者坐安不動喘氣肉虛實之應表於脾若其腑藏有病從肉生熱則應藏寒則應腑

治肉虛坐不安席好動主脾病寒氣所傷五加酒方

五加皮 枸杞皮 乾地黃 丹參 附子

杜仲 石膏

右八味㕮咀以清酒二斗漬三宿一服七合日再

治肉實坐安席不能動作喘氣主脾病熱氣所加關格半夏湯除喘方

半夏 宿薑 杏人 細辛

橘皮 麻黃 石膏 射干

右八味㕮咀以水九升煮取三升分三服須利下芒消三兩

秘澀第六論一首 方十五首 方四十首

論曰有人因時疾差後得秘塞不通遂致天命大不可輕之所以備述雖非死病凡人不明藥餌者拱手待斃深可痛哉單複諸方以虞倉卒耳凡大便不通皆用滑膩之物及冷水並通也凡候面黃者即知大便難跌陽脉浮而澀浮則胃氣強澀則小便數浮澀相搏大便則堅其脾爲約脾約者其人大便不通方

麻子人 枳實 厚朴 杏人 芍藥

右六味末之蜜丸如梧子飲服五丸日三漸加至十丸後服

治關格大便不通方

芒消 烏梅

桑白皮 芍藥

杏人 各四十枚 麻人 二兩
大黃 八兩

右七味㕮咀以水七升煮取三升分三服一本無爲梅加枳實乾地黃各三兩

治大便秘塞不通神方

猪羊膽無在以筒灌三合許令深入即出矣出不盡須更更灌一方加冬葵子汁和之亦妙又椒豉湯五合灌之佳臨時易可得即用之又煎蜜成煎如人指大深內穀道佳又無灰濃酒半升臨三錢匕鍊成如上法

三黃湯治下焦熱結不得大便方

大黃 三兩 黃芩 二兩 甘草 一兩 梔子 十七枚

右四味㕮咀以水五升煮取一升八合分三服若大秘加芒消二兩

淮南五子元治秘澀及虛損不足飲食不生肌膚三焦不調和榮衛利腑藏補三焦方

大黃 一斗米下 外蒸三 前胡 二兩 半夏 薤蓉

芍藥 茯苓 細辛 各一兩

右九味末之蜜和合擣萬杵爲丸梧子大食後服十五元稍增之日再 崔氏云今人煮兩服之緩中不如意便服之又有黃芩一兩

大五柔丸主藏氣不調大便難通榮衛利丸竅消穀益氣力方

大黃 芍藥 枳實 薤蓉

甘草 黃芩

芎藭 牛膝 各二兩

桃人 一枚 伯 杏人 四十枚

右十味末之蜜和丸如梧子一服三丸日三加至二十元酒

下

濡藏湯主大便不通六七日腹中有燥屎寒熱煩迫短氣汗出脹滿方

生葛根二升　猪膏二升　大黃一兩

右三味㕮咀以水七升煮取五升去滓內膏煎取三升澄清強人頓服羸人再服亦治大小便不通

治大便不通方

商陸　牛膝各三　大戟一斤　大豆五升

右四味㕮咀以水五升煮取二升以大豆五升煎令汁盡至豆乾初服三枚以通爲度

又方　蜜和胡臺屎內大孔中即通

又方

氷四升蜜一升合煮熟冷灌下部中一食頃即通

又方

塩半合蜜三合合煎如餳出之著冷水中丸如槟榔形如指許大深內下部中立通

治大便難方

單用豉清醬清羊酪土瓜根汁灌之立通

又方　以醬清漬烏梅灌下部中

又方

桑根白皮　榆根白皮各壹把

右二味㕮咀以水三升煮取一升半分三服

又方　桃皮三升水五升煮取一升頓服

又方　水一升煮羊蹄根一把取半升頓服

又方　常煮麻子取汁飲

又方　常服蜜煎五合

又方
猪脂和陳葵子末爲丸如梧子每服十丸通即止
又方 水服桃花方寸匕無桃花白皮亦得
又方 常服車前子及葉並良
又方 擣葵根汁生服
又方
好膠 參寸 葱白 壹把
右二味以水四升煮取一升半頓服之即下
又方
葵子 牛酥 臛亦用豬脂 壹升
右二味以水三升煮葵子取一升內酥煮一沸待冷分二服
又方 葵子汁和乳汁等分服之立出
又方

醬清三升 麻油二升 葱白十三
右三味合煮令黑去滓待冷頓服之一方不用醬清
芒消丸治脹滿不通方
芒消 芍藥 酪各一兩半 黃芩 六銖兩 杏人
大黃 酪二兩
右五味末之蜜丸如梧子飲服十五丸加至二十丸取通利
爲度口三
又方
通草 朴消 酪四兩 郁李人 黃芩
瞿麥 酪三兩 車前子五合一方六兩一方二升
右六味㕮咀以水八升煮取二升半分二服一方用絹袋
盛煮頓服二升
又方

獨頭蒜燒熟去皮綿裹內下部中氣立通又削薑裹
鹽導之及乾薑塩杏人擣丸道導之並佳

治脹滿閉不下方

吳茱萸一升　乾薑
桂心　芍藥
人參　細辛各一兩
雄黃十八銖　大黃
右十三味咬咀以水一斗煮取三升去滓內雄黃臭朱末
酒一升微火煮三沸服一升得下即止

走馬湯主一切卒中惡心痛腹脹大便不通方出第十三卷
心腹痛篇

巴豆丸主寒癖宿食久飲飽不消大祕不通方

巴豆人一升清酒五升煮三日三夕碎大熟合酒微
火煎令可丸如胡豆欲取吐下者服二丸

練中丸主宿食不消大便難方

大黃八兩　葶藶
右四味末之蜜丸如梧子食後服七丸日二稍加　別後名氣丸
大便難炙第七椎兩傍各一寸七壯
又炙承筋二穴各三壯在腨中央陷內
大便不通炙俠玉泉相去各三寸名曰腸遺隨年壯一寸半
又炙大敦四壯在足大指聚毛中
大便閉塞氣結心堅滿炙石門百壯
後閉不通炙足大都隨年壯

治老人小兒大便失禁炙兩脚大指去甲一寸三壯又炙大
指爺間各三壯

治大小便不通方

葵子 末一升 青竹葉一把

右二味以水三升煮五沸頓服

又方

葵子一升 榆皮切一升

右二味以水五升煮取二升分三服

又方

葵子一升以水三升煮取一升去滓內猪脂一升空腹分二服

又方 艷帶煮取汁和蒲黃方寸匕日三服

又方 猪脂一斤以水二升煮三沸飲汁立通

治大小便不利方

葵子一升 消石二兩

右二味以水五升煮取二升分再服

治小兒大小便不通方

擣白花胡葵子末煮汁服之

又方 末雞屎白服一錢匕

大小便不利欲作腹痛灸榮衛四穴百壯穴在背脊四面各一寸

腹熱閉時大小便難腰痛連腎灸圍岡百壯穴在小腸輸下二寸橫三間寸灸之

大小便不通灸臍下一寸三壯

又灸橫文百壯

大小便不利灸谿百壯穴在腰目下三寸俠脊相去四寸兩邊各四穴計八穴故名八谿（谿音遼）

小兒大小便不通灸合兩吻各一壯

小便不利大便數注灸屈骨端五十壯

小便不利大便注泄炎天樞百壯穴在俠臍相去三寸魂魄之舍不可針大法在臍傍一寸合臍相去可三寸也

金澤文庫

朝奉郎守太常卿兼祕閣校理判登聞檢院護軍賜緋魚袋臣林億等校正

熱痢第七論一首 脉證二十四條 方二十六首 灸法十首

論曰余立身已來二遭熱痢一經冷痢皆日夜百餘行乃至移牀就厠其困篤如此但率意自治者尋手皆愈乃知此疾天下易治但中性之徒率情驕倨良藥苦口不能克已早餌朝遇暮過望其自差疾勢日增胃氣漸弱心力俱微食飲與藥皆不能進既不時愈便稱痢病難治斯皆自誤也學者須深達斯旨然此病隨宜服一物皆得差之惟須力意苦已服食以差為限則無不愈也又大須慎口味重者差後百日次者一月日所以常哀驕恣者不能自慎興言於此以為至慨矣古今痢方千萬首不可具載此中但撮其效者七八而已雖然弘之在人也何則陸瑾丸烏梅丸松皮散等暴痢服之

何有不差其温脾湯建脾丸方出下凡痢有四種謂冷熱疳蟲冷則白熱則赤疳則赤白相雜無冷則加以熱藥疳則以藥吹灌下部蟲毒則以蟲法治之藥既主對相當痢者復自勉勵服餌焉有不愈者也

凡服止痢藥初服皆劇愚人不解即止其藥不服此特不可但使藥與病源的相主對雖劇但服不過再三服漸漸自知惟非其主對者本勿服也

凡痢病通忌生冷酢滑猪雞魚油乳酪酥乾脯醬粉鹹所食諸食皆須夫熟爛爲佳亦不得傷飽此將息之大經也若將息失所聖人不救也

下利脉滑而數有宿食當下之

下利脉遲而滑者實也利爲未止急下之

下利脉反滑當有所去下乃愈

下利不欲食者有宿食當下之

下利而腹痛滿爲寒實當下之

下利腹中堅者當下之

下利而讝語者腹內有燥屎宜下之

下利三部皆平（一作浮）按其心下堅者急下之

下利差至其年月日時復發者此爲下不盡更下之愈

風寒下者不可下下之後心下堅痛脉遲（一作浮）此爲寒但當温之脉沈緊下之亦然脉大浮弦下之當已下利脉浮大此爲虛以強下之故也設脉浮革者因爾腸鳴當温之

下利脉遲緊爲痛未欲止當温之得冷者蒲而便腸垢

下利身軀疼痛急救裏諸温之屬可與理中肆逆附子湯熱

藥輩

下利大孔痛者當温暖之
下利腹脹滿身體疼痛者先温其裏乃攻其表
下利清穀不可攻其表汗出必脹滿
下利氣者當利其小便
下利脉反浮數尺中自濇其人必清膿血
下利脉數而渴者令自愈設不差必清膿血有熱故也
下利脉大者爲未止脉微弱數者爲欲自
下利脉沈弦者下重其脉大而緊者面戴陽下虛故也
止雖發熱不死
下利脉沈而遲其人面少赤身有微熱下利清穀必鬱冒汗
出而解病人必微厥所以然者面戴陽下虛故也
下利有微熱而渴脉弱者令自愈
下利脉數有微熱汗出令自愈設脉緊爲未解
下利脉反弦發熱身汗者自愈

下利脉大浮弦下當已
下利舌黃燥而不渴胷中實下不止者死
下利後脉絶手足厥冷晬時脉還手足温者生不還不温者死
下利手足厥冷無脉者灸之不温若脉不還反微喘者死少
陰負趺陽者爲順
凡六腑氣絶於外者手足寒上氣脚縮五藏氣絶於内者下
不自禁下甚者手足不仁也細尋取之萬不失一下病體略
例如此耳
素問曰春傷於風夏爲腨泄秋必
洞泄秋多下水也患是冷也夫積冷積熱及水穀實而下者
以大黃湯下之強人勿過兩劑皆消息五六日更進一劑其
補澀湯不效者三兩日可進一劑
陟釐丸治百病下痢及傷寒身熱頭痛目赤四肢煩疼不解

協熱下痢或腎已吐下之腹内虚煩欲得冷飲飲不能消腹
中急痛温食則吐乍熱乍冷狀如温瘧或小便不利氣滿嘔
逆下痢不止方

水中陟釐 五兩 漢中木防己 六兩 紫石英 三兩
厚朴 一兩 三歲醇苦酒 五升 龍蒭當歸 四兩 黄連 二兩
右八味皆取真新者以苦酒二升漬防己極令潤出之留
苦酒置以利刀切防己厚令一分使厚薄悉等以板瓦覆
著炭火上以厚紙藉瓦上布成切防己著紙上訖從頭依
次反周而復始令色褊燥復漬向餘苦酒中更出著瓦上
熬之如此盡苦酒止勿令火猛徐徐熬令極燥各擣下篩
畢都合擣千杵以餘二升苦酒漬豉一宿明旦以瓦盆盛
之以一盆覆之蒸五升土下須土氣通流熟出之於盆中
研豉以新布絞取其濃汁如棗膏法以和藥擣三千杵頓
丸皆如水中雞頭子大分著數囊中懸令陰乾取燥乃更
盛著亟以蠟密封其際勿令見風塵此藥以三丸
爲一劑平旦以井華水服一劑晝服一劑暮服一劑皆
以水服之初服寧少食當餔食水飡欲服藥若食飲消腹
中調和者日可一服若已差者二三日可一服消息以意
若病重藥力未行者但益服之日可四五劑或時下不止
者當復更增令腹中有藥力飲食消是其效也新服藥未
安調當水飡助藥力心中了然然後可作羹臛但當冷食
之耳若有時不喜冷食者正是藥力盡耳復益服藥至一
宿許則復欲進冷也若欲不復藥者但稍温食藥力自盡
矣服藥不必須強多飲水也自隨體調耳久下虚服之如
法禁熱食生魚猪肉蒜生菜酒緣酒發藥力令病者煩熱

也又禁辛物及諸肥膩難消物皆勿食也若有風病加防風一兩人虛羸可加石斛一兩若宿有下痢腸胃損弱者可加太一餘粮二兩半取石中黃軟香者若婦人產後疾加石硫黃二兩小便黃赤不利加蒲黃一兩依方消息之無不得效也胡洽云舊有五石赤石脂白石英鍾乳礬石并禹餘粮各四兩常以二月合之

下痢熱諸治不差方

烏梅卅　黃連一斤色者

右二味末之蜜和服如梧子二十丸日三夜二神妙

治積久三十年常下痢神方

赤松皮去上蒼皮切一斗爲散麵粥和一升服之日三差即止不過服一斗永差三十年痢服之百日差

治熱毒痢苦參橘皮丸方

苦參　橘皮　獨活　阿膠　藍青　黃連　甘草　右九味等分末之以蜜烊膠和併手丸之如梧子乾之飲服十丸日三稍加之卒下注痢者大良

治諸熱毒下黃汁赤如爛血滯如魚腦腹痛壯熱方

黃蘗　黃芩　白頭翁　寄生　升麻　石榴皮各六分　當歸　牡蠣　龍骨　當歸　甘草各二兩　黃連二兩　艾葉二分　犀角　右十二味咬咀以水六升煮取三升分三服

龍骨丸主下血痢腹痛方

龍骨　當歸　乾薑　黃連　礬石各二兩半　犀角　甘草　龍膽　附子　羚羊角各三十銖　赤石脂　熟艾各八十銖　鬼臼一作鬼箭羽　黃蘗

右十二味末之蜜和先食服如小豆十五丸日三加至二十九

又方

牛角鰓　當歸　龍骨　乾薑
熟艾 各三兩　附子　黃蘗　赤石脂
芎藭　阿膠　厚朴　甘草
獨皮　芍藥　石榴皮 各二兩　大棗 二十枚
黃連 五合　升麻 一兩半　蜀椒 一兩

右十九味㕮咀以水一斗三升煮取四升去滓內牛角鰓末阿膠消以綿絞去滓分七服日四夜三 千金翼無橘皮

治血痢方

蒲黃 三合　乾地黃　桑耳　甘草
芒消　茯苓　人參　柏葉

阿膠　艾葉 各二兩　赤石脂 五分　禹餘粱
黃連 各一兩　生薑 二兩

右十四味㕮咀以水一斗煮取四升分温五服神效

治下雜血方

乾薑　犀角　地榆 各二兩　蜜 二合

右四味㕮咀以水五升煮取一升半去滓下蜜煎取五合分三服此治熱毒蠱蛊

治熱毒下黑血五內絞切痛日夜百行氣絶欲死方

黃連 一升　龍骨　白朮 各二兩　阿膠

乾薑　當歸　赤石脂 各三兩　附子 一兩

右八味㕮咀以水一斗煮取五升分五服余以正觀三年七月十二日忽得此熱毒痢至十五日命將欲絶處此方藥入口即定

治下血日夜七八十行方

黃連　黃蘗 各四兩

右二味㕮咀淳酢五升煮取一升半分再服

白頭翁湯治赤滯下血連月不差方

白頭翁　厚朴　阿膠　黃連

秦皮　附子　黃蘗　茯苓

芍藥 各二兩　乾薑　當歸　赤石脂

甘草　龍骨 各三兩　大棗 三十枚　粳米 一升

右十六味㕮咀以水一斗二升先煮米令熟出米內藥煮取三升分四服

治下赤連年方

地榆　鼠尾草 各一兩

右二味㕮咀以水二升煮取一升分二服如不止取屋塵水漬去滓一升分二服古今錄驗方云服屋塵汁一小盃

又方

鼠尾草　蔊　秦皮 如無用槲皮代之　薔薇根

右三味等分㕮咀以水淹煎去滓銅器重釜煎成丸如梧子服五六丸日三稍增差止亦可濃汁服半升

治大熱毒純血瘌不可差者方

黃連陸兩㕮咀以水七升煮取二升半夜露著星月下旦起空腹頓服之卧將息即止不差加黃芩二兩更作服之仍不差者以疳瘌法治之

治下久赤白連年不止及霍亂脾胃冷實不消溫脾湯方

大黃 四兩　附子 一大枚者　人參　甘草　乾薑 各二兩

右五味㕮咀以水八升煮取二升半分三服臨熟下大黃與

後溫脾湯小異須大轉瀉者當用此方神效

治熱痢水穀方

黃連　阿膠各二兩　烏梅四十枚　黃檗一兩
梔子三十枚

右五味㕮咀以水五升煮取二升半分三服亦治黑神良

治下痢絞痛腸滑不可差方

黃連六兩　阿膠　犀尾草　當歸
乾薑各三兩

右五味㕮咀若大冷白多以清酒一斗煮取三升分三服若熱及不痛者去乾薑當歸以水煮之

黃連湯治赤白痢方

黃連　黃檗　乾薑　石榴皮
阿膠各三兩　當歸二兩　甘草一兩

右七味㕮咀以水七升煮取三升分三服

茯苓湯治因下空竭欲死滯下膿血日數拾行羸篤垂死老少並宜服方

茯苓　黃蘗　黃連　龍骨
人參　乾薑　黃芩　桂心
芍藥　當歸　梔子大　甘草炙
赤石脂一兩　大棗十二枚

右十四味㕮咀以水五升煮取二升分再服不差滿三劑

此方主風虛冷痢最佳

女萎丸治熱病時氣下赤白痢遂成黑方

女萎三分　烏頭　桂心各四分　黃連
雲實各二分　藜蘆三分　代赭一分

右七味末之蜜和爲丸如梧子大服二九大下痢宿勿食

清旦以冷水服之勿飲食至日中過後乃飲食若得藥力
明旦更服如前亦可長服虛羸晝夜百行膿血亦差亦名聖湯方
治赤白下痢大孔蟲生悉皆差此名聖湯方
右五味㕮咀以水七升煮取二升半分三服一本單用桃
皮以酒煮服之
治赤白滯下方
成煎猪膏三合 清酒五合
右二味緩火煎十沸適寒温頓服之取差止
又方 酒四升煮錢四十文取二升分三服
又方 亂髮雞子大燒末水服不過三服
治冷熱不調或水或膿或五色血者方
酢石榴五枚合殼子擣絞取二升汁服五合差止

泄痢食不消不作肌膚灸脾輸隨年壯
泄注五痢便膿血重下腹痛灸下腰百壯三報穴在八髎正中央脊
骨上灸多益善也三宗骨是忌針
泄痢久下失氣勞冷灸丹田百壯三報穴在臍下二寸針入
五分
泄痢不嗜食食不消灸長谷五十壯三報穴在俠臍相去五
寸一名循際
泄痢赤白漏灸足大陰五十壯三報
久泄痢百治不差灸足陽明下一寸高骨之上陷中去大指
歧三寸隨年壯
又屈竹量正當兩膀脊上點訖下量一寸點兩傍各一寸復
下量一寸當脊上合三處一灸三十壯灸百壯以上一切痢

皆斷亦治濕鹽冷脊上當膊點處不灸

又灸臍中稍稍三三百壯

又灸關元三百壯十日灸并治冷痢腹痛在臍下三寸也

赤白下灸窮骨惟多為佳

冷痢第八論一首方三十二首

論曰舊治痢於貴勝用建脾丸多效今治積久冷痢先以温脾湯下訖後以建脾丸補之未有不效者貧家難以克辦亦無可將息也

温脾湯治積久冷熱赤白痢者方

大黃　桂心各三兩　附子　乾薑　人參各一兩

右五味㕮咀以水七升煮取二升半分三服與前温脾湯小異

建脾丸治虛勞羸瘦身體重脾胃冷飲食不消雷鳴腹脹泄痢不止方

鍾乳粉三兩　赤石脂　好麴　大麥蘗

當歸　黃連　人參　細辛

龍骨　乾薑　茯苓　石斛

桂心各二兩　附子一兩　蜀椒六兩

右十五味末之白蜜丸如梧子酒服十九日三加至三十丸弱者飲服此方通治男女集驗無細辛龍骨

增損建脾丸治丈夫虛勞五藏六腑傷敗受冷初作滯下久變五色赤黑如爛腸極臭臟者方

鍾乳粉　赤石脂各三兩　礬石一方用礬石　乾薑

薤蓉　桂心　石斛　五味子

澤瀉　遠志　寄生　柏子人

人參　白頭翁　當歸

石榴皮　牡蠣　龍骨　甘草各二兩

右三十味末之蜜丸酒服二十九日三加至四十九此二方止痢神驗

駐車丸治大冷洞痢腸滑下赤白如魚腦日夜無節度腹痛不可堪忍者方

黃連六兩　乾薑二兩　當歸二兩　阿膠各三兩

右四味末之以大酢八合烊膠和之併手丸如大豆許乾之大人飲服三十丸小兒百日以還三丸暮年者五丸餘以意加減日三服

大桃花湯治冷白滯痢腹痛方

赤石脂　乾薑　當歸各三兩　龍骨　附子二兩　白朮一外　甘草　芍藥各一兩　人參一兩半

右十味㕮咀以水一升二外煮朮取九外內諸藥煮取二外分三服膿者加厚朴三兩嘔者加橘皮三兩

又方

龍骨六兩　厚朴　當歸各二兩　赤石脂五兩

右四味㕮咀以水七外煮取二外半分三服熱加白頭翁二兩半牡蠣三兩

桃花丸治下冷臍下攪痛方

赤石脂　乾薑各十銖

右二味蜜丸如豌豆服十九日三服加至三十九

倉米湯治小腹冷氣積聚結成冷痢日夜三四十行方

倉糠米半外淨淘乾漉　香豉三外以水一斗煎取五外澄清　雞白一握去青切細　羊脂一斤熬外

右四味先以羊脂煎雞白令黃并米內豉汁中煎取四外旦空腹溫服一外如行十里更進一外得快利止若利不

止更服如前利後進粳米豉粥若復作更服一劑永差
附子湯治暴下積日不佳及久痢方

龍骨　甘草　芍藥　乾薑
黃連 酪一　石榴皮 一具大者　阿膠 二兩　附子 二枚
黃芩 半兩　粳米 三合

右十味㕮咀以水八升煮取三升分三服
治卒下痢湯方

黃連 五兩　生薑 一斤

右二味㕮咀以水五升煮取一升頓服未止更合服必定
治久冷痢下純白者此由積卧冷處經久病發遂令脾胃俱
冷日夜五六十行大小腹痛不可忍凡白痢屬冷赤痢屬熱
好麴米五升微熬令香粥清淳酒令熱和麴末一升
空腹頓服之日三服若至食時擣蒜一升令至熟下
薑椒末調和如常食之法惟須稠勿加鹽以水和麴
二升作餦餭餅極爛者熬之乾漉熱內蒜韲臼中相和一
頓食之少與餘食至飢時仍進前食麴末酒比至差
來少食餘食以此法治不過兩日無有不差
治久冷或痢不痢但患腰腹苦冷方

上新蜀椒三升醋宿漬之以麴三升和椒一升緊拌
煮作粥空腹頓服之加葱豉鹽任性調和不差更作
以差為限不過三升椒即愈此不但治冷大治諸虛
損冷極有所益久當自知耳
馬蘭子丸治積冷痢下白膿方

馬蘭子 一升熟熬之　附子 二兩
神麴　麥蘗
蜀椒 五合　乾薑　甘草 各二兩半
阿膠 各五兩　黃連 三兩

右九味末之蜜丸如梧子服二十九日二以知爲度酒調
散服方寸匕亦佳

治三十年痢不止厚朴湯方

厚朴　乾薑　阿膠各三兩　石榴皮　艾葉各三兩　黃連五兩

右六味㕮咀以水七升煮取二升分再服

四續丸治三十年注痢骨立痿黃腸滑不差方一名蠟煎丸

雲實五合令香熬　龍骨三兩　附子　女萎各三兩　白朮二兩半

右五味末之以蠟煎煉以丸藥如梧子大服五丸日三不
過五六服差

椒艾丸治三十年下痢所食之物皆不消化或青或黃四肢
沈重起即眩倒骨肉消盡兩足逆冷腹中熱苦筋轉起須
扶陰冷無子方

蜀椒三百粒　熟艾一升　乾薑三兩　赤石脂二兩　烏梅一百
右五味椒薑艾下篩梅煮一斗米下蒸令飯熟去核內薑
椒末合擣三千杵蜜和丸如梧子服十九日三服不差至
二十九加黃連一升

下痢丸治數十年痢下氣消穀令人能食夏月長將服之不
霍亂方

法麴一升　附子　乾薑　黃連　黃蘗　桂心各三兩　蜀椒半兩　大麥蘗一升　吳茱萸四兩　烏梅二十枚

右十味末之蜜和食後服如梧子十九日三加至三十九
三食三服亦可至四十九

麴蘗丸治數十年下痢不止消穀下氣補虛羸方

好麴　大麥蘗各一升　附子　當歸

桂心 酪三兩 蜀椒一兩 黃連 吳茱萸 各四兩

烏梅肉 乾薑各四兩

右十味末之蜜丸如梧子食已服二十九日三服

烏梅丸治久痢諸藥不差數十年者消穀下氣補虛方

烏梅肉四兩 當歸 乾薑各四兩 蜀椒一兩半 桂心二兩 黃連三兩

吳茱萸 乾薑各四兩

右七味末之蜜丸如梧子食後服十九日三

治下痢腸滑飲食及服藥俱完出猪肝丸方

猪肝一斤熬令乾 黃連 烏梅肉 阿膠酪各二兩 胡粉七豉子

右五味末之蜜丸如梧子酒服二十九日三亦可散服方寸匕

烏梅丸治冷痢久下方

烏梅三百枚 乾薑 黃連 黃連酪各十兩 當歸

蜀椒各四兩 細辛

黃蘗一方用麥蘗 人參各六兩 附子 桂心

右十味末之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸五升米下別擣如涅盤中攪令相得蜜和擣二千杵食前服如梧子十九日三服稍增至二十九七味散治痢下久不差神驗方

黃連八分 龍骨

烏梅肉二分 甘草一分

右治下篩漿水服二方寸匕日二小兒一錢匕

羊脂煎大治諸久痢不差方

亂髮灰汁洗去垢燒末 黃連未各一升 烏梅肉二兩 酢七合煎取猶

白蠟一兩碁子 羊脂一升碁子 蜜七合煎取五合

右七味合內銅器中湯上煎之攪可丸飲服如梧子大三

十九日三棊子大小如方寸匕

又方

黍米 二升 蠐螬 羊脂 阿膠 各二兩

右四味合煮作粥一服令盡即差

治大下後腹中空竭胃中虛滿不下食方

芍藥 甘草 當歸 各三兩 生薑 五兩 半夏 各一兩 厚朴 桂心 三兩

右七味㕮咀以水八升煮取三升分三服服二劑最佳

治下痢心脅滿不快腹中雷鳴或嘔吐方

黃連 五兩 橘皮 甘草 各二兩 龍骨 三兩 生薑 半夏 各三兩

大棗 十五枚 人參 一兩

右八味㕮咀以水一斗先煮水一大沸乃內藥煮取三升分四服并姙身良

斷痢湯治胃心下伏水方

半夏 一升 生薑 五兩 茯苓 甘草 各三兩 龍骨 各二兩 附子 一兩 人參

大棗 十二枚

右九味㕮咀以水八升煮取三升分三服

治下後煩氣暴上香蘇湯方

香豉 五兩 生蘇 一把 蘇子 三兩 冬用 人參 黃連 各三兩

大棗 十二枚

右三味以水五升煮取二升頓服之

治卒大下痢熱脣乾口燥嘔逆引飲瀉心湯方

人參 甘草 黃芩 橘皮 括樓根 各二兩 黃連 三兩 半夏 三兩 乾薑 一兩半

右八味㕮咀以水六升煮取二升分三服胡洽云治老小利水穀不化腹中雷鳴心下痞滿干嘔不安無橘皮括樓若寒加附子一枚渴加括樓一兩嘔加橘皮一兩痛加當歸一兩仲景用

治夏月暴冷忽則壯熱泄痢引飲熱湯下斷變通身浮腫成冷下結脉沈細小數方

澤漆一兩半　吳茱萸　茯苓　白朮
桔梗　當歸　犀角　青木香
海藻　芍藥　大黃各二兩
右十一味㕮咀以水九升煮取三升分三服下後消息五六日許可與女麴散

女麴散治利後虛腫水腫者服此藥小便利得止腫亦消方

女麴一升　乾薑　細辛
附子　桂心各一兩　撤目
右六味治下篩酒服方寸匕不知加至三三匕日三產後虛滿者大良

治卒暴冷下下部疫悶方

燒埻令熱大酢沃之三重布覆坐上即差

疳濕痢第九　論三首　方十首

論曰凡疳濕之病皆由暑月多食肥濃油膩取冷眠睡之所得也禮云君子盛暑之月薄滋味無食肥濃煮餅此時以不利人也養生者宜深戒之不爾多患疳濕耳

凡所患處或着口齗咽喉下部疳與月蝕並不痛令人不覺其治用五月五日蝦蟇角葛高救月木寒食泔淀但得一事單用之燒作灰和臘月猪脂傅之逐手便差極須慎口味耳

凡疳在慎鹽醬醋酥油棗等一切皆忌惟白飯豉苜蓿菩薩菁不在禁限

凡吹藥入下部沒中指許深即止

治疳濕下黑腥醬不能治垂死者方

髑髏灰　熏黃　朱砂　青黛
石鹽　丁香　麝香　礬石
梔子　莨菪子　鐵衣　乾薑
故鞋底灰　乾蝦蟇五月五日者　細辛　土瓜根
芥子　蜀椒　蒲萄　昌蒲各等分
右二十味治下篩以竹筒吹杏人大著大孔中所有患疳瘡上悉傳之其丁香麝香別研搗著藥中合之一方有寒食汨淀救月木楸葉爲三十三味若病大者用灌方如左

麝香　丁香　甘草　犀角各三分
右四味治下篩合和以鹽三合蜀椒三合豉二合以水二升煮取一升去滓內四味散合和分作二分灌大孔旦一灌酉一灌之凡久下一月不差成疳候大孔必寬者是以此主之

凡下血者是蟲也以八物詰其根湯主之在蟲方中治疳濕久下痢赤白百療不差者方

兔頭骨　蛇頭　薪葺子　故緋灰並
萇蘼子　狸骨一作狐骨　蜣蜋　百草五月五日收
倒掛草　牀中桃木　晚蠶蛾
青礬　丁香　蠍蟲屎　麝香
苦參　黃蘗　乾薑　角蒿
朱砂　印成鹽　救月木　桂心
鐵衣　芸消　蝦蟇　黃礬
荏子各等分
右二十九味治下篩以筒子內下部吹著日三度神方治疳濕不能食身重忽熱脚冷百節疼痛方
黃芩　苦參　甘草
芍藥

當歸　蜀椒　甘松一作甘淀　青黛
熏黃　豉各三兩　薤白握一枚　東引桃根握一
鹽一合　麝香半兩　猪膽二枚

右十五味㕮咀以水一斗八升煮取四升分爲二分一度灌一分湯如人體然後著麝香猪膽一枚即灌灌了作葱豉粥食之後日更將一分如前灌之七日忌生冷毒物等但是油膩醬乳酪三十日已忌之大佳

治疳蝕人諸處但是赤血痢久不差立著即差秘之方

五月五日蝦蟇一枚作炙末　金銀土堝　人屎灰各五兩作髮灰
麝香一分　銀末少許豆

右五味治下篩傳瘡上即差三七日忌如前痢者吹下部

治疳痢不止方

苦參　甘草　熏黃各三兩　豉一升半

右六味以苦參等三物各擣下篩以水五升煮葱白豉取三升以三指撮苦參末等各一撮內汁中冷暖如人體先飲少許豉汁食一口飯乃側卧徐徐灌之訖多時卧不出爲佳大急乃出之於淨地當有疳濕蟲如白馬尾狀頭黑是其效也其重者肛大難差當取桃枝綿裹頭用前件汁適寒温烙之近脊烙之一上三十度烙乃差神驗

又方崔氏云晉代之地多五疳蝕人五藏通見脊骨下體膿血手足煩疼四肢無力夜卧煩躁不安面失血色肩髃疼面及手足有浮氣或下血乃死治之方

雄黃　青葙各三兩　苦參三兩　礬石

雌黃　鐵衣　藜蘆各二兩　麝香二分別研

右八味治下篩以竹管內大孔中酸棗許吹內下部中日一不過三小兒以大豆許此方極救死

又方

大麻子　胡麻 各半一升

右二味並熬令黃以三升瓦瓶泥表上厚一寸待泥乾內大麻等令滿以四五枚葦管插口中密泥之掘地作竈倒立竈口底著瓦器承之密填竈孔中地平聚炭瓶四面著擊壘之日沒放火燒之至明旦開取適寒溫灌疳濕者下部中一合尋覺咽中有藥氣者為佳亦不得過多多則傷人隔日一灌之重者再三灌之旦起灌至日夕極覺體中乏力勿怪也非但治疳濕凡百異同瘡疥癬並洗塗之

論曰凡日月蝕時忌食飲腹中生蠱蟲及房室生子不具足必患月蝕瘡亦不得與兒乳日月生後乃不忌令人口臭齒斷宣露常有血出舌上生瘡者皆由犯此所致耳日月蝕時須救不救出行逢暴雨其救月杖須收取治蠱之神藥預備患此者施之救療

治月蝕惡瘡息肉方

硫黃　藺茹　斑貓 各等分

右三味治下篩傳瘡上乾者以猪脂和傳之日三夜一

又方

吳茱萸根　薔薇根　地榆根 各三兩

右三味治下篩以塩湯洗瘡傳之日三

小兒痢第十七方　首二十

溫中湯治小兒夏月積冷洗浴過度及乳母亦將冷洗浴以冷乳飲兒兒壯熱忽值暴雨涼加之兒下如水胃虛弱則面青肉冷眼陷乾嘔者宜先與此調其胃氣下即止方

乾薑　厚朴 各一分　當歸　桂心

甘草 各三分　人參　茯苓　白朮

桔梗 各三分

右九味㕮咀以水二升煮取九合六十日至百日見一服二合半餘皆隨兒大小

溫中大黃湯治小兒暴冷水穀下或乳冷下青結不消或冷實吐下乾嘔煩悶及冷滯赤白下者良若已服諸利湯去實胃中虛冷下如水乾嘔眼陷煩擾不宜利者可除大黃若中乳乳母洗浴水氣未消飲兒爲霍亂霍亂宜利者便用大黃不須利宜溫和者則除之方

乾薑　桂心　厚朴　甘草 各一分

當歸　人參　茯苓　白朮 各三分

大黃 六分　桔梗 二分

右十味㕮咀以水二升半煮取八合凡兒三十日至六十日一服二合半二百日已來

黃蘗湯治小兒夏月傷暑寒寒折大熱熱入胃下赤白滯如魚腦壯熱頭痛身熱手足煩此太陽之氣外傷寒使熱氣便入胃也服此方良若悞以利藥下之或以溫脾湯下之則熱痢以利藥下之便數去赤汁如爛肉者或下之不差後以澀熱藥斷之下既不止倍增壯熱者服之即效或是溫病熱盛復遇暴寒折之熱入腹中下血如魚腦者服之良方

黃蘗　黃連　白頭翁 一作白斂　升麻

當歸　石榴皮　黃芩

寄生　甘草 各二分　犀角　艾葉 各一分

右十二味㕮咀以水三升煮取一升二合百日兒至三百日一服三合二百餘日至朞歲一服二合半

治中結陽九斷泠滯下赤白青色如魚腦脫肛出積日腹痛
經時不斷者方

赤石脂五分　吳茱萸三分　乾薑　附子

當歸　厚朴　白朮　木蘭皮

白頭翁　黃連　黃蘗　石榴皮各一分

右十二味末之蜜丸如大豆三歲兒服五丸三歲已上服
十丸十歲已上二十丸暴下者服少許便差積下者盡一
劑更合之

治少小熱痢不止梔子丸方

梔子七枚　黃蘗三分　黃連五分　礬石四分　大棗四枚炙令黑

右五味末之蜜丸如小豆大服五丸日三夜二服不知稍
加至十九

治少小泄清痢薤蘆丸方

藜蘆二分　黃連二分　附子分

右三味末之蜜丸如麻子大以粥飲服二丸立驗

治少小泄注四物粱米湯方

粱米　稻米　黍米各三升　蝎如彈九大

右四味以水五升東向竈者煮粱米三沸去滓復以汁煮稻
米三沸去滓復以汁煮黍米三沸去滓以蝎內汁中和之
蝎消取以飲之數試有效

治少小壯熱渴引飲下痢龍骨湯方

龍骨　大黃　赤石脂

甘草　寒水石　栝樓根各二兩

桂心　石膏

右八味治下篩以酒水各五合煮散二合二沸去滓量兒
大小服之

治少小下痢若熱不食傷飽不乳大黃湯方

大黃　甘草
右三味㕮咀以水二升煮取一升二三歲兒分三四服
生金牛黃湯主小兒積下不止因發癎方
生金（二銖一方用六銖無生金用熟金亦得法應作屑）　乾薑（一分）　細辛（半分）
黃連（一分）　甘草（一分）
右八味㕮咀以水一升六合煮取八合去滓臨服研牛黃以煮湯中嫌兒熱者用生薑薑（代乾薑令並之生金但用成器金亦善）三兩皆得用也
澤漆茱萸湯治小兒夏月暴寒寒冫胃則暴下如水四肢被寒所折則壯熱經日熱不除經月許日變通身虛滿腹痛其脉微細服此湯一劑得數後漸安神方
澤漆　海藻　茯苓　白朮
當歸（各五分）　大黃（一分）　桔梗　芍藥
右十味㕮咀以水四升煮取一升半二百日至一歲兒一服二合半一歲已上至二歲一服四合
治少小久痢淋瀝水穀不調形羸柔堪大湯藥者宜此枳實散方
枳實二兩治下篩三歲已上飲服方寸匕若兒小以意服日三
治少小洞注下痢方
葵藜子二升擣汁溫服以差為度
又方　木瓜取汁飲之
又方　炒倉米末飲服之
又方　酸石榴燒灰末服半錢匕日三服

又方　狗頭骨灰水和服之
又方
羊骨灰　鹿骨灰
右二味並水和服之隨得一事即用之
又方
炒豉令焦水淋汁服之神驗冷則酒淋服
又方　五月五日百草未吹下部
治小兒赤白滯下方
薤白一把　豉一升
右二味以水三升煮取二升分三服
又方
柏葉一升　麻子未一升
右二味以水五升煮取三沸百日兒每服三合

又方　擣石榴汁服之
又方
亂髮灰　鹿角灰等分
右二味三歲兒以水和服三錢匕日三
又方　牛角鰓灰水和服三方寸匕
又方　燒蜂房灰水和服之
治小兒赤白痢方
白蘘荷根汁　生地黃汁各五合
右二味微火上煎一沸服之
又方　單服生地黃汁一合
又方　五月五日蝦蟇灰飲服半錢匕
治小兒熱痢方
煮木瓜葉飲之

治小兒冷痢方

蓼菜擣汁量大小飲之一作芥菜

又方　擣蒜薄兩足下

治小兒暴痢方

小鯽魚一頭燒末服之亦治大人

又方　燒鯉魚骨末服之一方作龍骨

治小兒蟲毒痢方

又方　赤小豆末酒和塗足下曰三油和亦得

藍青汁一升二合分為四服

治小兒渴痢方

單擣冬瓜汁飲之

朝奉郎守尚藥奉御祕閣校理判登聞檢院上護軍賜緋魚袋臣林　億　等校正

胃腑脉論第一

胃虛實第二

喉嚨論第三

反胃第四　酢咽附

嘔吐噦逆第五　惡心附

噎塞第六　哽附

脹滿第七

痼冷積熱第八　寒疝　骨蒸附

胃腑脉論第一

論曰胃腑者主脾也口脣者是其候也脾合氣於胃胃者水穀之腑也號倉庫守內藏吏重二斤十四兩迁曲屈伸長二尺

六寸大一尺五寸徑五寸受水穀三斗五升其中當留穀二斗水一斗五升廣胸大頸張胸五穀乃容而滿上焦泄氣出其精微慓悍滑疾下焦下溝既泄諸小腸此腸胃所受水穀之數也平人則不然胃滿則腸虛腸滿則胃虛更滿更虛氣得上下五藏安定血脉和利精神乃居故神者水穀精氣也五藏不足調於胃故腸胃之中當留穀二斗四升水一斗一升一升故人一日再至後（仲圖云後二升半一日中五升七日五七三斗五升而留水穀盡故平人不飲不食七日而死者水穀精氣津液皆盡故七日而死矣

右手關上陽絶者無胃脉也苦腸中伏伏（一作幅幅）不思食得食不陰治陰在足大指本節後一寸

右手關上陽實者胃實也苦腸中伏伏不思食得食不能消刺足陽明治陽在足上動脉脉浮而乾浮則爲陽乾則爲熱其陽則絶

氣朝者屬胃

胃脉搏堅而長其色赤當病折髀其耎而散者當病食癉髀痛

病先發於胃脹滿五日之腎少腹腰脊痛脛痠三日之膀胱脊膂筋痛小便閉五日上之心脾心痛閉塞不通身痛體重（靈樞云上之心三日不已死冬夜半後夏日昳）

胃病者腹脹胃管當心而痛上支兩脇膈咽不通飲食不下下取三里

飲食不下膈塞不通邪在胃管在上管則抑而刺之在下管則散而去之

胃脹者腹滿胃管痛鼻聞焦臭妨於食大便難

胃癰令人旦病也善飢而不能食食而支滿腹大刺足陽明

太陰橫脉出血

胃中有癖食冷物者痛不能食食熱則能食脾前受病移於胃脾欬不已嘔吐長蟲

厥氣客於胃則夢飲食

診得胃脉實則脹虛則洩脾應肉胭肉胭肉胭堅大者胃厚肉胭麤者胃薄肉胭小而麤者胃不堅肉胭不稱其身者胃下胃下者脘約肉胭不堅者胃緩肉胭無小果累標緊者胃急肉胭多小果累累者胃結者胃上脘約不利扁鵲云足太陰與陽明為表裏脾胃若病實則傷熱熱則引水漿常渴虛則傷寒寒則苦飢常痛發於風水其根在胃先從四肢起腹滿大通身腫方在治水篇中

胃絶不治五日死何以知之舌腫溺血大便赤泄

足陽明之脉起於鼻交頞中旁約太陽之脉下循鼻外入上齒中還出挾口環脣下交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱其支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾其直者從缺盆下乳內廉下挾臍入氣街中其支者起胃下口循腹裏下至氣街中而合以下髀關抵伏兔下膝入臏中下循脛外廉下足跗入中指內間其支者下膝三寸而別以下入中指外間其支者跗上入大指間出其端是動則病悽悽振寒善伸數欠顏黑病至證人與火聞木音則惕然而驚心動欲獨閉戶牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走賁腸腹脹是為骭厥是主血所生病者狂瘧温淫汗出歟衄口喎脣緊頸腫喉痺大腹水腫膝臏腫痛循膺乳街股伏兔骭外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘於胃則消穀善飢溺色黃氣不足則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿盛者則人迎大三倍於寸

口虛者則人迎反小於寸口

胃實第二脉二條 方三首

胃實熱

右手關上脉陽實者足陽明經也病苦頭痛脉經作腹中痛而熱汗不出如溫瘧脣口乾善噦乳癰缺盆腋下腫痛名曰胃實熱也

瀉胃熱湯方

梔子人 豉干 升麻 茯苓各二兩 芍藥四兩 白朮五兩 生地黃汁 赤蜜各一升

右八味㕮咀以水七升者取一升半去滓下地黃汁煮兩沸次下蜜煮取三升分三服老小以意加減

胃中熱病灸三里三十壯穴在膝下三寸

胃虛冷

右手關上脉陽虛者足陽明經也病苦脛寒不得卧惡風寒瀝瀝自汗出口苦舌乾喘滿目眩髮落脉空虛名曰胃虛冷也

治少氣口苦身躰無澤補胃湯方

防風 栢子人 細辛 桂心 橘皮各二兩 芍藥 甘草一兩 人參各三兩

右九味㕮咀以水一斗煮取三升分為三服

補胃虛寒身枯絶諸骨節皆痛人參散方

人參 甘草 細辛各六兩 麥門冬 桂心 當歸各七分 乾薑二兩 遠志一兩 吳茱萸二分 蜀椒三分

右十味治下篩食後溫酒服方寸匕

論曰噎噦者脾胃之候也重十二兩長一尺二寸廣二寸其層圍十二重應十二時主通利水穀之道往來神氣若藏熱喉則腫塞氣不通烏髮膏主之方在第六卷中若腑寒噎則耿耿如物常欲窒癢痺涎唾熱則開之寒即通之不熱不寒依藏調之其方具第六卷中

反胃第四脉法三條方十六首

寸緊尺澀其人脅滿不能食而吐出者為下之故不能食設言未止者此為胃反之故尺為之微澁跌陽脉浮而澁浮即為虛澁即傷脾脾傷即不磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名為胃反跌陽脉緊亦澁其病難治

治胃虛反食下噎便吐方

人參一兩　澤瀉一兩　甘草一兩　桂心一兩　橘皮一兩　乾薑一兩　茯苓四兩　青竹茹五兩

大黃六兩

右九味㕮咀以水八升煮取三升一服七合日三夜一已利者去大黃

治反胃而渴方

茯苓一兩　澤瀉一兩　半夏四兩　桂心一兩　甘草三兩

右五味㕮咀以水五升煮取二升分三服一方入生薑四兩

治胃反吐逆不消食吐不止方

人參一兩　澤瀉一兩　桂心一兩　茯苓四兩

橘皮一兩　甘草一兩　黃耆三兩　大黃一兩半

生薑八兩　半夏一升　麥門冬一升

右十一味㕮咀以水一斗二升煮取三升二合一服八合

治胃反朝食暮吐食訖腹中刺痛此由久冷方

橘皮三兩　甘草厚朴　茯苓
桂心　細辛　杏人　竹皮各二兩
檳榔十枚　前胡八兩　生薑五兩　人參一兩

右十二味㕮咀以水一斗三升煮取三升分三服一方有廿皮二兩

又方

橘皮三兩　白朮　人參各二兩　蜀椒一百二十粒

桂心一兩　薤白一握

右六味㕮咀以水二升漬一宿內羊肚中縫合以三升水煮水盡出之浸破去滓分三服

治反胃大驗方

前胡　生薑各四兩

吳茱萸四合　桂心三寸

右九味㕮咀以水三升煮取一升七合分二服

阿膠一兩　大麻人五合　橘皮三兩

甘草五寸　大棗十枚

華佗治胃反胃反爲病朝食暮吐心下堅如杯升往來寒熱嘔逆不下食此爲關上寒澼所作將成肺痿治之方

眞珠　雄黃

朴消五兩　乾薑一兩半

右五味末之蜜丸先食服如梧子三丸若小煩者飲水即解然無所忌神良無比一方用桂心一兩

治胃反食即吐方

擣粟米作麪水和作丸如梧子大七枚爛煮內醋中細細呑之得下便已麪亦得用之

治胃反不受食食已即嘔吐大半夏湯方

半夏三兩　人參二兩　白朮一兩　生薑三兩

右五味㕮咀以水五升和蜜揚之二三百下煮取一升半

分三服

治胃反食即吐出上氣方

右二味以水四升煮取二升頓服之得下良

茹根 各二兩 細切

蘆根

又方 燒先死雞脏腸令熟煮取二升頓服之得下良

又方 飲白馬尿即止

又方 淘小芥子暴乾為末酒服方寸匕日三

反胃食即吐出上氣多飲乳下各一寸以差為度

又灸臍上一寸二十壯

又灸內踝下三指稍邪向前有穴三壯 外臺秘要三指作一指

治酢咽方

麴末一斤 地黃三斤

右二味合擣日乾以酒服三方寸匕日三服

治噫酢咽方

吳茱萸半斤 生薑三兩 人參二兩 大棗十二枚

右四味�once以水六升煮取二升先食服一升曰再治食後吐酸水治中散方

乾薑 食茱萸 各二兩

右二味治下篩酒服方寸匕日二胃冷服之立驗

嘔吐噦逆第五脉一條 論一首方二十七首灸法十五首

夫吐家脉來形狀如新卧起陽緊陰數其人食已即吐陽浮而數亦為吐寸口脉緊而乾緊即為寒乾即為虛寒虛相搏脉為陰結而遲其人即噦關上數其人則吐趺陽脉微而澁微即下利澁即吐逆穀不得入趺陽脉浮者胃氣虛寒氣在上憂氣在下二氣並爭但出不入其人即嘔而不得食恐怖如死寬緩即差嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥難治

論曰凡服湯嘔逆不入腹者先以甘草三兩水三升煮取二
升服之得吐但服之不吐益佳消息定然後服餘湯即流利
更不吐也凡嘔者多食生薑此是嘔室聖藥
半夏湯主逆氣心中煩悶氣滿嘔吐氣上方
半夏一升 生薑一斤
右四味㕮咀以水八升煮取二升半分三服若少氣加甘
草二兩一名小茯苓湯
前胡湯主寒熱嘔逆少氣心下結聚髣髴滿不得食寒熱消
渴補不足方
前胡 生薑各二兩 甘草 朴消各三兩
大黃別浸各二兩 茯苓 麥門冬 當歸
半夏 芍藥 滑石 石膏
栝樓根 黃芩 附子 人參各一兩

右十六味㕮咀以水一斗二升煮取六升分四服
治嘔吐四肢痺冷上氣腹熱三焦不調方
前胡 芎藭 甘草 當歸
石膏 人參 桂心 橘皮各二兩
芍藥三兩 半夏四兩 生薑五兩 大棗三十枚
右十二味㕮咀以水一斗三升煮取三升下黃芩三兩合煮取三升去滓分三服
分三服一方不用黃芩
治嘔吐不止小麥湯方
小麥一升 人參 厚朴各四兩 甘草一兩
生薑汁三合 青竹節三兩半 茯苓三兩
右七味㕮咀以水八升煮取三升去滓分三服
治嘔而膈上寒豬苓散方
豬苓 茯苓 白朮各三兩

右三味治下篩以飲服方寸匕日三渴者多飲水

治嘔逆胃氣虛邪風熱不下食犀角人參飲子方

犀角　人參各三兩　蘆白五兩　粟米一合

右四味㕮咀以水四升半煮取一升七合下米煮令米熟分四服相去七里久進一服

治春夏時行傷寒寒傷於胃胃冷變嘔方

白茅根一升　橘皮　桂心　葛根各二兩

右四味㕮咀以水六升煮取三升分三服數進服尽更合有熱去桂

治諸嘔噦心下堅痞胸間有水痰眩悸者小半夏加茯苓湯方出第十八卷中

治嘔噦方

人參一兩　胡麻人分　橘皮一分　枇杷葉八兩

右四味㕮咀以水一斗煮枇杷葉取五升下藥煮取三升內麻人稍飲之

治氣厥嘔噦不得息方

豉一升　半夏兩　生薑二兩　人參

前胡　桂心　甘草各一兩

右七味㕮咀以水九升煮取三升分三服

又方

大棗十五枚　橘皮二兩　生薑二兩　人參

生薑　甘草各一兩　豉升　附子一枚

右六味㕮咀以水九升煎取二升分三服日三

治嘔噦方

蘆根切三升以水一斗煮取四升分四服

治卒嘔噦厥逆方

飲新汲冷水三升佳

治乾嘔噦若手足厥冷者橘皮湯方

橘皮四兩　生薑一斤

右二味以水七升煮取三升分三服不止更合服之

治傷寒後噦乾嘔不下食方

生蘆根切一升　青竹筎一升　粳米三合　生薑一兩

右四味以水五升煮取二升分三服不止服三劑

又方

通草　橘皮各二兩　生蘆根切一升　粳米三合

右四味以水四升煮取一升半分三服

治乾嘔吐逆涎沫出者方

半夏　乾薑各等分

右二味以漿水一升半煮取七合頓服之日三

治病人乾嘔方

取羊乳汁飲一杯

治乾嘔方

酒浸馬屎一宿取汁服之

乾嘔不止粥食湯藥皆吐不停灸手間使三十壯若四厥脉沈絶不至者灸之便通此起死人法

乾嘔灸心主尺澤亦佳

又灸乳下一寸三十壯

治噦方

煮豉三升飲汁佳

又方　空腹飲薑汁一升

又方　濃煮蘆根汁飲之

噦灸承漿七壯灶灶如麥大

又灸臍下四指七壯

治惡心方

苦瓠穰并子一升碎以酒水三升煮取一升頓服須臾吐并下如蝦蟆衣三升

又方　服小便百日佳

又方

麻子一升熬令香熟擣取酒三升熟研濾取一升飲盡日三服盡一石差一切病自能食飲不能酒任性多少

治食已吐其食方

大黃四兩　甘草二兩

右二味咬咀以水三升煮取一升半分再服

治食飲輒吐方

頓服生熟湯三升即止

吐逆嘔不得食灸心輸百壯

吐嘔逆不得下食今日食明日吐者灸膈輸百壯

吐變不得下食灸肓堂百壯

吐逆不得食灸巨闕五十壯

吐逆食不住灸胃管百壯三報

吐逆飲食却出灸脾募百壯三報（章門穴也）

吐嘔宿汁吞酸灸神光一名膽募百壯三報（甲乙經云日月膽募也在期門下五分）

吐逆霍亂吐血灸手心主五十壯

噫噦膈中氣閉塞灸腋下聚毛下附肋宛宛中五十壯

噦噫嘔逆灸石關百壯

噎塞第六論一首方二十八首

五噎丸主胷中久寒嘔逆逆氣食飲不下結氣不消方古今録驗

乾薑　蜀椒
人參各五分　細辛
附子各四分　橘皮六分

右十味末之蜜和丸如梧子大以酒服三丸日三服不知稍加至十丸

五噎丸主五種之氣皆令人噎方

人參　半夏
小草　附子
紫菀　乾薑

桂心　防風一作葵
細辛　甘草各三兩
食茱萸　芍藥

云五噎者氣噎憂噎勞噎食噎憶噎不徹胷脇苦痛憂噎者天陰苦厥逆心下悸動手足逆冷勞噎者苦氣膈脇下支滿胷中苦塞令手足逆冷不能自温食噎者食無多少惟胷中苦痛不得喘息思噎者心悸喜忘目視瞋瞋此皆憂恚寒氣上入胷脇所致也

烏頭各六分　枳實一兩
竹皮一方用竹葉　細辛各二兩
通草　人參
桂心　五味子各一兩
茯苓　甘草
麻黃　生薑

右十四味末之蜜丸以酒服如梧子五丸日三不知加至十五丸烏頭半夏相反但去一味合之

竹皮湯治噎聲不出方

右十味㕮咀以水一斗煮竹皮減二升去竹皮下藥煮取三升分三服

乾薑湯主飲食輒噎方

乾薑　石膏各四兩
人參　桂心各二兩
小麥一升　甘草一兩
赤小豆三十粒　吳茱萸二升

右十味㕮咀以酒五升水一斗煮棗二十枚去滓合煮取三升分三服（集驗名半夏湯）

通氣湯主胸滿氣噎方

半夏（八兩）　生薑（六兩）　桂心（三兩）　大棗（三十枚）

右四味㕮咀以水八升煮取三升分五服日三夜二服

羚羊角湯治氣噎不通不得食方

羚羊角　通草　乾薑　吳茱萸（各三兩）　烏頭（五枚）　橘皮（各二兩）　厚朴（三兩）

右七味㕮咀以水九升煮取三升分三服日三

又方

杏人　桂心　酪（三合）

右三味末之蜜丸如棗大稍稍咽之臨食先含彌佳

治卒噎方

滿口著蜜食之即下

又方　捻取飯盆邊零飯一粒食之即下

又方　刮舂杵頭細糠含之即下神驗

治諸噎方

常食乾糗米飯即不噎

又方　末火炭蜜丸如彈子大含少少咽即下

又方　老牛涎棗核大水中飲之終身不復噎

論曰凡療病者皆以其類至如治哽之法豈宜以麤鵝翅骨哽狸虎治魚哽耶至於竹篾雞白爵筋綿蜜等事乃可通爲諸哽用耳

治諸哽方

取鹿筋漬之令濡含而縈之大如彈丸以線繫之持筋端吞之入喉推至哽處徐徐引之哽著筋出

又方
作竹篾刮令滑綿裹內咽中令至哽處可進退引之哽即隨出
又方
用綿二兩以蜜煎使熱的的爾從外薄哽所在處灼瓠以熨綿上若故未出復煮一段綿以代前并以皂莢屑少少吹鼻中使得嚏哽出酌日後方云治哽者不出矣
又方
煮薤白令半熟小嚼之以線繫薤中央捉線吞薤下喉至哽處牽引哽即出矣
治哽咽方
以虎骨末若狸骨服方寸匕
又方 瞿麥末服方寸匕

治魚骨哽方
鸕鷀屎服方寸匕
又方 口稱鸕鷀鸕鷀則下
又方 服橘皮湯
又方 服沙糖水
又方 燒魚網灰服方寸匕 必效方云取魚網覆頭立下
治骨鯁在喉衆治不出方
取粘糖丸如雞子黃吞之不去更吞漸大作丸可至十九止
又方 燒虎狼屎服之
又方 吞猪膏如雞子不差更吞差止
治食中吞髮咽不去繞喉方
取亂髮燒末酒服一錢匕

治吞錢方

艾蒿五兩以水五升煮取一升頓服之即下

又方　末火炭酒服方寸匕水服亦得

又方　服蜜三升即出

治吞金銀鐶及釵方

白糖二斤一頓漸漸食之多食益佳也

又方　吞水銀一兩再服之鵝羽亦得

悞吞鐶及指彊方

燒鴈毛二七枚末服之

悞吞釵方

暴韭令萎蒸熟勿切食一束即出或生麥葉筋縷如韭法皆可用但力意多食自消

悞吞銅鐵而哽者方

燒銅弩牙令赤內酒中飲之立愈

悞吞釘針及筯箭鏃等方

但多食脂肥肉令飽自裹出

治悞吞針方

取懸針磁石末飲服方寸匕即下　古今錄驗云今吞針在喉中而服磁石末入腹若合磁石口中或吸針出耳

脹滿第七　論一首　灸法十一首　方八首

論曰病者腹滿按之不痛者為虛按之痛者為實也夫腹中滿不減減不驚人此當下之舌黃未下者下之黃自去腹滿時減復如故此為寒當得溫藥腹滿口中苦乾燥腹間有水是飲跗陽脉微弦法當腹滿不滿者必下部閉塞大便難兩胠下疼痛此虛寒氣從下向上當以溫藥服之取差腹滿轉痛來趣少腹為欲自下利也　一云腹中痛若轉氣下趣少腹為欲自利

温胃湯主胃氣不平時脹欬不能食方

附子　厚朴　人參　橘皮
芍藥　甘草　當歸
右九味㕮咀以水九升煮取三升分三服

大半夏湯主胃中虛冷腹滿塞下氣方

半夏外一　大棗二十枚　甘草　當歸
人參　厚朴各二兩　附子　桂心
枳實各二兩　蜀椒二百粒　生薑八兩　茯苓
右十二味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

附子粳米湯主腹中寒氣脹滿腸鳴切痛胷脅逆滿嘔吐方

附子一枚　半夏　粳米各半外　甘草一兩　大棗十枚
右五味㕮咀以水八升煮米熟去滓一服一升日三集驗加乾薑三兩

厚朴七物湯治腹滿氣脹方仲景云治腹滿發熱數十日脉浮數飲食如故者

厚朴半斤　甘草　大黃各三兩　大棗十枚
枳實五枚　桂心二兩　生薑五兩
右㕮咀以水一斗二升煮取五升去滓內大黃煮取四升服八合日三嘔噦者加半夏五合利者去大黃寒多者加生薑至半斤

厚朴三物湯治腹滿發熱數十日脉浮而數飲食如故方

厚朴半斤　甘草　大黃四兩
枳實五枚　桂心二兩　生薑五兩
右㕮咀以水一斗二升煮取五升內大黃煎取三升去滓服一升腹中轉動者勿服不動者更服一方加芒消二兩

治久寒腎脅逆滿不能食吳茱萸湯方

吳茱萸　半夏　小麥各一升　甘草
人參　桂心各一兩　大棗二十枚　生薑八兩
右八味㕮咀以酒五升水三升煮取三升分三服

治虛羸肩膊滿大桂湯方

桂心 一斤　半夏 生薑 各四兩　黃耆 三兩

右四味㕮咀以水一斗半煮取五升分五服日三夜二

治男子卒勞內傷汗出中風腹脹大飢食不下心痛小便赤黃時白大便不利方

大黃　葶藶　苦參　黃連 各等分

右六味末之蜜丸以豉汁和飲服如梧子二丸日三加至十丸

臚脹脅腹滿灸膊輸百壯三報

肖滿心腹積聚痞痛灸肝輸百壯三報

脹滿水腫灸脾輸隨年壯三報

腹中氣脹引脊痛食飲多身羸瘦名曰食晦先取脾輸後取季脇

藏腑積聚脹滿羸瘦不能飲食灸三焦輸隨年壯

脹滿雷鳴灸大腸輸百壯三報

脹滿氣聚寒冷灸胃管百壯三報穴在鳩尾下三寸

腹脹滿遶臍結痛堅不能食灸中守百壯穴在臍上一寸一名水分

脹滿痕聚滯下疼冷灸氣海百壯穴在臍下一寸忌不可針

脹滿氣如水腫狀小腹堅如石灸膀胱募百壯穴在中極臍下四寸

脹滿腎冷痕聚洩利灸天樞百壯穴在臍傍相對橫去臍兩傍各二寸

癇冷積熱第八

論曰凡人中寒者喜欠其人清涕出發熱色和者善嚏凡瞻

病者未脉望之口燥清涕出善噦欠此人中寒其人下利以裏虛故也欲噦不能此人腹中痛凡寒脉沈弦脉雙弦者寒也弦脉狀如張弓弦按之不移脉數弦者當下其寒脉雙弦而遲者心下堅脉大而緊者陽中有陰可下之右手寸口脉弦者即胷下拘急而痛其人漐漐惡寒師曰遲者為寒澀為無血寸口脉微尺中緊而澀緊即為寒微即為虛澀即為血不足故知發汗而復下之大露宿丸主寒冷百病方在第十七卷中

匈奴露宿丸治寒冷積聚方

礬石　桂心　附子　乾薑各二兩

右四味末之蜜丸如梧子一服十丸日三服稍加之

露宿丸主遇冷氣心下結緊嘔逆寒食不消并主傷寒晨夜觸寒冷惡氣方

附子　烏頭

右四味末之蜜丸以酒服如胡豆三九日三加至十九藥

耐寒冷忌熱食近火宜冷食飲

治痼冷風眩寒中手足冷胃口寒臍下冷百病五勞七傷第一令人能食二強盛三益氣四有子神驗方

生地黃十五斤取汁　烏頭十枚　桂心五兩　礬石四兩　大豆三升半

右三味以除日吹咀烏頭以酒一斗半和地黃汁浸烏頭至破日絞去滓內豆藥汁中至除日出暴之有汁更浸而暴之至汁盡藥成初服從二豆起可至二十豆酒服之有病空腹服無病食後服四時合並得二月三月為上時藥令人能食益氣強盛有子髮白更黑齒落更生先病熱人不可服治心腹痼冷百治不差方

麴末三升　白朮五兩　乾薑　桂心各三兩

吳茱萸　蜀椒各二兩

右六味治下節以米飲服方寸匕日二不過五劑諸冷頓愈無忌空腹服之

治積年冷病方

蜀椒二兩　香豉一升

右二味擣椒爲末和豉更擣三千杵酒服如彈丸大七丸日一服食前服

治諸冷極醫所不治方

馬藺子九升淨治去土空腹服一合日三飲及酒下之服訖須臾食壓之服取差乃止

赤丸主寒氣厥逆方

茯苓　桂心各四兩　細辛一兩　烏頭附子各二兩　射罔加大棗一枚

右六味末之內眞朱爲色蜜丸如麻子空腹酒服一九日再夜一服不知加至二九以知爲度一方用半夏四兩而不用桂

治胷滿有氣心腹中冷半夏湯方

半夏一升　桂心四兩　生薑八兩

右三味㕮咀以水七升煮取二升一服柒合日三服

温中下氣生薑湯方

生薑一斤　甘草三兩　桂心四兩

右三味㕮咀以水六升煮取一升半服五合日三服

甘草湯主虛羸悸悸氣欲絶方

甘草　生薑　五味子各二兩　人參二兩　吳茱萸升

右五味㕮咀以水四升煮茱萸令小沸去滓內藥煮取一升六合分二服服數劑佳

茱萸消石湯主久寒不欲飲食數十年澼飲方

吳茱萸 八合　消石 一升　生薑 一斤

右三味以酒一斗水解令得二斗煮藥取四升服二升病即下去勿更服也初下如泔後如汚泥若如沫滓吐者更可服之養如乳婦法

大建中湯主心胷中大寒大痛嘔不能飲食飲食下咽自知偏從一面下流有聲決決然若腹中寒氣上衝皮起出見有頭足上下而痛其頭不可觸近方

蜀椒 二合　乾薑 四兩　人參 二兩　粉糖 一升

右四味咬咀以水四升煮取二升去滓內糖微火煮令得一升半分三服服湯如炊三斗米久可飲粥二升許更服當一日食糜溫覆之

大黃附子湯治胷下偏痛發熱其脉緊弦此寒也當以溫藥下之方

大黃 三兩　附子 三枚　細辛 三兩

右三味咬咀以水五升煮取二升分再服

論曰寸口脉弦而緊弦即備氣不行衛氣不行即惡寒緊則不欲飲食弦緊相搏即爲寒疝弦緊俱動其人必緊疼痛緊去弦在其疝便發弦緊相搏即爲寒疝跗陽脉浮而遲浮即爲風虛遲即爲寒疝凡瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣必衝不衝者心下則痞

寒疝繞臍苦痛發即白汗出手足厥寒其脉沈弦大烏頭湯主之方

烏頭 十五枚熬黑不切以水三升煮取一升去滓內白蜜二斤煎令水氣盡得二升強人服七合羸人五合一服未差明日更服日止一服不可再也（仲景名烏頭煎）

烏頭桂枝湯主大寒疝腹中痛逆冷手足不仁若一身盡痛

灸刺諸藥不能治方

秋乾烏頭實中者五角 枚除去角 白蜜一斤

右二味以蜜煎烏頭減半去滓以桂枝湯五合解之令得一升許初服二合不知更進三合復不知加至五合其知者如醉狀得吐者爲中病也其桂枝湯方在傷寒中外臺云外以桂枝湯和蜜煎之得吐以桂枝湯和前烏頭煎服

論曰凡人患大熱皆須候脉若大大熱者不得一準方用藥皆準病用藥大熱不可那者當兩倍三倍大大熱者乃至十倍用之乃可制之爾有人苦熱不已皆由服石所致種種服餌不能制止惟朴消煎可以定之武德中有貴高人師市奴謂之金石凌非也此方直用二消寒水石石膏可也即不勞金有金者貴高人所加也

朴消煎方

朴消一斤 甘消八兩 寒水石四兩 石膏二兩 金二兩

右五味先內二消於八升湯中攪之令消以紙密封一宿澄取清內銅器中別擣寒水石石膏碎如豆粒以絹袋盛之內汁中以微火煎之候其上有漠起以筯投中著筯如凌雪凝白急下瀉著盆中待凝取出烈日暴乾積熱困悶不已者以方寸匕白蜜一合和冷水五合攪和令消頓服之日三熱定即止

五石湯主胃間熱熱病後不除煩悶口中乾渴方

寒水石 消石 赤石脂 龍骨

牡蠣 甘草 黃芩 栝樓根 各五分

知母 桂心 石膏各三分 大黃二分

右十二味咬咀以水七升煮取三升分四服日三夜一本諸

咬碓

竹葉湯主五心熱手足煩疼口乾脣燥肖中熱方

竹葉　小麥各一升　知母　石膏各三兩
黃芩　麥門冬酪三兩　人參一兩半
甘草　栝樓根　半夏酪一兩　茯苓二兩

右十二味㕮咀以水一斗二升煮竹葉小麥取八升去滓內藥煮取三升分三服老小五服

半夏湯主胷中客熱悶下煩滿氣上大小便難方

半夏一升　生薑二兩
甘草一兩　黃芩
枳實酪三兩　白朮五兩
人參酪三兩　杏人

右十味㕮咀以水九升煮取三升分三服胷中大熱者沈冷服之大小便澀加大黃三兩一方用梔子人二兩爲十一味

承氣湯主氣結胷中熱在胃管飲食嘔逆渴方

前胡　枳實
寒水石　知母
石膏　栝樓根酪二兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

治熱氣手足心煩熱如火方

竹葉二升　枳實三兩
吳茱萸　黃芩各二分

右十一味㕮咀以水八升煮取二升分三服

地黃煎主熱勞

地黃汁四升三合　茯神
栝樓根五兩　竹瀝三合用竹葉一方

青箱子　白前酪一兩
生薑六兩　前胡一作藥半夏酪五兩
栝樓根　麥門冬酪二兩

知母　萎蕤酪四兩
生薑汁

白蜜　生地骨皮切各二升
生麥門冬汁一升
右十一味㕮咀以水一斗二升先煮諸藥取汁三升去滓下竹瀝地黃麥門冬汁微火煎四五沸下蜜薑汁微火煎取六升初服四合日三夜一加至六七合四月五月作散服之

治積熱方
枳實　黃芩　大黃
右五味末之蜜丸空心酒服如梧子大三十九加至四十九日一服

治膈上熱方
苦參十兩　玄參五兩　麥門冬三兩　車前子二兩
右四味末之以蜜丸如梧子一服十五九日二服

細丸主客熱結塞不流利方
大黃　甘蘼各三兩　香豉三合　杏人　巴豆各三分
右五味末之蜜丸飲服如梧子二九日一服以利為度

治骨蒸熱羸瘦煩悶短氣喘息皷張日西即發方
龍膽　黃連　梔子十枚　苦參　芍藥　青箱子各三兩　大黃　芒消二分　黃芩
右十味末之蜜丸飲服如梧子二九日二以知為度一方無苦參已下止五味張文仲飲服方加梔子十枚散七

治骨蒸方
天靈蓋如梳大炙令黃碎以水五升煮取二升分三服起死人神方

又方　水服芒消一方寸匕日二服神良

又方　取人屎灰以酒服方寸匕日三服

五藏熱及身躰熱脉弦急者灸第十四椎與臍相當五十壯

老小增損之若虛寒至百壯橫三間寸灸之

備急千金要方卷第十六

備急千金要方卷第十七 肺藏

朝奉郎守太常少卿臣孫兆秘閣校理判登聞檢院臣高保衡臣林億等校正

肺藏脉論第一

肺虛實第二 肺與大腸俱虛俱實附

肺勞第三

氣極第四 氣虛實附

積氣第五 七氣五膈奔豚附

肺痿第六

肺癰第七

飛尸鬼疰第八

肺藏脉論第一

論曰肺主魄魄藏者任物之精也爲上將軍使在上行所以肺爲五藏之華蓋並精出入謂之魄魄者肺之藏也皐者肺

之官肺氣通於鼻鼻和則能知香臭矣循環紫宮上出於頰俠於鼻下迴肺中榮葉於髮外主氣內主肖與乳相當左乳庚右乳辛肺重三斤三兩六葉兩耳凡八葉有十四童子七女子守之神名鳥鴻主藏魄號爲魄藏隨節應會故云肺藏氣氣舍魄在氣爲欬在液爲涕肺氣虛則鼻息利少氣實則喘喝胥憑仰息肺氣虛則夢見白物見人斬血藉藉得其時則夢見兵戰肺氣盛則夢恐懼哭泣厥氣客于肺則夢飛揚見金鐵之器奇物

凡肺藏象金與大腸合爲腑其經手太陰與陽明爲表裏其脉浮相於季夏王於秋秋時万物之所終宿葉落柯萎萎枝條其坎然獨在其脉爲微浮衛氣遲榮氣數數則在上遲則在下故名曰毛陽當陷而不陷陰當昇而不昇爲邪所中感激故爲風寒所中陽中邪則捲陰中邪則緊捲則惡寒緊則爲慄寒慄相薄故名曰瘧弱則發熱浮乃來出旦中旦發暮中暮發藏有遠近脉有遲疾周有度數行有漏刻遲在上傷毛采數在下傷下焦中焦有惡則見有善則匿陽氣下陷陰氣則温陽反在下陰反在巔故名曰長而且留不及病在中太過則令人氣逆而背痛愠愠然不及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下聞病音

秋脉如浮秋脉肺也西方金也萬物之所以收成也故其氣來輕虛而浮來急去散故曰浮浮反此者病何如而反其氣來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂肺脉來厭厭聶聶如落榆莢曰肺平秋以胃氣爲本肺脉來不上不下如循雞羽曰肺病翻巢源無不字

肺脉來如物之浮如風吹毛曰肺死

眞肺脉至大而虛如以毛羽中人膚色白赤不澤毛折乃死

秋胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛而有弦
曰春病弦甚曰今病
肺藏氣氣舍魄喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人
皮革焦毛悴色夭死于夏
手太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣温皮毛者也氣弗營則
皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷皮節傷者則爪
枯（一作皮）毛折毛折者則氣先死丙篤丁死火勝金也
肺死藏浮之虛按之弱如葱葉下無根者死秋金肺王其脉
微澀而短曰平反得大而緩者是脾之乘肺母之歸子為虛
邪雖病易治反得沈濡而滑者是腎之乘肺子之乘母為實
邪雖病自愈反得浮大而洪者是心之乘肺火之剋金為賊
邪大逆十死不治反得弦細而長者是肝之乘肺木之陵金
為微邪雖病即差肝乘肺必作虛

右手關前寸口陰絕者無肺脉也苦短氣欬逆喉中塞噫逆
刺手陽明治陽
右手關前寸口陰實者肺實也苦少氣脅中滿膨膨與肩相
引刺手太陰治陰
肺脉來泛泛輕如微風吹身皮緩緩為肺寒熱怠墮欬唾血引要脊背脅若
病四至脫精五至死六至命盡手太陰脉也
肺脉急甚為癲疾微急為肺寒熱怠墮欬唾血引要脊背脅若
鼻息肉不通緩甚為多汗微緩為痿漏風（一作偏風）頭已下汗出
不可止大甚為脛腫微大為肺痺引胷背起要內小甚為殘
泄微小為消癉滑甚為息賁上氣微滑為上下出血濇甚為
嘔血微濇為風痿在頸肢掖之間下不勝其上其能喜酸
肺脉搏堅而長當病唾血其濡而散者當病漏（作瀋）汗至今不
復散發

白脉之至也喘而浮上虛下實鶩有積氣在胷中喘而虛名曰肺痺寒熱得之醉而使內也

黃帝問曰經脉十二而手太陰之脉獨動不休何也手太陰本在寸口中岐伯對曰足陽明胃脉也胃者五藏六腑之海胃脉在足趺上大指間上行三寸骨解中題其精氣上淸注於肺肺氣從太陰而行之其行之也以息往來故人一呼脉再動一吸脉亦再動呼吸不已脉動不止

黃帝問曰氣口何以獨爲五藏主岐伯曰胃者水穀之海六腑五藏氣氣口者太陰肺經之脉也五藏六腑之氣皆出於胃變見於氣口氣口屬腑藏主節

呼寸口者也

扁鵲曰肺有病則鼻口張實熱則喘逆胷仰息其陽氣壯則夢恐懼等虛寒則欬息下利少氣其陰氣壯則夢涉水等肺在聲爲哭在變動爲欬在志爲憂憂傷肺精氣共於肺則悲

味主秋結滿而血者病在胷及以飲食不節得病者取之合故命曰味主合

病先發於肺喘欬三日之胃腹脹十日不已死冬日入夏日出

身痛體重五日之胃腹脹支滿一日之脾閉塞不通病在肺下脯慧日中甚夜半靜假令肺病南行若食馬肉及麞肉得之不者當以夏時發得病以丙丁日也宜赤藥

凡肺病之狀必喘欬逆氣肩息背痛汗出尻陰股膝攣髀腨胻足皆痛虛則少氣不能報息耳聾嗌乾取其經手太陰足太陽之外厥陰內少陰血者

肺脉沈之而數浮之而喘苦洗洗寒熱腹滿腸中熱小便赤肩背痛從腰已上汗出得之房內汗出當風

肺病其色白身體但寒無熱時時欬其脉微遲爲可治宜服

五味子大補肺湯瀉肺散春當刺少商夏刺魚際皆瀉之季夏刺大淵秋刺經渠冬刺尺澤皆補之又當灸膻中百壯背第三椎二十五壯

邪在肺則皮膚痛發寒熱上氣喘汗出欬動肩背取之膺中外輸背第三椎之傍以手痛按之快然乃刺之取之缺盆中以越之

形寒寒飲則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上行肺傷其人勞倦則欬唾血其脉細堅浮數皆吐血此爲躁擾嗔怒得之肺傷氣擁所致也

肺中風者口燥而喘身運而重冒而腫脹

肺中寒者其人吐濁涕

肺水者其人身體腫而小便難時大便鴨溏

肺脹者虛而滿喘欬目如脫狀其脉浮大

趺陽脉浮緩少陽脉微緊微爲血虛緊爲微寒此爲鼠乳

診得肺積脉浮而手按之辟易脅下時痛逆背相引痛少肺之積名曰息賁在右脅下覆大如杯久久不愈病洒洒寒熱氣逆喘欬發肺癰以春甲乙日得之何也心病傳肺肺當傳肝肝適以春王王者不受邪肺復欲還心心不肯受因留結爲積故知息賁以春得之

肺病身當有熱欬嗽短氣唾出膿血其脉當短濇今反浮大其色當白而反赤者此是火之剋金爲大逆十死不治

商音人者主肺聲也肺聲哭其音聲其志樂其經手太陰厥逆陽明則榮衛不通陰陽反祚陽氣內擊陰氣外傷傷則寒寒則虛虛則厲風所中噓吸戰掉語聲嘶塞而散下氣息短

儻四肢僻弱面色青黯遺失便利甚則不可治依源麻黃續命湯主之方在第八卷中

又言音喘急短氣好唾此為火剋金陽擊陰陰氣沈陽氣昇昇則實實則熱熱則狂狂則閉眼悸言非常所說口赤而張飲無時度此熱傷肺肺化為血不治若面赤而鼻不歛可治也肺病為瘧者令人心寒甚則熱熱間善驚如有所見者恒山湯主之方在第十卷中若其人本來語聲雄烈忽爾不亮梅氣用力方得出言而反於常人呼共語直視不應雖曰末病勢當不久此則肺病聲之候也察觀疾病表裏相應依源審治乃不失也

白為肺肺合皮白如豕膏者吉肺主鼻鼻是肺之餘其人金形相比於上商白色小頭方面小肩背小腹小手足發動身輕精瘦急忿靜悍性喜為吏治秋冬不耐春夏春夏感而生病主壬太陰廉廉然肩膺厚薄堅竦則肺應之正白色小理者則肺小小則少飲不病喘鳴多飲善病肩喉痺逆氣巨肩反膺陷喉者則肺高寒喘鳴多飲善病肩喉痺逆合腋張脅者則肺下下則逼賁則實實則熱上氣肩急欬迫肝善脅下痛鼻塞或壅而涕生息肉好肩背厚者則肺堅堅則不病欬上氣肩背薄者則肺脆脆則易傷於熱喘息鼻衂肩膺好者則肺端正端正則和利難傷膺偏欹者則肺偏傾偏傾則病肖偏痛鼻亦偏疾凡人分部陷起者必有病生大腸陽明為肺之部而藏氣通於內外部亦隨而應之沈濁為內浮清為外若外病內入則所部起內病裏出則所部陷外入前治陽後治陰內出前治陰後治陽實瀉虛補陽主外陰主內凡人死生休否則藏神前變形于外人肺前病鼻則為之梁折孔閉青黑色若天

中等分墓色應之必死不治看色深淺斟酌賒促遠不出一
年促不延時月肺疾少愈而卒死何以知之曰赤黑如拇指
屬黯見顏頰上此必卒死肺絶三日死何以知之曰赤黑如拇指
出而不還面白目青是謂亂經飲酒當風風入肺經膽氣妄
泄目則爲青雖有天救不可復生面黃目白如枯骨死吉凶
之色在於分部順逆面見青赤白入鼻必病不出其年若年上
不應三年之中禍必應也

秋金肺脉色白主手太陰脉也秋取經輸秋者金始治肺將
收殺金將勝火陽氣在合陰氣初勝濕氣及體陰氣未盛未
能深入故取輸以瀉陰邪取合以虛陽邪陽氣始衰故取於
合其脉本在寸口之中掌後兩筋間二寸中應在腋下動脉
其脉根于太倉太倉在臍上三寸一夫是也

其筋起於手大指之上循指上行結於魚後行寸口外側上
循臂結肘中上臑內廉入腋下上出缺盆結肩髃前上結缺
盆下結胸裏散貫貫下抵季脅

其脉起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺系橫出
腋下下循臑內行少陰心主之前下肘中後循臂內上骨下
廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後直次指
內廉出其端合手陽明爲表裏陽明之本在肘骨中同會于

手太陰

太陰之別名列缺起於腕下分間並太陰之經直入掌中散
入於魚際別走手陽明主肺生病病實則大腸熱熱則手兌
掌起起則陽病陽脉反逆大於寸口三倍病則欬上氣喘喝
煩心胸滿臑臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則肩背痛風汗
出中風虛則大腸寒寒則欠欬小便遺數則陰病陰脉反
小於寸口一倍病則肩背寒痛少氣不足以息季脅空痛尿

色變卒遺失無度

秋三月者主肺大腸白氣狸病也其源從太陽擊手太陰太陰受搖邪之氣則經絡擁滯毛皮緊豎發泄邪生則藏腑傷温隨秋受廣其病相反若腑虛則爲陰邪所傷乍寒乍熱損肺傷氣暴嗽嘔逆若藏實則爲陽毒所損體熱生斑氣喘引飲故曰白氣狸病也

扁鵲云炙心肺二輸主治丹毒白狸病當依源爲療調其陽理其陰則藏腑之病不生矣

肺虛實第二 脉四條 方一十首 灸法二首

肺實熱

右手寸口氣口以前脉陰實者手太陰經也病苦肺脹汗出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀名曰肺實熱也

治肺實熱胃遇仰息泄氣除熱方

枸杞根皮 切二外 石膏 碎二兩 白前 杏人 酥各三兩

橘皮 白朮 各五兩 赤蜜七合

右七味㕮咀以水七升煮取二升去滓下蜜煮三沸分三服

治肺熱言音喘息短氣好唾膿血方

生地黃 切二外 石膏 碎二兩 麻黃五兩 杏人四兩

淡竹筎 雞子大一枚 升麻 羚羊角 芒消 各三兩

赤蜜外

右九味㕮咀以水七升煮取二升去滓下蜜煮兩沸分三服

治肺熱悶不止胃中喘急驚悸客熱來去欲死不堪服藥泄胃中喘氣方

桃皮 芫花 各一外

右二味㕮咀以水四升煮取一升五升去滓以故布手巾內汁中薄胃温四肢不勿盈數日即歇

治肺熱氣上欬息奔喘橘皮湯方

橘皮 麻黃各三兩 乾紫蘇 柴胡各三兩

宿薑 杏人各四兩 石膏八兩

右七味㕮咀以水九升煮麻黃兩沸去沫下諸藥煮取三升去滓分三服不差與兩劑

治肺熱喘息鼻衄血方

羚羊角 玄參 芍藥 升麻 射干 雞蘇

生地黃切升 梔子仁四兩 柏皮各三兩 淡竹葉一把

右十味㕮咀以水九升煮麻黃兩沸去沫下諸藥煮取三升分三服須利者下芒消三兩更煮三沸

治肺熱飲酒當風風入肺膽氣妄泄目青氣喘方

麻黃四兩 五味子各三兩半 甘草各三兩 杏人五十枚

母薑五兩 淡竹葉切一升

右六味㕮咀以水七升先煮麻黃去沫下諸藥煮取二升去滓分三服

瀉肺散治酒客勞倦或出當風喜怒氣舍於肺面目黃腫起即頭眩欬逆上氣時忽忽欲絶心下弦急不能飲食或吐膿血胷痛引背支滿欲嘔方

百部 五味子各三兩半 茯苓 附子

蔹蓉 當歸 石斛 遠志

續斷各一兩半 細辛 甘草各七分 防風

蜀椒 紫菀 桂心 款冬花

乾薑各一兩半 桃人六十枚 杏人三十枚

右十九味治下篩以酒服方寸匕日三稍加至二匕

肺脹氣搶胷下熱痛灸陰都隨年壯穴在俠胃管兩邊相去

一寸胃管在心下三寸
肺脹脅滿嘔吐上氣等病灸大椎并兩乳上第三肋間各止七
肺與大腸俱實
右手寸口氣口以前脉陰陽俱實者手太陰與陽明經俱實
也病若頭痛目眩驚狂佚痺痛手臂捲脣吻不收名曰肺與
大腸俱實也
治肺與大腸俱實令人氣滿煮散方
茯苓　麻黄　黄耆　大青　各六分　桂心　細辛　各三分　杏人　各五分　石膏　二兩　丹參　酐　五味子　甘草　具母　一橘皮　芍藥　各一兩　枳實　三枚
右十五味治下篩爲麤散裹一方寸匕半井華水一升
五合煮取七合爲一服日再

肺虛冷
右手寸口氣口以前脉陰虛者手太陰經也病苦少氣不足
以息噎乾不津液名曰肺虛冷也
治肺虛冷聲嘶傷語言用力戰掉緩弱虛瘠風入肺方
防風　獨活　芎藭　秦椒　乾薑　黄耆　各二十銖　麻黄　五味子　桂心　署預　山茱萸　甘草　各三十六銖　秦艽　細辛　防已　各十銖　天雄　杜仲　人參　貫衆　二枚　附子　七分　紫菀　甘菊花　各二十四銖
右二十二味治下篩以酒服方寸匕日二服一方有石膏六分當歸五分
治肺虛寒厲風所傷語聲嘶澁氣息喘備憊欬唾酥蜜膏酒止
氣嗽通聲方

酥　崖蜜　飴糖　薑汁

百部汁　棗肉　杏人　甘皮

右八味合和微火煎常攪三上三下約一炊久取薑汁等各減半止溫酒一升服方寸匕細細咽之日二夜一

又方

猪脂三具　大棗百枚

右二味以酒五升漬之秋冬七日春夏五日出布絞去滓七日服盡二七日忌鹽羊脂亦得治欬嗽胷脅支滿多喘上氣尤良（別後方治久欬上氣二十年諸治不差者）

治肺寒損傷氣嗽及涕唾鼻塞方

棗肉（二升研作脂）　杏人（一升熬研爲脂）　酥　生薑汁

白糖　生百部汁　白蜜各一升

右七味合和以微火煎常攪作一炊久下之細細溫清酒

服二合日二

補肺湯治肺氣不足逆滿上氣咽中悶塞短氣寒從背起口中如含霜雪言語失聲甚者吐血方

五味子三兩　乾薑　麥門冬一升　大棗百枚

右八味㕮咀以水一斗先煮桑白皮五沸下藥煮取三升分三服

又方

黃耆五兩　甘草　鍾乳　人參酪二合

桂心　乾地黃　茯苓　白石英

厚朴　桑白皮　乾薑　紫菀

橘皮　當歸　五味子　遠志

麥門冬各三兩　大棗三十枚　粳米一合　桑根白皮一斤　欵冬花酪二合

右十八味㕮咀以水一斗四升煮取四升分五服日三夜二
補肺湯治肺氣不足欬逆上氣牽縄而坐吐沫唾血不能食
飲方

蘇子一升　桑白皮五兩　半夏汰兩　紫菀
人參　甘草　五味子　杏人五十枚
射干　款冬花各一兩　麻黃　乾薑
桂心各三兩　細辛一兩半

右十四味㕮咀以水一斗二升煮取三升半分五服日三
夜二
補肺湯治肺氣不足欬逆短氣寒從背起口中如含霜雪語
無音聲而渴舌本乾燥方

五味子　蘇子各一升　白石英　鍾乳各三兩
竹葉　款冬花各一兩　橘皮　桂心

桑白皮　茯苓　紫菀各二兩　粳米二合
生薑五兩　杏人五十枚　麥門冬四兩　大棗十枚

右十六味㕮咀以水一斗三升先煮桑白皮粳米大棗米
熟去滓內諸藥煮取五升分六服日三
補肺湯治肺氣不足心腹支滿欬嗽喘逆上氣唾膿血胷背
痛手足煩熱惕然自驚皮毛起或哭或歌或怒乾嘔心煩耳
中聞風雨聲面色白方

款冬花　桂心各二兩　桑白皮一斤生薑
五味子　鍾乳各三兩　麥門冬四兩粳米五合
大棗十枚

右九味㕮咀以水一斗二升先煮粳米棗令熟去之內藥
煎取二升分三服溫服之一方用白石英二兩廣濟用紫菀人參各二兩名紫菀湯

治肺氣不足欬唾膿血氣短不得卧麻子湯方

麻子一升　桂心　人參各二兩　阿膠

紫菀洛一兩　生薑三兩　乾地黃四兩　桑白皮一斤

飴一斤

右九味㕮咀以酒一斗五升水一斗五升合煮取四升分五服

治肺氣不足咽喉苦乾宜服飴煎方

作飴任多少取乾棗一升去核熟擣水五升和使相得絞去滓澄去上清取濁內飴中攪火上煎勿令堅令連連服如雞子漸漸吞之日三夜二

凡肺風氣痿絶叫肢滿脹喘逆胷滿灸肺輸各二壯肺輸對乳引繩度之在第三椎下兩傍相去各一寸五分

右手寸口氣口以前脉陰陽俱虛者手太陰與陽明經俱虛也病苦耳鳴嘈嘈時妄見光明情中不樂或如恐怖名曰肺與大腸俱虛也

治肺與大腸俱不足虛寒之氣小腹拘急腰痛羸瘠百病小建中湯方

大棗十二枚　生薑三兩　甘草二兩　桂心三兩

芍藥六兩

右五味㕮咀以水八升煮取三升去滓內飴八兩煮三沸分三服肘後用黃者人參各二兩名黃耆建中湯

肺勞第三論一首　方三首

論曰凡肺勞病者補腎氣以益之腎王則感於肺矣人逆秋氣則手太陰不收肺氣焦滿順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順爲逆是謂關格病則生矣

肺勞實氣喘鼻張面目苦腫麻黃引氣湯方

麻黃　杏人　生薑　半夏　各五分　石膏八兩　紫蘇四分　桂心各三分　竹葉切一升　橘皮二分　白前　細辛

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服

治肺勞虛寒心腹冷氣逆遊氣奔豚氣滿從胸達背痛憂氣往來嘔逆飲食即吐虛乏不足半夏湯方

半夏一升　生薑一斤　桂心四兩　甘草　橘皮　麥門冬各三兩　厚朴各二兩　人參

右八味㕮咀以水一斗煮取四升分四服腹痛加當歸二兩治肺勞風虛冷痰澼水氣晝夜不得臥頭不得近枕上氣胸滿喘息氣絕此痰水盛溢厚朴湯方

厚朴　麻黃　桂心　黃芩　石膏　大棗十五枚　橘皮各二兩　枳實　杏人　茯苓各三兩　細辛一兩　半夏一升　生薑十兩　甘草　秦艽

右十六味㕮咀以水一斗三升煮取四升分為五服

咳痺氣逆欬嗽口中涎唾灸肺輸七壯亦可隨年壯至百壯

氣極第四論一首灸法二首　方六首

論曰凡氣極者主肺也肺應氣與肺合又曰以秋遇病為皮痺皮痺不已復感於邪內舍於肺則寒濕之氣客於六腑也若肺有病則先發氣氣上衝胸常欲自恚以秋庚辛日傷風邪之氣為肺風肺風之狀多汗若陰傷則寒寒則虛虛則氣逆欬欬則短氣暮則甚陰氣至濕氣生故甚陰畏陽氣盡日則差若陽傷則熱熱則實實則氣喘息上胸臆甚則唾血也然陽病治陰陰是其裏是以陰陽表

裏衰王之源故知以陽調陰以陰調陽氣實則泄陰氣虛則引善治病者初入皮毛肌膚筋脉則治之若至六腑五藏半死矣

扁鵲曰氣絶不治喘（作奔）而汗出二日死氣應手太陰太陰氣絶則皮毛焦氣先死矣

治氣極虛寒陰畏陽氣晝甚暮甚氣短息寒鍾乳散亦治百病令人丁強能食飲去風冷方

鍾乳（別研）　乾薑　細辛　桂心　白朮（一兩）　防風

右十二味治下篩以酒服方寸匕日三漸加至二七五十以上可數服得力乃止（千金翼云有冷加椒熱加黃芩各三兩）

治氣極虛寒皮毛焦津液不通虛勞百病氣力損乏黃耆湯方

黃耆（四兩）　人參　白朮　桂心（各二兩）　大棗（十枚）　附子（三十銖）　生薑（八兩）

右七味㕮咀以水八升煮取三升去滓分四服一方不用附子

治氣極虛寒皮痺不已內舍於肺寒氣入客於六腑腹脹虛滿寒冷積聚百病大露宿丸方

礬石（附後作礬石）　乾薑　桔梗　附子（各三兩）　桂心　皂莢

右六味末之蜜丸酒服如梧子十丸日三漸加之愼熱炙近火等

治氣極虛寒癖飲胃中痰滿心腹痛氣急不下飲食硫黃丸方

硫黃　礬石　烏頭　桂心　乾薑　附子　細辛　白朮

桔梗　茯苓各三兩

右十味末之蜜丸如梧子酒服十九曰三漸加之以知為度（附後無白朮桔梗茯苓用吳茱萸蜀椒人參皂莢當歸十二種為丸用治人大冷夏月溫飲食不解衣者）

治氣極傷熱喘息衝胷常欲自恚心腹滿痛內外有熱煩嘔不安大前胡湯方

前胡八兩　半夏　麻黃　芍藥各四兩　枳實四枚　生薑五兩　黃芩三兩　大棗十二枚

右八味㕮咀以水九升煮取三升去滓分溫三服

治氣極傷熱氣喘甚則唾血無氣短乏不欲食口燥咽乾竹葉湯方

竹葉二升　麥門冬　小麥　生地黃各一升　生薑六兩　麻黃三兩　甘草一兩　石膏六兩　大棗十枚

右玖味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服

嘔吐上氣灸尺澤不三則七壯尺澤者在腕後肘中橫文腹中雷鳴相逐食不化逆氣灸上管下一寸名太倉七壯

積氣第五（論一首　灸法二十四首　方五十一首）

論曰七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣凡七種氣積聚堅大如杯若柈在心下腹中疾痛飲食不能時來時去每發欲死如有禍祟此皆七氣所生寒氣即嘔逆惡心熱氣即說物不音而迫怒氣即上氣不可忍熱痛上搶心短氣欲死不得息恚氣即積聚在心下不得飲食喜氣即不可疾行不能久立憂氣即不可閉作暮卧不安愁氣即喜忘不識人語置物輒方還取不得去處若聞急即肆股腑腫手足筋攣捉不能舉如得病此是柒氣所生男子卒得飲食不時所致婦人即產後中風諸疾也

七氣丸方

烏頭 大黃 各七分 紫菀 半夏

前胡 細辛 丹參 茯苓

芎藭 桃人 胡洽作杏人 昌蒲一作芍藥 石膏

吳茱萸 桂心 各一兩 桔梗 各三分 人參

甘草 防葵 胡洽無丹三甘草 乾薑 蜀椒 各半兩

右二十味末之蜜丸酒服如梧子三丸日三加至十丸壹方去半夏加甘遂三分

七氣丸主七氣九氣者寒氣熱氣怒氣恚氣悲氣憂氣愁氣氣此之爲病皆星積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲食時去時來發則欲死凡寒氣狀吐逆心滿熱氣狀悗悗眩冒失精怒氣狀不可當熱痛湓心短氣欲絕不得息恚氣狀積聚心滿不得食飲喜氣狀不可疾行久立憂氣狀不可苦作卧不安席愁氣狀平故如怒喜忘四肢腑腫不得舉止亦治產後中風餘疾方

大黃 二兩半 人參 半夏 吳茱萸

柴胡 乾薑 細辛 桔梗

昌蒲 各三分 茯苓 芎藭 甘草

石膏 桃人 蜀椒 各三分一方用枝心

右十五味末之蜜丸如梧子大每服酒下三丸日進三服漸加至十九 千金翼十味無茯苓芎藭甘草石膏桃人

七氣湯主憂氣勞氣寒氣熱氣愁氣或飲食爲膈氣或勞氣內傷五藏不調氣衰少力方

乾薑 黃芩 厚朴 深師作枝心 半夏

甘草 枯樓根 深師作橘皮 芍藥 乾地黃 各一兩

蜀椒 三兩深師作枯梗 枳實 五枚 人參 一兩 吳茱萸 五合

右十二味咬咀以水一斗煮取三升分三服日三

七氣湯主虛冷上氣勞氣等方

半夏一升　人參　生薑　桂心

甘草各一兩

右五味咬咀以水一斗煮取三升分三服日三

五膈丸治憂膈氣膈食膈勞膈五病同藥服以憂恚思慮食飲得之若冷食及生菜便發其病苦心滿不得氣息引背痛如刺之狀食即心下堅大如粉絮大痛欲吐吐即差飲食不得下甚者及手足冷上氣欬逆喘息短氣方

麥門冬　甘草各五兩　蜀椒　遠志

桂心　細辛各三兩　附子一兩半　人參四兩

乾薑二兩

右九味末之蜜和丸微使淖先食含如彈丸一枚細細咽之喉中當熱藥力稍盡復含一丸日三夜二服藥七日愈延年方云若不能含者可分一大九作七小丸益服之夏月含益麥明冬甘草人參胡洽云亦可梧子大十九酒服之經心錄以吳茱萸代桂心酒服如梧子五丸空腹服之治寒冷則心痛咽中有物吐之不出咽之不入食飲少者

治結氣冷癥積在脅下及腳氣上入少腹腹中脹滿百病方

大蒜去心皮三升擣令極熟以水三升和令調絞取汁更擣餘滓令熟更以水三升和令調絞取汁合得九升所得滓可桃顆大

桑却以微火煎取三升下牛乳三升合煎取三升旦起空腹一頓溫服之令盡至申時食三日服一劑三十日服十劑止

大蒜煎治疝瘕積聚冷癖痰飲心腹脹滿上氣欬嗽刺風風癩偏風半身不隨腰疼膝冷氣息否塞百病方

蒜六斤皮切水四斗煮取一斗去滓　酥一升內蒜汁中　牛乳二升

華撥　胡椒
阿魏　戎鹽 各三兩
乾蒲桃四兩　石上昌蒲　木香 各一兩

右拾二味末之合內蒜汁中以銅器微火煎取一斗空腹酒下一兩五日以上稍加至三兩二十日覺四體安和更加至六兩此治一切冷氣甚良

治氣上下否塞不能息桔梗破氣丸方

桔梗　橘皮　乾薑 各三兩　石蜜
枳實　細辛　亭歷 各三分　胡椒
蜀椒　烏頭 各二分　華撥 十分　人參
桂心　附子　茯苓　前胡
防葵　芎藭 各五分　甘草　大黃
檳榔　當歸 各八分　白朮　吳茱萸 各六分

右二十四味末之蜜丸如梧子大酒服十九日三有熱者空腹服之

治氣實若積聚不得食息檳榔湯方

檳榔三七枚　細辛一兩　半夏一升　生薑八兩
大黃　柴胡 各三兩　橘皮
紫菀　甘草　紫蘇 冬用子　茯苓 各二兩　附子一枚

右十二味㕮咀以水一斗者取三升分三服相去如行十里久若有癥結堅實如石加鼈甲二兩防葵三兩氣上加桑白皮切二升枳實厚朴各二兩消息氣力強弱進二劑後隔十日更服前桔梗破氣丸

治積年患氣發作有時心腹絞痛忽然氣絕腹中堅實醫所不治復謂是蠱方

檳榔大者四七枚　柴胡三兩　半夏一升　生薑八兩

附子一枚　橘皮　甘草　桂心
當歸　枳實各三兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服五日一劑服三劑永除根本

治逆氣心腹滿氣上衝胷脅痛寒忩腹痛嘔逆及吐不下食憂氣結聚半夏湯方

半夏一升　生薑
桂心各五兩　橘皮四兩

右四味㕮咀以水七升煮取三升分四服日三夜一人強者作三服亦治霍亂後吐逆腹痛

治逆氣心中煩滿氣悶不理氣上半夏湯方出第十六卷嘔吐篇四味者是

治上氣咽喉窒塞短氣不得卧腰背痛胷滿不得食面色萎黃貝母湯方

貝母兩　生薑五兩　桂心　麻黃

石膏　甘草各三兩　杏人三十枚　半夏三合

右八味㕮咀以水一斗煮取三升分為三服日三

治上氣脉浮欬逆喉中水雞聲喘息不通呼吸欲死麻黃湯方

麻黃八兩　甘草四兩　大棗三十枚　射干如博碁子二枚

右四味㕮咀以井花水一斗煮麻黃三沸去沫内藥煮取四升分四服日三夜一

奔氣湯治大氣上奔胷膈中諸病發時迫滿短氣不得卧劇荏便悁欲死腹中冷濕氣腸鳴相逐成結氣方

半夏　吳茱萸各一升　人參　甘草各二兩　生薑一斤　桂心五兩

右六味㕮咀以水一斗煮取三升分四服

枳實湯下氣治胷中滿悶方

枳實 三枚 大棗 十四枚 半夏 五兩 附子 一枚
人參 甘草
厚朴 各二兩 白朮 乾薑

右九味㕮咀以水七升煮取三升半一服八合日三
治氣滿腹脹下氣方

半夏 一升 生薑 一斤 人參 半兩 橘皮 三兩
右四味㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服日三一方
無人參止三味
治氣雨膈滿急風冷方

杏人 茯苓
橘皮 桂心
白朮 射干
桔梗 枳實 各六分 防葵 各八分 吳茱萸
防風 澤瀉 各五分
芍藥 蘇子

右十四味末之蜜丸如梧子大酒服十九日二加至三十九
治氣滿閉塞不能食喘息方

訶梨勒十枚末之蜜丸如梧子食後服三丸不忌得利
即止
治上氣欬逆方

蘇子 一升 五味子 五合 麻黃
紫菀 人參 黃芩 甘草 各二兩
桂心 當歸 酢 各一兩 生薑 五兩 半夏 三兩
右十二味㕮咀以水一斗煮取三升分三服
治氣上不得卧神祕方

橘皮 生薑
五味子 各五兩一作桔梗
右五味㕮咀以水七升煮取三升分三服

治熱發氣上衝不得息欲死不得臥方

桂心 半兩　白石英　麥門冬　枳實
白鮮皮　貝母
天門冬 各二兩半　車前子 一兩　人參　茯神　檳榔人
橘皮　白薇
桃人 五分　杏人 各一兩半　郁李人 三兩

右十七味末之蜜和以竹葉飲服十丸如梧子日二加至三十丸

竹葉飲法

竹葉　紫蘇子 各三升　紫菀　白前 各四兩
百部　甘草　生薑 各三兩

右七味㕮咀以水八升煮取三升温以下前丸藥盡更含之安食下氣理胃脘并治客熱人參湯方

人參　麥門冬
茯苓　甘草
芍藥　枳實 各一兩
大棗 十枚　桂心 三兩　半夏 一升

右十三味㕮咀以水九升煮取三升去滓一服九合從旦至晡令盡皆熱服慎勿冷

治風虛支滿膀胱虛冷氣上衝肺息奔令咽喉氣悶往來下氣海藻橘皮丸方

海藻　橘皮 各三分　杏人　茯苓 各二分
人參　烏葉薑　白朮　蓽茇 各一兩
桑根白皮　秦肉　昆布 各二兩　芍藥
桂心 各五分　白前 三分　蘇子 五合

右十五味末之蜜丸飲服如梧子大十丸日二加至十五

丸以利小便為度

治氣上方

硇砂　細辛　牛膝各等分

右三味末之氣發酒服方寸匕後三日忌酒餘禁如藥法

治上氣方

上酥一外　獨頭蒜顆五

右二味先以酥煎蒜黃出之生薑汁一合共煎令熟空腹服一方寸匕温服之

治上氣嘔吐方

芥子二升末之蜜丸寅時井花水服如梧子七丸日二服亦可作散空腹服之及可酒浸服并治臍下絞痛

治勞氣方

小芥子三升擣末絹袋盛酒三斗浸之密封七日去滓温服半升漸至一升半得力更合息如藥法

治上氣三十年不差方

大棗一百枚　豉一百二十粒　蜀椒二百粒　杏人一百枚

右四味先擣杏人豉令熟後內棗椒更擣作丸如棗核大含之稍稍咽之日三夜一

治積年上氣不差垂死者方

莨菪子熬色變　熟羊肝薄切暴乾

右二味各擣等分以七月七日神酢拌令相著夜不食空腹服二方寸匕須拾針兩食間以冷漿白粥二匕止之隔日一服永差四十日內得煮飯汁作燕菁羹食之以外一切禁斷

下氣方

生薑五兩　小麥一外

右二味以水七升煮取一升頓服

又方

紫蘇葉切一升　大棗廿枚

右二味以酒三升煮取一升半分再服水煮亦得一方加橘皮半兩肘後方無棗用橘皮

治氣方

桃皮二斤去黃者㕮咀以水五升煮取三升一服一升差即止

又方　酒服驢脂二合日二差止

又方　黃牛乳二升煎取一升和生乳一升空腹服之日二

又方

驢乳初服三合三日後日別五合後至七合七日後至一升忌葵菜猪魚油等

又方　空腹服尿但尿則服之百日止治一切病

又方　空腹服烏牛尿日再至三升止

補氣虛逆方

大棗三十枚　甘皮去麤　乾地黃八兩　乾薑二兩

右四味治下篩酒四升漬棗三宿漉出棗取酒爲炊汁將棗內飢中微火蒸之令棗膏入釜中酒裹煎酒令餘二升許飢中棗候皮核在止火貯器中將前散及熱下攪之令調大略與糖相似以酒服二合日再非止補氣亦通治一切短氣并形體瘦甚良

大補氣方

羊肚一具治如食法去膏潰　羊腎一具去膏破　乾地黃五兩　甘草

秦椒一合　白朮

海藻洛三兩　乾薑

桂心　人參　厚朴

昆布　地骨皮洛四兩

右十三味治下節內羊肚中合腎縫塞肚口蒸極熟為度及熱木臼合擣取肚腎與藥為一家暴乾更擣為散酒服方寸匕日二

白石英散治氣及補五勞七傷無所不治明目利小便方

鍊成白石英十兩（白石英無多少以鎚子碁上細硫向明照透去黑色暗黑黃赤者惟取白淨者為佳擣絹下之）

（炙訖中研令極細熟以生絹袋於銅器中水飛之如作粉法如此三度研訖澄之漸漸去水水盡至石英暴得乾看上有盡惡不淨者去之取中央好者在下有惡者亦去之更研堪用者使熟白絹袋子盛著瓷椀中以瓷椀蓋之於三斗米下蒸之飯熟訖出取懸之使乾更以瓷器中研之為成）

石斛　菟絲子　茯苓　澤瀉　橘皮　各六兩

右七味治下節摠於甕器中研令相得重篩之酒服方寸匕日二不得過之忌豬魚鵝鴨蒜冷酢滑

補傷散主肺傷善澁涎善驚恐不能動筋不可以遠行膝不可久立汗出暴乾少氣喜悲心下急痛痛引背中卧不安席忽忽喜夢寒熱小便赤黃目不遠視唾血方

天門冬　防風　澤瀉　人參　各一兩半

白斂　大豆卷　前胡　芍藥　各二兩

栝樓根　石膏　乾薑　紫菀　各一兩

桂心　白朮　甘草　乾地黃　各三兩半

署預　當歸　阿膠　各一兩半

右十九味治下節食上酒服方寸匕日三

白石英丸補養肺氣方

白石英（一作白石脂）　礜石　陽起石　菟絲子　各一兩半

菟絲子　乾地黃　菥蓂　各二兩半

五味子　栝樓根　石斛　各一兩

人參　蛇牀子　巴戟天　各一兩半

右十五味末之蜜丸如梧子酒服十五丸加至三十丸日

二服

治氣不足理氣丸方

杏人　桂心酪二兩　益智子　乾薑酪三兩

右四味末之蜜丸如梧子未食服三丸以知為度

治冷氣氣短方

蜀椒五兩絹袋盛以酒一斗浸之二七日服之任意多少

治讀誦勞極疲乏困頓方

酥　白蜜　油　糖　酒外酪二

右五味合於銅器中微火煎二十沸下之準七日七夜服之令盡愼生冷

又方

人參　甘草　茯苓　當歸酪一兩

大棗二十枚　地骨皮　苦蘘　芍藥

黃耆　乾地黃酒洗酪三兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服一方用桂心三兩

治卒短氣方

擣韭汁服一升立差別後方治卒上氣鳴息便欲絕

治乏氣方

枸杞葉　生薑酪二兩

右二味㕮咀以水三升煮取一升頓服

治少年房多短氣方

梔子二七枚　豉七合

右二味以水二升煮豉取一升半去豉內梔子煮取八合服半升不差更服

凡上氣冷發腹中雷鳴轉叫嘔逆不食灸太衝不限壯數從痛至不痛從不痛至痛止

上氣厥逆灸肖堂百壯穴在兩乳間
肖膈中氣灸闕輸隨年壯扁鵲云第四椎下兩傍各一寸半
名闕輸
心腹諸病堅滿煩痛憂思結氣寒冷霍亂心痛吐下食不消
腸鳴泄利灸太倉百壯太倉一穴一名胃募在心下四寸乃
胃管下一寸
結氣囊裹針藥所不及灸肓募隨年壯肓募二穴從乳頭邪
度至臍中屈去半從乳下行度頭是穴
下氣灸肺輸百壯又灸太衝五十壯
凡臍下絞痛流入陰中發作無時此冷氣灸關元百壯穴在
臍下三寸
短氣不得語灸天井百壯穴在肘後兩筋間
又灸大椎隨年壯

又灸肺輸百壯
又灸肝輸百壯
又灸尺澤百壯
又灸小指第四指間交脉上七壯
又灸手十指頭合十壯
乏氣灸第五椎下隨年壯
少年房多短氣灸鳩尾頭五十壯
又塩灸臍孔中二七壯
論曰凡卒厥逆上氣氣攻兩脅心下痛滿奄奄欲絶此爲奔
豚氣即急作湯以浸兩手足數數易之
奔豚腹腫灸章門百壯章門一名長平二穴在大橫外直臍
季肋端
奔豚灸氣海百壯穴在臍下一寸半

又灸關元百壯穴在臍下三寸
奔豚搶心不得息灸中極五十壯中極一名玉泉在臍下四寸
奔豚上下腹中與腎相引痛灸中府百壯穴在乳上三肋間
奔豚灸期門百壯穴直兩乳下第二肋端傍一寸五分
奔豚上下灸四滿二七壯穴俠丹田兩傍相去三寸即心下
八寸臍下橫文是也

肺痿第六 論一首 方五首

論曰寸口脈數其人病欬口中反有濁唾涎沫出何也師曰
此為肺痿之病何從得之師曰病熱在上焦因欬為肺痿或
從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難數被駛藥
下重亡津液故得肺痿又寸口脈不出而反發汗陽脈早索
陰脈不澀三焦跡蹶入而不出陰脈不澀身體反冷其內反
煩多唾唇燥小便反難此為肺痿傷於津液便如爛瓜下如
豚腦但坐發汗故也其病欲欬不得欬欬出乾沫久久小便
不利其脈平弱肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺溺小
便數所以然者上虛不能制下故也此為肺中冷必眩師曰
肺痿欬唾咽燥欲者自愈自張口者短氣也
治肺痿多涎唾小便數肺中冷必眩不渴不欬上虛其下不
能制漉甘草乾薑湯以溫其藏服湯已小溫覆之若渴者屬
消渴法甘草乾薑湯方

甘草四兩　乾薑二兩

右二味㕮咀以水三升煮取一升半去滓分二服（集驗肘後有大棗十二枚）
治肺痿涎唾多出血心中溫溫液液甘草湯方（千金翼名溫液湯）

甘草二兩㕮咀以水三升煮取一升半去滓分三服
治肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴生薑甘草湯方

生薑五兩　甘草四兩　人參三兩　大棗十二枚

右四味㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服

治肺痿吐涎沫不止桂枝去芍藥加皂莢湯方

桂枝　生薑各三兩　甘草二兩　皂莢一枚炙　大棗十二枚

右五味㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服

治肺脹欬而上氣咽燥而喘脉浮者心下有水麻黃湯方

麻黃　芍藥　桂心各三兩　半夏五味子各半升　石膏四兩　生薑仲景用乾薑各三兩　細辛

右八味㕮咀以水一斗煮取三升分三服仲景名此為小青龍加石膏湯用甘草三兩為九味

肺癰第七　論一首　方五首

論曰病欬唾膿血其脉數實者屬肺癰虛者屬肺痿欬而口中自有津液舌上胎滑此為浮寒非肺痿若口中辟辟燥欬即胷中隱隱痛脉反滑數此為肺癰也問曰病者欬逆師脉之何以知為肺癰當有膿血吐之則死後竟吐膿死其脉何類何以別之師曰寸口脉微而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脉風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時時振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可救膿已成則難治寸口脉數跌陽脉緊寒熱相搏故振寒而欬跌陽脉浮緩胃氣如經此為肺癰師曰振寒發熱寸口脉滑而數其人飲食起居如故此為癰腫病醫反不知而以傷寒治之不應愈也何以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令膿在胷中者為肺癰其脉數欬唾有膿血久吐膿如粳米粥是為肺癰桔梗湯方

桔梗 三兩 集驗用二兩 古今録驗用一枚 甘草 二兩

右二味㕮咀以水三升煮取一升去滓分二服必吐膿血也 一方有款冬花一兩半

治肺癰喘不得卧葶藶大棗瀉肺湯方

葶藶 三兩 末之 大棗 二十枚

右二味先以水三升煮棗取二升去棗内藥一棗大煎取七合頓服令盡三日服一劑可服三四劑

治肺癰胷脅脹一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭欬逆上氣喘鳴迫塞葶藶大棗瀉肺湯主之用前方先服小青龍湯一劑乃進之小青龍湯方出第十八卷欬嗽篇中

治欬有微熱煩滿胷心甲錯是爲肺癰黄昏湯方

黄昏手掌大一片是合昏中皮也㕮咀以水三升煮取一升分二服

又方

葦莖 切二升以水二斗煮取五升去滓 薏苡仁 半升 瓜瓣 半升 桃人 三十枚

右四味㕮咀内葦汁中煮取二升服一升當有所見吐膿血

飛尸鬼疰第八 論一首 灸法十二首 方四十五首

論曰凡諸心腹痛服衆方執藥入腹寂然不動但益氣息急者此尸疰病也宜先服甘草汁一升消息少時服雚麥湯盡劑得下便覺寬也并暴癰堅結宿食及女人血堅痛發作無定者神良

五疰湯治卒中賊風遁尸鬼邪心腹刺痛大脹急方

大黄 甘草 酥各三兩 烏頭 十枚 生薑 當歸 芍藥 各二兩 蜜 一斤 桂心 四兩

右八味㕮咀别漬大黄以水九升煮取三升烏頭别内蜜中煎令得一升投湯中去滓分服三合如人行二十里久

更進一服日三不知加至四合
蜈蚣湯治惡疰邪氣往來心痛徹背或走入皮膚移動不定
苦熱四肢煩疼羸乏短氣方

蜈蚣一枚　牛黃一分　大黃二兩　丹砂
人參各三分　細辛　鬼臼　當歸
桂心　乾薑各二兩　黃芩　麝香半兩
附子四枚

右十三味㕮咀以水一斗煮取三升去滓下牛黃麝香末
分三服
治卒中惡賊風寒冷入腹便絞痛或飛尸遁尸發作無時搶
心脅滿脅痛如刀刺口禁者方

甘草　乾薑　茯苓
羊脂　當歸　乾地黃
細辛各一兩　芍藥

吳茱萸　桂心各二兩　梔子人十五枚
右十一味㕮咀以水八升煮取三升去滓內脂烊盡分三
服欲利者加大黃二兩
治卒中惡風角弓反張或飛尸遁尸心腹絞痛者方

茯苓　芍藥　甘草各二兩　桂心　當歸　乾地黃
吳茱萸　乾薑各一兩　梔子人十四枚
右十味㕮咀以水八升煮取三升分三服痛甚者加羊脂
三兩當歸人參芍藥各二兩心腹堅急加大黃三兩
桃皮湯治中惡氣心腹痛脅脹滿短氣方

桃白皮一握東引者　附子四兩各一　梔子人十四枚
當歸三兩　桂心二兩　吳茱萸五合
右八味㕮咀以水五升煮取二升去滓內眞朱末分作二

服一方無當歸以下四味
桃奴湯治中惡毒氣蠱疰心腹卒絞痛方
桃奴　當歸　人參　乾薑各二兩
芎藭　甘草各三兩　丹砂　麝香
茯苓　犀角　鬼箭羽　桂心各一兩
右十二味㕮咀以水九升煮取二升半去滓分三服未食
服大便不通腹滿者加大黃三兩芒消二兩胡治有雄黃一兩無丹砂芎藭
治卒中風寒冷溫氣入腹虛脹急滿搶心胷脅乂痛氣息不
通脉弦緊汗不出及得傷寒方
吳茱萸　當歸　麻黃　獨活
甘草　桔梗　茯苓各二兩　桂心
青木香　石膏　大黃　犀角各二兩
右十二味㕮咀以水九升煮取六升分三服日三

治風冷氣入腹忽然絞痛堅痛急如吹大小便閉小腹有氣
結如斗大脹滿起其脉弦老者沈遲方
瞿麥　當歸　鬼箭羽　猪苓
桔梗　防已　海藻　吳茱萸
芎藭各三兩　桂心　大黃各三兩
右十一味㕮咀以水九升煮取三升分三服亦可用犀角
二兩
治諸雜疰相連續死亦治三十年衆疰方
桃根白皮一斤㕮咀以水二斗煮取一斗去滓分八九服
二日服之令盡崔氏用桃根白皮治疰痛不可忍者
又方　擣桃人二七枚研酒服之
又方　小芥子末之雞子白和傳
尸疰鬼疰者即五尸之中尸疰又挾諸鬼邪爲害者也其變

動乃有三十六種至九十九種大略令人寒熱淋瀝沈沈嘿嘿不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後復注易傍人乃至滅門覺如此候者宜急療之方

獺肝一具陰乾治下篩水服一方寸匕日三如一具不差更作

小附著散治飛尸賊風發時急痛不在一處針則移發一日半日乃差須更復發方

細辛 天雄 甘草 桂心 烏頭 乾薑 雄黃 眞朱 各半兩

右九味治下篩酒服方寸匕不知稍增以知為度 胡洽有蜀椒四 分不用桂心附子

大附著散治五尸疰忤與前狀同方

黃芩 由跋 各一兩 麝香 牛黃 各一分 椒目 細辛 黃連 各一銖 眞朱 三分 蜈蚣 一枚

右十五味治下篩酒服一錢匕日三以知為度

大金牙散主一切疰方在第十二卷中

金牙散主鬼疰風邪鬼語尸疰或在腰脊肩膂流無常處不喜見人志意不定面目脫色目赤鼻張脣乾甲黃方

金牙一分 蜈蚣 蜥蜴 蜈蚣一枚 附子一枚 雄黃 大黃 甘草 各一兩 蛇蛻皮 露蜂房 野葛 芎藭 狼牙 人參 各四分 元青 徐長卿 各七枚 貝母二枚 鐵精 斑猫四枚 臭蚯 各十

曾青　眞珠　丹砂　蘭茹
乾漆各一分　桔梗　鬼臼　石長生
椒目　烏頭　狠毒　蕪荑
鬼督郵　鬼箭羽　藜蘆　狸骨一作鶴骨
雷丸　鼈甲　滑石各二分一作消石　毒公三分
石膏五分　寒水石　桂心各四分　牛黃
胡孎屎各三分

右四十五味治下篩先食以酒服一刀圭日再不知漸加之蟲隨大小便出崔氏名單牙散蜀

白朮散治風入藏腑悶絶常自躁痛或風疰入身冷疰鬼疰飛尸惡氣腫起或左或右或前或後或內或外針灸流移無有常處驚悸腹脹氣滿乂心頭痛或恍惚悲懼不能飲食或進或退陰下濕瘡或大便有血小便赤黃房中勞極方

白朮十四枚　附子　秦艽　人參
牡蠣　蜀椒　細辛　黃芩
芎藭　牛膝各三分　乾薑　桂心
防風各五分　茯苓　人參
獨活　柴胡各四分　桔梗　當歸
麻黃　石南　烏頭　甘草
天雄　杜仲各二分　莽草　栝樓根

右三十六味治下篩平旦酒服五分匕訖如人行七里久勢欲解更飲酒五合爲佳

太乙備急散治卒中惡客忤五尸入腹鬼刺鬼癰及中蠱症吐血下血及心腹卒痛腹滿傷寒熱毒病六七日方

雄黃　芫花各二兩　丹砂
桂心　巴豆各一分　野葛三分
蜀椒各一兩　藜蘆

附子 五分

右九味巴豆別治如脂餘合治下篩以巴豆合和更擣合和調置銅器中密貯之勿泄有急疾水服錢五匕可加至半錢匕老少半之病在頭當鼻衄在膈上吐在膈下利在四肢當汗出此之所爲如湯沃雪手下皆愈方宜秘之非賢不傳

龍牙散治百症邪氣飛尸萬病方

龍牙　茯苓 各二兩半　雄黃　棗膏
芍藥 各五分　乾地黃　石斛　胡燕屎 各三分
銅鏡鼻　甘草　橘皮　芎藭
鼈甲 各半兩　狸陰 二具　鬼督郵　遠志
蜈蚣 一枚　鬼箭羽　烏頭　羌活
露蜂房　曾青　眞珠　桂心
杏人　防風　桃奴　鬼臼
鸛骨 酪一　人參　大黃 各一兩半　蘇子 四合
白朮 二兩

右三十三味治下篩酒服一刀圭以知爲度當有蟲從便出

治鬼症蠱症毒氣變化無常方

鮫魚皮　犀角　麝香　丹砂
雄黃　蜈蚣　丁香　蘘荷根
鹿角　龍骨　蜀椒　乾薑 各一分
貝子 十枚

右十三味治下篩酒服方寸匕加至二匕日三

備急散主卒中惡風氣忤迷絕不知人方出第十二卷 三味備急丸是

治暴悶痛面無顏色欲死者方

以布裹鹽如彈丸大燒令赤置酒中消服之痢即愈

治蠱疰方

燒猫兒屎灰水服之用雄猫兒

治卒得惡疰腹脹墨奴丸方

釜下墨一合　鹽一合

右二味合治下以水一升半煮取八合一服使盡須臾吐下即差

治哭疰方

梳齒間刮取垢水服之

又方

臘月猪脂一合　亂髮一兩

右二味煎髮令消烊服之蟲死矣

又方　熬大豆帛裹熨之

治一切病食疰方

釜下土雞子大末之酢泔清一升和服行五十步吐即差

治凡食上得病名爲食疰方

還取本食種數多少相似各少許和合布裹燒灰取杏人

大水服之

鸛骨丸主遁尸飛尸積聚肉痛連背走無常處或在藏或腫在腹或奄奄然而痛方

鸛骨三寸　雄黄　莽草　丹砂一作丹參　牡蠣各四分一作牡丹　藜蘆　桂心　野葛各二分　斑猫十四枚去翅足　巴豆四十枚去皮心　蜈蚣一枚去頭足　芫青十四枚去翅足

右十二味末之蜜丸服如小豆大二丸日三以知爲度

蜥蜴丸主癥堅水腫蜚尸遁尸寒尸喪尸尸注骨血相注惡氣鬼忤蛄毒邪氣往來夢寤存亡流飲結積虎狼所齧痢犬所咋鴆毒入人五藏服藥以殺其毒毒即消婦人邪鬼忤亦

能遣之方

蜥蜴二枚　地膽五十枚　蜚蠊十四枚　蚤虫三十枚　芍藥五分　虎骨六分　犀角二分　巴豆七分　甘遂五分　桑赤雞二分　款冬花三分　蜈蚣二枚　杏人三十枚　蜚虻四十枚　朴消七分　澤漆二分　甘草一兩　桃奴二分　鬼督郵二分　乾薑四分　附子各二兩　藜蘆三分　皂莢　巴豆

右五味末之蜜和擣萬杵宿不食旦起飲服二丸如梧子大仰卧服勿眠至食時腸上吐腸下去惡物如科斗蝦蟇子或長一二尺下後當大虛口乾可作雞羹飲五合大極飲一升食粥三四日病未盡更服忌如藥法

十疰丸主十種疰氣疰勞疰鬼疰冷疰生人疰死人疰尸疰食疰水疰土疰等方

雄黃　巴豆各二兩　細辛一作蓁本　桔梗　附子　皂莢　蜀椒　麥門冬各兩　太一神明酒冰丸主諸病破積聚心下支滿寒熱鬼疰長病

右十味末之蜜丸空腹服如梧子大五丸日二稍加以知效逆唾噫辟除衆惡鬼逐邪氣鬼擊客忤中惡胷中結氣咽中閉塞有進有退繞臍絞痛惻惻隨上下按之挑手心中愠

慍如有虫狀毒注相染滅門方

雄黃二兩　元青五枚　桂心二兩　眞珠一兩半
麝香　人參　附子一兩半　蜈蚣一枚
射罔一兩　丹砂二兩　烏頭八枚　杏人三十枚
藜蘆　礬石各二兩作礬石　蜥蜴一枚　斑猫七枚
牛黃一兩　當歸三兩　樗雞七枚　地膽七枚
右二十四味末之以蜜和擣三萬杵丸如小豆大先食服二丸日再不知稍增以藥二丸著門上令衆邪不近傷寒服之無不愈若至病家及視病人夜行獨宿服二丸衆鬼不能近也胡洽無元青桂心真珠麝香入參犀角烏頭射罔蜥蜴蜴牛黃當歸只十二味与積聚篇重

汗出口噤不開心痛方

蜀椒三兩　人參　細辛　甘草各二兩
茯苓　眞珠　大黃　乾薑
丹砂　野葛　桂心　雄黃
鬼臼　麝香各一兩　烏頭　牛黃各三分
附子　紫菀各六分　巴豆六十枚　蜈蚣二枚
右二十味末之蜜丸飲服小豆大二丸加至四丸日一加
大度世丸主萬病與前狀同方
牛黃　大黃　雄黃　細辛
附子　眞珠　甘草　人參
射罔　丹砂　鬼臼　莽草各一兩
蜀椒　麝香　鬼箭羽　茯苓

桂心　紫菀各二兩
蜥蜴　蜈蚣各一枚
元青二十枚　樗雞二十枚
右二十六味末之蜜丸以飲服如小豆三九日三先食服之
治疰病相染易及霍亂中惡小兒客忤長病方
獺肝一具　雄黃
鬼臼　犀角
大黃　牛黃各一兩
右十一味末之蜜丸空腹服如麻子大三丸加至三丸以
知爲度
雷氏千金丸主行諸氣宿食不消飲實中惡心腹痛如刺及
瘧方
大黃五分　巴豆人六十枚
桂心　乾薑各三兩
野葛一尺　巴豆人八十枚
地膽五十枚

消石三分
右五味末之蜜丸擣三千杵服如大豆二丸神驗無比已
死者折齒灌之
治卒得尸疰毒痛往來方
亂髮灰　杏人
右二味等分研如脂酒服梧子三丸日三姚氏以猪膏和丸
治遁尸尸疰心腹刺痛不可忍者方
桂心　乾薑各一兩　巴豆人二兩
右三味治下篩以上酢和如泥傳病上乾即易之
芥子薄主遁尸飛尸又主暴風毒腫流入四肢頭面方
白芥子一升蒸熟擣以黃丹二兩攪之分作兩分疎布袋
盛之更蒸使熱以薄痛上當更迭蒸袋常使熱薄之如此
三五度即定

治遁尸疰心腹及身有痛處不得近方

取艾小挼令碎著痛上厚一寸餘熱湯和灰令強熱置艾上冷即易不過二三度差

治人皮膚中痛名曰癥疰方

醋和鷰窠土傅之

治走疰方

燒車釭令熱暫入水以濕布裹熨病上

治三十年氣疰方

豉心半升　生椒一合

右二味以水二升煮取半升適寒温用竹筒縮取汁令病者側卧手擘大孔射灌之少時當出惡物此法垂死悉治得差百千不可具說

凡五尸者飛尸遁尸風尸沈尸尸疰也今皆取二方兼治之

其狀腹痛脹急不得氣息上衝心肖傍攻兩脅或纍纍塊踊起或攣引腰背治之法灸乳後三寸男左女右可二七壯不止者多其壯取愈止

又灸兩手大拇指頭各七壯

又灸心下三寸十壯

又灸乳下一寸隨病左右多其壯數

又以細繩量患人兩乳頭內即裁斷中屈之又從乳頭向外量使當肋鋜於繩頭灸三壯或七壯男左女右

卒疰忤攻心肖灸第七椎隨年壯

又灸心下一寸三壯

又灸手肘文隨年壯

一切病食疰灸手小指頭隨年壯男左女右

五毒疰不能飲食百病灸心下三寸胃管十壯

金澤文庫

水疽口中涌水經云肺乘腎食後吐水炎肺輸又炎三陰交又炎期門期門在乳下二肋間瀉肺補腎也各隨年壯可至三百壯又治諸氣神良一名注市

備急千金要方卷第十七

金澤文庫

朝奉郎守太常少卿充秘閣校理判登聞檢院上護軍賜緋魚袋臣林億等校正

大腸腑脉論第一

大腸虛實第二

肛門論第三

皮虛實第四

欬嗽第五

痰飲第六

九蟲第七 附濕蟨

大腸腑脉論第一

論曰大腸腑者主肺也鼻柱中央是其候也肺合氣於大腸大腸者爲行道傳寫之腑也號監倉掾重三斤十二兩長一丈二尺廣六寸當臍右回疊積還反十二曲貯水穀一斗二

外主十二時定血脉和利精神千金明堂外臺同難經云長一尺六寸半十六曲盛穀二升水七升煮取三升去滓分温三服外臺云長一丈一尺大四寸徑一寸之半鼻遂以候大腸

右手關前寸口陽絶者無大腸脉也苦少氣心下有水氣立秩節即欬刺手大陰治陰在魚際間

右手關前寸口陽實者大腸實也苦腸中切痛如針刀所刺無休息時刺手陽明治陽在手腕中瀉之

大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感于寒則泄當臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉

腸中雷鳴氣上衝胷喘不能久立邪在大腸刺肓之原巨虛上廉三里

大腸脹者腸鳴而痛寒則泄食不化

大腸有寒熱溏有熱便腸垢

大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧狀

肺前受病移於大腸肺欬不已欬則遺失便利厥氣客於大腸則夢田野

肺應皮皮厚者大腸厚皮薄者大腸薄皮緩腹裏大者大腸緩而長皮急者大腸急而短皮滑者大腸直皮肉不相離者大腸結

扁鵲云手太陰與陽明爲表裏大腸若病實則傷熱熱則脹滿不通口爲生瘡食下入腸腸實而胃虛乍來乍去虛則傷寒寒則腸中雷鳴泄青白之利而發於氣水根在大腸方在治水篇中

大腸絶不治何以知之泄利無度利絶則死

手陽明之脉起於大指次指之端外側循指上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉上入肘外廉循臑外前廉上肩出髃骨之前廉上出柱骨之會上下入缺盆絡肺下膈

屬大腸其支者從缺盆直而上頸貫頰入下齒縫中還出俠口交人中左之右右之左上俠鼻孔是動則病齒痛頰腫是主津所生病者目黃口乾鼽衄喉痺耳前膚痛大指次指痛不用氣盛有餘則當脉所過者熱腫虛則寒慄不復盛者則人迎大三倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

大腸虛實第二 脉法七條 方二首

大腸實熱

右手寸口氣口以前脉陽實者手陽明經也病苦腸滿善喘欬面赤身熱喉咽中如核狀名曰大腸實熱也治大腸實熱腹脹不通口爲生瘡者生薑泄腸湯方

生薑 橘皮 梔子人 白朮 各二兩 芒消 各三兩 生地黃汁 黃芩 桂心 各一兩 茯苓 大棗十四枚

右十一味㕮咀以水七升煮取三升去滓下芒消分二服大腸中臚脹不消灸大腸輸四十九壯

大腸有熱腸鳴腹滿俠臍痛食不化喘不能久立巨虛上廉主之

大腸虛冷

右手寸口氣口以前脉陽虛者手陽明經也病苦脅中喘腸鳴虛渴脣乾目急善驚泄皆名曰大腸虛冷也治大腸虛冷痢下青白腸中雷鳴相逐黃連補湯方

黃連 四兩 茯苓 地榆 五兩 伏龍肝 雞子大一枚

右六味㕮咀以水七升煮取三升半去滓下伏龍肝末分三服

腸中雷鳴相逐痢下灸承滿五十壯穴在俠巨闕相去五寸

巨闕在心下一寸灸之者俠巨闕兩邊各三寸半
食飲不下腹中雷鳴大便不節小便赤黃陽網主之
腹脹腸鳴氣上衝胷不能久立腹中痛濯濯冬日重感於寒
則泄當臍而痛腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身腫俠臍
急天樞主之
腸中常鳴時上衝心炎臍中
腸鳴而痛温留主之

肛門論第三

論曰肛門者主大行道肺大腸候也號為通事令史重十二
兩長一尺二寸廣三寸二分應十二時若藏傷熱則肛門閉
塞大行不通或腫縮入生瘡若腑傷寒則肛門開大行洞寫
肛門凸出良久乃入熱則通之寒則補之虛實和平依經調
之方在第二十四卷中

皮虛實第四論一首方二首

論曰夫五藏六腑者內應骨髓外合皮毛膚肉若病從外生
則皮毛膚肉關格強急若病從內發則骨髓痛疼然陰陽表
裏外皮內髓其病源不可不詳之也皮虛者寒皮實者熱凡
皮虛實之應主于肺大腸其病發於皮毛熱則應藏寒則應腑
治皮虛主大腸病寒氣關格葫蕫蒲葉湯方

葫蕫根葉切三升　昌蒲葉切二升　桃葉皮枝剉三升
細糠一斗　秫米三升

右五味以水一石五斗煮取米熟為度大盆器貯之於盆
上作小竹牀子單盆人身坐牀中四面周迴將薄障風
身上以衣被羞覆若氣急時開孔對中泄氣取通身接汗
可得兩食久許如此三日蒸還温藥足汁用之若盆裏不
過熱盆下安炭火非但治寒但是皮膚一切勞冷悉皆治之

治皮實主肺病熱氣梔子煎方

梔子人　枳實　大青　杏人

柴胡　芒消　生地黃　淡竹葉　切各一升

生玄參五兩　石膏八兩

右十味㕮咀以水九升煮取三升去滓下芒消分為三服

欬嗽第五　論二首　證七條　方六十首　灸法十四首

論曰經云五藏六腑皆令欬肺居外而近上合於皮毛皮毛喜受邪故肺獨易為欬也邪客於肺則寒熱上氣喘汗出欬動肩背喉鳴甚則唾血肺欬經久不已傳入大腸其狀欬則遺矢失氣甚則遺尿肝欬者其狀左脇痛甚者不得轉側肝欬經久不已傳入膽其狀欬則清苦汁出心欬者其狀引心痛喉中介介如梗甚者喉痺咽腫心欬經久不已傳入小腸其狀欬則失氣脾欬者其狀右脇痛陰陰引肩背甚者不得動動則欬劇經久不已傳入胃其狀欬而嘔嘔甚則長蟲出久欬不已三焦受之三焦欬之狀欬而面浮腫氣逆也右順時有風聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也右順時有風寒冷人觸冒解脫傷皮毛間入腑藏為欬上氣如此也有非時忽然暴寒傷皮膚中與肺合則欬嗽上氣或胃脇支痛欬唾有血者是其熱得非時之寒暴薄之不得漸散伏結深喜肺癰也因欬服溫藥欬九劇及壯熱吐膿血汗出惡寒是也

天有非時寒者急看四時方也

問曰欬病有十何謂也師曰有風欬有寒欬有支欬有肝欬有心欬有脾欬有肺欬有腎欬有膽欬有厥陰欬問曰十欬之證以何為異師曰欲語因欬言不得音謂之風欬飲冷食寒因之而欬謂之寒欬心下堅滿欬則支痛其脉反遲謂之支

欬欬則引脇下痛謂之肝欬欬而嘔血引手少陰謂之心欬欬而涎出續續不止引少腹謂之脾欬欬引頸項而嘔涎沫痛口苦謂之膽欬欬而引腰并臍中謂之腎欬欬而引頭寒欬支欬肝欬刺足太衝心欬刺手神門脾欬刺足太白肺欬刺手太泉腎欬刺足太谿胃欬刺足陽陵泉厥陰欬刺手太陵

夫久欬為疹欬而時發熱脉在九菽一作卒弦者非虛也此為腎中寒實所致也當吐之

夫欬家其脉弦欲行咳藥當相人強弱而無熱乃可吐耳

欬家其人脉弦為有水可與十棗湯下之方見下不能卧出者陰不受邪故也留飲欬者其人欬不得卧引項上痛欬者如小兒掣縱狀夫酒客欬者必致吐血此坐久極飲過度所致也其脉數有熱者可治實大數者死其脉虛者必善冒其人本有支飲在胷中故也治屬飲家上氣汗出而欬屬飲家欬而小便利若失溺不可發汗汗出即厥逆冷

夫病吐血喘欬上氣其脉數有熱不得卧者死寒家欬而上氣其脉數者死謂其人形損故也脉大而散散者為氣實血虛名曰有表無裏上氣面腑欲作風水發汗愈尤甚上氣躁而喘者屬肺脹欬逆倚息不得卧小青龍湯主之方

麻黃　芍藥　乾薑　甘草炙　五味子　半夏洗　細辛　桂心

右八味咬咀以水一斗先煮麻黃減二升去上沫乃內諸藥煮取三升去滓分三服弱者服半升若渴去半夏加栝

婁根三兩若微痢去麻薑黃加
去麻黃加附子一枚若小便不利小腹滿者去麻黃加茯
苓四兩若喘者去麻黃加杏人半升
青龍湯下已多唾口燥寸脉沈尺脉微手足厥冷氣從少腹
上衝胷咽手足痺其面翕熱如醉狀因復下流陰股小便難
時復自者與茯苓桂心甘草五味子湯治其氣衝方

茯苓四兩　桂心　甘草三兩　五味子半升

右四味㕮咀以水八升煮取三升去滓分温三服
衝氣即低而反更劇自滿者用茯苓甘草五味子去桂加乾
薑細辛以治其劇滿方

茯苓四兩　甘草　乾薑　細辛各三兩　五味子半升

右五味㕮咀以水八升煮取三升去滓温服半升日三
劇滿即止而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑為執病藥
之當遂渴而渴反止者為支飲也支飲法當冒冒者必嘔嘔
者復內半夏以去其水方

半夏半升　茯苓四兩　細辛　乾薑各三兩　甘草半升

右六味㕮咀以水八升煮取三升去滓温服半升日三服
水去嘔止其人形腫者應內麻黃以其人遂痺故不內麻黃
內杏人方

杏人半升　細辛　乾薑各三兩　甘草　五味子各半升　茯苓四兩

右七味㕮咀以水一斗煮取三升去滓温服半升日三若
逆而內麻黃者其人必厥所以然者以其人血虛麻黃發

其陽故也

若面熱如醉此爲胃熱上衝熏耳面加大黃利之方

大黃 乾薑 茯苓四兩 五味子 半夏 杏人各半升 細辛 甘草各三兩

右八味㕮咀以水一斗煮取三升去滓温服半升日三

欬而上氣肺脹其脉浮心下有水氣脇下痛引缺盆設若有實者必躁其人常倚伏小青龍加石膏湯主之方

石膏 乾薑 芍藥 甘草各三兩 五味子 半夏 細辛各二兩 桂心 麻黃四兩

右九味㕮咀以水一斗先煮麻黃減二升下藥煮取二升半強人服一升羸人減之小兒四合 仲景用治肺脹欬而上氣煩躁而喘脉浮者心下有水外臺同

夫上氣其脉沈者澤瀉湯方

澤瀉 三斤 細切以東流水五斗煮取一斗五升去滓澄清 半夏半升 紫菀一作紫參 生薑 白前各五兩 甘草 黃芩 桂心 人參各三兩

右九味㕮咀內澤瀉汁中煮取五升一服五合日三夜一

大逆上氣咽喉不利止逆下氣麥門冬湯方

麥門冬升汁三升半夏升 粳米二合 大棗枚干

右六味㕮咀以水一斗二升煮取六升去滓服半升日三夜一

欬而上氣喉中如水雞聲射干麻黃湯主之方

射干 紫菀 細辛三兩 半夏 大棗枚 五味子 半夏各半升 麻黃 生薑各四兩 欬冬花各三兩

右九味㕮咀以東流水一斗二升先煮麻黃去上沫內藥煮取三升去滓分三服日三

欬而大逆上氣胸滿喉中不利如水鷄聲其脉浮者厚朴麻黄湯方

厚朴 五兩　麻黄 四兩　細辛 乾薑各三兩　石膏 三兩　杏人 半夏 五味子 各半升　小麥一升

右九味㕮咀以水一斗二升煮小麥熟去滓內藥煮取三升去滓分三服日三

治上氣胸滿者麻黄石膏湯方

麻黄 四兩　石膏 雞子大 一枚　小麥一升　杏人半升　厚朴 五兩

右五味㕮咀以水一斗先煮小麥熟去之下藥煮取三升去滓分三服深師方用治久逆上氣唉中如水雞鳴名小投杯湯欬者加五味子半夏各半升乾薑三累

欬逆上氣時時唾濁但坐不得臥皂莢丸元方

皂莢八兩末之蜜和丸如梧子大以棗膏和湯服三丸日三夜一必效以酥炙皂莢

夫有支飲家欬煩胸中痛者不卒死至一百日一歲可與十棗湯方

甘遂　大戟　芫花 各等分

右三味擣爲末以水一升五合煮大棗十枚取八合去滓內藥末強人一錢匕羸人半錢頓服之平旦服而不下者明旦更加藥半錢下後自補養

欬而引脇下痛者亦十棗湯主之用前方

食飽而欬温脾湯主之方

甘草 四兩　大棗 二十枚

右二味㕮咀以水五升煮取二升分三服温服之若因中痛聲鳴者加乾薑三兩

治嗽日夜不得臥兩眼突出百部根湯方

百部根 生薑 各半斤細辛　甘草 各三兩　貝母

白朮　五味子　各二兩　桂心　四兩　麻黃　六兩
右九味㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服古今錄驗
用杏人四兩紫菀三兩
欬而下利肖中痞而短氣心中時悸四肢不欲動手足煩不欲食眉脊痛時惡寒海藻湯主之方
海藻　四兩　半夏　五味子　各半升　細辛　二兩
杏人　五十枚　生薑一兩　茯苓　六兩
右七味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三一方
白前湯治水欬逆上氣身躭腫短氣脹滿晝夜倚壁不得臥咽中作水雞鳴方
白前　紫菀　半夏　大棗　各二兩
右四味㕮咀以水一斗浸一宿明旦煮取三升分三服

治九種氣噉欲死百病方
乾薑　細辛　紫菀
吳茱萸　半夏　莞花一作芫花、茯苓　甘草
甘遂　防葵　人參
大黃　杏人　各二分　葶藶　二分　烏頭
厚朴　各三分　五味子　遠志
白薇　各三分　巴豆
前胡　昌蒲　枳實　蜀椒
皂莢　當歸　大棗　桂心　各半分
右二十八味末之蜜丸先食服如梧子大二九日三服以知爲度不知增之
麻黃散主上氣噉欬方
麻黃　半斤　杏人　十枚　甘草　三兩　桂心　一兩
右四味治下篩別研杏人如脂內藥末和合臨氣上時服

一方寸匕食久氣未下更服一方寸匕日至三匕氣發便
服即止一方去桂心甘草
太醫令王叔和所撰御服甚良蜀椒丸治上氣欬嗽方
蜀椒五分　杏人　昌浦
皂莢　礬石各一分一云攀石　細辛
紫宛　乾薑各三分　吳茱萸　款冬花
右十二味末之蜜丸暮臥吞二丸如梧子治二十年欬不
過三十丸
通氣丸主久上氣欬嗽咽中腥臭虛氣攪心痛冷痰耳中嘈
嘈風邪毒注時氣食不生肌膚中閉塞嘔逆多唾惡心心下
堅滿飲多食少惡疰淋痛病方
飴糖三斤　蜀椒二升　烏頭七分　桂心六分
乾薑　人參各四分　杏人一升　天門冬十分

蜈蚣五節　大附子一枚
右十味末之別治杏人如脂稍內藥末擣千杵烊糖乃
內藥末中令調和含如半棗一枚日六七夜三四服以腎
中溫爲度若夢與鬼交通及飲食者全用蜈蚣食不消加
杏人五合少腹急腰痛加天門冬杜仲有風加烏頭三枚
附子一枚立夏後勿加也有留飲加葶藶一兩
治欬嗽上氣方
麥門冬十分　昆布
細辛各六分　海蛤
右八味末之蜜丸飲服如梧子十九加至二十九日三服
有人風虛中冷胷中滿上氣喉中如吹管聲吸吸氣上欲
欬服此方得差
治欬嗽胷脇支滿多唾上氣方
海藻　乾薑
蜀椒　桂心各四分

蜀椒五合　乾薑薑各三分　吳茱萸四分　款冬花
紫菀　杏人各三分　細辛　烏頭一方不用　昌蒲各一分
礬石一作礬石　黃環各二分
右十一味末之蜜丸著牙上一丸如梧子咽汁日五六服
劇者常含不止

又方
酒一升半浸肥皂莢兩挺經宿煮取半升分三服七日忌如藥法若吐多以酢飯三四口止之

又方
薑汁一升半　沙糖五合
右二味煎薑汁減半內糖更煎服之

又方
白糖五合　皂莢捶末方寸匕

右二味先微煖糖令消內皂莢末合和相得先食服如小豆二九

又方
巴豆炮去皮勿傷破肉白飲吞之初日二枚三日三枚
又方　服豆子七九以油漉酒下之

射干煎治嗽喘氣方
生射干　款冬花各二兩　紫菀　細辛
桑白皮　附子　甘草各三分　飴糖五兩
生薑汁一升二云乾姜三兩白蜜外一　竹瀝外一
右十一味以射干先內白蜜并竹瀝中煎五六沸去之次內沒一宿煎之七上七下去滓乃合飴
薑汁煎如餳服如酸棗一丸日三劇者夜二不知加之以知爲度

治冷嗽上氣皐中不利杏人煎方

杏人 五合 五味子 款冬花 各三兩 紫菀 二兩
甘草 四兩 乾薑 二兩 桂心 二兩 麻黃 一斤

右八味以水一斗煮麻黃取四升治末諸藥又內膠飴半斤白蜜一斤合內汁中攪令相得煎如飴先食服如半棗大日三服不知加之以知爲度

治上氣欬嗽蘇子煎方

蘇子 白蜜 生薑汁 地黃汁 杏人 各二升

右五味擣蘇子以地黃汁薑汁澆之以絹絞取汁更擣以汁澆又絞令味盡去滓杏人令黃黑治如脂又以向汁澆之絹絞往來六七度令味盡去滓內蜜合和置銅器中於湯上煎之令如飴一服方寸匕日三夜一 崔氏無地黃汁

又方 乾薑 三兩炙之 膠飴 一斤

右二味和令調蒸五升米下冷以棗大含稍稍咽之日五夜三

治忽暴嗽失聲語不出杏人煎方

杏人 蜜 沙糖 薑汁 各一升 桑根白皮 五兩

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓內杏人脂薑汁蜜糖和攪微火煎取四升初服三合日再夜一稍稍加之

通聲膏方

五味子 通草 款冬花 各三兩 人參 細辛 桂心 紫菀 各二兩 青竹皮 昌蒲 各二兩 酥 五升 棗膏 三升 白蜜 二升 杏人 薑汁 各一升

右十三味㕮咀以水五升微火煎三上三下去滓內薑汁

棗膏酥蜜煎令調和酒服棗大二九

治暴熱嗽杏人飲子方

杏人四十枚　柴胡四兩　紫蘇子一升　橘皮一兩

右四味㕮咀以水一斗煮取三升分三服常作飲服

芫花煎治新久嗽方

芫花　乾薑格二兩　白蜜一升

右三味末之內蜜中令相和微火煎令如糜欲痢者多服深師以治冷飲嗽又治三十年嗽者

一枚日三夜一以知為度

以水五升煮芫花取三升去滓內薑加蜜合煎如糜服之去

治新久嗽款冬煎方

款冬花　乾薑　紫菀　各三兩

五味子二兩　芫花一兩熬

右五味㕮咀先以水一斗煮三味取三升半去滓內芫花令赤

乾薑末加蜜三升合投湯中令調於銅器中微火煎令如糖一服半棗許日三

治三十年欬嗽或飲或欬寒氣嗽雖不同悉主之方

細辛　款冬花　紫菀　各三兩　蔊薑二兩　蜀椒五合　防風

右六味㕮咀取蔊薑先著銅器中次紫菀次細辛次款冬次半棗不知明旦服一枚以肖次椒以大棗百枚間著諸藥間以水一斗二升微火煮令汁盡出棗暴令燥雞鳴時取半棗藥藥勢靜乃食不爾令人吐不已中溫溫為度若強人欲嗽吐者可小增服之便吐膿囊裹結吐後勿冷飲食欬愈止

治三十年嗽方

百部根二十斤擣取汁煎如飴服一方寸匕日三服

外臺和飴一斤煎成煎以點摩飲調下深師白蜜二斤煎五六沸服三合

治三十年欬嗽方

白蜜一斤　生薑二斤取汁

右二味先秤銅銚知斤兩訖內蜜復秤知數次內薑汁以微火煎令薑汁盡惟有蜜斤兩在止旦服如棗大舍一丸日三服禁一切雜食

治三十年嗽方

紫菀二兩　款冬花二兩

右二味治下篩先食以飲服一方寸匕日三服七日差

治久嗽不差方

兎屎四十九枚　胡桐律分一　硇砂二分

右三味末之蜜和服如梧子大三丸以粥飲下日三吐令物盡即差

治積年欬嗽喉中呼聲一發不得坐卧方

紫菀　桑根白皮　貝母　半夏

五味子　射干　百部各五分　款冬花

皂莢　乾薑　橘皮　鬼督郵

細辛各四分　杏人　白石英各八分　蜈蚣二枚

右十六味末之蜜丸飲服十九如梧子大日再稍加至二十九（崔氏無半夏射干乾薑橘皮鬼督郵細辛白石英用麻黃二兩半以煮棗湯送之）

款冬丸治三十年上氣嗽欬唾膿血喘息不得卧方

款冬花　乾薑　蜀椒　吳茱萸

桂心　菖蒲各三分　人參　細辛

蒉花　紫菀　甘草　桔梗

防風　芫花　茯苓　皂莢各三分

右十六味末之蜜丸酒服如梧子三丸日三

又方

款冬花　紫菀
防風　芎藭
蜾本　甘草
半夏　天雄
桂心　麻黃各三兩
大棗二十五枚　芫花
右三十四味末之蜜丸酒服如梧子大三十丸日二服不
知加之酒漬服亦得
又方
蜀椒五合　吳茱萸六合　款冬花
桂心　紫菀各三分　乾薑
礬石一作礬石　菖蒲　烏頭各一分　細辛二分
右十二味末之蜜丸以酒服如梧子大五丸日三夜一二

十年嗽不過五十日愈患欬嗽喉鳴上氣服一劑永差
治肺傷欬唾膿血腸澼胃氣不能食惡風目暗眩流眶寒方
白膠五兩　乾地黃切一升　桂心二兩　桑白皮切二升
芎藭　大麻人　飴糖各一升　紫菀二兩
大棗二十枚　人參二兩　大麥二升　生薑五兩
右十二味以水一斗五升煮麥取一斗去麥下藥煮
取三升分五服
治唾中有膿血奎肖脇痛五味子湯方
五味子　桔梗　紫菀　甘草
續斷各二兩　地黃　桑根白皮各五兩
竹茹三兩　赤小豆一升
右九味以水九升煮取二升七合分為三服
竹皮湯治欬逆下血不息方

生竹皮三兩　紫菀二兩　飴糖一斤　生地黃一斤切
右四味㕮咀以水六升煮取三升去滓分三服

百部丸治諸嗽不得氣息唾膿血方

百部根三兩　外麻皮三兩　桂心　五味子
甘草　紫菀　乾薑各一兩
右七味末之蜜和服如梧子大三九日三以知為度

治上氣欬嗽喘息喉中有物唾血方

杏人　生薑汁各三合　糖　蜜各一合　猪膏一合
右五味先以猪膏煎杏人黃出之以紙拭令淨擣如膏各薑汁蜜糖等合煎令可丸服如杏核一枚日夜六七服漸漸加之

治一切肺病欬嗽膿血及唾血不止方

好酥三十斤三徧鍊停取凝當出醍醐服合旦三

服差止一切藥皆不出此神方

又方　三鍊酥如雞子黃適寒溫灌鼻中日再夜一吸散治寒冷欬嗽上氣胸滿唾膿血鍾乳七星散方

鍾乳　礬石　欵冬花　桂心各等分

右四味治下篩作如大豆七聚七星形以小筒吸取酒送之先食服之日三不知加之數試大驗又云臨井吸服之

又方

細辛　天雄　紫菀　石膏
鍾乳　欵冬花各等分
右六味治下篩取如大豆七聚如前吸之日二只得食粥七日嗽愈乃止若大豆聚不知小益之勿大多

治三十年欬嗽七星散方

桑根白皮　欵冬花　紫菀　代赭

細辛　伏龍肝

右六味治下篩作七星聚聚如蒴豆者以竹筒口當藥上一一吸咽之令藥入腹中先食日三元服四日日復作七星聚以一臠肉炙令熟送以轉展藥聚上令藥悉徧在肉上仰卧咀嚼肉細細咽汁令藥力散散割割然毒氣入咽中藥力盡摠咽即取差止未差作之如初羊牛鹿肉皆可勿用猪肉

治嗽熏法

以熟艾薄薄布紙上紙廣四寸後以硫黃末薄布艾上務令調勻竝狹一枚如紙長卷之作十枚先以火燒纔下去荻煙從孔出口吸煙咽之取吐止明旦復熏之如前日一二止自然差得食白粥餘皆息之恐是熏黃如硫黃見火必焰矣

又方

熏黃研令細一兩以蠟紙并上熏黃令與蠟相入調勻卷之如前法熏之亦如上法日一二止以吐為度七日將息後以羊肉羹補之

又方

爛青布廣四寸布上布艾艾上布青縑末縑上布少熏黃末又布少豉末急卷之燒令著內燥鏹中以紙蒙頭更作一小孔口吸取煙細細咽之以盡為度若心胸悶時略歇煙盡止日一二用三卷不盡差三七日愼油膩

論曰凡上氣多有服吐藥得差亦有針灸得除者宜深觧悟之嗽多兩乳下黑白際各百壯即差又以蒲當乳頭周匝圍身令前後正平當脊骨解中灸十壯

又以繩橫量口中折繩從春灸繩兩頭邊各八十壯三報之
三日畢兩邊者是口合度
灸從大椎數下行第五節下宛宛中間隨年壯并主氣壯即神道穴
上氣欬嗽短氣滿食不下灸肺募五十壯
上氣欬逆短氣風勞百病灸肩井二百壯
上氣短氣欬逆胃脘痛灸風門熱府百壯
上氣欬逆短氣胃滿多唾唾惡冷痰灸肺輸五十壯
上氣氣閉欬逆咽冷聲破唉猜猜灸天瞿五十壯一名天突
上氣胃滿短氣欬逆灸雲門五十壯
上氣欬逆胃痺背痛灸胃堂百壯不針
上氣欬逆灸亶中五十壯
上氣欬逆胃痛灸巨闕期門各五十壯
嗽灸手屈臂中有橫文外骨捻頭得痛處十四壯良

逆氣虛勞寒損憂恚筋骨寧痛心中欬逆泄注腹滿喉痺
頸項強腸痔逆氣痔血陰急鼻衄骨痛大小便澀鼻中乾煩
滿狂走易氣凡二十二病皆灸絕骨五十壯穴在外踝上三
寸宛宛中

痰飲第六 論一首 方四十一首

論曰夫飲有四何謂師曰有痰飲有懸飲有溢飲有支飲問
曰四飲之證何以為異師曰其人素盛今瘦水走腸間瀝瀝
有聲謂之痰飲飲後水流在脇下欬唾引痛謂之懸飲飲水
過多水行歸於四肢當汗出而汗不出身躰疼重謂之溢飲
其人欬逆倚息短氣不得臥其形如腫謂之支飲
凡心下有水者築築而悸短氣而恐其人眩而癲先寒即為
虛先熱即為實故水在於心其人心下堅築築短氣惡水而
不欲飲水在於肺其人吐涎沫欲飲水水在於脾其人少氣

身躰盡重水在於肝脇下支滿嗌而痛水在於腎心下悸
夫病人卒飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則
悸微者短氣脉雙弦者寒也皆大下後喜虛亘脉偏弦者飲
也肺飲不弦但喜喘短氣支飲亦喘而不能眠加短氣其脉
平也留飲形不發作無熱脉微煩滿不能食脉沈滑者留飲
病病有留飲者脇下痛引缺盆嗽轉甚其人欬而不得卧引
項上痛欬者如小兒掣瘛狀夫肖中有留飲其人短氣而渴
四肢歷節痛其脉沈者有留飲也心下有留飲其人背寒冷
大如手病人肖息上引此皆有溢飲在肖中久者缺盆滿馬
刀腫有劇時此為氣飲所致也膈上之病滿喘欬吐發則寒
熱背痛惡寒自泣自出其人振振身瞤劇必有伏飲病人一
臂不隨時復轉移在一臂其脉沈細此非風也必有飲在上
焦其脉虛者為微勞榮衛氣不周故也冬自差一本作久

病痰飲者當以温藥和之
病心腹虛冷遊痰氣上肖脇滿不下食嘔逆肖中冷者小半
夏湯主之方

半夏一升外　生薑斤

右三味㕮咀以水一斗煮取三升分三服若心中急及心
痛內桂心四兩若腹滿痛內當歸三兩羸弱及老人尤宜
服之一方用人參二兩

又方

半夏一升外　生薑斤　桂心三兩　甘草一兩　橘皮四兩

右四味㕮咀以水七升煮取二升半分三服
心下痰飲肖脇支滿目眩甘草湯主之方

甘草二兩　桂心　白朮各三兩　茯苓四兩

右四味㕮咀以水六升宿漬煮取三升去滓服一升日三

小便當利

病懸飲者十棗湯主之方在痰嗽篇中上氣汗出而痰者此為飲也十棗湯主之若下後不可與也

病溢飲者當發其汗小青龍湯主之方在痰嗽篇中(泡汗用大青龍湯)

膈間有支飲其人喘滿心下痞堅面黧黑其脈沈緊得之數十日醫吐下之不愈木防已湯主之方

木防已(三兩) 桂心(二兩) 人參(四兩) 石膏(雞子大十二枚)

右四味咬咀以水六升煮取二升分二服虛者即愈實者三日復發發則復與若不愈去石膏加茯苓四兩共消三合以水六升煮取二升去滓下消令烊分二服微下利即愈一方不加茯苓

夫酒客欬者必致吐血此坐久飲過度所致也其脉虛者必冒其人本有支飲在胸中也支飲胸滿厚朴大黃湯主之方

厚朴(尺一) 大黃(六兩) 枳實(四枚)

右三味咬咀以水五升煮取三升分為二服溫服之支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯主之方在肺癰篇中嘔家不渴渴者為欲解本渴今反不渴心下有支飲故也小半夏加茯苓湯主之方在嘔吐心下痞膈間有水目眩悸小半夏加茯苓湯主之方

半夏(一升) 生薑(半斤) 茯苓(三兩)

右三味咬咀以水七升煮取一升五合去滓分溫再服(胡洽不用桂心茯苓用四兩)

假令瘦人臍下有悸者吐涎沫而癲眩水也五苓散主之方在第九卷中

腹滿口乾燥此腸間有水氣椒目丸主之方

椒目　木防己　大黃酪一　葶藶二兩

右四味末之蜜丸如梧子大先食飲服一丸日三稍增口中有津液止渴者加芒消半兩

病者脉伏其人欲自利利者反快雖利心下續堅滿此爲留飲欲去故也甘遂半夏湯主之方

甘遂大者三枚　半夏十二枚水一升煮取半升　芍藥三枚如指大一升煮取半升　甘草二枚炙

右四味以蜜半升內二藥汁合得一升半煎取八合頓服之

大茯苓湯主胷中結痰飲僻結臍下弦滿嘔逆不得食亦主風水方

茯苓　白朮酪三　當歸　橘皮　附子酪二兩　生薑　半夏　桂心　細辛酪四兩一作人參

右九味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服服三劑良

茯苓湯主胷肩膈痰滿方

茯苓四兩　半夏外一升　生薑斤一　桂心八兩

右四味㕮咀以水八升煮取二升半分四服冷極者加大附子四兩若氣滿者加檳榔三七枚此方与第十六卷嘔吐篇方相重分兩加減法不同大半夏湯主痰冷澼飲胷膈中不理方

半夏外一升　白朮三兩　生薑八兩

人參　桂心

右八味㕮咀以水八升煮取三升分三服

半夏湯主痰飲澼氣吞酸方

半夏　吳茱萸酪各三兩　生薑六兩　附子一枚

右四味㕮咀以水五升煮取二升半分三服老小各半日三

乾棗湯主腫及支滿澼飲方

芫花　蕘花酪半兩　甘遂　大黃

黃芩酪一兩　甘草　大戟

大棗十枚

右八味㕮咀以水五升煮取一升六合分四服空心服以快下爲度

治留飲宿食不消腹中積聚轉下當歸湯方

當歸　人參　芍藥　芒消㊁　桂心　黃芩　甘草　大黃㊃　生薑　澤瀉㊂

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

治痰飲飲食不消乾嘔方

澤瀉　白朮　杏人　枳實㊀　茯苓

柴胡　生薑　半夏　芍藥㊂　人參

旋復花　橘皮　細辛㊀

右十三味㕮咀以水九升煮取二升七合分三服日三

治肖中痰飲腸中水鳴食不消嘔吐水方

檳榔十二枚　生薑　杏人　白朮㊃

半夏㊇　茯苓㊄　橘皮㊂

治肖中積冷心中嘈煩滿汪汪不下飲食心肖應背痛吳茱萸湯方

吳茱萸㊂　半夏㊃　桂心　人參㊁

甘草㊀　生薑㊂　大棗十枚

右七味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服日三

治肖膈心腹中痰水冷氣心下汪洋嘈煩或水鳴多唾口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此皆胃氣弱受冷故也其脉喜沈弦細遲悉主之方

旋復花　細辛　甘草

人參　橘皮　桂心

生薑㊄　芍藥㊂　半夏㊄

桔梗㊁　茯苓㊃

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升分三服病先有時喜
水下者用白朮三兩去旋復花若欲得利者加大黃二兩
須微調者用乾地黃
治冷熱久澼實不能飲食心下虛滿如水狀方

前胡　生薑　茯苓　半夏 各四兩　枳實　白朮 各三兩　桂心 二兩

右八味㕮咀以水八升煮取三升分三服
前胡湯治胷中久寒澼實隔塞胷痛氣不通利三焦冷熱不調
食飲損少無味或寒熱身重臥不欲起方

前胡 三兩　黃芩　麥門冬　吳茱萸 各一兩　生薑 四兩　大黃　防風 各一兩　人參

當歸　甘草　半夏 各三兩　杏人 四十枚

右十二味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服 深師方云若脇

小滿加大棗十二枚吐利水亦佳

旋復花湯主胷膈痰結噦不下食者方

旋復花　細辛　前胡　甘草　茯苓 各二兩　生薑 八兩　半夏 升一　桂心 四兩　烏頭 三枚

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服
薑椒湯主胷中積聚痰飲飲食減少胃氣不足欬逆嘔吐方

薑汁 七分　蜀椒 三合　半夏 三兩　桂心　附子

甘草 各二兩　橘皮

桔梗　茯苓 各二兩

右九味㕮咀以水九升煮取二升半去滓內薑汁煮取二
升分三服服三劑佳若欲服大散諸五石丸必先服此湯
及進黃耆丸佳一方不用甘草
薑附湯主痰冷澼氣胷滿短氣嘔沫頭痛飲食不消化方

生薑 八兩　附子 四兩生用四兩破

右二味咬咀以水八升煮取二升分四服亦主卒風
撩膈散主心上結痰飲寒冷心悶方
瓜丁二十枚 赤小豆三七枚 人參 甘草分各一
右四味治下篩酒服方寸匕日二亦治諸黃
斷膈湯主胷中痰癖方
恒山三兩 甘草
右四味咬咀以水酒各一升半煮取一升半分三服後服
漸減之得快吐後須服半夏湯半見前篇方
松蘿湯治胷中痰積熱皆除方
松蘿二兩 烏梅
右五味咬咀以酒三升浸藥一宿平旦以水三升煮取一
升半去滓頓服之亦可分二服一服得快吐即止
杜蘅湯主吐百病方
杜蘅 松蘿各三兩 瓜丁三七枚
右三味咬咀以酒一升五合漬三宿去滓分二服若一服
即吐者止未吐者更服相去如行十里久令藥力盡服一
升稀糜即定老小用之亦佳
蜜煎主寒熱方
恒山 甘草各一兩
右二味咬咀以水一斗煮取二升去滓內蜜五合温服七
合吐即止不吐更服七合勿與冷水一方用甘草半兩服
又方
蜜二合 醋八合
右二味調和平旦頓服須臾猥猥然欲吐摘之若意中不
盡明旦更服無不大嘔安穩
治卒頭痛如破非中冷又非中風其痛是胷膈中痰厥氣上

衝所致名爲厥頭痛吐之即差方

單煮茗作飲二三升許適冷煖飲二升須臾適即吐吐畢又飲如此數過劇者須吐膽乃止不損人而渴則差

葱白湯治冷熱膈痰發時頭痛悶乱欲吐不得者方

葱白二七莖　烏頭　甘草　眞朱

恒山各半兩　桃葉一把一作枇把葉

右六味㕮咀以水酒各四升和煮取三升去滓内朱一服一升吐即止

大五飲丸主五種飲一曰留飲停水在心下二曰澼飲飲水在胃中四曰溢飲飲水溢在膈上五藏間五曰流飲飲水在腸間動搖有聲夫五飲者由飲酒後及傷寒飲冷水過多所致方

遠志　苦參　烏賊骨　藜蘆　白朮

甘遂　五味子　大黃　石膏　桔梗

半夏　紫菀　石韋　消　栝樓根

桂心　芫花　前胡　芒　貝母

茯苓　芍藥　當歸　人參

恒山　署預　厚朴　細辛　附子各三分

巴豆卅枚　葳蕤一兩　甘草三分

右三十三味末之蜜和丸梧子大飲服三丸日三稍稍加之以知爲度

旋復花丸治停痰澼飲結在兩脇腹脹滿羸瘦不能食食不消化喜唾乾嘔大小便或澀或利腹中動搖作水聲腹内熱口乾好飲水漿卒起頭眩欲倒脇下痛方

旋復花　桂心　枳實　人參各五分　乾薑

芍藥　白朮各六分　茯苓　狼毒　烏頭
礬石各八分細辛　大黃　黃芩　葶藶
厚朴一　吳茱萸　芫花　橘皮各四分甘遂三分
右二十味末之蜜丸酒服如梧子大五丸日二加之以知為度芫花延年方無白朮狼毒烏頭礬石細辛黃芩厚朴吳茱萸芫花橘皮甘遂有皂莢附子各二分蜀椒防葵杏人各三兩乾地黃四兩乾地分

中軍候黑丸主澼飲停結滿悶目暗方黑又作里
芫花三兩　巴豆八分　杏人五分　桂心　桔梗各四分
右五味末之蜜丸服如胡豆三丸日一稍增得快下止
順流紫丸主心腹積聚兩脇脹滿留飲痰癖大小便不利小腹切痛膈上塞方
石膏五分　代赭　烏賊骨　半夏各三分
桂心四分　巴豆七枚

右六味末之蜜丸平旦服一丸如胡豆加至三丸胡洽有薤藜蘆當歸各三分范汪方無石膏半夏有當歸一分苦參三分薤藜蘆五分
治停痰澼飲結在兩脇腹滿贏瘦不能飲食食不消喜唾乾嘔大小便或澀或利方
旋復花　大黃　附子　茯苓
椒目　桂心　狼毒
乾薑　芍藥　芫花
右十二味末之蜜丸飲下如梧子三丸日三服漸增之
治風氣膈上痰飲方
枳實　細辛各八兩
不開口苦瓠湯煮五沸以物裹熨心膈上
結積留飲澼囊胷滿飲食不消灸通谷五十壯
九蟲第七論三方四十道五十首
論曰人腹中有尸蟲此物與人俱生而為人大害尸蟲之形

狀似大馬尾或如薄筋依脾而居乃有頭尾皆長三寸又有
九蟲一曰伏蟲長四分二曰蚘蟲長一尺三曰白蟲長一寸
四曰肉蟲狀如爛杏五曰肺蟲狀如蠶六曰胃蟲狀如蝦蟇
七曰弱蟲狀如瓜瓣八曰赤蟲狀如生肉九曰蝡蟲至細微
形如菜蟲狀伏蟲則群蟲之主也蚘蟲貫心則殺人白蟲相
生子孫轉多其毋轉大長至四五丈亦能殺人肉蟲令人煩
滿肺蟲令人欬嗽胃蟲令人嘔吐胃逆喜噦弱蟲又名腸蟲
令人多唾赤蟲令人腸鳴蝡蟲居胴腸之間多則為痔劇則
為癩因人瘡疾即生諸蟲直癬瘻瘍齒蟲無所不為人亦
不必盡有有亦不必盡多或偏有或偏無類婦人常多其蟲
凶惡人之極患也常以白蘞草沐浴佳根葉皆可用既是香
草且是尸蟲所畏也
論曰凡欲服補藥及治諸病皆須去諸蟲并爽飲宿癖醒醒

除盡方可服補藥不爾必不得藥力
治肝勞生長蟲在肝為病恐畏不安眼中赤方

雞子五枚去黃　乾漆四兩　蠐螬二兩

吳茱萸東行根皮各二兩　粳米粉拌

右五味擣葉萸皮為末和藥銅器中煎可丸如小豆大宿
勿食旦飲服一百丸小兒五十丸蟲當爛出獼驗方無葉萸根名雞子丸
治心勞熱傷心有長蟲名曰蠱長一尺貫心為病方

雷丸　橘皮各五分一作桃皮　石蠚蟲　桃人一作桃皮

狼牙六分　貫衆二枚　蠱蟲三七枚　吳茱萸根皮十分

蕪荑　青葙　乾漆各四分　亂髮如雞子大燒

右十二味末之蜜丸飲若酒漿腹服如梧子七丸加至三
七丸日二服一方無石蠚蟲
治脾勞熱有白蟲在脾中為病令人好嘔茱萸根下蟲方

東引吳茱萸根大者一尺大麻子八分外橘皮二兩
右三味㕮咀以水煎服臨時量之凡合禁聲勿語道作藥
蟲當聞便不下切忌之
治肺勞熱生蟲在肺為病方
狼牙三兩 東行桑根白皮切一
東行吳茱萸根白皮五合
右三味㕮咀以酒七升煮取一升平旦頓服之
治腎勞熱四肢腫急蟯蟲如菜中蟲在腎中為病方
貫衆三枚 乾漆二兩 吳茱萸枚五十 杏人四十枚
蕪荑 胡粉 槐皮酪一
右七味治下篩平旦井花水服方寸匕加至二匕半以差止
治蟯蟲方
以好醯末二兩苦酒半升合銅器中煮數沸宿不食
空心頓服之
又方
眞朱二兩 亂髮燒灰雞子大
右二味治下篩以苦酒調旦起頓服之消後以
蒜菲蕪丸治少小有蚘蟲結在腹中數發腹痛微下白汁吐悶
寒熱飲食不生肌皮肉瘦黃四肢不相勝舉方
蒜菲蕪 貫衆 雷丸 山茱萸 天門冬
狼牙酪八 藿蘆 甘菊花酪四分
右八味末之蜜丸如大豆三歲飲服五丸五歲以上以意
加之漸至十丸加藿蘆六分名藿蘆丸治老小及婦人等
萬病腹內冷熱不通急滿痛胃脘堅薄手足煩熱上氣不
得飲食身躰氣腫腰腳不遂腹內狀如水雞鳴婦人月經
不調無所不治

治蚘蟲方

薤蘆未以飲膿和服方寸匕不覺加之（備急以治蛕蟲）

治熱患有蚘蟲懊憹方

薤蘆盡十分　乾漆　蒴竹各三分

右三味治下篩米飲和一合服之日三

治蚘蟲在胃中漸漸齺人方

醇酒　白蜜　好漆各一升（外臺作好臨）

右三味內銅器中微火煎之令可丸如桃核一枚溫酒中（外臺治蛕蟲）

宿勿食旦服之蟲必下未下更服

又方

取楝實淳苦酒中浸再宿以綿裹內穀道中入三寸

一日易之（集驗方用治長蟲）

治蚘蟲攻心腹痛方

蕙苡根二斤剉之以水七升煮取三升先食服之虫

即死出

又方　苦酒空腹服方寸匕鶴蝨佳

又方

七月七日採蒺藜子陰乾燒灰先食服方寸匕日三

即差

治寸白蟲方

檳子四十九枚去皮以月上旬旦空腹服七枚七日

服盡虫消成水永差

又方

吳茱萸細根一把（熟搗）　大麻子三升（擣未熬）

右二味以水三升和搦取汁旦頓服之至巳時與好食令

飽須臾虫出不差明旦更合服之不差三日服（肘後治三虫以酒漬取汁服）

又方
取吳茱萸北陰根乾去土切一升以酒一升浸一宿
平旦分二服凡茱萸皆用細根東引北陰者良若如
指以上大不任用
又方 用石榴根如茱萸法亦可水煮
又方 蕪荑六分 狼牙四分 白斂二分
右三味治下篩以苦酒三合和一宿空腹服之
又方 研大麻取汁五升分五服亦治小兒蛕蟲
又方
以好油麻二升煎令熟內葱白三寸葱白黑便熟冷
頓服之
又方 熬餳令速速燥作末羊肉臛以藥方寸匕內臛中服
又方

桑根白皮切三升以水七升煮取二升宿勿食空腹
頓服之肘後云卒大行中見是腹中已多蟲故也宜速理之
又方 胡麻一升 胡粉一兩
右二味為末明旦空腹以猪肉臛汁暖盡之即差
又方
擣椒二七枚治下篩以水二升半先煮其皮取一升
半去滓內末頻服暖卧蟲出出不盡更合服取差止
宿勿食服之
論曰凡得傷寒及天行熱病腹中有熱又人食少腸胃空虛
三蟲行作求食蝕人五藏及下部若齒斷無色舌上盡白甚
者脣裏有瘡四肢沈重忽忽喜眠當數看其尸脣內有瘡唾血
脣內如粟瘡者心內懊憹痛悶此蟲在上蝕其五藏下脣內
生瘡者其人喜眠此蟲在下蝕其下部人不能知可服此蝕

蟲藥不爾匿蟲蝕殺人又曰凡患濕匿蟲者多是熱病後或久下不止或有客熱結在腹中或易水土温涼氣著多生此病亦有乾匿不甚泄痢而下部瘡癢不問乾濕久則殺人凡濕得冷而苦痢單煮黄連及艾葉苦參之屬皆可用之若病人齒斷無色舌上白者或喜眠煩憒不知痛癢處或下痢急治下部不曉此者但攻其上不以下部為意下部生蟲蝕其肛爛見五藏便死燒艾於竹筒熏之

治傷寒匿蟲病方

取生雞子小頭叩出白入漆一合熟和攪令極調當沫出更内著殼中仰吞之食頃或半日乃吐下蟲劇者再服蟲盡熟除病愈

治濕匿方

黄連　生薑各十兩　艾葉八兩　苦參四兩

右四味㕮咀以水一斗煮取三升分三服久者服三劑良懊憹散主濕匿瘡爛殺蟲除匿方

萹竹半兩　薤蘆　雷丸

青葙　女青

右六味治下篩粥汁服方寸匕日三加至二匕亦酒服

青葙散主熱病有匿下部生瘡方

青葙子一兩　薤蘆四兩　狼牙三分

橘皮　萹竹　甘草一分

右六味治下篩米飲和一合服之日三不知稍加之小品無甘草

治濕匿蟲蜜湯方

生薑汁五合　白蜜二合　黄連三兩

右三味以水二升別煮黄連取一升去滓内薑蜜更煎取一升空腹服四合日二一升二合五歲兒平旦空

治匿蟲蝕下部瘡慤道中生瘡方

阿膠　當歸　青葙子各二兩　艾葉一把

右四味㕮咀以水八升煮取二升半去滓分三服

治匿蟲杏人湯方

杏人五十枚　苦酒二升　鹽二合

右三味和煮取五合頓服之小兒以意量服

治蟯蟲蛔蟲及痔匿蟲食下部生瘡桃皮湯方

桃皮　艾葉各一兩　梔子三兩　大棗三十枚

右四味㕮咀以水三升煮取半升頓服之良

猪膽苦酒湯主熱病有匿蟲上下攻移殺人方

猪膽一具苦酒半升和之火上煎令沸三上三下藥成放溫空腹飲參滿口蟲死便愈

治溫病下部有瘡蟲蝕人五藏方

雄黃　皂莢炙各一分　麝香　朱砂各二分

右四味末之蜜和擣萬杵初得病酒服如梧子大一丸日二若下部有瘡取如梧子末內下部日二

治下部生瘡方

濃煮桃皮煎如糖以內下部口中有瘡含之

治濕匿方

青代黛二兩　黃連　黃蘗　丁香各一兩　麝香二分

右五味治下篩以小棗大內下部中日一重者棗大和車脂二三合灌下部中日二

治時氣病匿下部生瘡雄黃丸散方

雄黃半兩　桃人一兩　青葙子　黃連　苦參各三兩

右五味末之綿裹如棗核大內下部亦可棗汁服方寸匕日三

治病匿蟲方

燒馬蹄作灰末以猪脂和傳綿繩上以內下部中日四五度

治大孔蟲癢方

蒸大棗取膏以水銀和捻長三寸以綿裹宿內大孔中明旦蟲皆出水銀損腸宜慎之

治蟲蝕下部方

胡粉　雄黃

右二味各等分末著穀道中亦治小兒

治濕匿方

取生薑刮去皮斷理切之極熟研取汁一升半又以水一升半合和相得旦空腹服之仍削生薑二枚如齒大以楸葉若桃葉數重裹之於熾灰火中燒之令極熱內下部中食頃若濕盛者頻三且作之無有不差者

治傷寒熱病多睡變成濕匿四肢煩疼不得食方

羊桃十斤切擣令熟煖湯三斗淹浸之日正午時入中坐一炊久不過三度差

治熱病蛄毒令人喜眛不知痛處面赤如醉下利膿血當數視其人下部大小之孔穐穐然一云搜搜然赤則匿蟲齧者也劇因殺人見人肝肺服藥不差可熏之方

以泥作小甕令受一斗竹筒一枚如指大以竹筒一頭橫穿入甕腹中一頭入人穀道中淺入可取熟艾如雞子大著甕中然之於甕口吹煙令入人腹艾盡乃止大人可益艾小兒減之羸者不得多多亦害人日再熏不過三作蟲則死下斷亦可末燒雄黃如此

備急千金要方卷第十九

朝奉郎守太常少卿充秘閣校理判登聞檢院護軍賜緋魚袋臣林億等校正

腎藏脉論第一

腎虛實第二　腎與膀胱俱虛實附

腎勞第三

精極第四　精虛實附

骨極第五

骨虛實第六

腰痛第七

補腎第八

腎藏脉論第一

論曰腎主精腎者生來精靈之本也爲後宮內官則爲女主所以天之在我者德也地之在我者氣也德流氣薄而生者

也故生之來謂之精精者腎之藏也耳者腎之官腎氣通於耳耳和則能聞五音矣腎在竅爲耳然則腎氣上通於耳下通於陰也左腎癸腎右腎癸循環玄宮上出耳門候聞四遠下迴玉海俠脊左右與膂膊相當經於上焦榮於中焦衛於下焦外主骨內主膀胱腎重壹斤壹兩有兩枚神名澤澤主藏精號爲精藏隨節應會故云腎藏精精舍志在氣爲欠在液爲唾腎氣虛則厥逆實則脹滿四肢正黑虛則使人夢見舟船溺人得其時夢伏水中若有畏怖腎氣盛則夢腰脊兩解不相屬厥氣客於腎則夢臨淵沒居水中

凡腎藏象水與膀胱合爲膊其經足少陰與太陽爲表裏其脉沈相於秋王於冬冬時萬物之所藏白蟲伏蟄陽氣下陷陰氣上昇陽氣冲出陰氣冽爲霜遂不上昇化爲霜雪猛獸伏蟄蠆蟲匿藏其脉爲沈爲陰在裏否發汗發汗則蠆蟲出見其霜雪陰氣在表陽氣在藏慎不可下下之者傷脾脾土弱即水氣妄行下之者如魚出水蛾入湯重客在裏慎不可熏熏之逆客其息則喘無持客熱令口爛瘡陰脉且解血散不通正陽遂厥陰不往從客熱狂入內爲結胸脾氣遂弱清溲痢通

冬脉如營冬脉者腎也北方水也萬物之所以合藏也故其氣來沈以搏故曰營反此者病何如而反其氣來如彈石者此謂太過病在外其去如數者此謂不及病在中太過則令人解体脊脉痛而少氣不欲言不及則令人心懸如病飢肭中清脊中痛少腹滿小便變赤黃

腎脉來喘喘累累如句按之而堅曰平冬以胃氣爲本腎脉來如引葛按之益堅曰腎病腎脉來發如奪索辟辟如彈石曰腎死

眞腎脉至搏而絶如以指彈石碎碎然色黄黑不澤毛折乃死冬胃微石曰平石多胃少曰腎病但石無胃曰死石而有句曰夏病句甚曰今病凡人以水穀爲本故人絶水穀則死脉無胃氣亦死所謂無胃氣者但得眞藏脉不得胃氣也所謂脉不得胃氣者肝不弦腎不石也

腎藏精精舍志盛怒不止則傷志志傷則善忘其前言腰脊痛不可以俛仰屈伸毛悴色天死於季夏

足少陰氣絶則骨枯少陰者冬脉也伏行而濡滑骨髓者也故骨不濡則肉不能著骨也骨肉不相親即肉濡而却肉濡而却故齒長而垢髮無澤髮無澤者骨先死戊篤已死土勝水也

腎死藏浮之堅按之亂如轉丸益下入尺中者死

冬腎水王其脉沈濡而滑曰平反得微澀而短者是肺之乘

腎母之歸子爲虛邪雖病易治反得弦細而長者是肝之乘腎子之乘母爲實邪雖病自愈反得大而緩者是脾之乘腎土之剋水爲賊邪大逆十死不治反得浮大而洪者是心之乘腎火之陵水爲微邪雖病即差

左手關後尺中陰絶者無腎脉也苦足下熱兩髀裏急精氣竭少勞倦所致刺足太陽治陽左手關後尺中陰實者腎實也苦恍惚健忘目視眺耳聾悵悵善鳴刺足少陰治陰

右手關後尺中陰絶者無腎脉也苦足逆冷上搶肖痛夢入水見鬼善魘寐黑色物來掩人上刺足太陽治陽

右手關後尺中陰實者腎實也苦骨疼腰脊痛內寒熱刺足少陰治陰

腎脉沈細而緊再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡足少陰脉也

腎脉急甚爲骨痿癲疾微急爲奔豚沈厥足不收不得前後
緩甚爲折脊微緩爲洞下洞下者食不化入咽還出大甚爲
陰痿微大爲石水起臍下以至少腹腫垂垂然上至胃管死
不治小甚爲洞泄微小爲消癉滑甚爲癰癲微滑爲骨痿坐
不能起目無所見視見黑花濇甚爲大癰微濇爲不月水沈
痔腎脉搏堅而長其色黃而赤當病折腰其耎而散者當病
少血黑脉之至也上堅而大有積氣在少腹與陰名曰腎痺
得之沐浴清水而臥
扁鵲曰腎有病則耳龔腎在竅爲耳然則腎氣上通於耳五
藏不和則九竅不通陰陽俱盛不得相營故曰關格關格者
不得盡期而死也
腎在聲爲呻在變動爲慄在志爲恐恐傷腎精氣并於腎則
恐藏主冬病在藏者取之井

病先發於腎少腹腰脊痛脛酸一日之膀胱脊筋痛小便
閉二日上之心心痛三日之小腸脹四日不已死冬大晨夏
晏晡
病在腎夜半慧日乘四季甚下晡靜
假令腎病中央若食牛肉及諸土中物得之不者當以長夏
時發得病以戊巳日也
凡腎病之狀必腹大脛腫痛喘欬身重寢汗出憎風虛即胥
中痛大腹小腹痛清厥意不樂取其經足少陰太陽血者
腎脉沈之而大堅浮之而大緊苦手足骨腫厥而陰不興腰
脊痛少腹腫心下有水氣時脹閉時泄得之浴水中身未乾
而合房內及勞倦發之
腎病其色黑其氣虛弱吸吸少氣兩耳苦聾腰痛時時失精
飲食減少膝以下清其脉沉滑而遲少爲可治宜服內補散

建中湯腎氣丸地黃煎春當刺涌泉秋刺伏留冬刺陰谷皆補之夏刺然谷季夏刺太谿皆瀉之又當灸京門五十壯背第十四椎百壯

邪在腎則骨痛陰痺陰痺者撫之而不得腹脹腰痛大便難肩背頸項強痛時眩取之涌泉崑崙視有血者盡取之

有所用力舉重若入房過度汗出如浴水則傷腎

腎中風關腎中寒關

腎水者其人腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻頭汗其腰中冷如水狀一作如水洗狀如坐水中形如水狀

足逆寒大便反堅一云反瘦面

腎脹者腹滿引背央央然腰髀痛

腎著之病其人身躰重腰中冷如水狀反不渴小便自利食飲如故是其證也病屬下焦從身勞汗出衣裏冷濕故久久得之

腎著之爲病從腰以下冷腰重如帶五千錢

診得腎積脉沈而急苦奉與腰相引痛飢則見飽則減少腹裏急口乾咽腫傷爛目睆睆骨中寒主髓厥善忘色黑也

腎之積名曰奔豚發於少腹上至心下如豚奔走之狀上下無時久久不愈病喘逆骨痿少氣以夏丙丁日得之何也腑病傳腎腎當傳心心適以夏王王者不受邪腎復欲還腑腑不肯受因留結爲積故知奔豚以夏得之腎病手足逆冷面赤目黃小便不禁骨節煩疼少腹結痛氣衝於心其脉當沈細而滑今反浮大其色當黑而反黃此是土之剋水爲大逆十死不治

羽音人者主腎聲也腎聲呻其音毀其志恐其經足少陰厥逆太陽則榮衛不通陰陽翻祚陽氣內伏陰氣外昇昇則寒寒則虛虛則厲風所傷語音蹇吃不轉偏枯肘偏跛蹇若在

左則左腎傷右則右腎傷其偏枯風體從背而分半邊至脚緩弱不遂口亦歌語聲混濁便利仰人耳偏聾腰背相引甚則不可治腎瀝湯主之方在第八卷中又呻而好悲悲善忘恍惚有所思此爲土剋水陽虛陰氣伏而陽氣起則熱熱則實實則怒怒則忘耳聽無聞四肢滿急小便赤黃言音口動而不出笑而看人此爲邪熱傷腎甚則不可治若面黑黃耳不應亦可治

腎病爲癆者令人悽悽然腰脊痛宛轉大便難目眴眴然身掉不定手足寒恒山湯主之方在第十卷中若其人本來不吃忽然饗吃而好嗔恚反於常性此腎已傷雖未發覺已是其候見人未言而前開口笑還閉口不聲舉手柵腹一作把眼此腎病聲之候也虛實表裏浮沈清濁宜以察之逐以治之

黑爲腎腎合骨黑如烏羽者吉腎主耳耳是腎之餘其人水形相比於上羽黑色大頭曲面廣顧小肩大腹小手足發行搖身下尻長背延延也不敬畏善欺殆人戮死耐秋冬不耐春夏春夏感而生病主足少陰汗汗然耳大小高下厚薄偏圓則腎應之正黑色小理者則腎小小即安難傷粗理者則腎大大則虛虛則腎寒耳龍聾或鳴汗出腰痛不得俛仰易傷以邪耳高者則腎高高則實實則腎熱背急綴痛耳膿血出或生肉塞耳耳後陷者則腎下下則腰尻痛不可以俛仰爲狐疝耳堅者則腎堅堅則腎不受病不病腰痛耳薄者則腎脆脆則傷熱熱則耳吼鳴善病消癉耳好前居牙車者則腎端正端正則和利難傷耳偏高者則腎偏欹偏欹則善腰尻偏痛凡人分部骨陷者必死不免俠膀胱并太陽爲腎之部骨當其處陷也而藏氣通於內外部亦隨而應之沈濁爲內浮清爲外若色從外走內者病從外生部處起若色從內出外

者病從內生部處陷內病前治陰後治陽外病前治陽後治陰陽主外陰主內凡人生死休否則藏神前變形于外人腎前病耳則為之焦枯若腎前死耳則為之黑焦癖若天中等分墓色應之必死不治看應增損斟酌賒促賒不出四百日內促則旬日之間腎病少愈而卒死何以知之曰黃黑色黮黯如拇指應耳此必卒死腎絕四日死何以知之齒為暴黑面為正黑目中黃腰中欲折白汗出如流面黑目青白一作肾氣內傷病因留積八日當亡是死變也面黃目黑不死黑如灺死吉凶之色天中等分左右發色不正此是陰陽官位相法若不遭官事而應死也其人面目帶黃黑連耳左右年四十以上百日死若偏在一邊最凶必死兩邊有年上無三年之內禍必至矣

冬水腎脉色黑主足少陰脉也少陰何以主腎曰腎者主陰陰水也皆生於腎此脉名曰太衝凡五十七穴冬取其井滎冬者水始治腎方閉陽氣堅盛太陽氣伏沈陽脉乃去故取井以下陰氣逆取滎以通作素問實陽氣其脉本在內踝下二寸應舌下兩脉其脉根于涌泉涌泉在脚心下大拇指筋是其筋起於小指之下入足心並太陰之筋而邪走內踝之下結於踵與太陽之筋合而上結於內輔下並太陰之筋而上循陰股結於陰器循脊內俠膂上至項結於枕骨與太陽之筋合

其脉起於小指之下斜趣足心出然骨之下循內踝之後別入跟中以上腨內出腘中內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨俠舌本其支者從肺出絡心注胸中合足太陽為表裏太陽本在跟以上五寸中同會于手太陰

其足少陰之別名曰太鍾當踝後繞跟別走太陽其別者並
經上走於心包下貫腰脊主腎生病病實則膀胱脫熱熱則閉
癃癃則陽病陽脉反逆大於寸口再倍其病則口熱舌乾咽
腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃癉腸澼脊股內後廉痛痿厥
嗜卧足下熱而痛炎則強食而生災緩帶被髮大杖重履而
步虛則膀胱寒寒則腰痛痛則陰脉反小於寸口其病則飢
而不欲食面黑如炭色欬唾則有血喉鳴而喘坐而欲起目
眩眩無所見心懸若病飢狀氣不足則善恐心惕惕若人將
捕之是為骨厥

冬三月者主腎膀胱黑骨温病也其源從太陽少陰相搏蘊
積三焦上下擁塞陰毒內行藏腑受客邪之氣則病生矣其
病相反若腑虛則為陰毒內行藏腑受客邪之氣則病生矣其
或腰中痛欲折若藏實則陽温所損脊脅切痛類如刀刺不
得動轉熱彭彭若服冷藥過差而便洞瀉故曰黑骨温病也
扁鵲曰灸脾肝腎參俞主治丹毒黑温之病當依源為理
調藏理腑清濁之病不生矣

腎虛實第二 脉四條 灸法一首 方四首

腎實熱

左手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也病苦舌燥咽腫
心煩嗌乾脊時痛喘欬汗出小腹脹滿腰背強急躰重骨
熱小便赤黃好怒好忘足下熱疼四肢黑聾名曰腎實熱
也脉經云腎實熱者病苦膀胱脹閉火腹與腰脊相引痛也
右手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也病苦瘨身熱悉
痛脊脇相引痛足逆熱煩名曰腎實熱也
治腎實熱小腹脹滿四肢正黑耳聾夢腰脊離解及伏水等
氣急瀉腎湯方

芒消三兩 大黃切一升 水器中宿清 茯苓 黃芩 各三兩 生地黃汁
昌蒲 各五兩 磁石八兩 碎 如雀頭玄參 細辛 各四兩 甘草二兩
右十味㕮咀以水九升煮七味取二升半去滓下大黃內
藥汁中更煮減二三合去大黃內地黃汁微煎一兩沸下
芒消分三服

治腎熱好怒好忘耳聾無聞口脣滿急腰脊轉動強直方

柴胡 茯神 外臺作茯苓 黃芩 澤瀉
升麻 杏人 各一兩 磁石 四兩 碎 羚羊角 一兩
地黃 大青 芒消 各三兩 淡竹葉 切一升
右拾貳味㕮咀以水一斗煮取三升去滓下芒消分三服
治腎熱小便黃赤不出如梔子汁或如黃蘗汁每欲小便即
莖頭痛方

榆白皮 切一升 滑石 碎八兩 子苓 通草

矍麥 各三兩 石韋 四兩 冬葵子 一升 車前草 切一升
右八味㕮咀以水一斗先煮車前草取一斗去滓澄清取
九升下諸藥煮取三升五合去滓分四服

腎膀胱俱實

左手尺中神門以後脉陰陽俱實者足少陰與太陽經俱實
也病苦脊強反折戴眼氣上搶心脊痛不能自反側名曰腎
膀胱俱實也

右手尺中神門以後脉陰陽俱實者足少陰與太陽經俱實
也病苦癲疾頭重與目相引痛欲走反眼大風多汗名曰腎
腎膀胱俱實也

腎虛寒

左手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦心中悶下
重足腫不可以按地名曰腎虛寒也

右手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦足脛小弱惡寒脉代絶時不至足寒上重下輕行不可按地小腹脹滿上搶胷痛引脇下名曰腎虛寒也

治腎氣虛寒陰痿腰脊痛身重緩弱言音混濁陽氣頓絶方

生乾地黃五兩　蒺藜　白朮　巴戟天
麥門冬　茯苓　甘草　牛膝
五味子　杜仲酪八　車前子　乾薑酪五兩

右十二味治下飾食後酒服方寸匕日三服

治腎風虛寒炎腎輸百壯對臍兩邊向後俠脊相去各一寸五分

腎膀胱俱虛

左手尺中神門以後脉陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦小便利心痛背寒時時少腹滿名曰腎膀胱俱虛也

右手尺中神門以後脉陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦心痛若下重不自收篡反出時時苦洞泄寒中泄腎心俱痛名曰腎膀胱俱虛也

腎勞第三　論一首　方五首

論曰凡腎勞病者補肝氣以益之肝王則感於腎矣人逆冬氣則足少陰不藏腎氣沈濁順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順爲逆是謂關格病則生矣

治腎勞實熱小腹脹滿小便黃赤末有餘瀝數而少莖中痛陰囊生瘡梔子湯方

梔子人　芍藥　通草　石韋酪三
石膏五兩　滑石　子苓四兩　生地黃
榆白皮　淡竹葉切各一升

右十味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服

治腎勞熱陰囊生瘡麻黃根粉方

麻黃根　石硫黃兩格三　米粉一鎰

右三味治下節安繫如常用粉漬捨瘡上粉濕更搭之

治腎勞熱妄怒腰脊不可俛仰屈伸煮散方

丹參　牛膝　乾地黃　甘草　遠志　子參各格一　羚羊角　生薑　萆薢各三兩　石膏二兩半　茯苓　五加皮各三兩　橘皮格一　淡竹葉大雞子

右十六味治下節爲麤散以水三升煮兩方寸匕帛裹之時時動取八合爲一服日二服

治虛勞陰陽失度傷筋損脉噓吸短氣漏溢泄下小便赤黃陰下濕癢腰脊如折顏色隨墮云落方

生地黃　萆薢　桑肉　桂心　杜仲　麥門冬格一

右六味㕮咀以酒一斗五升漬三宿出暴乾復漬如此候酒盡取乾治下節食後酒服方寸匕日三

治腎勞虛冷乾枯憂恚內傷久坐濕地則損腎方

秦艽　牛膝　菩薊　防風　桂心　獨活　側子酪五兩　石斛六兩　茯苓酪四兩　杜仲　麥門冬　地骨皮酪三兩　丹參八兩　乾薑一作乾地黃　大麻子升二　五加皮兩半　薏苡仁兩一

右十七味㕮咀以酒四升漬七日服七合日二服

論曰凡精極者通主五藏六腑之病候也若五藏六腑衰則形體皆極眼視而無明齒焦而髮落身體重則腎水生耳聾

行步不正凡陽邪害五藏陰邪損六腑陽實則從陰引陰若陽病者主下
虛則從陽引陰若陽病者主高高則實實則熱眼視不明齒
焦髮脫腹中滿滿則歷節痛痛則宜瀉於內若陰病者主下
下則虛虛則寒體重則腎水生耳聾行步不正邪氣入內行
於五藏則欬欬則多涕唾面腫氣逆邪氣逆於六腑遙虛厥
於五藏故曰精極也所以形不足温之以氣精不足補之以
味善治精者先治肌膚筋脉次治六腑若邪至五藏已半死矣
扁鵲曰五陰俱絶不可治絶則目系轉轉則目精奪為志
先死遠至一日半日非醫所及矣宜須精研以表治裏以左
治右以右治左以我知彼疾皆差矣

黃芩湯方

竹葉升切二　黃芩　茯苓各三兩　甘草

麥門冬　大黃酪二　芍藥四兩　生地黃切一升　生薑六兩

右九味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服

治精極五藏六腑俱損傷虛勞熱遍身煩疼骨中痠痛煩悶方

生地黃汁二升　麥門冬汁　赤蜜酪一　竹瀝合

石膏八兩　人參　芎藭　桂心

甘草　黃芩

麻黃酪三兩　當歸四兩

右十二味咬咀以水七升先煮八味取二升去滓下地黃
等汁煮取四升分四服日三夜一

治五勞六極虛羸憂驚厥弱多夢寤忘湯方

茯苓四兩　甘草

乾薑酪各三兩　大棗擘五　芍藥　桂心

遠志　人參酪三

右八味咬咀以水八升煮取三升分三服

治虛勞少精方

鹿角末白蜜和爲丸如梧子大每服七九日三十日大效

又方

漿水煮菟絲子令熟取洗陰三十日知

棘刺丸治虛勞諸氣不足遺失精方

棘刺　乾薑　菟絲子各二兩　天門冬

烏頭　小草　防葵　署預

石龍芮　枸杞子　巴戟天　蕙蘚

細辛　萎蕤　石斛　厚朴

牛膝　桂心各一兩

右十八味末之蜜丸如梧子大酒服五九日三深師方以蜜雜雞子白各半和丸若患風瘧痺氣體不便煩滿少氣消渴加萎蕤天門冬菟絲子身黃汗小便赤黃不利加石龍芮枸杞子閉節腰背痛加蕙蘚牛膝寒中氣脹時泄數唾吐嘔加厚朴乾薑桂心陰囊下濕精少小便餘瀝加石斛以意增之古今録驗以乾地黃代乾薑以麥門冬代天門冬以杜仲代署預以柏子人代枸杞子以蓯蓉代萎蕤用治男子百病小便過多失精

治夢中泄精尿後餘瀝及尿精方

人參　麥門冬　赤石脂　遠志

續斷　鹿茸各一兩半　茯苓　龍齒

磁石　蓯蓉各二兩　丹參　韭子

柏子人各一兩半　乾地黃三兩

右十四味末之蜜丸如梧子大酒服二十九日再稍加至三十丸

治虛損小便白濁夢洩方

韭子　菟絲子　車前子各一　附子

苦蕒各二兩　當歸　礬石各一兩

桂心一兩

右八味末之蜜丸如梧子酒服五丸日三

又方

黃耆　人參　甘草　乾薑
當歸　龍骨　半夏　芍藥酪二
大棗五十枚　韭子五合

右十味末之蜜丸如梧子酒服五丸日三服

治小便失精及夢泄精韭子散方

韭子　麥門冬去心一升　菟絲子　車前子各三兩
芎藭三兩　白龍骨三兩

右六味治下篩酒服方寸匕日三不知稍增甚者夜一服

附後用澤瀉一兩半

棗人湯治大虛勞夢泄精薤白核微弱血氣枯竭或醉飽傷於房室驚惕忪悸小腹裏急方

棗核人二合　人參二兩　芍藥　桂心酪二兩
黃耆　甘草　茯苓　白龍骨
牡蠣酪二兩　生薑二斤　半夏外一升　澤瀉一兩

右十二味咬咀以水九升煮取四升一服七合日三若不能食小腹急加桂心六兩

韭子丸治房室過度精洩自出不禁腰背不得屈伸食不生肌兩脇苦弱方

韭子外一升　甘草　紫石英
禹餘粮　遠志　當歸
天雄　紫菀　署預　天門冬
細辛　茯苓　昌蒲　殭蠶
人參　杜仲　白朮　乾薑
苁蓉　附子　石斛各一兩半　蒐蘑

黃耆 兎絲子 乾地黃
乾漆四兩 蛇牀子酪二
右三十一味末之牛髓合白蜜棗肉搗三千杵空腹服
如梧子大十五丸日再可加至二十丸

治夢泄失精方

韭子一升 大棗五十枚 牛髓四兩

治虛勞尿精方

韭子二升 稻米二升

右二味以水一斗七升煮取汁六升為三服精溢同此

又方

石榴皮外臺作柏皮 桑白皮切各五合

右二味以酒五升煮取三升分三服

乾膠叁兩末之以酒二升和分温為三服差止一方
用鹿角膠

又方

新韭子二升十月霜後採者好酒八合漬一宿明旦
日色好童子向南擣一萬杵平旦温酒五合服方寸
匕日二

禁精湯治失精羸瘦痰削少氣目視不明惡聞人聲方

韭子二升 粳米一合

右二味合於銅器中熬之米黃黑及熱以好酒一斗投之
絞取汁七升每服一升日三盡三劑

羊骨湯治失精多睡目瞇瞇方

羊骨一具 生地黃 白朮各三 桂心八兩
麥門冬 人參 芍藥 生薑

甘草炙 三兩 茯苓 厚朴 阿膠
桑白皮 一斤 大棗 卅枚 飴糖 一升
右十五味㕮咀以水五斗煮羊骨取三斗汁去骨煮藥取
八升湯成下膠飴令烊平旦服一升後旦服一升
虛勞尿精灸第七椎兩傍各三十壯
又灸第十椎兩傍各三十壯
又灸第十九椎兩傍各三十壯
又灸陽陵泉陰陵泉各隨年壯
夢泄精灸三陰交二七壯
丈夫夢失精及男子小便澁難灸腎輸百壯男子陰中疼痛
溺血精出灸裂缺五十壯
失精五藏虛竭灸屈骨端五十壯陰上橫骨中央宛曲如却
月中央是也此名橫骨

男子虛勞失精陰上縮莖中痛灸大赫三十壯穴在屈骨端
三寸
男子腰脊冷疼溺多白濁灸脾募百壯
男子失精膝脛疼痛冷灸曲泉百壯穴在膝內屈文頭
男子虛勞失精陰縮灸中封五十壯

骨極第五 論一首 灸法二首 方一首

論曰骨極者主腎也腎應骨與腎合又曰以冬遇病為骨痺骨
痺不已復感於邪內舍於腎腎耳鳴見黑色是其候也若腎病
則骨極牙齒苦痛手足痠疼不能久立屈伸不利身痺腦髓
痠以冬壬癸日中邪傷風為腎風風歷骨故曰骨極若氣陰
陰則虛虛則寒寒則面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸不利
其氣衰則髮墮齒槁腰背相引而痛痛甚則欬唾甚若氣陽
陽則實實則熱熱則面色灼隱曲膀胱不通牙齒腦髓苦痛手

足痠痛耳鳴色黑是骨極之至也須精別陰陽審其清濁知其分部視其喘息善治病者始於皮膚筋脉即須治之若入藏腑則半死矣

扁鵲云骨絶不治痛而切痛伸縮不得十日死骨應足少陰少陰氣絶則骨枯髮無澤骨先死矣

治骨極主腎熱病則膀胱不通大小便閉塞顏焦枯黑耳鳴虛熱三黃湯方

大黃切別漬水一升 黃芩三兩 梔子十四枚 甘草一兩 芒消二兩

右五味咬咀以水四升先煮三物取一升五合去滓下大黃又煮兩沸下芒消分三服

腰背不便筋攣痺縮虛熱閉塞灸第二十一椎兩邊相去各一寸五分隨年壯

小便不利小腹脹滿虛乏灸小腸輸隨年壯

骨虛實第六論一首灸法一首方六首

論曰骨虛者酸疼不安好倦骨實者苦煩熱凡骨虛實之應主于腎膀胱若其腑藏有病從骨生熱則應藏寒則應腑治骨虛酸疼不安好倦主膀胱寒虎骨酒方

虎骨一具通炙取黃焦汁盡碎之如雀頭大釀米三石麴四斗水三石如常釀酒法所以加水麴者其骨消麴而飲水所以加之也酒熟封頭五十日開飲之

治骨實苦酸疼煩熱煎方

葛根汁 生地黃汁 赤蜜各一升 麥門冬汁五合

右四味相和攪調微火上煎之三四沸分三服

治骨髓中疼方

芍藥一斤 生乾地黃五斤 虎骨四兩

右三味咬咀以清酒一斗漬三宿暴乾復入酒中如此取

酒盡爲度擣篩酒服方寸匕日三

治骨髓冷疼痛方

地黃一石取汁酒二斗相攪重煎温服日三補髓

治虛勞冷骨節疼痛無力方

豉二升　地黃八斤

右二味再遍蒸暴乾爲散食後以酒一升進三方寸匕日

再服之亦治虛熱

又方

天門冬爲散酒服方寸匕日三一百日差

骨髓冷疼痛灸上廉七十壯三里下三寸是穴

腰痛第七　論一首　導引法二首　方十八首　針灸法七首

論曰凡腰痛有五一曰少陰少陰腎也十月萬物陽氣皆藏是以腰痛二曰風痺風寒著腰是以腰痛三曰腎虛役用傷腎是以腰痛四曰傷腰是以腰痛五曰取寒眠地地氣所傷是以腰痛痛不止引牽腰脊痛

治腎脉逆小於寸口膀胱虛寒腰痛脊中動通四時用之桂湯

杜仲　乾薑各四兩一云乾地黃　蕳藨　羌活

天雄　蜀椒　桂心　芎藭　防風

泰艽　烏頭　細辛各三兩　五加皮

石斛各五兩　續斷　栝樓根　地骨皮

桔梗　甘草各一兩

右十九味㕮咀以酒四斗漬四宿初服五合加至七八合下日再通治五種腰痛

又方

桑寄生　牡丹皮　鹿茸　桂心

右四味等分治下篩酒服方寸匕日三

又方　單服鹿茸與角亦愈

治腎虛腰痛方

牡丹皮二分　蓳蘞　桂心　白朮各三分

右四味治下篩酒服方寸匕日三亦可作湯服甚良

又方

牡丹皮　桂心各一兩　附子二分

右三味治下篩酒服一刀圭日再甚驗

腎著之爲病其人身躰重腰中冷如水洗狀不渴小便自利食飲如故是其證也從作勞汗出衣裏冷濕久久得之腰以下冷痛腹重如帶五千錢腎著湯主之方

甘草二兩　乾薑三兩　茯苓　白朮各四兩

右四味㕮咀以水五升煮取三升分三服腰中即溫（古今錄驗）

名甘草湯

腎著散方

桂心三兩　白朮　茯苓各四兩　甘草

澤瀉　牛膝　乾薑各三兩　杜仲三兩

右八味治下篩爲麪散一服三方寸匕酒一升煮五六沸去滓頓服日再

治腰疼不得立方

甘遂　桂心一作附子　杜仲　人參各二兩

右四味治下篩以方寸匕內羊腎中炙之令熟服之

杜仲丸補之方

杜仲二兩　石斛二分　乾地黃　乾薑各三分

右四味末之蜜丸如梧子酒服二十丸日再

治腰痛并冷痺丹參丸方

丹參　杜仲　牛膝　續斷各三兩

桂心　乾薑各一兩

右六味末之蜜丸如梧子服二十丸日再夜一禁如藥法

治腰痛方

蕳蘞　杜仲　枸杞根各一斤

右三味㕮咀好酒三斗漬之內甕中密封頭於銅器中煮一日服之無節度取醉

腰背痛者皆是腎氣虛弱臥冷濕當風所得也不時速治喜流入脚膝或為偏枯冷痺緩弱疼重若有腰痛蠻脚重痺急宜服獨活寄生湯方在第八卷中

治腰脊苦痛不遂方

大豆三斗熬一斗煮一斗蒸一斗蒸一斗酒六斗甕一口蒸令極熱豈亦熱內甕中封閉口秋冬二七日於甕下作孔出取服五合日夜三三服之

又方　地黃花末酒服方寸匕日三

又方

鹿角去上皮取白者熬令黃末之酒服方寸匕日三

特禁生魚餘不禁新者良陳者不任服角心中黃處亦不中服大神良

又方　羊腎作末酒服三方寸匕日三

又方

三月三日收桃花取一斗一升井花水三斗麴六升米六斗炊之一時釀勃熟去糟一服一升日三服若作食飲用河水禁如藥法大神良

治丈夫腰脚冷不隨不能行方

上醇酒三斗水三斗合著甕中溫漬腳至膝三日止冷則甕下常著灰火勿使冷手足煩者小便三升盆

腰臂痛道引法

正東坐收手抱心一人於前據躡其兩膝一人後捧其頭徐牽令偃卧頭到地三起三卧止便差

腰臂痛宜針決膝腰句盡中青赤路脉出血便差

腰痛不得俛仰者令患人正立以竹柱地度至臍斷竹乃以度度背脊灸竹上頭處隨年壯灸訖藏竹勿令人得知

腰痛灸脚跟上橫文中白肉際十壯良

又灸足巨陽七壯巨陽在外踝下

又灸腰目窌七壯在尻上約左右是

又灸八窌及外踝上骨約中

腰卒痛灸窮骨上一寸七壯左右一寸各灸七壯

補腎第八 論一首 灸法一首 方五十九首

論曰補方通治五勞六極七傷虛損五勞五藏病六極六腑病七傷表裏受病五勞者一曰心勞五曰疲勞六極者一曰氣極二曰血極三曰筋極四曰骨極五曰髓極六曰精極七傷者一曰肝傷善夢二曰心傷善忘三曰脾傷善飲四曰肺傷善嗽五曰腎傷善唾六曰骨傷善飢七曰脉傷善欬凡遠思強慮傷人憂恚悲哀傷人喜樂過度傷人忿怒不解傷人汲汲所願傷人戚戚所患傷人寒暄失節傷人故曰五勞六極七傷也論傷甚衆且言其略此方悉主之也

建中湯治五勞七傷小腹急痛膀胱虛滿手足逆冷食飲苦吐酸痰嘔逆泄下少氣目眩耳聾口焦小便自利方

大棗十五枚　膠飴半斤　黃耆　附子一兩　人參　半夏　乾薑　當歸各三兩

橘皮　芍藥

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升半湯成下膠飴烊沸

分四服（深師有桂心六兩生薑一斤無橘皮乾薑一兩）

建中湯治虛損少氣腹脹內急拘引小腹至冷不得屈伸不能飲食寒熱頭痛手足逆冷大小便難或復下痢口乾夢寐泄精或時吐逆恍惚面色枯瘁又復微腫百節疼酸方

人參　甘草

當歸各二兩　黃耆

大棗三十枚　芍藥四兩

生薑六兩　厚朴一兩

右十五味㕮咀以水一斗二升煮取四升去滓內飴糖服

八合日三夜一劾者加生薑一倍

建中湯治五勞七傷虛羸不足面目黧黑手足疼痛久立腰

甘草各二兩

疼起則目眩腹中懸急而有絶傷外引四肢方

生薑　芍藥

芍藥各五兩　大棗三十枚

乾地黃　甘草

右六味㕮咀以水六升漬一宿明旦復以水五升合煮取三升分三服藥入四肢百脈似醉狀是效無生薑酒漬乾薑三兩一宿用之常行此方神妙

大建中湯治虛勞寒澼飲在脇下涊涊有聲飲已如從一邊下涊涊然也有頭並衝皮起引兩乳內痛裏急善夢失精氣短目眩眩忽忽多忘方

甘草二兩　人參三兩

蜀椒二合　飴糖八兩

右六味㕮咀以水一斗煮取三升去滓內糖消服七合裏急拘引加芍藥桂心各三兩手足厥腰背冷加附子一枚

半夏升　生薑斤

勞者加黃耆一兩

大建中湯治五勞七傷小腹急臍下彭亨兩脅脹滿腰脊相引鼻口乾燥目暗眩眴憒憒不樂胷中氣急逆不下食飲吞中策策痛小便黃赤尿有餘瀝夢與鬼神交通去精薦恐虛乏方

飴糖半斤　黃耆　遠志　當歸千金翼無

澤瀉一兩三銖　芍藥　人參　龍骨

甘草二兩　生薑八兩　大棗二十枚

右十一味㕮咀以水一斗煮取二升半湯成內糖令烊一服八合消息又一服（深師無飴糖遠志澤瀉龍骨有桂心六兩半夏一升附子一枚）

凡男女因積勞虛損或大病後不復常苦四體沈滯骨肉痠酸吸吸少氣行動喘憐或少腹拘急腰背強痛心中虛悸煩熱乾脣燥面體少色或飲食無味陰陽廢弱悲憂慘戚多臥少起久者積年輕者百日漸致瘦削五藏氣竭則難可復振治之以小建中湯方

甘草一兩　桂心三兩　芍藥六兩　生薑三兩　大棗十二枚

膠飴一升

右六味㕮咀以水九升煮取三升去滓內膠飴一服一升日三間三日復作一劑後可將諸丸散（仲景云嘔家不可服肘後云加黃耆人參各二兩為佳若患痰滿及溏泄可除膠飴胡方有半夏六兩黃耆三兩今錄驗名芍藥湯）前胡建中湯治大勞虛劣寒熱嘔逆下焦虛熱小便赤痛客熱上重頭痛目疼骨肉痛口乾方

前胡二兩　黃耆　芍藥　當歸

茯苓　桂心各三兩　甘草一兩

半夏各六分　白糖六兩　人參　生薑八兩

右十一味㕮咀以水一斗二升煮取四升去滓內糖令消服

治虛勞裏急諸不足黃耆建中湯方

黃耆　桂心　甘草　芍藥
各三兩　各二兩　六兩

生薑三兩　大棗十二枚　飴糖一升

右七味㕮咀以水一斗煮取二升去滓內飴令消溫服一升日三間日可作嘔者倍生薑腹滿者去棗加茯苓四兩

佳仲景集驗古今錄驗並同深師治虛勞腹滿食少小便多者無飴糖有人參二兩半夏二升又治大虛不足小便上衝胸短氣言語謬誤不能食吸吸氣乏悶亂必効方治虛勞下焦虛冷不禁小便數者有人參當歸各二兩若失精加龍骨白斂各一兩古今錄驗治虛勞裏急小腹急痛氣引胸脅痛或心痛短氣者以

黃耆湯治虛勞不足四肢煩疼不欲食食即脹汗出方

黃耆　芍藥　桂心　麥門冬
五味子　甘草　當歸　細辛
人參　大棗
各一兩　十二枚　二十枚　前胡　茯苓
各三兩　六兩　四兩

生薑　半夏
各二兩　八

右十四味㕮咀以水一斗四升煮取三升每服八合日二服不深師方治虛乏四肢沈重或口乾吸吸少氣小便利諸不足者無麥門冬五味子細辛前胡有桑螵蛸十枚治丈夫虛勞風冷少損或大病後未平復而早牽勞腰背強直腳中疼弱補諸不足者無五味子細辛有遠志橘皮各二兩蜀椒一兩烏頭三枚小品方治虛勞少氣小便過多者無五味子細辛前胡茯苓半夏有黃芩一兩地黃二兩以水九升煮取三升治虛勞腎中客氣塞冷癖痞宿食不消吐噁胸間水氣或流飲腸鳴食不生肌肉頭痛上重下輕目瞤瞤忽忽去來躁熱目不得安小腹急小便不利小便白濁傷多者無麥門冬赤餘歷臨事不起瞤忽去來或小便白濁傷多者無麥門冬五味子當歸細辛前胡茯苓半夏有厚朴二兩治方治五藏內傷者無麥門冬五味子當歸細辛前胡茯苓名大橫耆湯延年以釘方主補虛損強腎氣者無麥門冬五味子細辛前胡有防風芎藭各三兩

樂令黃耆湯治虛勞少氣胸心淡冷時驚惕心中悸動手脚逆冷體常自汗補諸不足五藏六腑虛損腸鳴風濕榮衛不調百病又治風裏急方

黃耆　人參　橘皮　當歸

桂心　細辛　前胡　芍藥
甘草　茯苓　麥門冬各一兩　生薑五兩
半夏二兩半　大棗二十枚

右十四味㕮咀以水二斗煮取四升一服五合日三夜一
服深師方無橘皮細辛前胡甘草麥門冬有烏頭三兩蜀椒二兩遠志二兩名醫別錄有烏頭五枚崔氏大黃酒洽崔氏有烏頭一兩

治虛勞損羸乏效逆短氣四肢煩疼腰背相引痛耳鳴面黧黯骨間熱小便赤黃心悸目眩諸虛乏腎瀝湯方

羊腎一具　桂心二兩　人參　澤瀉
甘草　五味子　防風　菖蒲
薤白　地骨皮　當歸各二　茯苓

右十六味㕮咀以水一斗五升先煮腎取一斗去腎入藥生薑各四　磁石五兩

煎取三升分三服可常服之廣濟方治虛勞百病者無人參甘草芍藥生薑當歸芍藥生薑

玄參有蔕三兩牛膝五加皮各二兩胡洽大虛損夢寤驚悸上氣肩息腎小腹裏急引腰脊四肢常苦寒冷大小便澀利無常或赤或白足微腫或吞酸善忘無者無澤瀉防風黃耆玄參礎石地骨皮有黃芩一兩麥門冬乾地黃遠志各三兩大棗二十枚崔氏治腎藏虛勞所傷補益者無芍藥玄參礎石地骨有黃芩遠志各二兩乾地黃三兩麥門冬四兩大棗二十枚治五勞六極八風十二痺補若不足者無澤瀉甘草五味子防風芍藥生薑玄參地骨有附子牡丹皮各一兩半牡荊子昌蒲桑螵蛸各二兩經心錄治腎氣不足耳無所聞者無澤瀉甘草五味子防風芍藥生薑玄參地骨有附子牡丹皮牡荊子味子各一兩乾地黃三兩大棗十五枚名羊腎湯

又方

羖羊腎一具切去脂以水一斗六升煮取一斗三升　大棗二十枚

桑白皮六兩　黃耆　五味子　菥蓂
澤瀉　巴戟天
防風　秦艽

人參　桂心　署預　丹參
遠志　茯苓　細辛　牛膝 各三兩
石斛　生薑 酪五兩　杜仲　礓石 各八兩

右二十二味咬咀內腎汁中煮取三升分三服相去如人行五里再服

增損腎瀝湯治大虛不足小便數噓吸焦燋引飲膀胱滿急每年三伏中常服此三劑於方中商量用之

羊腎一具　人參　石斛　麥門冬
澤瀉　乾地黃　括樓根　地骨皮 各四兩
遠志　生薑　甘草　當歸
桂心　五味子　桑白皮 寄生桑作 各三兩
茯苓 各三兩　大棗三十枚

右十七味咬咀以水一斗五升先煮腎取一斗二升去腎內藥煮取三升去滓分三服小品方無石斛括樓地骨桑皮茯苓有芎藭黃連龍骨各二兩療增二十枚又治腎氣不足消渴引飲小便過多腰脊痠痛者無石斛括樓地骨桑白皮甘草有芎藭二兩黃芩芍藥各一兩桑螵蛸二十枚雞肫胵黃皮一具崔氏治虛勞夢遺滑精無石斛括樓地骨桑白皮有黃耆黃芩芍藥防風各二兩

治左脅氣衝膈上滿頭上有風如蟲行手足頑痺皐塞脚轉筋申縮不能兩目時腫痛方

豬腎一具　防風　芎藭　橘皮
澤瀉　桂心　石斛 各一兩　生薑
丹參　茯苓　通草　半夏 各三兩
乾地黃三兩

右十三味咬咀以水一斗半煮腎減三升去腎下藥煮取二升七合去滓分三服

五補湯治五藏內虛竭短氣欬逆傷損鬱邑不足下氣通津

液方

桂心　甘草　五味子　人參各二兩
麥門冬　小麥各一升　狗杞根白皮一斤
薤白一斤　生薑八兩　粳米三合

右十味㕮咀以水一汁二升煮取三升每服一升日三口
燥者先煮竹葉一把水減一升去葉內諸藥煮之千金翼無生薑
凝唾湯治虛損短氣咽喉疑唾不出如膠塞喉方

茯苓　人參各半兩　前胡三兩　甘草一兩
大棗三十枚　麥門冬五兩　乾地黃　桂心
芍藥各一兩

右九味㕮咀以水九升煮取三升分溫三服一名茯苓湯
補湯方

防風　桂心各二兩　車前子二兩有青　五加皮三兩

丹參　鹿茸　巴戟天　乾地黃
枸杞皮各五兩

右九味㕮咀以水八升煮取三升去滓分三服
人三湯治男子五勞七傷胃中逆滿害食之氣嘔逆兩脅下
脹少腹急痛宛轉欲死調中平藏理絕傷方

人參　麥門冬　當歸　芍藥
甘草　生薑　白糖各二兩　前胡
茯苓　蜀椒　五味子　橘皮各一兩
桂心二兩　大棗十五枚　枳實三兩

右十五味㕮咀取東流水一斗半漬藥半日用三歲陳薑
梢以煎之取四升內糖復上火煎令十沸年二十以上六
十以下一服一升二十以下六十以上服七八合雖年盛
而久羸者亦服七八合日三夜一不爾藥力不接則不能

救病也要用勞水陳釜不則水強火盛猛即藥力不出也

貞觀初有人久患羸瘦形容不復人狀殆死余處此方一劑則差如湯沃雪所以録記之餘方皆爾不能一一具記

內補散治男子五勞六絕其心傷者令人善驚妄怒無常其脾傷者令人腹滿喜噫食竟欲卧面目痿黃其肺傷者令人少精腰背痛四肢厥逆其肝傷者令人少血面黑其腎傷者有積聚少腹腰背滿痺欬唾小便難陸絶之為病皆起於大勞脉虛外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹中雷鳴時時泄痢或閉或痢面目腫心下憒憒不欲語憎聞人聲方

乾地黃五分　巴戟天一兩　甘草　麥門冬

人參　蓯蓉　五味子

桂心　茯苓　附子一兩半　菟絲子

山茱萸各五分　遠志一兩　地麥五分

右十五味治下篩酒服方寸匕日三加至三匕無所禁

石斛散治大風四肢不收不能自反覆兩眉中疼痛身重脛急筋腫不可以行時寒時熱足牖如似刀刺身不能自任此皆得之飲酒中大風露卧濕地寒從下入腰以下冷不足無氣子精虛衆脉寒陰下濕亟消令人不樂恍惚時悲此方除風輕身益氣明目強陰令人有子補不足方

石斛十分　牛膝二分　附子　杜仲各四

芍藥　松脂　柏子人　石龍芮

澤瀉　蓴辭　雲母粉　防風

山茱萸　菟絲子　細辛　桂心各三

右十六味治下篩酒服方寸匕日再陰不起　倍菟絲子杜仲腹中痛倍芍藥膝中痛倍牛膝背痛倍蓴辭腰中風倍

防風少氣倍梔子人蠶不能行倍澤瀉隨病所在倍三分亦可爲丸以棗膏丸如梧子酒服七丸

腎瀝散治虛勞百病方

羚羊腎一具陰乾　茯苓一兩半　桂心　巴戟天　山茱萸　防風　五味子　甘草　人參　石斛　附子　遠志　牛膝　鍾乳粉　菟絲子各五分　乾地黃二兩　乾薑　細辛各一兩　丹參　蔥蓉

右二十味治下篩令鍾乳粉和欖更篩令勻平旦清酒服方寸匕稍加至二匕日再

腎瀝散治男子五勞七傷八風十二痺無有冬夏悲憂憔悴凡是病皆須服之方

羊腎一具陰乾　厚朴　五味子　女萎　細辛　芍藥　石斛　白斂　茯苓　乾漆　礬石　龍膽　桂心　苦蘘　蔥蓉　蜀椒　白朮　牡荊子　菊花　遠志　人參　續斷　澤瀉　蕳蘞　黃耆　巴戟天　昌蒲　山茱萸各一兩　乾薑　石龍芮　牛膝各一兩半　附子　秦艽各一兩　桔梗二兩半　防風　署預　石龍芮　續斷　桔梗　乾薑　茯苓各二兩　蜀椒　山茱萸　昌蒲

右三十七味治下篩酒服方寸匕日三忌房室

又方

芍藥　人參　龍膽　女菱
厚朴　細辛　巴戟天　蕳蘼
附子　石斛　黃耆　菖蒲
白斂　烏頭　天雄　桂心
肉蓯蓉各一兩半　秦艽　五味子　白朮
礬石一兩作礬石　牡荊子　菊花　牛膝各一兩
遠志二兩半　羊腎一具陰乾　署預一兩半　乾漆三兩

右三十六味治下篩酒服方寸匕日三此方比前方無澤瀉黃芩防風有烏頭天雄各一兩餘並同

署預散補丈夫一切病不能具述方

署預　牛膝　菟絲子各一兩　蓯蓉一兩
巴戟天　杜仲　續斷各一兩一方用遠志五味子二分
荊實一兩一方用枸杞子　山茱萸一分一方用防風

茯苓一兩一方用茯神　蛇牀人一分

右十二味治下篩酒服方寸匕日二夜一惟禁醋蒜自外無忌服後五夜知覺十夜力生十五夜力壯如盛年二十夜力倍若多忘加遠志茯苓體澀加柏子人服三兩劑益肌肉亦可丸一服三十丸日二夜一以頭面身體暖爲度其藥和平不熱調五藏久服健力不可當婦人服者面生五色

治五勞六極七傷虛損方

蓯蓉　續斷　陽起石
白龍骨各七分　五味子　蛇牀子　乾地黃
牡礪　桑寄生　天門冬　白石英各二兩
車前子　地膚子　菟絲子各五合
韭子　地骨皮八分

右十七味治下篩酒服方寸匕日三服

補五勞方

五月五日採五加葉七月七日採葉九月九日取根治下篩服方寸匕日三長服去風勞妙

地黃散主益氣調中補絕令人嗜食除熱勞方

生地黃三十斤細切暴乾取生者三十斤擣取汁漬之令相得出暴乾復如是玆反暴擣末酒服方寸匕食後服勿令絕

鍾乳散治五勞七傷虛羸無氣力傷極方

鍾乳六兩無問麁細以白淨無赤黃黑爲上銅鎗中可盛三兩斗并取粟麁糠二合訖內鎗中煮五六沸乃內乳於淨淘之暴乾碓玉碓研不作聲止重密絹水下澄取之用

鐵精一兩 鹿角一兩白者 蛇牀人三兩 人參 桂心 礪石 磨蟲 白馬莖別研 硫黃別研 石斛各一兩

右十一味末之以棗膏和擣三千杵酒服三十丸如梧子日再愼房及生冷酢滑雞猪魚陳敗

寒食鍾乳散治傷損乏少氣力虛勞百病令人丁強飲食去風冷方在第十七卷氣極篇中

三石散主風勞毒冷百治不差補虛方

鍾乳 紫石英 白石英各五分 人參 栝樓根 蜀椒 乾薑 附子 牡蠣 桂心 杜仲 細辛 茯苓各十分 白朮 桔梗 防風各五分

右十六味治下篩酒服方寸匕日三行十數歩至五十歩以上服此大佳少年忽用之自餘補方通用老少皆宜冬服之

千金翼名更生散用赤石脂不用紫石英弱椒杜仲茯苓為十三味

黃帝問五勞七傷於高陽負曰陰襄二曰精清三曰精少四曰陰消五曰囊下濕六曰腰膝厥痛冷不欲行骨熱遠視淚出口乾腹中鳴時有熱小便淋瀝莖中痛或精自出有病如此所謂七傷一曰志勞二曰思勞三曰心勞四曰憂勞五曰疲勞此謂五勞黃帝曰何以治之高陽負曰石韋九主之方

石韋　蛇牀子　肉蓯蓉　山茱萸
細辛　磨石　遠志　茯苓
澤瀉　柏子人　昌蒲　杜仲
桔梗　天雄　牛膝　續斷
署預酪二　赤石脂　防風各三兩

右十九味末之棗膏若蜜和丸酒服如梧子三十九日三七日愈二十日百病除長服良雀氏無磨石茯苓澤瀉桔梗署預有栝樓根二兩半

云侯　治水

五補丸治腎氣虛損五勞七傷腰脚酸疼肢節苦痛目暗眩眩心中喜怒恍惚不定夜卧多夢覺則口乾食不得味心常不樂多有恚怒房室不舉心腹脹滿四體疼痺口吐酸水小腹冷氣尿有餘瀝大便不利方悉主之久服延年不老四時勿絕一年萬病除愈方

人參　五加皮　五味子　天雄
牛膝　防風　遠志　石斛
署預　狗脊各四分　蒺藜　乾地黃各十分
巴戟天六分　茯苓　菟絲子各五分　覆盆子
石龍芮各二分　白朮各八分　蓮蘇　天門冬七分　杜仲六分　鹿茸十五分

右二十四味末之蜜丸如梧子酒服十九日三有風加天

雄芎藭當歸黃耆五加皮石南茯神獨活柏子人白朮各
三分有氣加厚朴枳實橘皮各三分泄加乾薑桂心吳茱
萸附子細辛蜀椒各三分泄精加韭子白龍骨牡蠣鹿茸
各三分泄痢加赤石脂龍骨黃連烏梅肉各三分春依方
服夏加地黃五分黃芩三分麥門冬四分冷則去此加乾
薑桂心蜀椒各三分若不熱不寒亦不須增損直爾服之
三劑以上即覺庶事悉佳愼酢蒜鱠陳臭大冷醉吐自外
治諸虛勞百損無比署預丸方

署預二兩　蒺藜四兩　五味子六兩　菟絲子
杜仲酪三　牛膝　澤瀉　乾地黃
山茱萸　茯神一作苓　巴戟天　赤石脂酪一兩

右十二味末之蜜丸如梧子食前以酒服二十九至三十
九日再無所忌惟禁酢蒜陳臭之物服之七日後令人健
四體潤澤脣口赤手足暖面有光悅消食身體安和音聲
清明是其驗也十日後長肌肉其藥通中入腦鼻必酸疼
勿怪若求大肥加燉煌石膏二兩失性健忘加遠志一兩
體少潤澤加柏子人一兩古今録驗有白馬莖二兩共十
六味治丈夫五勞七傷頭痛目眩手足逆冷或煩熱有時
不生肌肉或少食而脹滿體澀無光或冷痺肩疼腰髖不
行此藥能補十二經脉起陰陽通內制外安魂定魄開三
焦破積氣厚腸胃銷五痞邪氣除心內伏熱強筋練骨輕
身明目除風去冷無所不治補益處廣常須服餌爲佳七
十老人服之尚有非常力況少者乎

大署預丸主男子女人虛損傷絶頭目眩骨節煩痛飲食微
少羸瘦百病方

署預　人參　澤瀉　附子各八分古今録作茯苓
黃芩　天門冬　當歸各十分　桔梗
乾薑　桂心各四分　乾地黃十分　白朮

芍藥　白斂作防風　石膏　前胡各三分
乾漆　杏人　大豆卷五分古今錄作黃耆　阿膠各三分　五味子十六分
大黃六分　甘草二十分　大棗一百枚

右二十四味末之蜜和棗膏擣三千杵丸如梧子酒服五十丸張仲景無附子黃芩石膏乾漆五味大黃有神麴十分芍藥防風各六分日三漸增至十丸以一百丸爲劑每服一杖令三分丸如彈丸

腎氣丸治虛勞腎氣不足腰痛陰寒小便數囊冷溼尿有餘瀝精自出陰痿不起忽忽悲喜方

乾地黃八分　薤蓉六分　麥門冬　遠志
防風　乾薑　署預　牛膝　地骨皮
萎蕤　石斛　細辛
甘草　附子　桂心
桂心　茯苓

山茱萸各四分　鍾乳粉十分　羖羊腎一具

右十九味末之蜜丸以酒服如梧子十五丸日三稍加至三十丸古今錄驗無遠志防風乾薑牛膝地骨萎蕤甘草鍾乳有狗脊一兩黃耆四兩人參三兩澤瀉乾薑各二兩大棗一百枚

腎氣丸主男子婦人勞損虛羸傷寒冷乏少無所不治方

石斛二兩　紫菀　牛膝　白朮各五分
麻人一分　人參　杏人　大豆卷
苓蘭　大豆卷　蜀椒　當歸
乾地黃各四分　羊腎具一　茯苓
防風　黃芩　甘草各六分
桂心　甘草

右十八味末之蜜丸酒服如梧子十丸日再漸增之一方有茯苓六分

腎氣丸勝胡公腎氣丸及五石丸方

乾地黃　茯苓
署預　桂心
澤瀉四兩
右九味末之蜜丸酒服如梧子二十丸加至三十丸以知爲度千金翼有牡丹皮四兩爲十味

八味腎氣丸治虛勞不足大渴欲飲水腰痛小腹拘急小便不利方

乾地黃八兩　山茱萸
牡丹皮　茯苓各三兩
右末之蜜丸如梧子酒下十五丸日三加至二十五丸仲景云常服去附子加五味子姚公云加五味子三兩薤白四兩張文仲云五味子薤白各四兩肘後方云地黃四兩附子澤瀉各一兩餘各二兩

腎氣丸主腎氣不足羸瘦目劇吸吸少氣躭重耳聾眼闇百

病方

桂心四兩　乾地黃一斤　澤瀉　署預
茯苓八兩　牡丹皮六兩　半夏二兩

右七味末之蜜丸如梧子大酒服十丸日三

黃耆丸治五勞七傷諸虛不足腎氣虛損目視眩眩耳無所聞方

黃耆　乾薑
芎藭　甘草
桂心　烏頭
人參　芍藥
蔾蓉酥二　羊腎具一
柬高五

右十九味末之以柬高腎與蜜爲丸酒服如梧子十五丸日二加至三十丸一方無乾薑當歸蒐活芎藭止十四味

當歸　蒐活白朮作
茯苓　細辛
附子　防風
石斛　乾地黃

錄驗无羊腎有羌活鍾乳赤石脂白石脂礬石各二分紫石英石硫黃名五石黃耆丸

黃耆丸療虛勞方

黃耆　鹿茸　茯苓　烏頭
乾薑各三分　桂心　芎藭　乾地黃各四分
白朮　菟絲子　五味子　柏子人
枸杞白皮各五分　當歸四分　大棗三十枚

右十五味末之蜜丸如梧子旦酒服十丸夜十丸以知爲度禁如藥法

神化丸主五勞七傷氣不足陰下濕癢或生瘡小便數有餘瀝陰頭冷疼失精自出少腹急繞臍痛膝重不能久立目視漠漠見風淚出胜酸精氣衰微卧不欲起手足厥冷調中利食方

菟絲　牛膝
署預各六分　山茱萸

續斷　大黃各五分　遠志　澤瀉
天雄　人參
石斛　杜仲
栝樓根　白朮
當歸二兩各一　桂心
蓳蘼　茯苓
赤石脂　昌蒲

右三十一味末之蜜丸梧子大酒服五丸日三加至二十丸三人九子丸主五勞七傷補益方

酸棗人　柏子人　慧莎人　菟絲子
菊花子　枸杞子　菴蕳子　地膚子
烏麻子　蛇牀子　五味子
桂心二兩各一　菟絲子　牡荊子
乾地黃　署預

右十六味末之蜜丸如梧子酒服二十九日二夜一
塡骨丸主五勞七傷補五藏除萬病方
石斛　人參　巴戟天　當歸
牡蒙　石長生　石韋　白术
遠志　菟絲　紫菀　茯苓
乾薑　天雄　蛇牀子　柏子人
五味子　牛膝　牡蠣　乾地黃
附子　牡丹　甘草　署預
阿膠酪二　蜀椒三兩
右二十六味末之白蜜和丸如梧子大酒服三九日三
通明丸主五勞七傷六極強力行事舉重重病後骨髓未滿
房室所食不消胃氣不平方
麥門冬三斤　乾地黃　石韋酪一　紫菀
甘草　阿膠
肉蓯蓉　遠志
右十二味末之蜜丸如梧子食上飲若酒服十九日再加
至三十九
補虛益精大通丸主五勞七傷百病方
乾地黃酥　天門冬　杜仲　五味子
石斛　肉蓯蓉　茯苓　天雄酪半
芍藥　人參酪六　麻子人　大黃
黃芩酪五　蜀椒三升　防風四兩　當歸
茯苓　杏人酪三　白芷一兩　甘草
右十九味末之白蜜棗膏丸如彈子空腹服一丸日三十日效
赤石脂丸主五勞七傷每事不如意男子諸疾方
赤石脂　山茱萸酪七分　防風　遠志

括樓根　牛膝　杜仲　署預各四分
蛇牀人六分　柏子人　續斷　天雄
昌蒲各五分　石韋二分　肉蓯蓉二分
右十五味末之蜜棗膏和丸如梧子空腹服五九日三十
日知久服不老加菟絲子四分佳
鹿角丸補益方
鹿角
防風
蛇牀子各五分　杜仲
赤石脂　乾薑各四分　牛膝
巴戟天各六分　蓯蓉七分　遠志
天雄二分
右三十一味末之酒服如梧子三十九日三忌米醋一方

無乾薑五味子
治五藏虛勞損傷陰痺陰下濕癢或生瘡蝕中痛小便餘瀝
四肢虛吸陽氣絶陽脉傷蓯蓉補虛益氣方
蓯蓉　署預各五分　遠志四分
菟絲子各六分　五味子　山茱萸各七分　蛇牀子
巴戟天十分　天雄八分
右九味末之蜜丸如梧子酒服二十九日二服加至二十
五九
治五勞七傷六極藏腑虛弱食飲不下顏色黧黑風所傷
乾地黃補虛益氣能食資顏色長陽方
乾地黃七分　蛇牀子六分　遠志十分　茯苓七分
蓯蓉十分　五味子四分　麥門冬五分　杜仲十分
阿膠八分　桂心五分　天雄七分　秦肉八分

甘草十分

右十三味末之蜜丸如梧子酒下二十九日再加至三十

丸常服尤佳

治虛勞不起囊下癢汗出小便淋瀝莖中數痛尿時赤黃甚者失精虧苦溺血目視眩眩得風淚出莖中冷精氣衰兩膝腫不能久立起則目眩補虛方

蛇牀子　細辛　天雄　大黃

杜仲　柏子人　菟絲子　茯苓

防風　蕳蒲　澤瀉各四　

栝樓根三分　桂心　菟蓉　署預

山茱萸　蜀椒　石韋　白朮各三分

遠志　牛膝各六分

右三十二味末之蜜丸如梧子酒服十五丸日再漸加至

伍拾丸拾伍日身體輕參拾日聰明伍拾日可御伍女

覆盆子丸主五勞七傷羸瘦補益令人充健方

覆盆子拾貳分　菟蓉　巴戟天　白龍骨

五味子　鹿茸　茯苓　天雄

續斷　署預　白石英各拾分　乾地黃八分

菟絲子拾貳分　蛇牀子伍分　遠志　乾薑各六分

右拾陸味末之蜜丸如梧子酒服拾伍丸日再細細加至參拾丸慎生冷陳臭（張仲景方無英字）

子人澤瀉各陸分牛膝肆分赤石脂廿草各捌分白朮桂心枸杞子人參拍分細辛肆分山茱萸肆分

治五勞七傷虛羸無氣力傷極方

菟絲子　五味子各貳兩　蛇牀子壹兩

右參味末之蜜丸如梧子壹服參丸日參禁如常法

補益方

乾漆　柏子人　山茱萸　酸棗人各四分

右肆味末之蜜丸如梧子大服貳柒丸加至貳拾丸日貳曲囊丸治風冷補虛弱亦主百病方

乾地黃　蛇牀子　署預　牡蠣

天雄　遠志　杜仲　鹿茸

五味子　桂心　鹿藥草　石斛

車前子　菟絲子　雄雞肝　肉蓯蓉

未連蠶蛾

右拾柒味各等分欲和任意擣末蜜丸如小豆大酒服參丸加至柒丸日參夜壹禁如常法須常有藥氣大益人服藥拾日以後少少得強翟平世治五勞七傷方

鍾乳粉　菖蒲屑各一分　乾薑三分一作乾地黃　巴戟天

菟絲子　蓯蓉各二分

右六味末之蜜丸如梧子酒服七九日三服訖行百步服酒三合更行三百步腎中熱定即食乾飯牛羊兔肉任爲羹去肥膩餘不忌明目益精長志倍力久服長生耐老方

遠志　茯苓　細辛　木蘭

菟絲子　續斷　人參　昌蒲

龍骨　當歸　芎藭　茯神

右十二味各五分末之蜜丸如梧子服七九至十九日二夜一滿三年益智

礜石酒療丈夫虛勞冷骨中疼痛陽氣不足陰下疥痛一作熱方

礜石　石斛　澤瀉　防風兩各五

杜仲　桂心酪四兩　桑寄生　天雄

黃耆　天門冬酌三　石南二兩　狗脊八兩

右十二味㕮咀酒四斗浸之服三合漸加至五合日再服亦可單漬礜石服之

石英煎坐男子女人五勞七傷消枯羸瘦風虛冷少氣力無顏色不能動作口苦咽燥眠中不安惡夢驚懼百病方

紫石英　白石英　各一斤　石斛五兩　柏子人

勿住手去滓澄清　遠志各一兩　茯苓　人參　桂心

乾薑　白朮　五味子　薤蓉

甘草　天雄　白芷　細辛

芍藥　黃耆　山茱萸　麥門冬

防風　署預各二兩　白蜜三斤　酥一升

桃人三升

右二十四味治下篩內煎中如不足加酒取足為限煎之令可丸丸之酒服三十丸如梧子日三稍加至四十丸為度無藥者可單服煎令人肥白充實

麋角丸方

取當年新角連腦頂者為上看角根有斫痕處亦堪用退角根下平者是不堪諸麋角丸方凡有一百一十方此特出衆方之外容成子羔服而羽化夫造此藥取角五具或四具三具兩具一具為一劑先去尖一大寸即各長七八寸取勢截斷量把鎊得即於長流水中以竹器盛懸浸可十宿如無長流水處即於淨盆中滿著水浸每夜易之即將出削去皴皮以利鎊鎊取白處至心即止以清粟米泔浸之經兩宿初經一宿即乾握去舊水置新絹上暴乾淨擇去惡物麤骨皮及鎊不勻者即以無灰美酒於大白瓷器

中浸經兩宿其酒及器物隨藥多少其藥及酒俱入淨釜
中初武火煮一食久後即又著火微煎如蠅目沸以柳木
篦長四尺闊三指徐攪之困即易人不得住時時更添美
酒以成煎為度煎之皆須平旦下手不得經兩宿仍看屑
消似希膠即以牛乳五大升酥一斤以次漸下後藥

秦艽　人參　檳榔　蒐絲子（酒浸兩宿待乾別搗之）　甘草　肉蓯蓉

右擣為散如不要補即不須此藥共煎又可一食時候藥
似稠粥即止火少時歇熱氣即投諸藥散相和攪之相得
仍待少時漸稠堪作丸即以新器中盛之以衆手一時丸
之如梧子大若不能衆手丸旋煖漸丸亦得如粘手著少
酥塗手其服法空腹取三果漿以下之如無三果漿酒下

（條炙令黃為散與諸藥同制之）　通草

亦得初服叁拾丸日加壹丸至伍拾丸為度日貳服初服壹百
日內忌房室服經壹月腹內諸疾自相驅逐有微痢勿怪
漸後多泄氣能食明耳目補心神安藏腑填骨髓理腰脚
能久立鬚白更黑皃老還少其患氣者加枳實青木香准
前各壹大兩若先曾服丹石等藥即以三黃九食上壓令
宣泄如飲酒食麪口乾鼻中氣麤眼澁即以蜜漿飲之
即止如不止加以三黃九使微利諸如此壹度發動已
後方始調暢服至貳百日面皺自展光澤壹年齒落更生
強記身輕若風日行數百里貳年常令人肥飽少食柒拾
已上却成後生叁年腸作筋髓預見未明肆年常飽不食
自見仙人叁拾已下服之不輟顏壹定其藥合之時須淨
室中不得令雞犬女人孝子等見婦人服之亦佳
五藏虛勞小腹弦急脹熱炙腎輸伍拾壯老小損之若虛冷

上進一組重傷津液以七分為限

可至百壯橫叁間寸灸之

備急千金要方卷第十九

金澤文庫

涼
香稅

備急千金要方卷第二十 膀胱腑

朝奉郎守太常少卿充秘閣校理判登聞檢院護軍賜紫金魚袋臣林億等校正

膀胱腑脉論第一
膀胱虛實第二
胞囊論第三
三焦脉論第四
三焦虛實第五
霍乱第六
雜補第七

膀胱腑脉論第一

論曰膀胱者主腎也耳中是其候也腎合氣於膀胱膀胱者津液之腑也號水曹掾名玉海重玖兩貳銖左回疊積上下縱廣玖寸受津液玖升玖合兩邊等應貳拾肆氣舍空在外

金澤文庫

膀胱漏泄

黃帝曰夫五藏各一名一形腎乃獨兩何也岐伯曰膀胱為腑有三處腎亦三形應腑有三處藏名一腑名三故伍藏陸腑也一說腎有左右而膀胱無二今用當以左腎合膀胱右腎合參焦

左手關後尺中陽絶者無膀胱脈也病苦逆冷婦人月使不調王月則閉男子失精尿有餘瀝刺足少陰經治陰在足內踝下動脈是也

右手關後尺中陽絶者無子戶脈也病苦足逆寒絶產帶下左手關後尺中陽實者膀胱實也病苦逆冷脅下邪氣相引痛刺足太陽經治陽在足小指外側本節後陷中

右手關後尺中陽實者膀胱實也病苦少腹滿胥痛刺足太陽經治陽病先發於膀胱者背脽筋痛脛痠一日之小腸脹一日之脾閉五日之腎少腹胥痛口乾死冬雞鳴夏下晡一云日夕

膀胱病者少腹偏腫而痛以手按之則欲小便而不得肩上熱若脈陷及足小指外側及脛踝後皆熱若脈陷取委中

膀胱脹者少腹滿而氣蹇

腎前受病傳於膀胱腎欬不已欬則遺溺

厥氣客於膀胱則夢遊行

腎應骨密理厚皮者三焦膀胱厚粗理薄皮者三焦膀胱薄腠理疎者三焦膀胱緩急皮而無毫毛者三焦膀胱急毫毛美而粗者三焦膀胱直稀毫毛者三焦膀胱結也

扁鵲云六腑有病徹面形腎膀胱與足少陰太陽為表裏膀

胱㾦通於五藏所以五藏有疾即應膀胱胱有疾即應囊傷熱則小便不通膀胱急尿苦黃赤傷寒則小便數清白或發石水根在膀胱四肢小其腹獨大也方在治水篇中

骨絕不治齒黃落十日死

足太陽之脉起於目內眥上額交巔上其支者從巔至耳上角其直者從巔入絡腦還出別下項循肩膊內俠脊抵腰中入循脊絡腎屬膀胱其支者從腰中下會於後陰下貫臀入腘中其支者從膊內左右別下貫胂（一作髖）過髀樞循髀外後廉下合腘中以下貫腨內出外踝之後循京骨至小指外側是動則病衝頭痛目似拔脊痛腰似折髀不可以曲腘（一作膕）如結腨如裂是為踝厥是主筋所生病者痔瘧狂癲疾頭腦項痛目黃淚出鼽衄項背腰尻腘腨脚皆痛小指不用盛者則人迎大再倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

膀胱虛實第二 脉四條 方六首 灸法一首

膀胱實熱

左手尺中神門以後脉陽實者足太陽經也病苦逆滿腰中痛不可俛仰勞也名曰膀胱實熱也

右手尺中神門以後脉陽實者足太陽經也病苦胞轉不得小便頭眩痛煩滿脊背強名曰膀胱實熱也

治膀胱實熱方

石膏八兩　梔子人一作仁瓜　茯苓　知母三兩　蜜五合　生地黃　淡竹葉各切　外

服須利加芒消三兩

治膀胱熱不已舌乾咽腫方

大黃　升麻各三兩　薔薇根白皮

射干　生玄參　黃蘗各四兩　蜜七合

右七味㕮咀以水七升煮取一升去滓下蜜煮三沸細細含之

膀胱虛冷

左手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦脚中筋急腹中痛引腰脊不可屈伸轉筋惡風偏枯腰痛外踝後痛名曰膀胱虛冷也

右手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦肌肉振動脚中筋急耳聾忽忽不聞惡風颼颼作聲名曰膀胱虛冷也治膀胱虛冷飢不欲飲食面黑如炭謇脇疼痛方

磁石六兩　黃耆　茯苓各三兩　五味子各四兩　杜仲　白朮　白石英各五兩

右七味㕮咀以水九升煮取三升分三服

治膀胱虛冷欬唾則有血喉鳴喘息方

羊腎一具　人參　玄參　桂心　苓蘑各三兩　甘草各二兩　茯苓四兩　地骨皮　生薑各五兩　白朮六兩　黃耆三兩

右十一味㕮咀以水一斗一升先煮腎減三升去腎下藥煮取三升去滓分爲三服

龍骨丸治膀胱虛腎冷坐起欲倒目瞤瞤氣不足骨痿方

龍骨　柏子人　甘草　防風　乾地黃各五分　桂心　禹餘粮　黃耆　茯苓　白石英各十分　人參　附子　菟絲子各六分　玄參　苓蘑　五味子各十分　磁石各四分　杜仲　乾薑各八分　山茱萸各四分

右二十味末之蜜丸如梧子空腹酒服三十丸日二加至四十九

治膀胱寒小便數漏精稠厚如米白泔方

赤雄雞腸兩具 雞肫胵具 乾地黃三分 桑螵蛸 牡蠣 龍骨 菟絲六分 赤石脂五分 黃連各四分 白石脂五分

右十味治下篩內雞腸及肫胵中縫塞蒸之令熟暴乾合擣爲散以酒和方寸匕日三服

胞囊論第三 論一首 灸法八首 方十六首

論曰胞囊者腎膀胱俟也貯津液并氷若藏中熱病者胞澁小便不通氷若黃赤若腑有寒病則胞滑小便數而多白若至夜則氷偏甚者夜則內陰氣生故熱則瀉之寒則補之不寒不熱依經調之則病不生矣

凡氷不在胞中爲胞屈僻津液不通以葱葉除尖頭內陰莖孔中深三寸微用口吹之胞脹津液大通便愈

治腎熱應胞囊澀熱小便黃赤苦呆不通榆皮通滑泄熱煎方

榆白皮 葵子各一升 赤蜜一升 滑石 車前子五升 通草各三兩

右六味咬咀以水三斗煮取七升去滓下蜜更煎取三升分三服婦人難產亦同此方

治膀胱急熱小便黃赤滑石湯方

滑石八兩 子苓三兩 榆白皮四兩 車前子 冬葵子各一升

右五味咬咀以水七升煮取三升分三服

治虛勞氷白濁方

榆白皮切二斤水二斗煮取五升分五服

又方 擣乾羊骨末服方寸匕日二

虛勞尿白濁灸脾輸二百壯

又灸三焦輸百壯

又灸腎輸百壯

又灸章門百壯在季肋端

凡飽食訖忍小便或飽食走馬或忍小便大走及入房皆致胞轉膀胱急滿不通治之方大燒末醋四合和二方寸匕服之

亂髮急纏如兩拳大燒末醋四合和二方寸匕服之訖即炒熟黑豆葉蹲坐上

治胞轉方

榆白皮一升　石韋一兩　鬼箭三兩　滑石四兩

葵子一升　通草一兩　甘草一兩

右七味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

治丈夫婦人胞轉不得小便八九日方

滑石一兩　寒水石一兩　葵子一升

右三味㕮咀以水一斗煮取五升分三服

治胞轉小便不得方

葱白四七莖　阿膠一兩　琥珀三兩　車前子一升

右四味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

又方 阿膠三兩水二升煮取七合頓服之

又方 豉五合以水三升煮取三升分三服

又方 麻子煮取汁頓服之

又方 連枷關燒灰水服之

又方 筆頭灰水服之

又方 內白魚子莖孔中

又方 燒死蜣蜋二枚末水服之

又方　酒和猪脂雞子大頓服之

腎痛小便不利苦胞轉炙玉泉七壯穴在關元下一寸大人從心下度取八寸是玉泉穴小兒斟酌以取之

又灸第十五椎五十壯

又灸臍下一寸

又灸臍下四寸各隨年壯

三焦脉論第四

論曰夫三焦者一名三關也上焦名三管反射中焦名霍亂下焦名走哺合而為一有名無形主五藏六腑往還神道周身貫體可聞不可見和利精氣決通水道息氣腸胃之間不可不知也三焦名中清之腑別號玉海水道出屬蜀膀胱合者雖合而不同上中下三焦同號為孤腑而榮出中焦衛出上焦榮者絡脉之氣道也衛者經脉之氣道也其三焦形相厚薄大小並同膀胱之形云

三焦病者腹脹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則為水留則為脹候在足太陽之外大絡在太陽少陽之間亦見于脉取委陽

小腹腫痛不得小便邪在三焦約取太陽大絡視其結脉與厥陰小絡結而血者腫上及胃管取三里

三焦脹者氣滿於皮膚殼殼而不堅疼（一云殼殼而堅）久欬不已傳之三焦欬而腹滿不欲飲食也

手少陽之脉起於小指次指之端上出兩指之間循手表腕出臂外兩骨之間上貫肘循臑外上肩而交出足少陽之後入缺盆交膻中散絡心胞下隔徧屬三焦其支者從膻中上出缺盆上項俠耳後直上出耳上角以屈下額至頰其支者從耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰至目兌皆是動

則病耳聾煇煇煒煒嗌腫喉痺是主氣所生病者汗出目眩
脊痛頰腫耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用爲此諸病
盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛
不虛以經取之盛者人迎大再倍於寸口虛者人迎反小於
寸口也

三焦虛實第五論三首 灸法七首 方十八首

論曰夫上焦如霧霧者霏霏起上也 其氣起於胃上管 難經甲乙巢源作上口
並咽以上貫膈布胃中走腋循足太陰之分而行還注於手
陽明上至舌下注足陽明常與榮衛俱行於陽二十五度行
於陰二十五度爲一周日夜五十周身周而復始大會於手
太陰也主手少陽心肺之病內而不出人有熱則飲食下胃
其氣未定汗則出或出於面或出於背身中皆熱不循衛氣
之道而出者何此外傷於風內開腠理毛蒸理泄衛氣走之
固不得循其道此氣慄悍滑疾見開而出故不得從其道名
曰漏氣其病則肘攣痛食先吐而後下也寒則精神不守泄下便痢語聲不
所以飲食先吐而後下其氣不續膈間厥悶
出若實則上絕於心若虛則引氣於肺也
治上焦飲食下胃胃氣未定汗出面背身中皆熱名曰漏氣
通脉瀉熱澤瀉湯方

澤瀉 半夏 柴胡 生薑各三兩
地骨皮五兩 石膏八兩 竹葉五合 薤心一升
茯苓 人參各二兩 甘草 桂心各一兩
右十三味㕮咀以水二斗煮取六升分五服一云水一斗煮取三升分三服
治上焦熱腹滿而不欲食或食先吐而後下肘攣痛麥門冬
理中湯方

麥門冬 生薑根 竹茹 廩米各一升

生薑四兩　白朮五兩　甘草尊心五合
茯苓各二兩　人參　橘皮各三兩　菱雞各三兩
右十二味㕮咀以水一斗五升取三升分三服
胷中膈氣聚痛好吐炙厥陰輸臨年壯穴在第四椎兩邊各相去一寸五分灸隨年壯
治上焦虛寒短氣不續語聲不出黃耆理中湯方
黃耆　桂心各二兩　丹參　杏人各四兩
桔梗　乾薑　五味子　茯苓
甘草　芍藥各三兩
右十味㕮咀以水九升煮取三升分爲三服
治上焦冷下痢腹內不安食好注下黃連丸方
黃連　烏梅肉各八兩　桂心二兩　乾薑
附子　阿膠各四兩　檗皮　芍藥

黃蘗各三兩
右九味末之蜜丸如梧子大飲下二十丸加至三十丸
治上焦閉塞乾嘔嘔而不出熱少冷多好吐白沫清涎吞酸厚朴湯方
厚朴　茯苓　芍藥　白朮　乾薑各四兩
生薑八兩　吳茱萸八合　桔梗　附子　人參
橘皮各三兩
右十一味㕮咀以水二斗煮取五升分五服
論曰中焦如漚中漚者在胃如漚也其氣起於胃中管難經作中口甲乙巢源作胃口在上焦之後此受氣者主化水穀之味秘糟粕蒸津液化爲精微上注於肺脉乃化而爲血奉以生身莫貴於此故獨得行於經隧名曰營氣主足陽明之別號曰鬯隆在外踝上去踝八寸別走太陰絡諸經之脉上下絡太倉主腐熟五穀

不吐不下實則生熱熱則閉塞不通上下隔絕虛則生寒寒則腹痛洞泄便痢霍亂毒脾胃之病夫血與氣異形而同類衛氣是精血氣是神故血與氣異名同類焉而脫血者無汗此是神氣奪汗者無血此是精氣故人有兩死（一刪繁作死）而無兩生猶精神之氣隔絕也若虛則補於胃實則瀉於脾調其中和其源萬不遺一也

治中焦實熱閉塞上下不通隔絕關格不吐不下腹滿膨脹喘急開關格通隔絕大黃瀉熱湯方

蜀大黃（切以水一升浸）　芒消（硏各三兩）　羚羊角　梔子（硏各四兩）　生玄參（八兩）

地黃汁（一升）　澤瀉　升麻

右九味㕮咀以水七升煮取二升三合下大黃更煮兩沸去滓下消分三服

治中焦熱水穀下痢藍青丸方

藍青汁（三升）　黃連（八兩）　黃蘗（四兩）　烏梅肉

白朮　地榆　地膚子（各三兩）　阿膠（五兩）

右八味末之以藍青汁和微火煎丸如杏人大飲服三丸日二七月七日合天良當併手丸之

治中焦寒洞泄下痢或因霍亂後瀉黃白無度腹中虛痛黃連煎方

黃連　酸石榴皮　地榆　阿膠（各四兩）

黃蘗　當歸　厚朴　乾薑（各三兩）

右八味㕮咀以水九升煮取三升去滓下阿膠更煎取烊分三服

四肢不可舉動多汗洞痢灸橫隨年壯穴在俠臍兩邊各二寸五分

論曰下焦如瀆瀆者如溝水決洩也其氣起胃下管別回腸注於膀胱而滲入焉故水穀者常并居於胃中成糟粕而俱下於大腸主足太陽灌滲津液合膀胱主出不主入別於清濁主肝腎之病候也若實則大小便不通利氣逆不續嘔吐不禁故曰走哺若虛則大小便不止津液氣絶人飲酒入胃穀未熟而小便獨先下者何蓋酒者熟穀之液也其氣悍以滑故後穀入而先穀出也所以熱則瀉於肝寒則補於腎也

治下焦熱實小便不通柴胡通塞湯方

柴胡　黄芩　橘皮　澤瀉　羚羊角各三兩
生地黄一升　香豉一升別盛　梔子四兩　石膏六兩　芒消二兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升去滓内芒消分三服

治下焦熱煩悶恍惚赤石脂湯方

赤石脂八兩　烏梅二十枚　梔子十四枚　白朮

升麻三兩　乾薑二兩　凜米一升

右七味㕮咀以水一斗煮米取熟去米下藥煮取二升半分爲三服

治下焦熱氣逆不續嘔吐不禁名曰走哺止嘔人參湯方

人參　委貗　茯苓各三兩　白朮　黄芩　知母
梔子人兩各四兩　石膏八兩　橘皮　生薑根

右十味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服

治下焦熱毒痢魚腦雜痢赤血臍下少腹絞痛不可忍欲痢不出香豉湯方

香豉　薤白升各一　梔子　黄芩
地榆兩各四　黄連　黄蘗　白朮
苗根兩各三

右九味㕮咀以水九升煮取三升分三服
膀胱三焦津液下大小腸輸五十壯
不利婦人帶下炙小腸輸五十壯
治下焦虛冷大小便洞泄不止黃蘗止泄湯方
黃蘗　人參　地榆　阿膠　各三兩
右九味㕮咀以水一斗煮取三升去滓下膠消盡分三服
治下焦虛寒津液不止短氣欲絕人參續氣湯方
人參　橘皮　茯苓　烏梅
麥門冬　黃耆　乾薑　各四兩
白朮　厚朴　各四兩　桂心　二兩　吳茱萸　三合
右十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升分三服
治下焦虛寒損腹中瘀血令人喜忘不欲聞人語肖中噎塞

而短氣茯苓丸方
茯苓　乾地黃　當歸　各八分　甘草
人參　乾薑　各七分　桂心　四分　黃耆　六分　杏人　五十枚　厚朴　三分　芎藭　五分
右十一味末之蜜丸如梧子初服二十丸加至三十丸爲度日二清白飲下之
治下焦虛寒損或先見血後便轉此爲近血或利不利伏龍肝湯方
伏龍肝　五兩　用黃蘗　阿膠　三兩
髮灰　二合　甘草
乾薑　黃芩
地榆　牛膝　各三兩　作朱萸根
右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓下膠煮消下髮灰分爲三服

治下焦虛寒損或先便轉後見血此爲遠血或利或不利好因勞冷而發宜續斷止血方

續斷　當歸　乾地黃各盃兩　阿膠各一兩　桂心各一兩　乾薑　甘草二兩　蒲黃

右八味咬咀以水九升煮取三升半去滓下膠取烊下蒲黃分三服

治三焦虛損或上下發泄吐唾血皆從三焦起或熱損發或因酒發宜當歸湯方

當歸　乾薑　乾地黃、柏枝皮　小薊　羚羊角　阿膠各三兩　芍藥　白朮各盃兩　黃芩　甘草各二兩　蒲黃五合　青竹茹半外　伏龍肝一雞子大　髮灰一雞子

右十五味咬咀以水一斗二升煮取三升半去滓下膠取烊次下髮灰及蒲黃分三服

五藏六腑心腹滿腰背疼飲食吐逆寒熱往來小便不利羸瘦少氣灸三焦輸隨年壯

腹疾腰痛膀胱冷澼飲注下灸下極輸隨年壯

三焦寒熱灸小腸輸隨年壯

三焦膀胱腎中熱氣灸水道隨年壯穴在俠脊兩邊各二寸半

脊骨在臍下五寸脊骨端水道俠脊兩邊各二寸半

霍亂第六　論二首　方二十八首　證四條　灸法十八首

論曰原夫霍亂之爲病也皆因食飲非關鬼神夫飽食肫膾復食乳酪海陸百品無所不噉眠卧冷席多飲寒漿胃中諸食結而不消陰陽二氣擁而反戾陽氣欲升陰氣欲降陰陽乖隔變成吐痢頭痛如破百節如解遍體諸筋皆爲回轉論

時雖小卒病之中最爲可畏雖臨深履危不足以諭之也養生者宜達其旨趣庶可免於夭横矣

凡霍亂務在温和將息若冷即遍躰轉筋凡此病定一日不食爲佳仍須三日少少喫粥三日已後可恣意食息七日勿雜食爲佳所以養脾氣也

大凡霍亂皆中食膽酪及飽食雜物過度不能自裁夜卧失覆不善將息所致以此殉命者衆人生稟命以五藏爲主夫五藏者即是五行内爲五行外爲五味五行五味更宜扶抑所以春夏秋冬逆理之食啖不可過度允飲食於五藏相剋者爲病相生無他經曰春不食辛夏無食鹹季夏無食酸秋無食苦冬無食甘此不必全不食但慎其太甚耳諺曰百病從口生蓋不虚也四時昏食不得太飽皆生病耳從夏至秋分忌食肥濃然熱月人自好冷食更與肥濃兼食果菜無節極遂致冷眠卧冷水洗浴五味更相剋賊雖欲無病不可得也所以病苦人自作之非關運也書曰非天夭人人中自絶命此之謂也

凡諸霍亂忌與米飲胃中得米即吐不止但與厚朴葛根飲若冬瓜葉飲沾漬咀嚼而不可多與若服湯時隨服吐者候吐定乃止診脉絶不通以桂合葛根爲飲吐下心煩内熱汗不出不轉筋脉急數者可犀角合葛根爲飲吐下不止發熱心煩欲飲水可少飲米粉汁爲佳若不止可與葛根蘘荷飲服之

問曰病有霍亂者何師曰嘔吐而利此爲霍亂

問曰病者發熱頭痛身躰疼痛惡寒而復吐利當屬何病師曰當爲霍亂霍亂吐利止而復發熱也傷寒其脉微澁本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必利本嘔下

利者不可治也霍乱吐多者必轉筋不渴即臍上築霍乱而臍上築者為腎氣動當先治其築治中湯主之去朮者以朮虚故也加桂者恐作貧狍世霍乱而臍上築吐多者若下多者霍乱而驚悸霍乱乱而渴霍乱而腹中痛嘔而吐利嘔而利欲得水者皆用治中湯主之霍乱吐下脹滿食不消心腹痛方

人參　乾薑　白朮　甘草　各三兩

右四味㕮咀以水八升煮取三升分三服不差頻服三兩劑遠行防霍乱依前作丸如梧子服三十丸如作散服方寸匕酒服亦得若轉筋者加石膏三兩仲景云若臍上築者腎氣動也去朮加桂心四兩吐多者去朮加生薑三兩下多者復用朮悸者加茯苓三兩半腹中痛者加人參合前成四兩半若寒者加乾薑合前成四兩半腹滿者去朮加附子一枚服湯後一食頃服熱粥一升微自温勿發揭衣被也

四順湯治霍亂轉筋肉冷汗出嘔惋者方

人參　乾薑　甘草　各三兩　附子一兩

右四味㕮咀以水六升煮取二升分三服范汪云利甚加龍骨二兩妙

四逆湯主多寒手足厥冷脉絶方

吳茱萸二升　生薑八兩　桂心　附子　各三兩　大棗二十五枚　通草　甘草　各二兩

右九味㕮咀以水六升酒六升合煮取五升分五服舊方用棗三十枚今以霍亂病法多痞故除之如退棗入葛根二兩佳霍亂四逆加半夏一合附子小者一枚惡寒乃與大附子

吐下而汗出小便復利或下利清穀裏寒外熱脉微欲絶或發熱惡寒四肢拘急手足厥四逆湯主之方

甘草二兩 乾薑一兩半 附子一枚

右三味咬咀以水三升煮取一升二合温分再服強人可與大附子一枚乾薑至三兩 廣濟方若吐之後吸吸少氣及下而腹滿者加人參一兩

吐利已斷汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絶通脉四逆湯主之方

大附子一枚

右三味咬咀以水三升煮取一升二合分二服脉出即愈

甘草一兩半 乾薑三兩強人四兩

若面色赤者加葱九莖腹中痛者去葱加芍藥二兩嘔逆加生薑二兩咽痛去芍藥加桔梗一兩利止脉不出者去桔梗加人參二兩皆與方相應乃服之 仲景用通脉四逆加猪膽汁湯

霍亂吐利已服理中四順熱不解者以竹葉湯主之方

竹葉一握 生薑一斤 白米三合 小麥一升

橘皮 當歸 桂心各二兩 甘草

人參 附子 芍藥各一兩

右十一味咬咀以水一斗半先煮竹葉小麥取八升去滓下藥煮取三升分三服上氣者加吳茱萸半升即差理中四順皆大熱若有熱宜竹葉湯

治婦人霍亂嘔逆吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其涎沫可服小青龍湯涎止次治其痞可服甘草瀉心湯方

甘草四兩 半夏半升 乾薑三兩 黃連一兩 大棗十二枚

右六味咬咀以水一斗煮取六升分六服

治婦人霍亂嘔吐小青龍湯方出第十八卷

霍亂四逆吐少嘔多者附子粳米湯主之方

中附子一枚 乾姜 甘草各一兩 粳米五合 半夏半升 大棗十枚

右六味㕮咀以水八升煮藥取米熟去滓分三服仲景無乾薑
治年老羸劣冷氣惡心食飲不化心腹虛滿拘急短氣霍亂嘔逆四肢厥冷心煩氣悶流汗扶老理中散方

麥門冬 乾薑 甘草各五兩 附子 茯苓各三兩 人參 白朮各六兩

右七味治下篩以白湯三合服方寸匕常服將蜜丸酒服如梧子二十丸

人參湯主毒冷霍亂吐利煩嘔轉筋肉冷汗出手足指腫喘息垂死絶語音不出百方不效脉不通者服此湯取差乃止隨吐續更服勿止并灸之方

人參 附子 橘皮 當歸 厚朴 茯苓 甘草 葛根 乾薑 桂心各一兩

右十味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

霍亂蠱毒宿食不消積冷心腹煩滿鬼氣方

極鹹塩湯三升熱飲一升刺口令吐宿食使盡不吐更服吐訖復飲三吐乃住靜止此法大勝諸治俗人以爲田舍淺近法鄙而不用守死而已凡有此病即須先用之

治霍亂方

萹豆升 香薷升

右二味以水六升煮取二升分服單用亦得

霍亂洞下不止者方

艾一把水三升煮取一升頓服之良

又方

香菜一把水四升煮取一升頓服之青木香亦佳

霍亂吐下腹痛方

以桃葉冬用皮煎汁服一升立止

霍亂引飲飲輒乾嘔方

生薑五兩㕮咀以水五升煮取二升半分二服高良薑大佳

治霍亂杜若丸又將遠行防備方

杜若	藿香	白朮	橘皮	乾薑
木香	人參	厚朴	甕麥	桂心
藪荷	女萎	回香	昌茅	雞舌香
虎掌	薇銜酪三	厚朴六兩	皂莢三寸	白朮酢
檳榔	乾薑酪三			

右十味末之蜜丸如梧子酒下二十九日三武德中有德行尼名淨明患此已又或一月一發或一月再發發即至死時在朝大醫蔣許甘單之徒亦不能識余以霍亂治之處此方得愈故疏而記之

凡先服石人因霍亂吐下服諸熱藥吐下得止因即變虛心煩手足熱口乾燥欲得水嘔逆遂悶脉急數者及時行熱病後毒未盡因霍亂吐下仍發熱心脅欲裂者以此解之方

薺苨	人參	厚朴	知母	栝樓根
茯苓	犀角	藍子	枳實	桔梗
橘皮	葛根	黃芩	甘草酪一	

右十四味㕮咀以水一斗煮取三升分三服中熱霍亂暴利心煩脉數欲得冷水者方

新汲井水頓服一升立愈先患胃口冷者勿服之治霍亂醫所不治方

童妾月經衣合血燒末酒服方寸匕秘之百方不差
者用之
治霍亂轉筋方
蓼三把去兩頭以水二升煮取一升頓服之一方作
梨葉
又方　燒故木梳灰末之酒服一枚小者永差
又方　車轂中脂塗足心下差
治霍亂轉筋入腹不可忍者方
極醎作塩湯於槽中煖漬之
又方　以酢煮青布搦之冷復易之
治轉筋不止者方
若男子以手挽其陰牽之女子挽其乳近左右邊
論曰凡霍亂多灸之或時雖未立差終無冤憂不可逆灸或但

先腹痛或先下後吐當隨病狀灸之
若先心痛及先吐者灸巨闕七壯在心下一寸不效更灸如
前數
若先腹痛者灸太倉二七壯宛在心厭下四寸臍上一寸夫不
止更灸如前數
若先下利者灸穀門二七壯在臍傍三寸男左女右一名大
腸募不差更灸如前數
若吐下不禁兩手陰陽脉俱疾數者灸心蔽骨下三寸又灸
臍下三寸各六七十壯
若下不止者灸大都七壯在足大指本節後內側白肉際
若泄利所傷煩欲死者灸慈宮二十七壯在橫骨兩邊各二寸
半橫骨在臍下橫門骨是
若乾嘔者灸間使各七壯在手腕後三寸兩筋間不差更灸

如前數
若嘔噦者灸心主各七壯在掌腕上約中止不止更灸如前數
若手足逆冷灸三陰交各七壯在足內踝直上三寸廉骨際未差更灸如前數
轉筋在兩臂及胷中者灸手掌內肉際七壯又灸臺中中府巨闕胃管足澤并治筋拘頭足皆愈
走哺轉筋灸踵踝白肉際各三七壯又灸小腹下橫骨中央隨年壯
轉筋四厥灸兩乳根黑白際各一壯
轉筋不止灸足踵聚筋上白肉際七壯立愈
轉筋入腹痛欲死四人持手足灸臍上一寸十四壯自不動下約中一壯

勿復持之又灸股裏大筋去膝六寸各一壯
霍亂已死有暖氣者灸承筋取繩量圍足從指至跟匝捻取繩橫量兩肘尖等折半以度令頭至跟踏地處引繩上至度頭即是灸七壯起死人
又以塩內臍中灸二七壯

雜補第七論三道十首

論曰彭祖云使人丁壯不老屋室不勞損氣力顏色不衰者莫過麋角其法刮之爲末十兩用生附子一枚合之酒服方寸匕日三大良亦可熬令微黃單服之亦令人不老然遲緩不及附子者又以雀卵和爲九彌佳服之三十日大有效
琥珀散主虛勞百病除陰痿精清力不足大小便不利如淋

狀腦門受寒氣結在關元強行陰陽精少餘瀝要脊痛四肢
重咽乾口燥食无常味乏氣力遠視眩眴臟悸不安五藏虛
勞上氣滿悶方

琥珀研一 松子 柏子 萹子各三外
蕪菁子 車前子 蛇牀子
菟絲子 枸杞子 胡麻子
橘皮 松脂 菴蕳子 麥門冬各一外
桂心 石韋 肉蓯蓉各四兩
茯苓 芎藭 人參 杜蘅
續斷 遠志 當歸 牛膝
牡丹各三兩 通草十四分

右三十味各治下篩合擣三千杵盛以韋囊先食服方寸匕日三夜一用牛羊乳汁煎令熟釀服令人志性強輕體益氣消穀能食耐寒暑百病除愈可御十女不勞損令精實如膏服後七十日可得行房久服老而更少髮白更黑齒落重生

蓯蓉散主輕身益氣強骨補髓不足能使陰氣強盛方

肉蓯蓉斤一 生地黃取汁三十斤 愼火草二斤切外
楮子二外 乾漆二外 甘草斤一
遠志 五味子各一斤

右八味以地黃汁浸一宿出暴乾復漬令汁盡爲散酒服方寸匕空腹服日三三十日力倍常可御十女

禿雞散方

蛇牀子 菟絲子 遠志 防風
巴戟 五味子 杜仲 蓯蓉各三兩

右八味治下篩酒下方寸匕日二常服勿絕無室勿服

治五勞七傷陰痿不起衰損天雄散方

天雄　五味子　蛇牀子　菟絲子酪六兩　遠志酪一兩　蓯蓉十分

右六味治下篩以酒下方寸匕日三常服勿止

治陰下濕癢生瘡失精陰痿方

牡蒙　菟絲子　柏子人　蛇牀子　蓯蓉酪二兩

右五味治下篩以酒下方寸匕日三以知爲度

治陰痿精薄而冷方

蓯蓉　鍾乳　蛇牀子　遠志

續斷　署預　鹿茸酪三兩

右七味治下篩酒下方寸匕日二服欲多房室倍蛇牀欲堅倍遠志欲大倍鹿茸欲多精倍鍾乳

治五勞七傷羸事衰惡方

署預　巴戟天　天雄　蛇牀子各二分

雄蠶蛾十枚石斛　五味子　蓯蓉各三分

菟絲子　牛膝

右十一味治下篩以酒服方寸匕日三

石硫黃散極益房補虛損方

石硫黃　白石英　鹿茸　遠志

天雄　白馬莖　女萎　蛇牀子

五味子　蠶蛸　菟絲子酪等分

右十一味治下篩酒服方寸匕日三無房禁服

又方

蘼蕪摩六兩　五味子　酸棗人　柏子人

枸杞根皮　乾地黃各三兩

右六味治下篩酒服方寸匕日三

又方

車前子莖葉根治下篩服方寸匕強陰益精

常餌補方

菟絲子　續斷　乾薑各二兩　遠志

乾地黃十兩　枸杞子一斤　天雄三兩

右九味治下篩酒服方寸匕日二服不忌服藥十日候莖

頭紫色乃可行房

治男子陰氣衰憊腎痛苦寒莖消少精小便餘瀝出失精囊

下濕癢虛冷令人充實肌膚肥悅方

巴戟天　菟絲子　杜仲　桑螵蛸　石斛

右五味等分治下篩酒服方寸匕日一常服佳

又方

署預　丹參　山茱萸　巴戟

人參各五分　蛇牀子　五味子各四分　天雄

右十一味治下篩酒服方寸匕日二夜一服

又方

五味子　蛇牀子各二兩　續斷

牛膝各三兩　菥蓂　車前子各四兩

右六味治下篩酒服方寸匕日二

治男子羸瘦短氣五藏痿損要胃痛不能房室益氣補虛杜仲

散方

杜仲　蛇牀子　五味子　乾地黃各六分

木防己五分　菟絲子十分　菥蓂各八分　巴戟天七分　遠志八分

右九味治下篩食前酒服方寸匕日三長服不絕佳

治陽氣不足陰囊濕癢尿有餘瀝漏洩虛損云為不起蓯蓉補虛益陽方

蓯蓉　續斷　蛇牀子　天雄
五味子　署預　遠志　乾地黃
巴戟天

右九味治下篩酒服方寸匕日三凡病皆由醉飽之後并疲極而合陰陽致成此病也

白馬莖丸主空房獨怒見敵不興口乾汗出失精囊下濕癢尿有餘瀝漏夢偏大引痠膝冷脛痠目中眩眩少腹急要脊強男子百病方

白馬莖　赤石脂　石韋　天雄
遠志　山茱萸　昌蒲　蛇牀子
署預　杜仲　肉蓯蓉　柏子人
石斛　續斷　牛膝　栝樓根
細辛　防風

右十八味末之白蜜丸如梧子大酒服四丸日再服七日知一月日百病愈加至三十丸

治陰痿方

雄雞肝一具　鯉魚膽四枚

右二味陰乾百日末之雀卵和丸服如小豆一丸日三

又方

菟絲子一升　雄雞肝二具陰乾百日

右二味末之雀卵和丸服如小豆大一丸

又方

乾漆　白朮
巴戟天　五味子
蓯蓉　甘草
牛膝　菟絲子

桂心酪三石南　石龍芮酪一乾地黃酪四兩
右十二味末之蜜和丸如梧桐子酒服二十九日三
治陽不起方
　原蠶蛾未連者一升陰乾去頭足毛羽末之白蜜丸
　如梧子夜卧服一丸可行十室昌蒲酒止之
又方
　蛇牀子　菟絲子　杜仲各五分　五味子四分　薤蓉八分
又方
　磁石五斤研清酒三斗漬二七日一服三合日夜一
又方　常服天門冬亦佳
又方
　五味子一斤新好者治下篩酒服方寸匕日三稍加
　至三匕無所慎忌食猪魚大蒜大醋服一斤尽即得
　力百日已上可御十女服藥常令相續不絶四時勿
　廢功能自知
又方
　菟絲子　五味子　蛇牀子各等分
右三味末之蜜丸如梧子飲服三九日三
壯陽道方
　蛇牀子末三兩　菟絲合汁二
右二味相和塗日五遍
冷暖適性方
　蒺藜　遠志各三分
右四味末之以唾和丸如梧子安莖頭内玉泉中
　附子一分　蛇牀子三分
一行當百思想不忘方

蛇牀子三分　天雄
右五味末之唾丸如梧子塗莖頭內玉泉中稍時遍體熱
陰痿不起方
蜂房灰夜卧傳陰上即熱起無婦不得傳之

備急千金要方卷第二十

朝奉郎守太常寺奉禮郎充秘閣校理判登聞檢院護軍賜緋魚袋臣林億等校正

消渴第一　消中不渴而利　消渴尿血　淋閉　水腫
淋閉第二　遺尿尿牀附　失禁
尿血第三　溺中　渴利　渴兼他病
水腫第四

消渴第一　論六首　方五十三首

論曰凡積久飲酒未有不成消渴然則大寒凝海而酒不凍明其酒性酷熱物無以加脯炙鹽鹹此味酒客躭嗜不離其口三觴之後制不由己飲啜無度咀嚼鮓醬不擇酸鹹積年長夜酣興不解遂使三膲猛熱五藏干燥木石猶且焦枯在人何能不渴治之愈否屬禹在病者若能如方節慎月而瘳不自愛惜死不旋踵方書醫藥寔多有效其如不慎者何其

所慎者有三一飲酒二房室三鹹食及麪能慎此者雖不服
藥而自可無他不知此者縱有金丹亦不可救深思慎之又
曰消渴之人愈與未愈常須思慮有大癰何者消渴之人必
於大骨節間發癰疽而卒所以戒之在大癰也當預備癰藥
以防之有人病渴利始發於春經一夏服栝樓豉汁得其分
渴漸差然小便猶數甚晝夜二十餘行常至三四升極差不
減二升也轉久便止漸食肥膩日就羸瘦候咽唇口焦燥吸
吸少氣不得多語心煩熱兩脚酸食乃兼倍於常故不為氣
力者然此病皆由虛熱所為宜治法栝樓汁可長將服以除
熱牛乳杏酪善於補此法最有益
治消渴除腸胃熱實方
麥門冬　茯苓　黃連　石膏　菱蕤各八分　人參　龍膽　黃芩各六分　升麻四分
枳實五分　枸杞子外臺用地骨皮　栝樓根　生薑四兩
右十三味末之蜜丸如梧子大以茹根粟米汁服十九日
若渴則與此飲至足大麻亦得飲方如左
茹根切一升　粟米三合
右二味以水六升煮取米熟用下前藥
又方
栝樓根　生薑切五兩　茹根切三升
右五味㕮咀以水一斗煮取三升分三服
治胃腑實熱引飲常渴洩熱止渴茯神湯方
茯神二兩外臺作茯苓　栝樓根　生地黃六兩　菱蕤四兩　小麥二升　生麥門冬各五兩
淡竹葉切三升　大棗二十枚　知母四兩　蘆根切各二升

右九味㕮咀以水三斗煮小麥一升葉取九升去滓下藥煮取四升分四服服不問早晚但渴即進非但正治胃渴通治渴患熱即主之

猪肚丸治消渴方

猪肚一枚治如食法　黃連　梁米各五兩　栝樓根　茯神各四兩　知母三兩　麥門冬二兩

右七味為末內猪肚中縫塞安罐中蒸之極爛接熱及藥木臼中擣可丸若強頓蜜和之丸如梧子飲服三十丸日二加至五十丸隨渴即服之

又方

栝樓根　麥門冬　鉛丹各六分　茯神一作茯苓　甘草各六分

右五味治下篩以漿水服方寸匕日三服外臺無茯神

又方

黃耆　茯神　栝樓根　甘草　麥門冬各三兩　乾地黃五兩

右六味㕮咀以水八升煮取二升半去滓分三服日進一劑服十劑佳

治消渴浮萍丸方

乾浮萍　栝樓根等分

右二味末之以人乳汁和丸如梧子空腹飲服二十丸日三三年病者三日愈治虛熱大佳

治消渴日飲一石水者方

栝樓根三兩　鉛丹二兩　葛根三兩　附子一兩

右四味末之蜜丸如梧子飲服十丸日三渴則服之春夏減附子

治渴黃連丸方

黃連一斤張文仲云十斤　生地黃一斤

右二味絞地黃取汁浸黃連出暴之燥復內之令汁盡乾之擣末蜜丸如梧子服二十丸日三食前後無在亦可爲散以酒服方寸匕

栝樓粉治大渴秘方

深掘大栝樓根厚削皮至白處止以寸切之水浸一日一夜易水經五日取出爛擣碎研之以絹袋濾之如出粉法乾之水服方寸匕日三四亦可作粉粥乳酪中食之不限多少取差止

治渴方

栝樓粉和雞子暴乾更杵爲末水服方寸匕日三丸服亦得

又方

水和栝樓散服方寸匕亦可蜜丸服三十丸如梧子大

又方

取柒家井索近桶口結燒作灰井花水服之不過三服必差

又方　取豉漬汁任性多少飲之

又方　濃煮竹根取汁飲之以差止

又方　以青粱米煮取汁飲之以差止

論曰尋夫內消之爲病當由熱中所作也小便多於所飲令人虛極短氣夫內消者食物消作小便也而又不渴正觀十年梓州刺史李文博先服白石英久忽然房道強盛經月餘漸患渴經數日小便大利日夜百行以來百方治之漸以增劇四體羸憊不能起止精神恍惚口舌焦乾而卒此病雖

稀甚可畏也利時脉沉細微弱服枸杞湯即効但不能長愈服鉛丹散亦即減其間將服除熱宣補丸

枸杞湯方

枸杞枝葉一斤 栝樓根 石膏 黃連 甘草 各三兩

右五味㕮咀以水一斗煮取三升分五服日三夜二劇者多合渴即飲之

鉛丹散主消渴止小便數兼消中方

鉛丹 胡粉 各二分 栝樓根 甘草 各十分 澤瀉 石膏 赤石脂 白石脂 各五分肘後作貝母

右八味治下篩水服方寸匕日三壯人一匕半一年病者一日愈三年病者二日愈渴甚者夜二服腹痛者減之九服亦佳一服十九傷多令人腹痛張文仲云腹中痛者宜漿水汁下之備急方云不宜酒下用麥汁下之古今録驗方云服此藥了經三兩日宜淡食之候小便得鹹或作羹亦得宜傷

茯神丸方

茯神 黃耆 栝樓根 麥門冬 人參 甘草 黃連 知母 各三兩 乾地黃 石膏 各六兩

葰絲子三合 葰蓉四兩

右十二味末之以牛膽三合和蜜丸如梧子以苓根湯服三十丸日二服漸加至五十丸 集驗名宣補丸治腎消渴小便數者

口含酸棗丸治口乾燥內消方

酸棗一外五合 酢安石榴子五合乾子 葛根 覆盆子 各三兩

烏梅五十枚 麥門冬四兩 茯苓 栝樓根 各三兩半

桂心一兩六銖 石蜜四兩

右十味末之蜜丸合如酸棗許不限晝夜以口中津液為度盡復更合無息

消中日夜尿七八升方

鹿角炙令焦末以酒服五分匕日三漸加至方寸匕

又方　漚麻汁服一升佳

又方

葵根如五升盆大兩束（外臺云五六大斤）以水五斗煮取三斗宿不食平旦一服三升

論曰強中之病者莖長興盛不交精液自出也消渴之後即作癰疽皆由石熱凡如此等宜服猪腎薤苁蓉湯制腎中石熱也又宜服白鴨通湯（方見下卷解石毒篇）

猪腎薤苁蓉湯方

猪腎一具　大豆一升　苁蓉石膏各三兩　人參　茯神一作茯苓　磁石綿裹　知母　葛根　甘草各二兩　括樓根　黃芩

右十二味㕮咀以水一斗五升先煮猪腎大豆取一斗去滓下藥煮取三升分三服渴乃飲之下膲熱者夜輒合一劑病勢漸歇即止

增損腎瀝湯治腎氣不足消渴小便多腰痛方

羊腎一具　遠志　人參　澤瀉　乾地黃　桂心　當歸　茯苓　龍骨　黃芩　甘草　生薑各六兩　五味子五合　大棗十枚　麥門冬一升

右十六味㕮咀以水一斗五升煮羊腎取一斗二升下藥取三升分三服

治下膲虛熱注脾胃從脾注肺好渴利方

小麥　地骨白皮各一升　竹葉切三升　麥門冬　茯苓各四兩　甘草三兩　生薑　栝樓根各五兩　大棗三十枚

右九味㕮咀先以水三斗煮小麥取一斗去滓澄清取八
升去上沫取七升煮藥取三升分三服

治渴利虛熱引飲不止消熱止渴方

竹葉（切二升） 地骨皮 生地黃（切一斤各） 石膏（八兩） 茯神（恭作苓） 菱蕤 知母 生薑（各四兩） 生麥門冬（一升半） 栝樓根（八兩）

右十味㕮咀以水一斗二升下大棗三十枚并藥煮取四
升分四服

治面黃手足黃咽中乾燥短氣脉如連珠除熱止渴利補養
地黃丸方

生地黃汁 生栝樓根汁（各二升） 牛羊脂（三升） 白蜜（四升） 黃連（一斤末之） 栝樓根（六分一作兩） 茯苓（各四分） 鉛丹（一分）

右五味合煎令可丸飲服如梧子大五九日二加至三十
丸若苦冷而渴渴差即別服溫藥也

治渴小便數方

貞母（六分一作兩） 栝樓根 茯苓（各四分） 鉛丹（一分）

雞肫胵中黃皮（十四枚）

右五味治下篩飲服方寸匕日三差後常服甚佳去鉛丹
以蜜丸之長服勿絕以麥飲服

治渴利方

生栝樓根三十斤切以水一石煮取一斗半去滓以
牛脂五合煎取水盡以溫酒先食服如雞子大日三服

治渴小便利復非淋方

榆白皮二斤切以水一斗煮取五升一服三合日三
又方 小豆藿一把擣取汁頓服三升

又方 薔薇根水煎服之佳（肘後治睡中遺尿）

又方　三年重鵲巢燒末以飲服之（肘後治睡中遺尿）

又方　桃膠如彈丸含之咽津

又方

蠟如雞子大以酢一升煮之三沸適寒溫頓服之

論曰凡人生放恣者衆盛壯之時不自慎惜快情縱慾極意房中稍至年長腎氣虛竭百病滋生又年少懼不能房多服石散真氣既盡石氣孤立惟有虛耗唇口乾焦精液自洩或小便赤黃大便乾實或渴而且利日夜一石或渴而不利或不渴而利所食之物皆作小便此皆由房室不節之所致也凡平人夏月喜渴者由心王也心王便汗汗則腎中虛燥故渴而小便少也冬月不汗故小便多而數也此為平人之證也名為消渴但小便利而不飲水者腎實也經云腎實則消消者不渴而利是也所以服石之人於小便利者石性歸腎腎得石則實實則能消水漿故利利多則不得潤養五藏五藏衰則生諸病張仲景云熱結中焦則為堅熱結下焦則為溺血亦令人淋閉不通明知不必悉患小便利信矣內有熱者則喜渴除熱則止渴兼虛者須除熱補虛則差矣

治不渴而小便大利遂至於死者方

牡蠣五兩以患人屎尿三升煎取二升分再服神驗

治小便不禁多日便一二斗或如血色方

麥門冬　乾地黃（各二兩）　續斷　桂心（各一兩）　甘草（一兩）　乾薑（四兩）　蒺藜子

右七味㕮咀以水一斗煮取二升五合分三服（古今錄驗）

九房散主小便多或不禁方

胸瘦細數小便

菟絲子　黃連（各三兩）　蒲黃（各三兩）　消石（一兩）　肉蓯蓉（二兩）

右五味治下篩并雞肫胵中黃皮三兩同為散飲服方寸匕日三如人行十里更服之千金翼有五味子三兩每服腹空進之

又方

鹿茸十二寸 蠷躅非子各外 桂心一尺

附子大者三枚 澤瀉三兩

右六味治下篩漿服五分匕日三加至一匕

薯蕷治消中虛勞少氣小便數方

薯蕷 芍藥 生薑 桂心 當歸 甘草各二兩

麥門冬 乾地黃 黃芩各一兩 大棗三十枚

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服日三

辣剌丸治男子百病小便過多失精方

辣剌 石龍芮 巴戟天各二兩 麥門冬 厚朴

菟絲子 蒴藿作藬外臺作藬 柏子人 菱蘞

小草 細辛 杜仲 牛膝 蔥蓉 石斛

桂心 防葵 乾地黃各一兩 烏頭三兩

右十九味末之蜜和更搗五六千杵以飲服如梧子十九丸日三加至三十丸以知為度

治尿數而多方

羊肺一具作羹內少羊肉和鹽豉如食法任性食不過三具

治消渴陰脉絕胃反而吐食方

茯苓八兩 澤瀉四兩 白朮 生薑 桂心各三兩

甘草一兩

右六味㕮咀以水一斗煮小麥三升取三升去麥下藥煮取三升半服入合日再服

又方

取屋上瓦三十年者碎如雀腦三升東流水二石煮
取二斗內藥如左
生白朮 乾地黃 生薑 橘皮 人參
甘草 黃耆 遠志 桂心 當歸
芍藥 酸棗 大棗三十枚
右十二味㕮咀內瓦汁中煮取三升分四服單飲瓦汁亦佳
治熱病後虛熱渴四肢煩疼方
葛根一斤 人參 甘草 竹葉一把
右四味㕮咀以水一斗五升煮取五升渴即飲之日三夜三
治虛勞渴無不効骨蒸煩方
茯苓 菟絲子 山茱萸 當歸 牛膝 附子
五味子 巴戟天 麥門冬 石膏 石韋
人參 桂心
蒻蓉 各四兩外臺作遠志 大豆卷一升

天門冬 五兩
右十六味爲末次取生地黃栝樓根各十斤擣絞取汁於
微火上煎之減半便作數分內藥并下白蜜二斤牛髓半
斤微火煎之令如糜食如雞子黃大日三服亦可飲服之
治虛熱四肢羸乏渴熱不止消渴補虛茯神煮散方
茯神 蒻蓉 菜菔 各四兩 生石斛 黃連 各八兩
栝樓根 知母 人參 當歸 各三兩 麥蘗三升外臺作小麥
右十三味治下篩以三方寸匕水三升煮取一升以綿袋
盛煮之日二服一煮爲一劑
治虛勞口中苦渴骨節煩熱或寒枸杞湯方
枸杞根 白皮切五升 麥門冬 小麥 各一升
右三味以水二斗煮麥熟藥成去滓每服一升日再

巴郡太守奏三黃丸治男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者方

春三月黃芩四兩　大黃三兩　黃連四兩

夏三月黃芩六兩　大黃一兩　黃連七兩

秋三月黃芩六兩　大黃二兩　黃連三兩

冬三月黃芩三兩　大黃五兩　黃連二兩

右三味隨時和擣以蜜爲丸如大豆飲服五丸日三不知稍加至七丸取下而已服一月病愈久服走逐奔馬嘗試有驗一本云夏三月不服

治熱渴頭痛壯熱及婦人血氣上衝悶不堪方

茅根切二升三擣取汁令盡渴即飲之

治嶺南山瘴風熱蠚毒氣入腎中變寒熱脚弱虛滿而渴方

黃連不限多少　生梧樓根汁　生地黃汁　羊乳汁

右四味以三汁和黃連末爲丸空腹飲服三十丸如梧子大漸加至四十丸日三重病五日差小病三日差無羊乳牛乳人乳亦得若藥苦難服即煮小麥粥飲服之亦得主虛熱大佳張文仲名黃連丸

阿膠湯治虛熱小便利而多服石散人虛熱當風取冷患腳氣喜發動兼渴消腎脉細弱服此湯立減方

阿膠二挺　麻子升　遠志四兩　附子一枚

右五味㕮咀以水七升煮取三升半去滓內膠令烊分三服說云小便利多白日夜數十行至二石五日頻服良

論曰凡消渴病經百日以上者不得灸刺灸刺則於瘡上漏膿水不歇遂致癰疽羸瘦而死亦忌有所誤傷但作針許大瘡所飲之水皆於瘡中變成膿水而出若水出不止者必死愼之愼之初得患者可如方灸刺之佳

消渴咽喉乾灸胃管下輸三穴各百壯穴在背第八椎下橫三寸間寸灸之

消渴口乾不可忍者灸小腸輸百壯橫三間寸灸之

消渴欬逆灸手厥陰隨年壯

消渴咽喉乾灸胃堂五十壯又灸足太陽五十壯

消渴口乾煩悶灸足厥陰百壯又灸陽池五十壯

消渴小便數灸兩手小指頭及足兩小指頭并灸項椎佳

又灸當脊梁中央解間一處與腰目上灸兩處凡三處又灸脊上脾輸下四寸當俠脊梁灸之兩處凡諸灸皆當隨年壯又灸腎輸二處又灸腰目在腎輸下三寸亦俠脊骨兩傍各一寸半左右以指按取關元一處又兩傍各二寸二處陰市二處在膝上當伏兔上行三寸臨膝取之或三三列灸相去一寸名曰腎系者（甀横帝經云伏兔下一寸）曲泉陰谷陰陵泉復留此

諸穴斷小行最佳不損陽氣亦云止遺溺也太溪中封然谷太白大都趺陽行間大敦隱白涌泉凡此諸穴各一百壯腹背兩脚凡四十七處其腎輸腰目關元水道此可灸三十壯五日一報之各得一百五十壯佳涌泉一處可灸十壯大敦隱白行間此處可灸三壯餘者悉七壯皆五日一報之滿三灸可止也若發如此灸諸陰而不愈宜灸諸陽諸陽在脚表并灸肺輸募按流注孔穴壯數如灸陰家法

小便數而少且難用力輒失精者令其人舒兩手合掌併兩大指令齊急逼之令兩爪甲相近以一炷灸兩爪甲本肉際肉際方後自然有角令炷當角中小侵入爪上此兩指共用一炷也亦灸脚大指與手同法各三炷而已經三日又灸之

淋閉第三　論一首　方五十三首　證二條　灸法十五首

論曰熱結中膲則爲堅熱結下膲則爲溺血令人淋閉不通

此多是虛損之人服大散下膲客熱所爲亦有自然下膲
者但自少可善候之
凡氣淋之爲病溺難瀝瀝常有餘瀝石淋之爲病莖中痛溺不
得卒出治之如氣淋也膏淋之爲病尿似膏自出治之如氣
淋也勞淋之爲病勞倦即發痛引氣衝下治與氣淋同熱淋
之爲病熱即發其則尿無餘如氣淋方
凡人候鼻頭色黃法小便難也
治下膲結熱小便赤黃不利數起出少莖痛或血出溫病後
餘熱及霍亂後當風取熱過度飲酒房勞及行步冒熱冷飲
逐熱熱結下膲及散石熱動關格小腹堅脹如斗諸有此
淋皆悉治之立驗地膚子湯方

地膚子 三兩　知母　黃芩　猪苓　瞿麥
枳實 一作松實　升麻　通草　葵子　海藻 各三兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服大小便皆閉者
加大黃三兩女人房勞腎中有熱小便難不利小腹滿痛
脉沈細者加猪腎一具崔氏煮腎取一斗汁然後內藥煎之小
品方不用枳實

治百種淋寒淋熱淋勞淋小便澀胞中滿腹急痛方

通草　石韋　王不留行　甘草 各二兩　滑石
瞿麥　白朮　芍藥　冬葵子 各三兩

右九味㕮咀以水一斗煎取三升分五服歸咕今錄驗有當
以麥粥清服方寸匕日三

又方

栝樓根　滑石　石韋 各三兩

右三味治下篩大麥飲服方寸匕日三

治諸種淋方

葵根 兩八 大麻根 兩五 甘草 一兩 石首魚頭石 兩三
通草 二兩 茆根 三兩 貝子 五合
右七味㕮咀以水一斗二升煮取五升分五服日三夜三
亦主石淋
又方
細白沙三升熬令極熱以酒三升淋取汁服一合
又方
榆皮 斤 車前子 冬瓜子 各一升 鯉魚齒
桃膠 通草 地脉 各二兩 瞿麥 四兩
右八味㕮咀以水一斗煮取三升分三服日三
治淋痛方
滑石 四兩 貝子 七枚燒碎 芍藥 各二兩
茯苓 白朮 通草

右六味治下篩酒服方寸匕日二十日差
又方
葵子 五合 茯苓 白朮 當歸 各二兩
右四味㕮咀以水七升煮取二升分三服日三
又方
猪脂酒服三合日三小兒服一合臘月者
治小便不利莖中疼痛小腹急痛方
通草 茯苓 各三兩 葶藶 二兩
右三味治下篩以水服方寸匕日三服
又方
蒲黃 滑石 等分
右二味治下篩酒服方寸匕日三服
治小便不通利膀胱脹水氣流腫方

水上浮萍暴乾末服方寸匕日三服

治小便不通方

滑石三兩　葵子　榆白皮各一

右三味治下篩煮麻子汁一升半取一升以散二方寸匕和分二服即通

又方

水四升洗鼈帶取汁煮葵子取二升半分三服

又方

胡蘆屎豉各一合和擣丸如梧子服三九日三服

又方

髮去垢燒末一升葵子一升以飲服方寸匕日三服

又方　石首魚頭石末水服方寸匕日三

又方　石槽塞灰土井華水服之日三

又方　鯉魚齒燒灰末酒服方寸匕日三

又方　服車前子末方寸匕日三百日止

治卒不得小便方

車前草把　桑白皮一斤

右二味㕮咀以水三升煎取一升頓服之

又方　吞雞子白立差雞黃

治婦人卒不得小便方

杏人二七枚熬末服之立下

又方

紫菀末井華水服三指撮立通血出四五度服之

治黃疸後小便淋瀝方

猪腎一具　茯苓三兩

黃芩三兩　澤瀉一斤　瞿麥六兩　車前根切三升

地膚子一合　椒目三合　綿裹

右八味㕮咀以水二斗煮車前取一斗六升去滓下腎煮取一斗三升去腎下藥煮取三升分三服

治氣淋方

又方　水三升煮瓠瓜底莖如鵝鴨子大取二升頓服

又方　水三升煮豉一升一沸去滓內塩一合頓服亦可單煮豉汁服

又方　水一斗煮比輪錢三百文取三升溫服之

又方　擣葵子末湯服方寸匕

又方　空腹單茹蜀葵一滿口止

又方　熬鹽熱熨少腹冷復易亦治小便血肘後方治小便澁不通

又方　臍中著鹽灸之三壯增小便氏云治不通

氣淋灸関元五十壯又灸俠玉泉相去一寸半三十壯

治石淋方

車前子二升絹袋盛水九升煮取三升頓服之石即出先經宿不得食備急方云治熱淋

又方

取浮石使滿一手下篩以水三升酢一升煮取二升澄清服一升不過三服石出亦治噦淳酒煮之

又方

挑膠棗許大夏以三合冷水冬以三合湯和一服日三當下石子如豆卯石盡止亦治小便出血

石淋臍下三十六種病不得小便灸關元三十壯又灸氣門三十壯

石淋小便不得灸水泉三十壯足大敦是也

治膏淋方

搗葎草汁二升酢二合和空腹頓服之當尿小豆汁
也又濃煮汁飲亦治淋瀝(蒴藋用療尿血)
治五勞七傷八風十二痺結以為淋勞結為血淋熱結為肉
淋小便不通莖中痛及小腹痛不可忍者方
滑石 王不留行 冬葵子 桂心 通草
車前子 各二分
右八味治下篩服方寸匕以麻子飲五合和服日三尿泆
石出也一方加揄白皮三分
勞淋炙足太陰百壯在內踝上三寸三報之
治熱淋方
葵根一升冬用子夏用苗切 大棗二七枚
右二味以水三升煮取一升二合分二服熱加黃芩一兩
出難加滑石二兩末血者加茜根三兩痛者加芍藥二兩
加藥水亦加之
又方
白茅根切四斤以水一斗五升煮取五升服一升日
三夜三
又方 常煮冬葵根作飲服之
治血淋小便磣痛方
雞蘇二兩 滑石五兩 生地黃汁 小薊根一兩
竹葉一把 通草五兩
右六味㕮咀以水九升煎取三升去滓分溫三服不利
治血淋石韋散方
石韋 當歸 蒲黃 芍藥各等分
右四味治下篩酒服方寸匕日三服
又方

以水五升煮生大麻根十枚取二升頓服之亦治小便出血

又方　以水四升煮大豆葉一把取二升頓服之

又方

以水三升煮葵子一升取汁日三服亦治虛勞尿血

血淋灸丹田隨年壯又灸伏留五十壯一云隨年壯

五淋不得小便灸懸泉十四壯穴在內踝前一寸斜行小脉上是中封之別名

卒淋灸外踝尖七壯

五淋灸大敦三十壯

淋病不得小便陰上痛灸足太衝五十壯

淋病九部諸疾灸足太陽五十壯

腹中滿小便數數起灸玉泉下一寸名尿胞一名屈骨端灸二七壯小兒以意減之

治遺尿小便澀方

牡蠣　鹿茸酥炙各四兩　桑耳三兩　阿膠一兩

右四味㕮咀以水七升煮取二升分二服日二古今録驗云無桑耳

又方

防巳　葵子　防風各一兩

右三味㕮咀以水五升煮取二升半分三服散服亦佳

遺溺灸遺道俠玉泉五寸隨年壯又灸陽陵泉隨年壯

足陽明隨年壯

遺溺失禁出不自知灸陰陵泉隨年壯

治小便失禁方

以水三升煮雞腸取一升分三服

小便失禁灸大敦七壯又灸行間七壯

治失禁不覺尿方

豆醬汁和竈突墨如豆大內尿孔中（范汪方治胞轉亦治小兒）

治尿牀方

取羊肚系盛水令滿線縛兩頭熟煮即開取中水頓服之立差

又方 取雞胜胵一具并腸燒末酒服男雌女雄

又方

取羊胞盛水滿中炭火燒之盡肉空腹食之不過四五頓差

又方

以新炊熱飯一盞寫尿牀處拌之收與食之勿令知良尿牀垂兩手兩髀上盡指頭上有陷處灸七壯

又灸臍下橫文七壯

衆血第三 訪十首

治房損傷中衆血方

牡蠣 車前子 桂心 黃芩 阿膠（各二兩）

右四味治下篩以飲服方寸匕稍加至二匕日三服

治小便血方

生地黃（八兩） 柏葉（一把） 黃芩（等分）

右四味㕮咀以水八升煮取三升去滓下膠分三服一方加甘草二兩

又方

蒲黃 白芷 荊實 菟絲子（炙） 乾地黃 苦蘘（各等分小品作敗醬）

葵子 當歸 茯苓 酸棗

右十味末之蜜丸服如梧子飲送五丸日三稍加至十丸

治溺血方

戎鹽六分 甘草 蒲黃 鹿角膠 芍藥 酪三

礬石三兩 大棗十枚

右七味㕮咀以水九升煮取二升分三服

又方

胡麻三升擣細末以東流水二升漬一宿平旦絞去

滓煮兩沸頓服之

治小便去血方

龍骨細末之溫水服方寸匕日五六服 張文仲云酒服

又方 擣荊葉取汁酒服二合

又方 酒三升煮蜀當歸四兩取一升頓服之

治小便出血方

煮車前根葉子多飲之為佳

又方

刮滑石末水和傅繞少腹及繞陰際佳葛氏云治小便不通

又方 豉二升酒四升煮取一升頓服

又方 酒服亂髮灰蘇澄用水服

又方 酒服葵莖灰方寸匕日三

水腫第四 論一道 方四十九首 證八條 灸法二首

論曰大凡水病難治差後特須慎於口味又復病水人多嗜食不廉所以此病難愈也代有醫者隨逐時情意在財物不本性命病人欲食肉於貴勝之處勸令食羊頭蹄肉如此者未見有一愈者又此病百脉之中氣水俱實治者皆欲令寫之使虛羊頭蹄極補那得瘳愈所以治水藥多用葶藶子等諸藥本草云葶藶久服令人大虛故水病非久虛不得絶其根本又有蠱脹但腹滿不腫水脹脹而四肢面目俱腫大有醫者不善診候治蠱以水藥治水以蠱藥或但見脹滿皆以

水藥如此者仲景所憲醫殺之今録愼忌如左 其治蠱方具在雜方

喪孝　産乳　音樂　房室　諠戲

一切魚　一切肉　生冷　酢滑　蒜

粘食米豆油膩

右以前並禁不得食之及不得用心其不禁者並具本方之下其房室等猶三年愼之永不復重發不爾者差而更發重發不可更治也古方有十水丸歷驗多利大便而不利小便所以不能述録也

黃帝問岐伯曰水與膚脹鼓脹腸覃石瘕何以別之岐伯曰水之始起也目果上微腫（靈樞作微擁太素如新臥起之狀頸脈動時欬陰股間寒足脛腫腹仍大其水已成也以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也膚脹何以候之膚脹者寒氣客於皮膚之間殼殼然而堅（太素外臺作不堅）腹大身盡腫皮厚按其腹陷（太素作脅）而不起腹色不變此其候也鼓脹何如腹脹身腫大大與膚脹等而堅其色蒼黃腹脈起此其候也腸覃何如何如腸覃者寒氣客於腸外與胃（太素作衛）氣相薄正氣不得榮因有所繫瘕而內著惡氣乃起息肉乃生始也如雞卵稍以益大至其成也若懷子之狀久者離歲月按之即堅推之則移月事時下此其候也石瘕者生於胞中寒氣客於子門子宮閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉衄以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下之曰膚脹鼓脹可刺耶曰先寫其血絡後調其經刺去其血脈師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脈自浮外證骨節疼痛其人惡風皮水其脈亦浮外證浮腫按之沒指不惡風其腹如鼓（腰略巢源如鼓）不滿不渴當發其汗正水

其脉沈遲外證自喘石水其脉自沈外證腹滿脉經作痛不喘黃汗其脉沈遲身體發熱胷滿四肢頭面並腫久不愈必致癰膿心水者其人身體重腫作而少氣不得卧煩而躁其人陰大腫肝水者其人腹大不能自轉側而脇下腹中痛時時津液微生小便續通脾水者其人腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難也肺水者其人身體腫而小便難時時鴨溏腎水者其人腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗足爲逆冷其面反瘦師曰治水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗即愈問曰有病下利後渴飲水小便不利腹滿因腫何故師云此法當病水若小便自利及汗出者自當愈一作蒲月當俞凡水病之初先兩目上腫起如蠶色俠頸脉動股裏冷脛中滿按之沒指腹內轉側有聲此其候也不即治之須臾身體稍腫腹中盡脹按之隨手起水爲已成猶可治也此病皆從虛損

大病或下利後婦人產後飲水不即消三膲決漏小便不利仍相結漸漸生聚遂流諸經絡故也

水有十種不可治者有五第二脣黑傷肝第二缺盆平傷心第三臍出傷脾第四背平傷肺第五足下平滿傷腎此五傷必不可治

凡水病忌腹上出水出水者月死大忌之

中軍候黑丸治膽玄水先從頭面至脚腫頭眩痛身虛熱名曰玄水體腫大小便澀宜此方方出第十八卷中

治小腸水少腹滿暴腫口苦乾燥方

巴豆三十枚和皮咬咀水五升煮取三升綿內汁中拭腫上隨手減矣目五六拭莫近目及陰集驗治身體暴腫如吹治大腸水乍虛乍實上下來去方

赤小豆 五升 桑白皮 切三升 鯉魚 重四斤 白术 八兩

右四味㕮咀以水三斗煮取魚爛去魚食取盡并取汁四升細細飲下魚勿用鹽

外許

又方

羊肉 一斤 當陸 切一升

右二味以水二斗煮令當陸爛去滓下肉為臛葱豉酢事如臛法 肘後云治卒腫滿身面洪大

治膀胱水四肢瘦腹腫方

桑白皮 穀白皮 澤瀉葉 各三升 大豆 五升

防己 射干 白术 各四兩

右七味㕮咀以水一斗五升煮取六升去滓內好酒三升更煮取五升每日二服夜一服餘者明日更服 集驗無澤瀉防己射干四味

又方

桑白皮 六兩 射干 黃芩 茯苓 白术 各四兩

澤瀉 三兩 防己 二兩 澤漆 切一升 大豆 三升

右九味㕮咀以水五斗煮大豆取三斗去豆澄清取汁一斗下藥煮取三升空腹分三服

治胃水四肢腫腹滿方

猪腎 一具 茯苓 四兩 防己 橘皮 玄參

黃芩 杏人 澤瀉 一作澤漆 桑白皮 各三兩

猪苓 白术 各三兩 大豆 三升

右十二味㕮咀以水一斗八升煮腎桑白皮大豆澤瀉取三升分三服若欲加五味子三斗澄清去滓內藥煮取三升八升煮腎桑白皮大豆澤瀉取兩凡服三劑間五日一劑常用有效

有人患氣虛損久不差遂成水腫如此者衆諸皮中浮水攻

面目身體從腰以上腫皆以此湯發汗悉愈方

麻黃四兩　甘草二兩

右二味咬咀以水五升煮麻黃再沸去沫內甘草取三升分三服取汗愈慎風冷等

治面腫小便澀心腹脹滿方

茯苓　杏仁各八分　蘇子三合

右六味末之蜜丸如小豆以桑白皮湯送十九日二加至三十九

治面目手足有微腫常不能好者方

楮葉切二升以水四升煮取三升去滓煮米作粥食如常作勿絕久則頽取葉乾之準法作粥周年永差慎生冷一切食物

治大腹水腫氣息不通命在旦夕者方

牛黃二分　海藻洛十分　牽牛子桂心各八分

葶藶子六分　椒目三分　昆布

右七味末之別擣葶藶如膏合和丸之如梧子飲服十丸日二稍加小便利為度大良正觀九年漢陽王患水醫所不治余處此方日夜尿一二斗五六日即差差後有他犯因爾殂矣計此即是神方（崔氏云蜜和為丸蜜湯服）

有人患水腫腹大四肢細腹堅如石小勞苦足脛腫小飲食便氣急此終身疾不可強治徒服利下藥極而不差宜服此藥將以微除風濕利小便消水穀歲久服之乃可得力耳差後可長服之方

丹參　鬼箭羽　白朮　獨活洛兩五　秦艽

知母　海藻　茯苓　豬苓洛兩三

桂心 酪三

右十味㕮咀以酒三斗浸五日服五合日三任性量力漸加之

治水腫利小便酒客虛熱當風飲冷水腹腫陰脹滿方

當陸 四兩 甘遂 一兩 甘消 吳茱萸 芫花 各三兩

右五味末之蜜丸服如梧子飲服三丸日三一方有大黃烏豆一斗熬令香勿令大熟去皮為細末篩下餳粥服一合稍加之若服初多後即嫌臭服皆得服之初服一合稍加之若服初多後即嫌臭服盡則更造取差止不得食肥膩渴則飲羹汁愼酒肉猪雞魚生冷酢滑房室得食漿粥牛羊兔鹿肉此據大飢渴得食之可忍亦勿食也此病難治雖諸大藥丸散湯膏當時雖差過後發惟此大豆散差後不發終身服之終身不發矣其所禁之食常須少噉莫恣意鹹物諸雜食等

又方

葶藶末二十匕 蒼耳子灰二十匕

右二味調和水服之日二

又方 枹日水煮馬兜零服之

治水氣腫鼓脹小便不利方

莨菪子 一升 粘羊肺 一具 清羊亦佳

右二味先洗羊肺湯微煮之薄切暴乾作末以三年大酢漬莨菪子一晬時出熬令變色熟擣如泥和肺末蜜合擣三千杵作丸食後一食久以麥門冬飲服如梧子四丸日

三以喉中乾口粘浪語為候數日小便大利佳山連療意
司業得差司業姪雲表所送云數用神驗

麥門冬飲方

麥門冬 五十个 米 二十 五元

右二味以水一升和煮米熟去滓以下前丸藥每服即作之
徐王煮散治水腫服輒利小便方

防已 羌活 人參 丹參 牛膝 牛角鰓
升麻 防風 秦艽 穀皮 紫菀 杏人
生姜 胳附子 石斛 各三兩 橘皮一兩 桑白皮六兩
白朮 澤瀉 茯苓 豬苓 黃連 郁李人 各一兩

右二十三味治下篩為麤散以水一升五合煮三寸匕取
一升頓服日再不能者但一服二三月以前可服主利多
而小便澀者用之大驗

褚澄漢防已煮散治水腫上氣方

漢防已 澤漆葉 石韋 澤瀉 各三兩 白朮
丹參 赤茯苓 橘皮 桑根白皮
通草 酪三 郁李人 卩生薑 各十兩

右十二味治下篩為麤散以水一升半煮散三方寸匕取
八合去滓頓服日三取小便利為度

治水腫茯苓丸甄權為安康公處者方

茯苓 白朮 椒目 各四分 木防已 葶藶
澤瀉 各五分 甘遂十一分 赤小豆 前胡
芫花 桂心 各三分 芒消七分別研

右十二味末之蜜和蜜湯服如梧子五丸日一稍加以知
為度

治水腫利小便方

大黃（白朮一作蓴蘼）木防己各等分

右三味末之蜜丸飲下如梧子十丸利小便爲度不知加之

又方

蓴蘼（四兩生用）桂心一兩

右二味末之蜜丸飲下梧子大七丸日二以知爲度

又方

牽牛子末之水服方寸匕日一以小便利爲度

又方

郁李人（未熬）各一

右二味和作餅子七枚燒熟空腹熱食四枚不知更加一枚不知加之至七枚

又方

水銀（三兩三日夜煮）

蓴蘼子（搥目）各一

衣魚（十枚）

水萍（瓜蒂滑石各一兩芒消三兩）

右八味擣蓴蘼令細下水銀更擣令不見水銀止別擣椒目令細擣瓜蒂水萍下篩合和餘藥以蜜和更擣三萬杵成丸初服一丸如梧子次服二丸次服三丸次服四丸次服五丸次服六丸至七日還從一丸起次服二丸如是每至六丸還從一丸起始服藥當咽喉上有歷歷子腫起頰車腫滿齒斷齒斷皆腫嗌碎血出勿怪也不經三五日即消所苦皆差亦止服藥若下多停藥以止利藥至五下止病未差更服病差止此治諸體肉肥厚按之不陷甚者臂髀著衰袖不受及十種大水醫所不治者悉主之神良（無衣魚水萍瓜蒂滑石）深師集驗陶氏古今錄驗

澤漆湯治水氣通身洪腫四肢無力或從消渴或從黃疸支飲內虛不足榮衛不通氣不消化實皮膚中喘息不安腹中

澤瀉　桂心　狼毒　撥目　白朮　乾薑
大戟　甘草　酪二合　蓯蓉二兩半　女麴三合
赤小豆二合

右十七味治下篩酒服方寸匕日三夜一老小二錢匕以
小便利爲度

治水氣通身洪腫百藥治之不差待死者方

大麻子一石皆取新肥者佳　赤小豆一石不得一粒雜

右二味皆以新精者淨揀擇以水淘洗暴燋乾炙麻子使熟
更暴令乾貯於淨器中欲服取伍升麻子熬令黃香惟須
緩火勿令焦極細作末以水五升搦取汁令盡淨密器貯
之明旦欲服今夜以小豆一升淨淘浸之至旦乾漉去水
以新水煮豆未及好熟即漉出令乾內麻子汁中煮令芙
爛熟爲佳空腹恣意食之日三服當小心悶少時即止五

響響脹滿眼不得視方

澤漆根十兩　鯉魚肚赤小豆二升　生薑八兩

茯苓三兩　人參　麥門冬　甘草酪三

右八味咬咀以水一斗七升先煮魚及豆減七升去之內
藥煮取四升半一服三合再服氣下喘
止可至四合晬時小便利腫氣減或小瀉下若小便大利
還從一合始大利便止若無鯉魚鯛魚亦可用若水甚不
得臥臥不得轉側加澤漆一斤渴加栝樓根二兩欬嗽加
紫菀二兩細辛一兩款冬花一合桂三兩增魚汁二升胡洽
無小豆麥門冬有澤瀉五兩杏人一兩古今錄驗無小豆治水
在五藏令人欬逆喘上氣腹大響響兩脇腫目下有卧蠶狀微
渴不得安卧氣奔短氣有頃乃復小便難少而數
肺病胃滿隱痛宜利小便水氣迫腫會翕寒熱

豬苓散主虛滿通身腫利三焦通水道方

豬苓　葶藶　人參　玄參　五味子　防風

日後小便數或赤而嘯黏口乾不足怪之服訖常須微行
未得即卧十日後針灸三里絕骨下氣不爾氣不洩盡服
藥後五日通不可下者取大鯉魚一頭先死者去鱗尾等
以湯脫去滑淨洗開肚去藏以上件麻汁和小豆完煮令
熟作羹葱豉橘皮生薑紫蘇調和食之始終一切斷塩渴
即飲麻汁秋冬煖飲春夏冷飲常食不得至飽止得免飢
而已慎房室瞋恚大語高聲酒麪油醋生冷菜茹一切魚
肉塩醬五辛治十十差神驗并治一切氣病服者皆差凡
作一月日服之麻子熟時多收新者貯擬施人也

又方

吳茱萸　蓽撥　昆布　杏人　葶藶各等分

右五味末之蜜丸如梧子氣急服五丸勿令飽食食訖飽
悶氣急服之即散

苦瓠丸主大水頭面徧身大腫脹滿方

苦瓠白瓤實捻如大豆以麪裹煮一沸空腹吞七枚
至午當出水一升三四日水自出不止大瘦乃差三
年內慎口味也苦瓠須好無厭腎細理研淨者不爾
有毒不堪用（崔氏用子作鐫服二七枚若恐虛者牛乳服之如此隔日作服漸加至三七枚以小便利為度小便若太多即一二日停）

治水通身腫方

煎猪椒枝葉如餌空腹服一匕日三癢以汁洗之

又方

苦瓠膜二分　葶藶子五分

右三味合擣爲丸服如小豆大五丸日三

又方

煎人尿令可丸服如小豆大日三

又方

葶藶 桃人 各等分

右二味皆熬合擣爲丸服之利小便一方用杏人

又方 大棗肉七枚苦瓠膜如棗核大擣丸一服三丸如十五里又服三丸水出更服一丸即止

又方 葶藶子生擣酢和服之以小便數爲度

又方 燒葍石令赤內黑牛尿中令熱服一升日一

又方

單服牛尿大良凡病水服無不差服法先從少起得下爲度

水通身腫灸足第二指上一寸隨年壯又灸兩手大指縫頭七壯

麻黃煎主風水通身腫欲裂利小便方

麻黃 茯苓 各四兩 防風 澤瀉 各四兩 白朮 五兩

杏人 大戟 清酒 各一外 黃耆

猪苓 各三兩 澤瀉 四兩 獨活 八兩 大豆 二升 水七升 煮取一升

右十三味㕮咀以豆汁酒及水一斗合煮取六升分六七服一日一夜令盡當小便極利爲度

大豆湯治風水通身大腫眼合不得開短氣欲絶方

大豆 杏人 清酒 各一外 猪苓 各四兩 澤瀉 黃耆 烏頭 各三兩

生葍 七兩 半夏 六兩 茯苓 白朮 各五兩

甘遂 甘草 各三兩

右十六味㕮咀以水一斗四升煮豆取一斗去之內藥及酒合煮取七升分七服日四夜三得小便快利爲度腫消停藥不必盡劑若不利小便者加生大戟一外葶藶二兩

無不快利萬不失一

治風水腫方

大豆三升　桑白皮五升以水二斗煮取一斗去滓內後藥　茯苓

白朮酪五兩　防風　生薑酪四兩

當歸　防已　麻黃　猪苓酪三兩　大戟一兩

葵子一升　鼈甲一斤　防風三兩　附子一兩　赤小豆三升

右十三味㕮咀內前汁中煮取五升一服八合日三服每服相去如人行十里久麻子湯治偏身瘀腫方

麻子五升　當陸一斤

右五味㕮咀先擣麻子令熟以水三斗煮麻子取一斗三升去滓內藥及豆煮取四升去滓食豆飲汁

治男子女人新久腫得暴惡風入腹婦人新產上圊風入藏腹中如馬鞭者噓吸短氣欬嗽大豆煎方

大豆一斗淨擇以水五斗煮取一斗五升澄清內盆中以一斗半美酒內中更煎取九升宿勿食旦服三外溫覆取汗兩食頃當下去風氣腫減慎風冷十日平復也除日合服之若急不可待逐急合服腫未盡加之腫差更服三外若醒醒差勿服之亦可任性飲之常使酒氣相接附後云腫差後渴慎勿多飲

又方

楮皮枝葉一大束切煮取汁隨多少釀酒但服醉為佳不過三四日腫減差後可常服之一方用猪椒皮枝葉

又方

鯉魚長一尺五寸以泉漬令沒一宿平旦以木從口

中貫至尾微火炙令微熟去皮宿勿食空腹頓服之
不能者分再服勿與鹽

凡腫病須百方內外攻之不可一槩摩膏表方

生當陸一斤　猪膏得二斤通可二外

右二味和煎令黃去滓以摩腫亦可服少許并塗以紙覆之燥輒傳之不過三日差

治婦人短氣虛煩備身浮腫皮膚急欲所稀見薤白香散方

麝香二銖　雄黃六銖　芫花　甘遂各二分

右四味治下篩酒服錢五匕老小以意增減亦可爲丸強人小豆大服七九丸小品無雄黃深師以蜜丸如大豆服二丸日三治三焦決瀦水在胷外名曰水病腹獨大在腹表用大麝香九華他方附後有人三分爲九服

虛勞浮腫灸太衝百壯又灸腎輸

金澤文庫

朝奉郎守太常卿充秘閣校理判登聞檢院上護軍賜緋魚袋臣林億等校正

丁腫第壹

癰疽第貳　毒腫石癰附

發背第叁

丹毒第肆　小兒丹附

隱軫第伍

瘭疽第陸　惡肉　赤脈　惡核　痛病　附骨疽　賊風　熱毒　洪燭瘡　肥瘡　浸淫瘡　風疽　石疽　代指　腐瘡　脈瘡　骨疽　瘜肉　指腫　惡瘡　反花瘡　尸胸　逆臚　割甲　侵肉附

丁腫第壹論一首　證十五條　方二十九首　灸法一首

論曰夫稟形之類須存攝養將息失度百病萌生故四時代謝陰陽遞興此之二氣更相擊怒當是時也必有暴氣奏暴

氣者每月之中必有卒然大風大霧大寒大熱若不時避人忽遇之此皆入人四體頓折皮膚流注經脉遂使湊理擁隔榮衛結滯陰陽之氣不得宣瀉變成癰疽丁毒惡瘡諸腫至於丁腫若不預識令人死不速辰若甚者訖乃欲求方其人已入木矣所以養生之士須早識此方凡是瘡瘍無所逃矣

凡療丁腫皆刺中心至痛又刺肆邊拾餘下令血出去血傳藥藥氣得入針孔中佳若不達瘡裏療不得力

又其腫好著口中頰邊舌上看之赤黑如珠子疹痛應心是也是秋冬寒毒久結皮中變作此疾不即療之日夜根長流入諸脉數道如箭入身捉人不得動搖若不慎口味房室死不旋踵經伍陸日不差眼中見火光心神憒昏熬煩即死也

壹曰麻子丁其狀肉上起頭大如黍米色稍黑肆邊微赤多癢忌食麻子及衣布并入麻田中行

二曰石丁其狀皮肉相連色爲黑如黑豆甚硬刺之不入肉內陰陰微疼忌瓦礫墮石之屬

三曰雄丁其狀皰頭黑厭黑四畔仰瘡皰漿起有水出色黃大如錢孔形高忌房事

四曰雌丁其狀瘡頭稍黃尚裏厭黑亦似炙瘡四畔皰漿起心四色赤大如錢孔忌房事

五曰火丁其狀如湯火燒灼瘡頭黑厭黑四邊有皰漿又如赤栗米忌火炙燃

六曰爛丁其狀色稍黑有白斑瘡中潰潰有膿水流出瘡形大小如匙面忌沸熱食爛臭物

七曰三十六丁其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起大赤色今日生一明日生二至三日生三乃至十若滿三十六藥所不能治如未滿三十六者可治俗名黑皰忌嗔怒畜積愁恨

八曰蛇眼丁其狀瘡頭黑皮上浮生形如小豆狀似蛇眼大躰硬忌惡眼人看之并嫉妒人見及毒藥

九曰瞼膚丁其狀大如韭面闊邊皆赤有黑粟粒起忌鹹食

十曰水洗丁其狀大如錢形或如錢孔大瘡頭白裏黑黧汁出中硬忌飲漿水水洗渡河

十一曰刀鎌丁其狀如雞葉大長一寸左側肉黑如燒爛忌刺及刀鎌切割鐵刃所傷可以藥治

十二曰浮漚丁其狀瘡躰躶闊狹如蓮葉大圓少許不合長而狹內黃外黑黑處刺不痛內黃處刺之則痛

十三曰牛拘丁其狀肉皰起掐不破

右十三種瘡初起必先癢後痛先寒後熱熱定則寒多四肢沈重頭痛心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆者難治其麻子丁一種始末惟癢所錄忌者不得犯觸犯觸者即難療其浮漚丁牛拘丁兩種無所禁忌縱不療亦不能殺人其狀寒熱與諸丁同皆以此方療之萬不失一欲知犯觸但眷強瘡痛極甚不可忍者是犯之狀也

治十三種丁方

用枸杞其藥有四名春名天精夏名枸杞秋名却老冬名地骨春三月上建日採子冬三月上建日採葉夏三月上建日採枝秋三月上建日採根凡四時初逢建日取枝葉子根等四味並暴乾若得五月五日午時合和大良如不得依法採者但得一種亦得用緋繒一片以裹藥取匝爲限亂髮雞子大牛黃梧子大反鉤棘針二十七枚末赤小豆七粒末先於緋上薄布亂髮以牛黃末等布髮上即卷緋繒作圈髮作繩十字縛之熨斗中急火熬之令沸沸定後自乾即

刮取擣作末絹篩以一方寸匕取枸杞四味合擣絹
篩取二匕和合前一匕共爲三匕令相得又分爲二分
早朝空腹酒服一分日三
治凡是丁腫皆用之此名齊州榮姥方
白薑石黃斬軟 鍾乳二兩 牡蠣九爛者兩 枸杞根皮二兩
白石英一兩 桔梗半兩
右六味各擣絹篩之合和令調先取伏龍肝九升末之以
清酒一斗二升攪令渾渾然澄取清二升和藥捻作餅子
大六分厚二分其濁滓仍置盆中布餅子於籠上以一
張紙藉盆上以泥酒氣蒸之仍數攪令氣散發經半日
藥餅子乾乃內瓦坩中一重紙一重藥遍布勿令相著密
以泥封三七日乾以紙袋貯之乾處舉之用法以針刺瘡
中心深至瘡根弁刺四畔令血出以刀刮取藥如大豆許

內瘡上若病重困日夜三四度著其輕者三度著重者
二日根始爛出輕者半日一日爛出當看瘡浮起是根出
之候若根出已爛者勿停藥仍著之藥甚安穩令生肌
易其病在口咽及胷腹中者必外有腫異相也寒熱不快
疑是此病即以飲或清水和藥如二杏人許服之日夜三
四服自然消爛或以物剔吐根出即差若根不出亦差當
看精神自覺醒悟合藥以五月五日爲上時七月七日次
九月九日臘月臘日並可合若急須藥佗日亦得要不及
良日也合藥時須清淨燒香不得觸穢孝子不具足人
產婦六畜雞犬等見之凡有此病忌房室猪雞魚牛生韭
蒜葱芸薹胡荽酒醋麵蘗等若犯諸忌而發動者取枸
杞根湯和藥服並如後方其三方本是一家智者評論
以後最是眞本

趙嬈方

薑石二十五兩　牡蠣十兩氏七兩　雀枯根皮四兩　茯苓三兩

右四味各擣篩合和先取新枸杞根合皮切六升水一斗半煎取五升去滓內狗屎雀屎二升攪令調澄取清和前藥熟擣捻作餅子陰乾病者以兩刃針當頭直刺瘡痛徹拔出針刮取藥末塞瘡孔中拔針出即內藥勿令歇氣并遍封瘡頭上即脹起針挑根出重者半日已上即出或以消爛桃根不出亦自差勿憂之其病在內者外當有腫相應並皆惡寒發熱疑有瘡者以水半盞刮取藥如桐子大五枚和服之日夜三度服即自消也若須根出服藥經一日以雞羽剔吐即隨吐根出若不出根亦自消爛在外者亦日夜三度傳藥勿住即生肉易差若犯諸忌而發動者取枸杞根合皮骨切三升以水五升煎取二升去滓研藥末一錢匕和枸杞汁一盞服之日二三服并單飲枸杞汁兩盞彌佳又以枸杞汁攪白狗屎取汁服之更良合訖即用不必待乾所言白狗屎是狗食骨其屎色如石灰直言狗白屎也如預造取五月五日七月七日九月九日臘月臘日造者尤良神驗或有人忽患喉中痛乍寒乍熱者即是其病當急以此藥療之無故而痛惡寒發熱者亦是此病但依前服之立差前後二方同是一法用一同亦主瘥癰疽甚效

治丁腫病忌見麻勃見之即死者方

胡麻　燭燼　針沙各等分

右三味末之以醋和傅之

又方

針刺四邊及中心塗雄黃末立可愈神驗　黃上云塗

又方

馬齒菜二分　石灰三分

右二味擣以雞子白和傅之立可

又方　鼠新坌土和小兒尿傅之立可

又方　鐵衣末和人乳汁傅之差

又方　以小豆花爲末傅之差

又方　以人屎尖傅之立差

又方

以四神丹一枚當頭上安經宿即根出矣方在第十二卷中

治一切丁腫方

蒼耳根莖苗子但取一色燒爲灰醋泔淀和如泥塗上乾即易之不過十度即拔根出神良余以正觀監年忽口角上生丁腫造甘子振毋爲帖藥經十日不差余以此藥塗之得愈已後常作此藥以救人無有不差者故特論之以傳後嗣也丁腫方殆有千首皆不及此方齊州榮姥方亦不勝此物造次易得也

又方　取鐵漿每飲一升立差

又方　麪和臘月猪脂封上立差

又方

蔌菜子一升燒爲灰釅醋和封上經宿便差或針破頭封上更佳

又方　皂莢子取人作末傅之五日內差

正觀初衢州徐使君訪得治丁腫人玉山韓光方

艾蒿一撅燒作灰於竹筒中淋取汁以一二合和石灰如麪漿以針刺瘡口至痛即點之點三遍其根自拔亦大神驗正觀中治得三十餘人差故録之

魚臍丁瘡似新火針瘡四邊赤中央黑色可針刺之若不大痛即殺人治之方

以臘月魚頭灰和髮灰等分以雞涪屎和傅上此瘡見之甚可而能殺人（外臺不用髮灰以雞子清和塗）

又方以寒食餳傅之良又硬者燒灰塗帖即差

治魚脐瘡其頭白似腫痛不可忍者方

先以針刺瘡上四畔作孔擣白苣取汁滴著瘡孔內

又方傅水獺屎大良

治赤根丁方

熬白粉令黑蜜和傅之良

又方以新塗鼠壤水和塗之熱則易之

又方擣馬牙齒末臘月猪脂和傅之拔根出亦燒灰用

犯丁瘡方

蕪菁根鐵生衣

右二味各等分和擣以大針刺作孔復削蕪菁根如針大又塗所擣者封上仍以方寸匕以前鐵生衣塗上刺孔中

緋帛塗帖上有膿出易之須更拔根出立差忌油膩生冷醋滑五辛陳臭粘食

又方

刺營頭及四畔令汁極出擣生粟黃傅上以麪圍之勿令黃出從旦至午根拔出矣

又方

以麪圍瘡如前法以針亂刺瘡銅器煮醋令沸瀉著麪圍中令容一盞冷則易之三度即拔根出

又方

取蛇蛻皮如雞子大以水四升煮三四沸去滓頓服差

又方　燒蛇蛻皮灰以雞子清和塗之差

又方　取蒼耳苗擣取汁一二升飲之滓傅上立差

丁腫灸掌後橫文後五指男左女右七壯即差已用得效丁腫灸法雖多然此一法甚驗出於意表也

癰疽第二　脈七條　論一首　方八十七首　灸法二首　灸法三首

脈數身無熱即內有癰膿久洗洗惡寒若有痛處當結爲癰

諸浮數脈當發熱而反弱而數此爲振寒當發癰腫

脈微而澀必發熱脈弱其形黑黑胃中微燥不知痛處其人當發癰腫

脈滑而數滑則爲實數則爲熱滑即爲榮數即爲衛榮衛相逢即結爲癰熱之所過即爲癰膿身體有痛處時時苦有瘡

問曰寸口脈微而澀法當亡血若汗出設不汗者當云何荅曰跌陽脈滑而數法當亡血故也

論曰夫癰疽初發至微人皆不以爲急此實奇患惟宜速治若療稍遲乃即病成以此致禍者不一但發皆外皮薄爲癰外皮厚爲疽宜急治之

凡癰疽始發或似小瘡或復大痛或復小痛或發如米粒大白膿子此皆微候宜善察之見有小異即須大驚忙急須攻之及斷口味速服諸湯下去熱毒若無醫藥處即灸當頭百壯其大重者灸四面及中央三三百壯數灸不必多也復薄冷藥種種救療必速差也

凡用藥種種救療必速差也

凡用藥帖法皆當瘡頭處其藥開孔令洩熱氣亦當頭以火針針入四分即差

凡癰疽瘤石癰結筋瘰癧皆不可就針角針角者少有不及禍也

凡癰無問大小亦覺即取膠如手掌大煖水浸令軟納納然稱大小當頭上開一孔如錢孔大帖腫上令相當須臾乾急若未有膿者即定不長已作膿者當自出若以鋒針當孔上刺至膿大好至差乃洗去膠

凡腫根廣一寸已下名癤一寸已上名小癰如豆粒大者名胞子皆始作急服五香連翹湯下之數劑取差乃止

凡癰高而光大者不大熱其肉正平無尖而紫者不須攻之但以竹葉黃耆湯申其氣耳肉正平為無膿也癰卒痛以八味黃耆散傅之大癰七日小癰五日其自有堅彊者寧生破發乳若熱手不可得近者先內服王不留行散外摩發背膏若背生破無苦在乳宜令極熟候手按之隨手即起者瘡熟也須針之針法要得著膿以意消息肩背不過一寸斟量不得膿即与食肉膏散著兌頭內癰口中如體氣熱歇即服木占斯散五日後癰欲著痂者即服排膿內塞散

凡癰破之後便綿惙欲死內寒外熱文闕腫自有似癰而非者當以手按腫上無所連乃是風毒耳勿針之宜服升麻湯外摩膏破癰口當令上留三分近下一分針之務極令熱熱便不痛破後敗壞不差者作猪蹄湯洗之日二夏用二日冬用六七日用湯半劑亦可去癰壞後有惡肉者宜猪蹄湯洗去穢次傳食肉膏散惡肉盡後傳生肉膏散及摩四邊令好肉速生當斷絕房室忌風冷勿自勞煩待筋脉平復乃可任意耳緣新肉易傷傷則重發發即難救也愼之愼之

凡諸暴腫一一不同無問近遠皆服五香連翹湯刺去血小

豆末傅之其間數數以針刺去血若失療已潰爛者猶服伍香湯及漏蘆湯下之隨熱多少依方用之外以升麻湯捐洗熨之方在丹毒篇摩升麻膏方在癰疽篇若生息肉者以鼠糞散傅之青黑肉去盡即停之好肉生傅升麻膏如肌不生傅一物黃耆散若傅白蘭茹如青黑惡肉不盡者可以漆頭蘭茹散半錢和三錢白蘭茹散用之此數法集驗之直仍成散用之腓治緩疽驗

或身中忽有痛處如以打撲之狀名曰氣痛痛不可忍遊走不住發作有時痛則小熱痛定則寒此皆由冬時受溫氣至春暴寒風來折之不成溫病乃作氣痛宜先服五香連翹湯摩丹參膏膏又以白酒煎楊柳皮及煖熨之有赤氣點點者即刺出血也其五香連翹湯及小竹瀝湯可服數劑勿以劑未差便住以謂無效即禍至矣中間將白薇散佳又有氣腫痛其狀如癰腫無頭虛腫色不變但皮急痛不得手近亦須服此五香湯次白針寫之次與發癤內發出也

腎中痛短氣者當入闇室中以手中指捺左眼視若見光者腎中有結癰若不見光者是瘭疽內發出也

經云氣宿於經絡中血氣俱澀不行擁結為癰疽也不言熱之所作其後成癰又陽氣湊集寒化為熱熱盛則肉腐為膿也由人體有熱被寒冷搏之而脉凝結不行熱氣擁結成癰疽方有灸法亦有溫治法以其中冷未成熱之時其用冷藥帖薄之治熱已成以消熱令不成膿也赤色腫有尖頭者藜蘆膏傅之一云醋和蚱蛤灰塗乾則易之

余平生數病癰疽得效者皆即記之考其病源多是藥氣所作或有上世服石遂令子孫多有此疾食中尤不宜食麪及酒蒜又慎溫粖厚被能慎之者可得終身無它此皆躬自

驗之故特論之也

五香連翹湯凡一切惡核瘰癧癰疽惡腫患皆主之方

青木香　沉香　薰陸香　丁香　麝香　升麻　射干　獨活　寄生　連翹　通草各三兩　大黃三兩

右十二味咬咀以水九升煮取四升內竹瀝二升更煮取三升分三服取快利（附後方有紫葛甘草無通草治惡肉腫氣痛要籍劒義有惡核風結腫氣痛要籍劒義有黃者甘草岩消各六分千金翼云未差重小有異處）

治癰疽發背黃耆竹葉湯方

黃耆　甘草　芍藥酪三　當歸　麥門冬　黃芩　人參　石膏　芎藭　半夏酪各三兩　生薑五兩　生地黃八兩　大棗三十枚　淡竹葉一握

右十四味咬咀以水一斗二升先煮竹葉取一斗去滓內藥煮取三升分四服相去如人行三十里間食日三夜一

八味黃耆散傅之方

黃耆　芍藥　大黃　黃連　芍藥　莽草　黃芩　梔子仁各等分

右治下篩雞子白和如泥塗故帛上隨腫大小傅之乾則易之若已開口封瘡上須開頭令瘀氣

王不留行散治癰腫不能潰困苦無聊賴方

王不留行子三合千金翼作一升　龍骨二兩　野葛皮半分　當歸二兩　乾薑　桂心酪二　栝樓根六分

右七味治下篩食訖溫酒服方寸匕日三以四肢習習為度不知稍加之令人安穩不覺膿自潰即著瘡痂平復

神良此浩仲堪方隋濟閣黎所名為神散癰腫即消極
安穩（千金貫云治癰疽及諸雜腫已潰皆服之）
內補散治癰疽發背婦人乳癰諸瘍未潰者便消不消者
令速潰疾愈方
木占斯　人參　厚朴　細辛　桔梗　括樓根　乾薑一云乾地黃　桂心　敗醬　防風　甘草各一兩
右十一味治下篩酒服方寸匕藥入咽覺流入瘡中若癰
疽灸之不能發壞者可服之瘡未壞者去敗醬已發膿者
內敗醬服藥日七八服夜二三服以多為善若病在下當
膿血出此為腸癰也諸病在裏惟服此藥即覺其力痛
者即不痛長服治諸瘡及疽痔瘡已潰便早愈醫人不
知用此藥發背無有治者惟服此耳若始覺背上有不好

而渴者即勤服之若藥力行覺渴止便消散若雖已壞但
日夜服之勿住也服之腫自消散不覺去時欲長服者當
去敗醬婦人乳癰宜速服之一方無桂心一名木占斯散
主癰腫堅結若已壞者速愈未壞者使不成癰便消（張文仲無桂心劉消子云此是華佗方）
治大瘡熱退膿血不止瘡中肉虛疼痛排膿肉塞散方
防風　茯苓　遠志　甘草　當歸　黃耆各一兩　白芷　桔梗　厚朴二兩　赤小豆五合酒浸熬之　桂心二分　人參　菖蒲　附子二枚炮
右十四味治下篩酒服方寸匕日三夜一
治癰疽發背豬蹄湯方
豬蹄一具治如食法　黃連　芍藥各三兩

黃芩二兩　蘼蕪根　狼牙根各八兩

右七味㕮咀以水三斗煮猪蹄令熟澄清取二斗下諸藥煮取一斗去滓洗瘡一食頃以帛拭乾帖生肉膏日二如

痛加當歸甘草各二兩

治癰疽發十指或起膀胱及發背後生惡肉者方

猪蹄一具治如食法　當歸　大黃

芍藥　黃芩　獨活　莽草各一兩

右八味㕮咀以水三斗煮猪蹄取八升去之內諸藥煮取四升去滓以漬瘡兩食頃洗之拭令乾傅麝香膏

治癰疽及發背諸惡瘡去惡肉麝香膏方

麝香　雄黃　礬石各一兩　蔺茹各一兩一作眞朱

右四味治下篩以猪膏調如泥塗之惡肉盡止却傅生肉膏

食惡肉膏方

大黃　苦蘞　莽草　眞朱

雌黃　附子一生用各一兩　白斂　礬石

黃芩　蔺茹各二兩　雄黃半兩

右十一味㕮咀以猪脂一升半煎六沸去滓內蔺茹石末攪調傳瘡中惡肉盡乃止

治癰腫惡肉不盡者方

葫藶灰一作藶灰　石灰一附後作白炭灰

右二味各淋取汁合煎如膏成食惡肉亦去黑子此藥過十日後不中用

又方

生地黃汁煎如膠作餅子帖之日四五度

食惡肉散方

流黃　馬齒礬　漆頭蔺茹　丹砂

麝香　雄黃　雌黃　白礬各二分

右八味治下篩以粉之吮食惡肉千金翼薄帖第一

傳之又處療癰疽篇無丹雌黃有藜蓋云亦膏和

潰瘍中有紫肉破不消以此散充頭內蝕膿膿之

又方

茼茹　礬石　雄黃　流黃各二分

右四味治下篩內瘡中惡肉盡即止不得過好肉也

治癰疽發背壞後生肉膏方

生地黃一斤　辛夷二兩　獨活　當歸

大黃　黃著　芎藭　白芷

芍藥　黃芩　續斷各一兩　薤白五兩

右十二味咬咀以臘月猪脂四升煎取白芷黃下之去滓

傅之立差

生肉膏治癰疽發背潰後令生肉方

甘草　當歸　白芷　蒗蓉

蜀椒　細辛各二兩　烏喙炙肺　蛇銜一兩

薤白半升　乾地黃二兩

右十味咬咀以醋半升漬一宿猪膏二斤煎令沸三上三

下膏成塗之立差

蛇銜生肉膏主癰疽金瘡敗壞方

蛇銜　當歸各六分　乾地黃二兩　黃連

黃耆　黃芩　大黃　續斷

蜀椒　芎藭　白及　芎藭

莽草　白芷　附子　甘草

細辛各一兩　薤白一把

右十八味咬咀酢漬再宿臘月猪脂七升煎三上三下酢

盡下之去滓傅之日三夜一（崔氏有大戟獨活各一兩死地黃黃連黃耆續斷白及芎）

菊白並
甘草

五香湯主熱毒氣卒腫痛結作核或似癰瘍而非使人頭痛寒熱氣急者數日不除殺人方

青木香　薏香　沈香　丁香　薰陸香各一兩

右五味㕮咀以水五升煮取二升分三服不差更服之并以滓薄腫上千金翼以麝香代薏香

漏蘆湯方

漏蘆　白及　黃芩　麻黃　白薇
枳實　升麻　芍藥　甘草各二兩　大黃二兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服快下之無藥處單用大黃下之良肘後云治癰疽丹毒惡肉千金翼方劉消子死芍藥有連翹治時行熱毒腫及眼赤痛生瘴瘧若熱盛者可加芒消二兩經心錄死白薇有知母犀角芒消各二兩此方與小兒篇方相重分兩服法異

丹參膏方

丹參　葫藶　蒴藋　鼠尾草各二兩
秦艽　獨活　蜀椒　蠷螋各二兩
烏頭　防已各一兩　牛膝　菊花

右十二味㕮咀以醋二升浸一宿夏半日如急要便煎之豬脂四升煎令醋氣歇慢火煎之去滓用傳患上日五六度肘後療癰防風不用防已結諸腫云此治惡肉惡膏亦可服

治氣痛小竹瀝湯方

淡竹瀝一升　射干　杏人　獨活　枳實
白朮　防已　防風　秦艽　芍藥
甘草　茵芋　茯苓　黃芩　麻黃各二兩

右十五味㕮咀以水九升煮取半下瀝煮取三升分四服

白薇散方

白薇　防風　射干　白木各三分　當歸
防巳　青木香　天門冬　烏頭
獨活　山茱萸　萎蕤各四分　枳實
白芷各三分　莽草一兩　麻黃五分　柴胡
治氣腫痛蔥藥散方　蜀椒各一分　秦艽五分
蔥藥子一升熬令黃為末以麻油和之如泥炒令焦黑
以傅故熟布上如腫大小勿開孔帖之無蔥藥用小
豆末和雞子如前乾易之甚妙
治赤色腫有尖頭者藜蘆膏方
藜蘆盡二分　黃連
黃芩各八分　礬石　雄黃
右六味末之猪脂二升二合煎令烊調和以傅上瘡癬頭

瘡極效又治淺瘡經年抓搔成瘡孔者
矍麥散治癰排膿止痛利小便方
矍麥一兩　芍藥　桂心　赤小豆酒浸熬
苦鶡　黃耆　當歸　白斂
麥門冬各二兩
右九味治下篩先食酒下方寸匕日三千金翼用細辛慧
慧苡人　桂心　白斂　當歸
薤蓉　乾薑各三兩
右六味治下篩先食溫酒服方寸匕日三夜再
癰疽潰後膿太多虛熱黃耆茯苓湯方
黃耆　麥門冬各三兩　苦鶡　茯苓

心麥門冬白斂沙諸癰潰及未潰瘡中疼痛膿血不絕不可忍者

桂心 各二兩　生薑 四兩　五味子 四合　大棗 二十枚

右八味㕮咀以水一斗半煮取四升分六服千金翼有遠志當歸人參各二兩甘草六兩

內消散治凡是癰疽皆宜服此方

赤小豆 一升浸蒸　酢 一升　人參 甘草

當歸 黃耆 薏苡人 各三兩　猪苓 各二兩　白斂

右十二味治下篩以酒服方寸匕日三夜一長服取差

治癰疽膿血內漏諸漏壞敗男發背女乳房及五痔猬皮散方一具

猬皮一具　蜂房一枚　地榆 附子 桂心 當歸 各三兩　防風 一兩　升麻 四兩

續斷 各五分　乾薑 六分　蜀椒 葈本各四分　厚朴 六分

右十一味治下篩空腹以酒服方寸匕日三取差加斑猫七枚益良

凡患腫皆因宿熱所致須服冷藥差後有患冷利不止者方

赤石脂　人參　龍骨 甘草 乾薑 各二兩　附子 一枚

右六味㕮咀以水八升煮取二升半分三服每服八合

桅子湯主表裏俱熱三焦不實身體生瘡及發癰癤大小便不利方

桅子人 二七枚　芒消 二兩　黃芩　甘草 知母 各三兩　大黃 四兩

右六味㕮咀以水五升煮減半下大黃取一升八合去滓內芒消分三服

五利湯主年四十已還強壯常大患熱發癰疽無定處大小便不通方

大黃三兩　梔子人五枚　升麻　黃芩各二兩
芒消一兩
右五味咬咀以水五升煮取二升四合去滓下芒消分四
服快利即止劉消子名大黃湯
乾地黃丸壯熱人長將服之終身不患癰疽令人肥悅耐勞
苦方
乾地黃五兩　芍藥　甘草　桂心
黃芩　遠志各二十石斛
當歸　大黃各三兩　人參　巴戟天
栝樓根各一兩　蒺藜四兩　天門冬各四兩
右十五味末之蜜丸酒服如梧子大十九日三加至二十九丸
乾地黃丸主虛熱消瘡癰方
乾地黃四兩　大黃六分　芍藥　茯苓

王不留行　甘草　遠志　麥門冬
艾參　升麻　黃芩各三兩　桂心六兩
右十三味末之蜜和酒服如梧子十九日三加至二十九長
服令人肥健一方有枳實三兩外臺無甘草遠志麥門冬人參升麻黃芩
乾地黃丸主虛勞客熱數發癰腫瘡癤經年不除方
乾地黃四兩　天門冬五兩　黃連　澤瀉　細辛各三兩
大黃　黃著　黃芩
甘草　桂心　芍藥　茯苓
乾漆各二兩　人參一兩
右十四味末之蜜丸酒服如梧子大十九日三夜一加至
二十九又服延年終身不發癰疽凡方中用大黃薄切五
外米下蒸熟暴乾用之熱多倍大黃無要籍論義無澤瀉
地黃煎補虛除熱散乳石去癰癤痔疾悉宜服之方

生地黃噉多少三擣三壓取汁令盡銅器中湯上煮
勿蓋令泄氣得減半出之布絞去麁碎結濁滓藏更
煎之令如餙酒服如彈丸許日三勿加之百日癰疽
永不發

枸杞煎主虛勞輕身益氣令人有力一切癰疽永不發方

枸杞三十斤剉葉生至未落可用莖葉落至未生
可用根以水一石煮取五斗去滓淀將滓更入釜與
水依前煮取五斗并前爲一斛澄之去淀釜中煎令
取二斗許更入小銅鍋子煎令連連如餙去器盛重
湯煮更好每旦早朝服一合半日再初服一合漸漸
加之

主風濕躄痛不能飲食兼癰疽後補虛贏方

薔薇根　枸杞根各一百斤　生地黃　食蜜各十斤

右四味㕮咀以水煮令爛絞去滓微火煎令如粥內蜜耗令相得每食後服如
彈丸許

搗腫方

大黃　黃芩　白斂　芒消各三分

右四味咀以水六升煮取三升汁故帛四重內汁中以搗腫
上乾即易之無度數晝夜爲之

治癰疽始作腫赤煴熱長甚速方

青木香　犀角　大黃　升麻
黃芩　梔子人　黃連　甘草
芒消　射干　黃蘗　紫檀香
羚羊角　白斂各三分　地黃汁五合　麝香二分研入

右十六味㕮咀以水五升煮取二升小冷故帛兩重內易

中搨腫上乾易之日夜數百度

治頸項及胷背有大腫赤發即封令不成膿方

生乾地黃 半斤 香豉 半斤 朴消 五兩

右三味合擣令地黃爛熟傳腫上厚二分日三四易至差止此兼治一切腫

治癰腫痛煩悶方

生楸葉十重帖之以帛包令緩急得所日二易止痛兼消腫蝕膿甚良勝於衆物如冬月先收乾者用時監潤之亦可薄削楸皮用之

治癰始覺腫令消方

大黃 通草 葶藶 莽草 各等分

右四味為末以水和傳上乾則易之

又方

以莨菪末三指撮水和服之日三神良

治癰方

芫花為末膠和如粥傳之

治癰疽發腹背陰匿處通身有數十癰者方

取乾牛糞燒灰下篩以雞子白塗之乾復易

若已結膿使聚長者方

栝樓根末之苦酒和傳上燥復易赤小豆亦佳

治大人小兒癰腫方

生猪腦傳紙上帖之乾則易日三四度

又方 芥子末湯和傳紙上帖之 千金翼以猪膽和塗之

又方 白薑石末蒜和擣傳上即頭出

又方 馬鞭草擣傳上差

大人小兒癰腫灸兩足大拇指奇中立差仍隨病左右

治癰子方

凡癰無頭者吞葵子一枚不得多服

又方　燒葛蔓灰封上自消牛糞灰封之亦佳

又方　鼠粘根葉帖之

又方　水和雀屎傅之

又方

生椒末　釜下土　千金翼有麴

右三味等分酯和塗之干末爲三味

又方

狗頭骨　芸臺子

右二味等分末之醋和傅上

治癰有膿令潰方

雞羽三七枚燒末服之即潰

又方　人乳和麪傅上比曉膿血出並盡不用近手

又方　箔經繩燒末臘月猪脂和傅下畔即潰不須針灸

治癰腫發背初作及經十日已上腫赤燃熱毒氣盛日夜疼痛百藥不效方

殷雞子　枚　新出狗屎　如雞子大

右二味攪調和微火熬令稀稠得所捻作餅子可腫頭堅處帖之以紙帖上以帛抹之時時看之覺餅子熱即易勿令轉動及歇氣經一宿定如多日患者三日帖之一日一易差止此方穢惡不可施之貴勝然其愈疾一切諸方皆不可及自外諸方還復備具設儀注而已覺者當曉斯方亦備諸急爾

烏麻膏主諸漏惡瘡一十三般丁腫五色遊腫癰癤癰毒熱狐刺蛇毒狂犬蟲狼六畜所傷不可識者二十年漏金瘡中風

皆以此膏帖之惡膿盡即差止痛生肌帖不換藥惟一日
一度拭去膏上膿再帖之以至差乃止方

生烏麻油一斤　黃丹四兩　蠟四分皆大外

右三味以臘日前一日從午內油銅器中微火煎之至明旦看油減一分下黃丹消盡下蠟令沫消藥成至午時下之惟男子合之小兒女人六畜不得見之

治諸腫紫葛帖方

紫葛十分　大黃五分　白斂　乞參

黃芩　黃連　升麻　揄白皮

由跋各三分　赤小豆一合　青木香一分

右十一味治下篩以生地黃汁和如泥傳腫上乾易之無地黃汁與米醋和之

又帖膏方

松脂一斤　大黃一兩　猪脂一斤　細辛

防風　黃芩　芎藭　白蘞

當歸　白芷　黃蘗　黃連各半　白蠟四兩

右十五味㕮咀先煎脂蠟令烊乃內諸藥三上三下絞以綿及布以著水中為餅取少許火炙之油紙上傳之貼瘡上千金翼有黃蓍一兩

青龍五生膏治癰疽疼漏惡瘡膿血出皆以導之方

生梧桐白皮　生桑白皮　生龍膽　生吉竹茹　生柏白皮各五兩　蜂房

猬皮　蛇蛻皮各一具　雄黃

雌黃各一兩　蜀椒

苦蔘各五分　附子

右十三味咬咀以三年苦酒二斗浸藥二宿於炭火上炙
乾擣下細篩以猪脂二升半於微火上煎攪令相得如飴
著新未中水白瓷器中盛稍稍隨病深淺傳之并以清
酒服如棗核曰一
治癰疽痔漏惡瘡婦人妬乳漆瘡方
野葛　芍藥　蘼白　當歸
通草各三分　附子一分
右六味咬咀酒漿半日先煎猪脂八合令煙出內亂髮二
分令消盡下之待冷又內松脂八分蠟二分更著火上令
和即內諸藥煎令沸三上三下去滓故帛傳藥帖腫上乾
即易之如春去附子其髮須洗去垢不尒令人瘡痛
治癰腫松脂膏方
黃芩　當歸
黃耆　黃連
芍藥　大黃
右八味咬咀合松脂一斤半猪脂一合半微火煎之三上
三下綿布絞去滓火炙傳紙上隨腫大小帖之日三易之
即差
治諸色癰腫惡瘡差後有瘢滅瘢膏方
蠟　芎藭各一兩
蘘荷　安息香一作婆萎　狼毒　烏頭
羊躑躅　附子　野葛　白芷
烏賊骨　赤石脂　皂莢　乾地黃
天雄　芍藥　芎藭　大黃
當歸　莽草　石膏　地榆
白朮　續斷　鬼臼　蜀椒
巴豆　細辛各一兩
右二十六味擣末以成煎猪脂四斤和藥以此爲準煎之

三上三下以好塩一大匙下之膏成須服者與服之須摩
者與摩之摩之忌近眼服之忌姙娠人若滅瘢者以布指令
傷傳之皐中息肉取如大豆內皐中如瘀血酒服如棗核大
痔漏以綿裹如梅子內下部若中風摩患上取差出朋中亦
內若滅瘢取少許和鷹屎白傳之取臘日合之神效千金翼有
治膿潰後瘡不合方
燒鼠皮一枚作末傳瘡孔中
又方 熟搗大豆以傳之
又方 炒烏麻令黑熟搗以傳之
又方 以牛屎傳之乾即易之
又方 燒破蒲蓆灰臘月猪脂和內孔中
治癰久不差方
馬齒菜擣汁煎以傳之

治癰癤潰後膿不斷及諸物刺傷瘡不差方
石流黃粉二分 筯一片 礎頭碎
右二味少濕筯內流黃中以刺瘡孔瘡差為度
治癰肉中如眼諸藥所不效者方
取附子削令如碁子安腫上以唾帖之乃灸之令附
子欲焦復唾濕之乃重灸之如是三度令附子熱氣
徹內即差此法極妙
治諸瘡著白痂復發方
大蒜 鼠矢
右三味等分為末傳之日三
書墨
禁腫法
凡春初雷始發聲時急以兩手指雷聲聲止乃止後
七日勿洗手於後有一切腫及蠆螫惡注腫瘡摩之

尋手差

書腫方

太乙 神一 未 甲一 不生 壬乙一 不成 癸死

右以丹書閉氣書腫上立差

治惡毒腫或著陰卵或著一邊疼痛攣急引入小腹不可忍一宿殺人方

取茴香草擣取汁飲一升日三四服滓薄腫上冬中根亦可用此是外國神方從永嘉年末用之起死人神驗

治風勞毒腫疼痛攣急或牽引小腹及腰髀痛方

桃人一升研如常法以酒三升攪和頓服之厚衣蓋令汗不過三劑

若從脚腫向上至腹者即殺人治之方

赤小豆一斗以水三斗煮令爛出豆以汁浸脚至膝每日一度差止若已入腹不須浸但煮豆食之忌鹽菜米麪等渴飲汁差乃止

麻子小豆湯治毒腫無定處或赤色惡寒或心腹刺痛煩悶者此是毒氣深重方

麻子 赤小豆 各五 生商陸二升 升麻四兩

附子二兩 射干三兩

右六味㕮咀以水四斗先煮四味取二斗半去滓研麻子碎和汁煮一沸濾去滓取汁煮豆爛取汁每一服五合日二夜一當利小便爲度腫退即差并食豆

治一切毒腫疼痛不可忍者方

取蜱麻子擣傅之即差

治癰有堅如石核者復大色不變或作石癰練石散方

麞理黃石斤一　鹿角八兩燒白斂兩

右三味以醋五升先燒石令赤內醋中不限數醋半止搗擣末以餘醋和如泥厚傅之乾則易取消止盡更合諸漏及瘰癧其藥悉皆用之仍火針針頭破傅藥又單磨鹿角半夏末和傅之不如前方佳也

治石癰堅如石不作膿者方

生商陸根擣傅之乾即易之取軟為度又治濕漏諸癰瘇

又方　蜀桑根白皮陰乾擣末烊膠以酒和藥傅腫即拔出根

又方　醋和萇楚子末傅頭上即拔出根矣

又方　蛇蛻皮帖之經宿便差

又方

櫟子一枚以醋於青石上磨之以塗腫上乾更塗不過十度即愈

又方

梁上塵　葵根燒灰　等分

右二味醋和傅之即差

凡發腫至堅有根者名曰石癰治之法當上灸之百壯石子當碎出如不出益壯乃佳

發背第三　論一首　方十五首

論曰凡發背皆因服食五石寒食更生散所致亦有單服鍾乳而發者又有生平不服而自發背者此是上代有服之者其候率多於背兩胛間起初如粟米大或痛或癢仍作赤色人皆初不以為事日漸長大不過十日遂至於死其臨困之時以闊三寸高一寸瘡有數十孔以手按之諸孔中皆膿出尋時失音所以養生者小覺背上癢痛有異即火急取淨土

水和為泥捻作餅子厚二分闊一寸半以麤艾大作炷灸泥上帖著瘡上灸之一炷一易餅子若粟米大時可灸七餅子即差如榆莢大灸七七餅炷即差如錢大可日夜灸之不限炷數仍服五香連翹湯及鐵漿諸藥攻之乃愈又法諸發背未作大膿可以冷水射之浸石令冷熨之日夜莫住差乃止此病忌麪酒五辛等亦有當兩肩上發者

凡服石人皆須勞役四體無令自安如其不爾者多有發動亦不得逐便恣意取煖稱已適情必須遺欲以取寒凍雖當時不寧於後在身多有所益終無發動之慮耳

凡腫起背胛中頭白如黍粟四邊相連腫赤黑令人悶亂即名發背也禁房室酒肉蒜麪若不灸治即入內殺人若灸當瘡上七八百壯有人不識多作雜腫治者皆死

治發背及癰腫已潰未潰方

香豉三升少與水和熟擣成強泥可腫作餅子厚三分已上有孔勿覆孔上布豉餅以艾列其上灸之使温温而熱勿令破肉如熱痛即急易之患當減快得安穩一日二度灸之如先有瘡孔孔中得汁出即差

治發背背上初欲結腫即服此方

大黃　升　麻

梔子擘　黃芩　甘草炙　各三兩

右五味㕮咀以水九升煮取三升分三服取快利便止不通更進

治癰疽發背已潰未潰及諸毒腫方

栝樓根　榆白皮　胡麻麨　鼠屎土

右四味等分末之以女人月經衣水洗取汁和如泥封腫上乾易潰者四面封之亦覺即封從一日至五日令差

內補散治癰疽發背已潰排膿生肉方

當歸 桂心各二兩 人參 芎藭

厚朴 防風 甘草 白芷

桔梗一兩

右九味治下篩酒服方寸匕日三夜二未差更服勿絕外臺

無防風白芷甘草

內補散治癰瘡發背方

蜀椒 乾薑各二分 白斂一兩 黃芩

人參二分 桂心一分 甘草一兩 小豆一合半

附子 防風各一兩 芎藭二兩

右十一味治下篩酒服方寸匕日三夜二

治癰疽發背及小小瘭癘李根皮散方

李根皮一升 通草 白斂 桔梗

厚朴 黃芩

當歸各二兩 葛根三兩

芍藥各四兩 芎藭六兩

右十五味治下篩酒服方寸匕日三瘡大困者夜再服之

曾有人患骨從瘡中出兼有三十餘癰癤服此散得差

治發背癰腫經年差後復發此因大風或結氣在內經脉閉

塞至夏月已來出攻於背久不治積聚作膿血為瘡內漏大

內塞排膿散方

山茱萸 五味子 茯苓 乾薑各一分

當歸 石韋 芎藭四分 附子二分

蓬蘞 巴戟天 遠志 麥門冬

乾地黃各八分 桂心 芍藥三分 地膽

蒐絲子各三分 石斛 人參 甘草各五分

右二十味治下飾酒服方寸匕日三夜一稍加之長服終身不患癰癤

治發背方

亂髮灰酒服方寸匕亦治瘭疽

又方　飲鐵漿二升取利

又方　三年醋漬微火煎令稠和牛脂傅上日一易

又方　猪狗牙燒灰醋和傅上日三四易之

又方

猪脂傅上日四五亦治發乳敕急（之詐即寒定好眠甚妙）（一斤差皆初帖少）（力云取猪羊脂切作片冷水浸帖上暖易）

又方　蛇頭灰醋和傅之日三易

又方　燒鹿角灰醋和傅之日四五

又方　燒古蛙灰雞子白和傅之日三易

丹毒第四　論方三十八首

論曰丹毒一名天火肉中忽有赤如丹塗之色大者如手掌甚者徧身有癢有腫无其定色有血丹者肉中腫起癢而復痛微虛腫如吹狀隱軫起也有雞冠丹者赤色而起大者如連錢小者如麻豆粒狀肉上粟粟如雞冠肌理也一名茱萸丹有水丹者由徧躰熱起遇水濕搏之結丹晃晃黃赤色如有水在皮中喜著股及陰處此雖小疾不治令人至死治之皆用升麻膏也

升麻膏方

升麻　白薇（肘後作白斂）　漏蘆　連翹

梔子（四十枚）　蒴藿（四兩）　黃芩（各二兩）

芒消　蛇銜　枳實（各三兩）

右十味微擣之水三升浸半日以猪膏五升煎令水氣盡

去滓膏成傳諸丹皆用之日三及熱瘡腫上經心錄無枳實以治諸毒腫

治丹毒升麻揭湯方

升麻　漏蘆　甘消酪二　梔子二十枚

黃芩三兩　葫蘿蔔五兩

右六味㕮咀以水一斗浸良久煮取七升冷以故帛染汁揭諸丹毒上常令濕揭後須服飲子并漏蘆湯方並在前癰腫條中但服之立差小品用治丹毒腫

治丹毒單用藥方

水苔　生蛇銜　生地黃　生菘菜

葫蘿蔔葉　慎火草　五葉藤　豆葉

浮萍　大黃　梔子　黃芩

芒消

右十三味但以一味單擣塗之立差大黃皂下水和用

又方

凡天下極冷無過濕菜最冷但有患熱毒腫并丹等取渠中藻菜細切熟擣傳丹上厚三分乾易之

治諸丹神驗方

以苦薹菜熟擣厚封之隨手即消如餘熱氣未愈但三日內封之陵醒醒好差止縱乾亦封之勿歇以絶本余以正觀七年三月八日於內江縣飲多至夜睡中覺四躰骨肉疼痛比至曉頭痛目眩額左角上如彈丸大腫痛不得手近至午時至於右角至夜諸處皆到其眼遂閉合不得開幾至殞斃縣令周公以種種藥治不差經七日余自處此方其驗如神故疏之以傳來世云耳

五色油丹俗名油腫若犯者多致死不可輕之方

縛母猪枕頭卧之甚良

又方　牛屎塗之乾易

赤流腫丹毒方

取榆根白皮作末雞子白和傅之

又方　擣大麻子水和傅之

又方

以羊脂煎令摩之得青羊脂最良集驗方云治人面起如疥狀不治日劇遍身即殺人

治小兒丹毒方

擣馬齒莧一握取汁飲之以滓薄之

又方　擣赤小豆五合水和取汁飲之一合良滓塗五心

又方　濃煮大豆汁塗之良差亦無瘢痕

又方　臘月猪脂和釜下土傅之乾則易

治小兒五色丹方

擣蒴藿葉傅之

又方　猪槽下爛泥傅之乾則易集驗治卒赤黑丹

又方　服黃龍湯二合并傅患上

治小兒白丹方

燒猪屎灰雞子白和傅之良

治小兒赤丹方

芸薹葉汁服三合滓傅上良千金翼云未芸薹以雞子白和塗之

治小兒赤丹斑駁方

唾和胡粉從外向內傅之

又方　銅鐵屎以猪脂和傅之

又方　屋塵和臘月猪脂傅之

治小兒火丹赤如朱走皮中方

以醋和豉研傅之
又方　鯉魚血傅之良
又方　擣荏子傅之良
又方　猪屎水和絞取汁服少許良
治小兒天火丹肉中有赤如丹色大者如手甚者徧身或痛
或癢或腫方
　赤小豆二升末之雞子白和如薄泥傅之乾則易便
　差一切丹並用此方皆差
又方　生麻油塗之
治小兒骨火丹其瘡見骨方
　擣大小蒜厚封之著足踝者是
治小兒殃火丹毒著兩脇及腋下者方
　伏龍肝末和油傅之乾則易若入腹及陰以慎火草

治小兒尿竈丹初從兩股起及臍間走入陰頭皆赤色者方
　水二升桑皮切三升煮取汁浴之良
又方　燒李根爲灰以苗中流水和傅之良
治小兒朱田火丹病一日一夜即成瘡先從背起漸至徧身
如棗大正赤色者方
　濃煮棘根汁洗之以成瘡者赤小豆末傅之未成瘡
　者雞子白和小豆末傅之凡方中用雞子者皆取先
　破者用之完者無力
治小兒天竈火丹病從髀間起小兒未滿百日犯行路竈君
若熱流下令陰頭赤腫血出方
　伏龍肝擣末雞子白和傅之日三良
又方

鯽魚肉 到五合

右二味和搗少水和傅之良

治小兒野火丹病徧身皆赤者方

用油塗之

治小兒菜黃丹病初從背起徧身如細纈一宿成瘡者方

赤小豆作末以粉之如未成瘡者雞子白和傅之

治小兒廢寢火丹初從足趺起正赤色者方

以秦根煮汁沐浴五六度

隱軫第五 論一首 灸法一首 方二十九首

論曰素問云風邪客於肌中則肌虛眞氣發散又被寒搏皮膚外發湊理開毫毛淫氣妄行之則爲癢也所以有風軫搔癢皆由於此又有赤軫者忽起如蚊蚋啄煩癢劇者重沓龍起搔之逐手起又有白軫者亦如此赤軫熱時即發冷即止白軫天陰冷即發白軫宜煮礜石汁拭之或煮蒴藿和少酒以浴之良 姚氏治赤軫或煮石南汁拭之良或水煮雞屎汁或煮枳實汁拭之良餘一切如治丹方法俗呼爲風屎亦名風尸

石南湯治六十四種風淫液走人皮中如蟲行腰脊強直五緩六急手足拘攣隱軫搔之作瘡風尸身癢卒面目腫起手不得上頭口噤不得言方出第八卷中此方但是隱軫宜服之差

治風瘙隱軫心迷悶亂方

天雄 牛膝 桂心 知母 各四分

防風六分 乾薑 細辛 各三分 人參二分

括樓根 白朮 各五分

右十味治下篩酒服半錢匕加至一匕爲度

千金方二十三 茂

治搶癩皮中風虛方

枳實 三分 獨活 薤蓉
秦艽 各四兩 丹參 桂心 各五兩 松葉 切一升

右八味㕮咀以酒二斗浸六宿每服二合日二稍稍加之

治風瘡隱輕方

大豆三升酒六升煮四五沸每服一盞日三

又方 牛膝爲末酒下方寸匕日三并治骨疽癩病及瘡瘍

又方 芥子末漿水服方寸匕日三

又方 白朮 三兩 戎鹽 蓽茇 細辛 黃芩 右八味㕮咀以水一斗煮取三升洗之良日五

又方 白朮 三兩 戎鹽 蓽茇 各半兩 黃連 芎藭 茵芋 各一兩

馬鬬子 蒴藿 蔓荊子 礬石 蔾藜子 茵芋 羊桃 石南 羊桃 篇竹 各二兩

右八味㕮咀以漿水二斗煮取一斗二升內礬石洗之日三

又方

蒴藿 防風 茵芋 芫花 羊桃 石南 羊桃 礬石

右八味各一兩㕮咀以漿水一斗煮取五升去滓內礬石令小沸溫浴之

治隱輕瘡瘍痂方

大黃 升麻 防風 芍藥 黃蘗 當歸 黃芩 青木香 甘草 各二兩 楓香 五兩 芒消 一兩 地黃汁 一升

右十二味咬咀以水一斗煮取三升半去滓下芒消令消
帛染揖病上一炊久日四五度
治舉體痛癢如蟲齧癢而搔之皮便脫落作瘡方
蒺藜子二升　蛇牀子二升　大戟一斤　大黃二兩
右七味咬咀酒四升水七升煮取四升去滓內礬石帛染
拭之
治風瘙膚癢癢在頭面大黃揖洗方
大黃　芒消各四分　黃芩八分　蒺藜子五合
右六味咬咀以水七升煮取三升去滓下消以帛染揖之
日一度勿近目
治風瘙隱軫方
蛇牀子二升　防風二兩　生蒺藜二斤
右三味咬咀以水一斗煮取五升拭病上日三五遍
治身體赤隱軫而癢搔之隨手腫起方
莽草二分　當歸　芎藭　大戟
細辛　芫花　蜀椒
附子　蠷螋各四分　猪膏二升半
右十一味咬咀以酒漬藥一宿猪膏煎之候附子色黃膏
成去滓以傅病上日三
青羊脂膏主風熱赤軫搔之逐手作瘡方
青羊脂四兩　甘草　芍藥各三兩　白芷
寒水石　防風　白及
黃耆　升麻各四分　石膏一升　竹葉一把
右十二味咬咀先以水八升煮石膏竹葉取四升去滓浸

諸藥以不中水猪脂二升合煎膏成傅病上良

治風搔隱軫方

石灰淋取汁洗之良

又方　白芷根葉煮汁洗之

又方　酪和鹽熟煮摩之手下即消良妙

治隱軫百療不差者方

景天一斤一名慎火草細擣取汁傅上熱灸手摩之再三度差

又方　芒消八兩水一斗煮取四升適寒温綿拭

又方

黃連　切　芒消酪　五兩

右二味以水六升煮取半去滓洗之日四五

治風搔隱軫心迷悶亂方

巴豆二兩以水七升煮取三升故帛染汁拭之大人小兒加減之

又方　礬石二兩末酒三升漬令消帛染拭病上

又方　吳茱萸一升酒五升煮取一升半帛染拭病上

治暴氣在表攻皮上隱軫作瘡方

煮槐枝葉洗之

治小兒患隱軫入腹體腫強而舌乾方

燕菁子末酒服方寸匕日三

又方　車前子作末粉之良

又方　蚕沙二升水二升煮去滓洗之良

又方　塩湯洗了以蔘子接傅之

舉體痛癢如蟲齧齒癢而搔之皮便脫落作瘡灸曲池二穴隨年壯發即灸之神良

論曰瘭疽者肉中忽生黤子如豆粒小者如黍粟劇者如梅李或赤或黑或青或白其狀不定有根不浮腫痛傷之應心根深至肌經久便四面悉腫膿胞黤熟紫黑色能爛壞筋骨若毒散逐脉入藏殺人南人名爲搦著毒厚肉處即割去之亦燒鐵烙之令焦如炭或灸百壯或飲葵根汁或飲藍青汁若犀角汁及升麻汁竹瀝黃龍湯等諸單方治專去其熱取差其病喜著十指故與代指相似人不識之呼作代指不急治之亦逐脉上入藏殺人南方人得之皆斬去其指初指頭先作黤疱後始腫赤黑黤瘡痛入心是也

代指者先腫瘢熱痛色不黤緣爪甲邊結膿劇者爪皆脫落此謂之代指病也但得一物冷藥汁搦漬之佳若熱盛服漏蘆湯及搦漬之傳升麻膏亦可針去血不妨洗漬塗膏也

復有惡肉病者身上忽有肉如赤豆粒突出便長推出如牛馬乳上如雞冠狀不治自長出不止亦不痛癢此由春冬時受惡風入肌脉中變成此疾治之宜服漏蘆湯外燒鐵烙之日日爲之令焦盡即以升麻膏傳之積日乃差

又有赤脉病身上忽有赤脉絡起隴聳如死蚯蚓之狀看之如有水在脉中長短皆逐脉所處此由春冬受惡風入絡脉中其血肉瘀所作也宜五香連翹湯及竹瀝等治之刺去其血仍傳丹參膏亦用白雞屎塗之良

惡核病者肉中忽有核累累如梅李核小者如豆粒皮肉瘡痛非熱非寒是也與諸瘡瘢因瘡而生是緩無毒惡核病卒然而起有毒若不治入腹煩悶殺人皆由冬月受温風至春夏有暴寒相搏氣結成此毒也但服五香湯主之又以小豆末傅之亦煮湯漬

時時洗之消後以丹參膏傅之令餘核摠消盡凡惡核初似
被射工毒無常定處多惻惻然痛或時不痛人不痛者便
不憂不憂則救遲遲治即殺人是以宜早防之尤忌牛肉
雞猪魚馬驢等肉其疾初如粟米或似麻子在肉裏而堅似
皰長甚速初得多惡寒須臾須臾即短氣取吳茱萸五合作
末水一升和之絞取汁頓服之以滓傅上須臾服此汁令毒
散止即不入腹也入腹則致禍矣切愼之

凡瘺病喜發四肢其狀赤脉起如編繩急痛壯熱其發於脚
喜從腨起至踝亦如編繩故云瘺病也發於腎喜著腋下
皆由久勞熱氣盛爲濕涼所折氣結筋中成此病也若不即
治其久潰膿亦令人筋攣縮也若不消潰其熱氣不散多作
躭病漏蘆湯主之瀉後鍼鋒針數針去惡血氣針瀉其根核
上傅小豆末取消爲度又用治丹法治之亦用治癰三味

甘草散傅之若潰傅膏散如癰法

惡核瘺病瘭疽等多起嶺表中土尠有南方人所食雜類
繁多感病亦復不一仕人往彼深須預防之無法必遭
其毒惟須五香湯小豆散吳茱萸皆是其要藥

凡附骨疽者以其無破(外臺故作附骨成膿故名附骨疽)喜著足
節解中丈夫產婦喜著胜中小兒亦著脊背大人急著者先
覺痛不得動搖按之應骨痛經日便覺皮肉漸急洪腫如
肥狀是也小兒纔手近便大啼呼即是肢節有痛候也大人
緩者先覺肌烘烘然經日便覺痛痺不隨小兒四肢不能動
搖亦如不隨狀看肢節解中若有肌烘烘處不知是附骨疽
令偏身成腫不至潰躰皆有青黯大人亦有不別呼爲賊風
風腫不知是疽也凡人身躰患熱當風取涼風入骨解中風
熱相搏便成附骨疽其候嗜眠沉重忽忽耳鳴又秋夏露卧

爲冷所折風熱伏結而作此疾急者熱多風少緩者風多熱
少小兒未知取風冷何故而有此疾由其血盛肌嫩爲風折
之即使凝結故也凡初得附骨疽即須急服漏蘆湯下之傳
小豆散得消可服五香連翹湯方在癰疽條中
凡賊風其人體卒無熱忽暴風冷即骨解深痛不發轉動
按之應骨痛也又即結痛或結瘰癧其附骨疽又即腫而
結膿以此爲異耳若治附骨作賊風則增益病深膿多若治
賊風作附骨即加風冷遂成瘰癧偏枯攣曲之疾也療之爲
效都在其始耳此非天下至精其孰能與於此若候附骨與
賊風爲異者附骨之始未腫但痛而已其賊風但痛不熱附
骨則其上壯熱四躰乍寒乍熱小便赤大便澁而無汗若得
下却熱并開發湊理便得消也縱不消盡亦得浮淺近外凡
賊風但夜痛骨不可按抑不得回轉痛處不壯熱亦不乍
寒乍熱多覺身體索索然冷欲得熱熨痛處即小寬時復有
汗出此爲賊風證也宜針灸尉熨傅諸服治風藥即愈方在風
條中
又有風熱毒相搏爲腫其狀先腫上生瘭漿如火灼處名曰
風熱毒治之一如丹法
又有洪燭瘡身上忽生瘭漿如沸湯灑劇者徧頭面亦有腎
脅腰腹腫緩通體如火湯灼瘭起者是也治之法急服漏蘆
湯下之外以升麻膏傅之其間傅升麻膏若無效一依傅丹方
凡熱瘡起便生白膿黃爛瘡起即淺但出黃汁名肥瘡
淺深瘡者淺撥之曼延長不止搔癢者初如疥搔之轉生汁
相連著是也
瘸瘡者初作亦如肥瘡喜於
坼裂春夏秋冬隨差劇者是
著手足常相對至隨月生死痛癢

有久癰餘瘡敗爲深疽者在臍脛間喜生瘡中水惡露寒凍不差經年成骨疽亦名脈瘡深爛青黑四邊堅強中央膿血汁出百藥不差汁潰好肉處皆虛腫亦有碎骨出者可溫赤龍皮湯（方見下卷腸癰篇）夏月日日洗冬天四日一洗青肉多可傳白薇散食却惡肉可三日傅之止後長傅家猪屎散得差止取猪屎燒作灰末如粉致瘡中令滿白汁出吮去隨更傅之差止若更青肉復著白薇茹散如前法家猪散取平復凡骨疽百療不差者可瘡上以炙之三日三夜便差如瘡不差差而復發骨從孔中出者名爲骨疽取先死烏雌雞一隻去肉取骨熬焦如炭取三家牛梔木刮取屑三家甑簡各一兩皆燒成炭合導瘡中碎骨當出數片差治瘺疽秘方世所不傳神良無比方

射干　甘草　蜚蠊　乾地黃

升麻　黃芩各二兩　大黃十分　麝香二分

犀角六分　前胡三分

右十味㕮咀以水九升煮取三升下大黃一沸去滓內麝香分三服差止不限劑數外臺無黃芩云翼深師加黃芩白薇枳實升麻松巢

治瘺疽諸疽十指頭瘃赤痛而癢方

白芷　大黃　芎藭　芩蘭　黃芩

黃連　甘草　蜚蠊　芥草各一兩　細辛　藁本

右十一味㕮咀以水二斗煮猪蹄一具取一斗煮藥取五升浸瘡即差（千金翼名猪蹄湯）

治瘺疽浸淫多汁日漸大方

胡粉　甘草　蘭茹各二分　黃連二兩

右四味治下篩以粉瘡上日三四

凡瘭疽著手足肩背累累如米起色白刮之汁出差後復發方

黃耆六分　款冬花二分　外麻四分　附子一枚炮各一分

右六味治下節酒服方寸匕加之日三　苦參汪無

又方　虎杖白者以馬屎和之暴乾燒爲灰粉之良

又方

胡粉一兩　青木香　滑石　龍骨各三兩

米粉一升　右五味爲末稍以粉病上日三

又方

竈屋塵　竈突墨　釜下土各一升

右三味合研令勻以水一斗煮三沸取汁洗瘡日三四度

治瘭疽著手足肩背忽發累累如赤豆剥之汁出者方

燕薔子熬擣帛裹展轉傳上良

又方　以麻子熬作末摩上良

又方　酒和麪傳之

又方

鮒魚長三寸者　亂髮雞大子　豬脂一升

右三味煎爲膏傳之

又方

剥去瘡痂溫醋泔清洗之以胡壖窠和百日男兒屎如膏傳之

又方　亂髮灰服方寸匕日三亦治發背

又方

煮芫華菜取汁一升服之并食乾熟葦臺數頓少與鹽醬冬月研其子水和服之

又方　以猪膽傅之良
又方　枸杞根葵根葉煮汁煎如糖服之隨意
又方　臘月糖晝夜浸之數日乃愈
治疽潰後方
以鹽湯洗拭了燒皂莢灰粉上良
又方　梁上塵和車軸中脂傅之良
又方　以牛耳中垢傅之良
又方　以生麻油滓綿裹布瘡上蟲出
又方　以沸湯灌瘡中三四遍作湯錫盛了明日還滿膿如小豆汁者方
凡疽似癰而小有異今曰去膿之埋熱灰中更互熨之即快得
芸臺孰擣濕布袋盛安不過再三即差冬用乾者
又方　皂莢煎湯洗瘡拭乾以蘗皮末傅勿令作痂

凡疽卒著五指筋急不得屈伸者灸踝骨中央數十壯或至百壯
治浸淫瘡苦瓠散方
苦瓠一兩　蛇蛻皮　蜂房各半兩　梁上塵合
大豆半合
右五味治下篩以粉爲粥和傅紙上帖之曰三易大令歛豆
又方　以煎餅承熱搦之亦治細癬
瘡表裏相當名浸淫瘡方
猪牙車骨年久者椎破燒令脂出熱塗之
又方
取苦楝皮若枝燒作灰傅乾者猪膏和塗并治小兒禿瘡及諸惡瘡
治瘑瘡方

醋一升温令沸以生薤一把内中封瘡上差爲度

又方　擣桃葉和鯉魚鮓糟封之亦可以鮓薄之

又方　炒臘月糖薄之

又方　燒故履系末傳之

又方　燒松根取脂塗之

治燥瘑方

醋和灰塗之

又方　熱牛屎塗之

治濕瘑方

燒乾蝦蟆猪脂和傳之

治瘑疥百療不差方

楝實外一　地榆根

右四味㕮咀以水一斗煮取五升稍温洗之日一

桃皮　苦參各五兩

治久瘑疥濕瘡浸淫日廣癢不可堪搔之黃汁出差後復發方

羊蹄根淨去土細切熟熬以醋和熟擣淨洗磨傳上一時間以冷水洗之日一又陰乾作末癢時搔汁出以粉之又以生葱根搗之千金翼無葱字

一切瘑瘡炙足大指奇間二七壯炙大指頭亦佳治脚腨及曲腋中癢搔之黃汁出是風疽方

以青竹筒一枚徑一寸半長三尺當中著大豆一升以糠馬屎二物燒竹筒中燒之以器承兩頭取汁先以泔清和鹽熱洗磨了即塗豆汁不過三度極効

又方　嚼胡麻傳以綿裹之日一易之神良

治石疽狀如痤癰而皮厚擣穀子傳之亦治金瘡

擣穀子傳之亦治金瘡方

治久癰瘡敗壞成骨疽方
末龍骨粉瘡四面厚二分以膏著瘡中日二易之
蟲出如髮盡愈瘡方如左
大蝦蟆（虛枚自死者）亂髮（壹呢子大）雞猪脂（壹懷）
右三味內脂中煎之二物略消盡下待冷更內塩一合攪和之充前用
治瘡久不差差而復發骨從孔中出名爲骨疽方
以猪膽和楸葉擣封之
又方 擣白楊葉末傳之帛裹一日一易
又方 蕪菁子擣傳之
又方
穿地作坑口小裹大深二尺取乾雞屎二升以艾及荆葉擣碎和雞屎令可然火坑中燒之令煙出內疽於坑中熏之以衣擁坑口勿洩氣半日當有蟲出甚效
治久疽方
鯽魚破腹勿損內白塩於腹中以針縫之於銅器中火上煎之令乾作末傳疽瘡中無膿者以猪脂和傳之小瘥痛無悋也十日差
治附骨疽方
擗皮燒末飲服方寸匕
又方
新剥鼠皮如錢孔大帖腫上即膿出已潰者取猪脊上脂帖之則膿出
附骨疽灸間使後一寸隨年壯立差
治諸瘡因風致腫方

燒白芋灰溫湯和之厚三分傳瘡上乾即易不過
五度差

又方

櫟根皮三十斤剉水三斛煮令熱下鹽一把令的的
然熱以浸瘡當出膿血日日爲之差止

治惡露瘡方

擣薤菜傳瘡口以大艾炷灸藥上令熱入內即差

治反花瘡并治積年諸瘡方

取牛蒡根熟擣和臘月猪脂封上差止并治夂不
差諸腫惡瘡漏瘡等皆差

又方 取馬齒菜擣封差止

又方 取蜘蛛膜帖瘡上數易之差止

治惡瘡方

礬石 蠟 松脂 亂髮各二分 猪膏四兩

右五味煎髮消內礬石次內松脂次內蠟去滓先刮洗瘡
以塗之日再三不痛夂瘡時愈新瘡遲愈蝎蚘蟲瘡頭禿
皆即愈生髮勝飛黃膏

又方 燒萹竹灰和楮白汁塗之

又方 羊矢麻根燒煙斷膏和封有汁者乾傳之

又方 麥一升作餅大小覆瘡灸上令熱汁出盡差

治惡瘡似火爛洗湯方

白馬屎暴乾以河水和煮十沸絞取汁洗之

治惡瘡名曰馬疥其大如錢方

以水漬自死蛇一頭令爛去骨以汁塗之手下差

治身瘡及頭瘡不止方

昌蒲末傳上日三夜二

治瘡久不差方

蕪荑　藜蘆各一兩　薑黃　青礬

雄黃分各一　苦參　沙參各三分　附子一枚

右八味治下篩先以藍汁洗瘡去痂乾拭傅之小兒一炊久剥去之大人半日剥之再傅不過三四度愈治惡瘡十年不差似癩者方

蛇蛻皮一枚燒之末下篩豬脂和傅之醋和亦得

又方

苦瓠一枚叹咀煮取汁洗瘡日三又煎以塗癬甚良

又方　鹽湯洗擣地黃葉帖之

又方　燒猳豬矢傅之

又方　燒萇荂子末傅之

又方　燒鯽魚灰和醬清傅之治諸瘡久不差并治六畜方

秦膏三升水三斗煮取一斗半數洗取愈

烏膏主惡瘡方

雄黃　雌黃　芎藭　升麻

烏頭　及已　竹灰　黃連

薰蘆　水銀各二分　杏人三十枚　胡粉一分

巴豆二十枚　松脂　亂髮各一雞子大　蠟三兩

右十六味咬咀以猪膏三升急煎令髮消去滓停小冷以眞朱二錢匕投攪令相得以傅之凡用膏先淨瘡拭乾乃傅之傅訖以赤石脂黃連散粉之

烏膏治種種諸瘡不愈者方

水銀一兩　黃連二兩　經墨三分

右三味治下篩以不中水猪膏和之傅上不過再三愈神良若欲多作任人惟不治金瘡水銀大須熟研

治代指方

甘草二兩㕮咀水五升煮取一分半漬之若無用苦消代之

又方

以唾和白硐砂搜麪作椀子盛唾著硐砂如棗許以爪指着中一日差

又方

以毛雞黃土作泥泥指上令厚五分內糖灰中煨之令熱可忍泥乾易不過數度差

又方　刺指熱飯中二七遍

又方　以麻沸湯漬之即愈

又方　單煮地榆作湯漬之半日

又方　先刺去膿血炙魚鮓皮令温以纏裹周匝痛止便愈

又方　以蜀椒四合水一升煮三沸以漬之

又方　取蒴藋葉煮沸漬之

治指痛欲脫方

猪脂和塩煮令消熱內指中食久住翼和乾薑

治手足指掣痛不可忍方

醬清和蜜温塗之

又灸指端七壯立差

治手足指逆臚方

此緣厠上搔頭還坐厠上以指到拌二七下即差

又方

青珠一分　乾薑二分

右二味擣以粉瘡上日三

治凍指豕欲墮方

馬屎三升以水煮令沸漬半日愈

治手足皴裂逆臚代指方

酒搗猪膇洗之愼風冷

治手足皴破裂血出疼痛方

猪脂煮熱酒中洗之

治冬月冒涉凍凌面目手足皴疹及始熱痛欲疹者方

取麥巢煮令濃熱洗之

治手足皴痛方

煮茄子根洗之

又方

苦蒻三分 蜀椒二分 白芷 防風 鹽酪各一

右伍味㕮咀以水四升煎濃塗之猪脂煎更良

治人脚無冬夏常拆裂名曰尸脚方

雞矢一升水二升煮數沸停小冷漬半日差止亦用

馬矢

又方

烊膠膠乾帛帖上

硇砂礬石末裹之以差為候

割甲侵肉不差方

又方 擣鬼針草苗汁鼠黏草根和臘月猪脂傅之

備急千金要方卷第二十二

備急千金要方卷第二十三　痔漏

朝奉郎守太常少卿充秘閣校理判登聞檢院上護軍賜緋魚袋臣林億等校正

九漏第一　瘡瘻　附瘰癧
腸癰第二　癰疽　附乳癰　乳
五痔第三
疥癬第四　癜　赤疵　白癜　疣目　附
惡疾第五

九漏第一　論一首　方八十三首
灸法十六首

論曰夫九漏之爲病皆寒熱瘰癧在於頸腋者何氣使生此皆鼠瘻寒熱之毒氣也堤留於脉而不去者也鼠瘻之本皆根在於藏其未上出於頸腋之下其浮於脉中而未著於肌肉而外爲膿血者易去去之杳何曰請從其末引其本可使衰去而絶其寒熱審按其道以予之徐往來以去之其小如

麥者一刺知三刺已汏其死生奈何曰反其目視其中有赤
脉從上下貫童子見一脉一歲半死見二
脉二歲死見二脉半二歲半死見三脉三歲死赤脉不下貫
瞳子可治
凡項邊腋下先作瘰癧者欲作漏也宜禁五辛酒麪及諸熱
食凡漏有似石癰累累然作癧子有核在兩頸及腋下不痛
不熱治者皆練石散傅其外内服五香連翹湯下之已潰者
治如癰法諸漏結核未破者火針針使著核結中無不差者
何謂九漏一曰狼漏二曰鼠漏三曰螻蛄漏四曰蜂漏五曰
蚍蜉漏六曰蠐螬漏七曰浮沮漏八曰瘰癧漏九曰轉脉漏
治狼漏始發於頸腫無頭有根起於缺盆之上連延耳根腫
大此得之憂恚氣上不得下其根在肝一作肺空青主之商陸
爲之佐散方

空青 蝟腦各三分 蝟肝一具干之 苦菪半分 獨活 乳婦蔗草 黃芩 鼈甲炙 斑猫 乾薑 商陸 蜀椒一攀石各一分 粳米三十粒

右十六味治下篩以酒服方寸匕日三十五日服之
治鼠漏始發於頸無頭尾如鼈鼠使人寒熱脫肉此得之食
於鼠毒不去其根在胃狸骨主之知母爲之佐散方

狸骨 鮫鯉甲 桂心 雄黃 乾薑各等分 知母 山龜殼 甘草

右八味治下篩以飲服方寸匕日三仍以蜜和内瘡中無
不差先灸作瘡後以藥傅之已作瘡不用灸
治螻蛄漏始發於頸項狀如腫此得之食瓜果實毒不去其
根在大腸荏子主之桔梗爲之佐九方

茈子 龍骨 附子 蜀椒 桂心
各半兩 百粒

乾薑 桔梗 礬石 獨活 苦蔚
各三分

右十味末之以棗二十枚合擣醋漿和丸如大豆溫漿下
五丸至十九

治蜂漏始發於頸瘰癧三四處俱相連以潰此得之飲流水
水有蜂毒不去其根在脾雄黃主之黃芩爲之佐散方

雄黃 黃芩 蜂房 鼈甲 茴香
各一兩 一具

吳茱萸 乾薑 蜀椒
各半兩 二百枚

右八味治下篩傳瘡口上日一十日止

治蚘蜉漏始發於頸初得如傷寒此得之因食中有蚘蜉毒
不去其根在腎礬石主之防風爲之佐散方

礬石 防風 桃白皮 知母 雌黃

乾地黃 獨活 青黛 斑猫 白芷

松脂 芍藥 海藻 當歸
拍一作脂 各四分 百粒 各一分

白朮 蜀椒
蜚皮 各三分

右十七味治下篩飲服一錢匕日三服

治螻蟧漏始發於頸下無頭尾如棗核堰累移在皮中使人
寒熱心煩此得之因喜怒哭泣其根在心礬石主之白朮爲
之佐散方

礬石 白朮

細辛 蜚皮
一兩

地膽 乾烏賊腦
各一分 三大豆許

右十味治下篩服方寸匕日三以酢漿服之病在上側輪
臥在下高枕臥使藥流下

治浮沮漏始發於頸如兩指使人寒熱欲臥此得之因思慮
憂懣其根在膽地膽主之甘草爲之佐散方

空青 當歸
各二分

斑猫 枸杞

地膽　雄黃　乾薑　石決明　續斷
各三分　細辛二分　大黃半分　甘草一分

右十味治下篩傅瘡日四五度（古今錄驗無雄黃有錄驗無黃）

治瘭癘漏始發於頸有根初苦痛令人寒熱此得之因新沐濕結髮汗流於頸所致其根在腎雌黃主之芍藥爲之佐丸方

雌黃　茯苓　礬石　空青
一分　附子一兩　乾薑　桂心
恒山　虎腎　烏賊骨　狸肉
乾地黃　桔梗　蜀椒　斑猫
（集驗斑猫心）　白芷　綠青　大黃各二分　人參

右十七味末之蜜丸以酒服十九如大豆日二

治轉脉漏始發於頸濯濯脉轉苦驚惕身振寒熱此得之因驚臥失枕其根在小腸斑猫主之白芷爲之佐丸方

當歸　桂心各三兩　麥門冬　白朮各一兩
升麻　鍾乳　甘草　防風
地膽　續斷　麝香　礬石各一分

右十七味末之蜜丸酒服十九如大豆日三服勿食菜慎房室百日（外臺無大黃桂心麥門冬白朮鍾乳）

治九漏方

空青　商陸　知母　狸骨
桔梗　防風　荏子　礬石
黃芩　白芷　芍藥　甘草
雌黃　白朮　礬石　地膽
斑猫　雄黃各等分

右十八味末之蜜丸以酢服如大豆三九三十日知四十日愈六十日平復一百日愼房室（一方爲散酢服一刀圭日三老小半之）

又方

蜻皮半枚 蜀椒 附子 當歸 蜂房

地榆 桂心 通草 乾漆 蔓荊子

牡丹 蒺藜子 漏蘆一作藿蘆 龍膽一作龍骨 土瓜各二分

玳瑁猫四分 苦參 蛇牀子 大黃 雄黃

簡茹 細辛 蛇蛻皮各一分 鶺鴒骨六分 鮫鯉甲

搗雞冥各四枚 蜥蜴 蜈蚣各一枚 蝮虫

右二十八味治下篩酒服五分匕以知爲度日二服

又方

斑猫七十枚 蜻皮 真朱 雄黃各一分

右四味治下篩酒服半錢匕日三

又方

末成鍊松脂塡瘡孔令滿日三四度七日差大有神驗

又方

斑猫二十七枚 雄黃 桂心 犀角各一兩

右四味治下篩酒服一錢匕病從小便出日再

又方

馬齒莧陰乾 臘月燭燼各等分

右二味爲末臘月猪脂和先以暖泔清洗瘡拭乾傳之日三

又方

乾牛屎 乾人屎

右二味擣先幕綿瘡上綿上著屎蟲聞屎香出若癢即舉

綿去之更別取屎綿著如前候蟲出盡乃止

又方

苦瓠四枚大如盞者各穿一孔如指大置湯中煮十數沸取一竹筒長一尺內一頭瓠孔中一頭注瘡孔

上冷則易之漏止

治一切漏方

蜥蜴一寸 蛴螬半寸 雄鼠屎各十四枚 元青二十枚 地膽十枚
班猫四十枚 豉四十九枚 皂莢核大棗核 牛黃大棗核 生大豆黃十枚

右八味末之蜜丸飲服如梧子二九須臾多作酸漿粥冷飲之病從小便出尿盆中看之如有蟲形狀又似膠汁此病出也隔一日一服飲粥一常小弱者隔三四日候無蟲出瘡漸差特忌油膩一切器物皆須灰洗乃作食初服藥少夜食明旦服二丸至七日甚麁可煮食蔓菁菜羹自餘脂膩醋口味果子之類並不得食人強隔日一服十人弱兩三日一服差後仍作二日將息不能將息便不須服

又方

煮鹽花以麪擁病上內鹽花麪匡中厚二寸其下以桑葉三重藉鹽候冷熱得所可忍冷則無益熱則破肉一日一度候瘻根株勢消則止若已作瘡者擣穅穀爲末粉之

又方

槲北陰白皮三十斤剉之以水一石煮取一斗去滓煎如糖又取都廁上雌雄鼠屎各十四枚燒令汁盡末內煎中溫酒一升投煎中合攪之羸人五合服之當有蟲出

治漏作瘡孔方

末露蜂房臘月猪脂和傅孔上

治漏發心胷以下者方

武都雄黃 松脂各三兩

右二味和爲塊刀子刮爲散飲服一方寸匕日二不差更合

治漏方

鍛落鐵屑　狗頰車連齒骨炙

虎糞　鹿皮合毛燒灰

右四味等分治下篩以猪膏和內瘡中須臾易之日五六度

治諸漏方

霜下瓠花暴乾末傳之

又方　擣土瓜根薄之燥則易不限時節

又方　死蛇去皮肉取骨末之合和封瘡上大痛以杏人膏摩之止

又方　死蛇和臘月猪脂合燒作灰末之內孔中

又方　燒死蜣蜋末醋和塗又死蛇灰醋和傳

又方　故布裹塩如彈丸燒令赤末酒服

又方　服白馬屎汁一升

又方　正月雄狐屎陰乾杵末水和服

又方　塩麪和燒灰傳之

又方　水研杏人服之

又方　猪脂一升酒五合煎沸頓服之

治一切冷瘻方

燒人吐出蛔蟲爲灰先以甘草湯洗瘡後著灰無不差者愼口味

治鼠漏瘡差復發及不愈出膿血不止方

以不中水猪脂咬咀生地黃內脂中令脂與地黃足相淹和煎六七沸桑灰汁洗瘡去惡汁以地黃膏傳瘡上日一易

治鼠漏方

得蛇虺所吞鼠燒末服方寸匕日再不過三服此大驗自難遇耳并傳瘡中

又方

死鼠（一枚中形者）亂髮如雞子大一枚

右二味以臘月猪脂取令淹鼠髮煎之令鼠髮消盡膏成分作三分一分稍稍塗瘡中出良秘方

治鼠瘻腫核痛未成膿方

以柏葉傳著腫上熬鹽著葉上熨之令熱氣下即消

治風漏及鼠漏方

赤小豆　白斂　黃耆　牡蠣　各等分

右四味治下篩酒服方寸匕日三

治螻蛄瘻方

槲葉灰先以泔清煮槲葉取汁洗拭乾內灰瘡中

治蜂瘻初生時狀如桃而癢搔之則引大如雞子如覆手者方

熬鹽熨之三宿四日不差至百日成瘻其狀大如四五寸石廣三寸中生蜂作孔乃有數百以石硫黃隨多少燃燭燒令汁出著瘡孔中須臾間見蜂數十惟蜂盡差

治蜂瘻方

鵄頭灰傅之

又方　人屎蛆蛻灰臘月猪膏和傅之

又方　蜂窠灰臘月猪膏和傅孔中

治蟻漏孔容針亦有三四孔者

蝟皮肝心灰末酒服一錢匕

又方

死蛇腹中鼠臘月猪脂煎使焦去滓傅之

又方

取大鯇鮓燒耕垈土令赤以苦酒浸垈土時合壁土
故熱以鯇鮓着壁上展轉令熱以傅瘡上
又方　鯪鯉甲二七枚燒末猪膏和傅瘡上
又方　半夏一枚擣末以鴨脂和傅瘡上
瘰癧瘭橫闊作頭狀若杏人形亦作瘰癧方
用雄雞屎灰臘月猪脂和封之
治蜣螂瘭方
牛屎灰和臘月猪脂傅之
又方　蜣螂丸末傅即蜣螂所食屎也
又方　乾牛屎末傅瘭即撥却更厚封差乃止
又方　熱牛屎塗之數數易應有蜣螂出
治蚯蚓瘭方
蚯蚓屎　雞屎

右二味末之用社猪下頷髓和傅之
治蠷瘭五六孔皆相通者方
擣茅根汁著孔中
治蝦蟆瘭方
五月五日蛇頭及野猪脂同水衣封之佳
治蛇瘭方
虵腹中蛙灰封之
治蛇瘭方
虵蛻皮灰臘月猪脂和封之
治顛當瘭方
擣土瓜根傅至差慎口味
治雀瘭方
取母猪屎灰和臘月猪膏傅蟲出如雀形

治膿瘻方

桃花末和猪脂封之佳

治石瘻兩頭出者其狀堅實令人寒熱方

以大鈹針破之鼠粘葉二分末和雞子白一枚封之

又方　擣槐子和井花水封之

炙漏方

葶藶子二合　豉一升

右二味和擣令極熟作餅如大錢厚三分許取一枚當瘡孔上作大艾炷如小指大灸餅上三炷一易三餅九炷隔三日復一灸之外臺治瘻古今録驗云不可灸頭瘡葶藶氣入腦殺人

又方

擣生商陸根捻作餅子如錢大厚三分安漏上以艾灸上餅干易之灸三四升艾差外臺灸瘻歷

又方

七月七日日未出時取麻花五月五日取艾等分合擣作炷用灸瘡上百壯外臺灸瘻

寒熱腎滿頸痛四肢不舉腋下腫上氣腎中有音喉中鳴天池主之

寒熱酸疼痛四肢不舉腋下腫馬刀瘻善自齧舌頰天牖中腫寒熱腎脇腰痺痺不仁陽輔主之

腎中滿腋下腫馬刀瘻善自齧舌頰天牖中腫寒熱腎脇腰痺痺不仁陽輔主之

外廉痛臨泣主之

寒熱頸頷腫後谿主之

寒熱頸掖下腫申脉主之

寒熱頸腫丘墟主之

寒熱瘰癧癰大迎主之

腋下腫馬刀肩腫吻傷太衝主之

九漏灸肩井二百壯

漏灸鳩尾骨下宛宛中七十壯

諸漏灸瘻周四畔差

諸惡漏中冷息肉灸足內踝上各三壯二年六壯

治鼠漏及瘰癧五白膏方

白馬　白牛　白羊　白猪　白雞等屎各一升

漏蘆二斤

右六味各於石上燒作灰研絹篩之以猪膏一升三合煎藥成去滓痂以鹽湯洗新帛拭乾然後傅膏若無痂猶須湯洗日再若著膏當以帛裹上勿令中風冷也神驗

治寒熱瘰癧及鼠瘻曾青散方

曾青　荏子　防風　栝樓根　狸骨　甘草　斑猫　元青按五　礬石一作礬石　附子各半兩　當歸　連翹　土瓜根　芎藭　露蜂房各二兩　細辛　乾薑各二兩　栝樓根　芎藭　龍膽　黃連　苦參　恒山各一兩

右十七味治下篩以酒服一方寸匕日再服

治寒熱瘰癧散方

右八味治下篩酒服五分匕日三服千金翼外臺有狸骨一方有當歸無恒山千金救又千金翼一方

治身體有熱氣瘰癧及常有細瘡并口中生瘡薔薇丸方

薔薇根三兩　石龍芮　黃耆　鼠李根皮　芍藥　苦參　白斂

防風一作防已　龍膽　括樓根各一兩　梔子人卅枚
右十二味末之蜜丸飲服如梧子大十五丸日再服漸加
黃蘗一兩

治瘰癧方

白殭蠶治下篩水服五分匕日三服十日差

又方　狸頭一枚炙擣篩飲服方寸匕日二

又方

故鞋內氈替燒末五匕和酒一升旦向日服之強行
須臾吐鼠出三朝服外臺同

又方　狸頭蹄骨等炙黃擣篩爲散飲服一錢匕日二

又方　猫兩眼陰乾燒灰并花水服方寸匕日再

又方　乾猫舌末傅瘡上

又方　狼屎灰傅之

又方　五月五日取一切種種雜草煮取汁洗之

又方　狐頭狸頭灰傅上

又方　猫腦　莽草

右二味等分爲末著孔中但有肉結疑似作瘡及癰癤者方
灸一切瘰癧在項上及髑處但取熱而已七壯一易蒜日日
以獨頭蒜截兩頭留心大作艾炷稱蒜大小帖瘡子
上灸之勿令上破肉但取熱而已七壯一易蒜日日

灸之取消止

一切瘰癧灸兩膀裏患癧處宛宛中日一壯七日止神驗

又灸五里人迎各三十壯

又灸患人背兩邊腋下後文上隨年壯

又灸耳後髮際直脉七壯

論曰卒得腸癰而不曉其病候愚醫治之錯則殺人腸癰之爲病小腹重而痛抑之則痛小便數似淋時時汗出復惡寒其身皮皆甲錯腹皮急如腫狀其脉數者小有膿也（洪氏云數者膿也）其脉遲緊者未有膿也甚者腹脹大轉側聞水聲或遶臍生瘡或膿從臍中出或大便出膿血

問曰官羽林婦病醫脉之何以知婦人腸中有膿爲下之即愈師曰寸口脉滑而數滑則爲實數則爲熱滑則爲榮數則爲衛衛數下降榮滑上外榮衛相干血爲濁敗少腹否堅小便或澀或復汗出或復惡寒膿爲已成設脉遲緊即爲瘀血血

下則愈

治腸癰大黃牡丹湯方

大黃四兩　牡丹三兩　桃人五十枚　瓜子半升　芒消二兩

右五味㕮咀以水五升煮取一升頓服之當下膿血（刪繁方用芒消半合瓜子五合芒消子用石三合去腸癰之病少腹痞堅或編在膀胱左右其色或白黑大如掌熱小便欲調時白汗出其脉遲緊者未成膿可下之當有血脉數膿成不復可下肘後名瓜子湯）

治腸癰湯方

牡丹　甘草　敗醬　生薑　茯苓各二兩

薏苡人　桔梗　麥門冬各三兩　丹參　芍藥各四兩

生地黃五兩

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升分三服日三

又方　薏苡人一升　牡丹皮　桃人各三兩　瓜瓣人二升

右四味㕮咀以水六升煮取二升分再服（姚氏不用桃人用李人崔氏有芒消二兩去腹中疾痛煩毒不安或服滿不思飲食小便涩此病多是腸癰人多不識婦人產後虛熱者多成斯病縱非癰疽疑是便服此藥無他損也）

又方　雄雞頂上毛并屎燒作末空心酒服之

又方　截取擔頭尖少許燒作灰水和服當作孔出膿血愈

凡腸癰其狀兩耳輪文理甲錯初患腹中苦痛或繞臍有瘡如粟皮熱便膿血出似赤白下不治必死方

馬蹄灰雞子白和塗即拔氣不過肘

又方　瓜子三升擣末以水三升煮取一升五合分三服

又方　死人塚上土作泥塗之

治內癰未作頭者方

服伏雞屎即差

又方　馬牙灰和雞子塗之乾則易

惡汁於內引熱溫壯結堅牽衛掣痛大渴引飲乳急痛手不得近成妬乳非癰也急灸兩手各魚際各二七壯斷癰狀也不復腸癰屈兩肘正灸肘頭銳骨各百壯則下膿血即差

論曰產後宜勤濟乳不宜令汁畜積畜積不去便結不復出惡手近乳汁亦自出便可手助迮捋之則乳汁大出皆如膿狀內服連翹湯外以小豆薄塗之便差

婦人女子乳頭生小淺熱瘡瘙搔之黃汁出浸漫為長百種苟抄乳是也宜以赤龍皮湯及天麻湯洗之傅二物飛烏散佳若始作者可傅黃芩漏蘆散及黃連胡粉散並佳治不差者動經年月名為妬乳婦人飲兒者乳皆欲斷世謂及飛烏散佳若始作者可傅黃芩漏蘆散及黃連胡粉散並佳

赤龍皮湯方

槲皮切三升以水一斗煮取五升夏冷用之冬溫用之分以洗乳亦洗諸深敗爛久瘡洗竟傅膏散

天麻湯方

天麻草切五升以水一斗半煮取一斗隨寒熱分洗乳以殺瘡也此草葉如麻冬生夏著花赤如鼠尾花也亦以洗浸漫黃爛熱瘡瘙痒濕陰蝕小兒頭瘡洗竟傅膏散

飛烏膏方

傾粉（是燒朱砂作水銀粉黑烟也一作湘粉）上　礬石（酪二兩）

右二味爲末以甲煎和如脂以傅乳瘡日三傅作散若不須和汁但著可用散亦傅諸熱瘡及黃爛瘡浸淫汁養吏夫陰蝕瘡濕瘡小兒頭瘡月蝕口邊肥瘡癌瘡等並傅之

黃連胡粉散方

黃連（二兩）　胡粉（十分）　水銀（一兩）

右三味黃連爲末以二物相和熬皮果熟搜之自和合也縱不得成一家且得水銀細散入粉中也以傅乳瘡諸濕瘡黃爛肥瘡等若乾著甲煎爲膏

治妒乳乳生瘡方

蜂房　猪甲中土　車轍中土（等分）

右三味末苦酒和傅之

婦人乳生瘡頭汁出疼痛欲死不可忍鹿角散方

鹿角（三分）　甘草（一分）

右二味治下篩和以雞子黃於銅器中置於温處炙上傅之日再即愈神驗不傳

治妒乳方

取葵莖灰擣篩飲服方寸匕日三即愈（集驗方直擣爲散不爲灰）

又方　燒白死蛇灰和猪膏塗大良

妒乳以蒲橫度口以度從乳上行炙度頭二七壯

論曰産後不自飲兒并失兒無兒飲乳乳壅喜結癰不飲兒令乳上腫者以雞子白和小豆散傅乳房令消結也若飲兒不泄者數捻去之亦可令大孩子含水使口中冷爲啣取滯乳汁吐去之不含水嗽去熱喜令乳頭作瘡乳孔塞也

凡女人多患乳癰年四十已下治之多差年五十已上慎不

治治之多死不治自得終天年

治妬乳乳癰連翹湯方

連翹　芒消各三兩　防巳　杏人　甘草各三兩

右十一味㕮咀以水九升煮取二升五合分三服

治乳癰方

麥門冬去心　芍藥　黃芩　黃耆　粉糖入兩　大棗五枚　人參　甘草各三兩　防風　桑寄生

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升去滓內糖一沸分四服乳癰先服前件湯五日後服此丸即愈方

天門冬五兩　澤蘭五分　大黃十分　升麻六分　羌活　防風　人參　黃耆　乾地黃　白芷　桑寄生　通草各三分　天雄　芎藭　當歸　五味子各一兩

右十九味末之蜜丸酒服二十丸日二加至四十九

治乳癰始作方廣濟方云治乳癰大堅硬赤紫色手不得近乳癰不可忍者

大黃　棟實　芍藥　馬蹄

右四味等分治下篩飲服方寸匕取汁出差服廣濟方云酒服方寸匕覆取汗當睡著覺後腫散不痛細宿乃消

排膿散治乳癰方

薤蓉　鐵精　桂心　細辛　芍藥　防巳一作防風　黃芩　當歸各三分　甘草五分　人參　乾薑　芎藭

右十二味治下篩酒服方寸匕日三夜一服藥十日膿血

出多勿怪之其惡肉除出也

又方

生地黃汁 芒消各一合 豉外一升

右三味同擣薄之熱即易之取差止一切癰腫皆用之方單用地黃薄

治妬乳乳癰腫方

取研米槌二枚炙令熱以絮及故帛摐乳上以槌更互熨之差止已用立驗

治乳癰堅方

以水罐中盛醋泊清燒石令熱內中沸止更燒如前少熱內乳漬之冷更燒石內漬不過三燒石即愈

又方

黃芩 白斂 芍藥各等分

右三味爲末以漿水飲服半錢匕日三若左乳汁結者即捋去右乳汁若右乳汁結者可捋去左乳汁小品妬乳法

治乳癰方

大黃 鼠屎新者各 黃連二分

右三味擣黃連大黃末合鼠屎共治以黍米粥清和傅乳四邊痛止即愈無黍米粟米粳米亦得

又方 取葱白擣傅之并絞汁一升頓服即愈

治乳癰二三百日衆療不差但堅紫色青柳根熨方

柳根削取上皮擣令熟熬令溫盛著練囊中熨乳上乾則易之一宿即愈

治乳癰方

大黃 紫菀草各二分 生薑二分 伏龍肝十二分

右四味擣末以酒和塗癰即止有效

又方

鹿角下篩以猪脂上清汁服方寸匕不過再服亦可

以醋漿水服

婦人乳腫痛除熱蒺藜丸方

蒺藜子　大黃酸一　敗醬一分　桂心

人參　附子　薏苡人　黃連

黃耆　雞骨　當歸　梫實

芍藥　通草各三分

右十四味末之蜜丸未食以飲服如梧子三丸不知益至五丸日三無所忌一方無大黃敗醬黃連通草為散酒服方寸匕

五痔第三論一首灸法二首　方二十六首

論曰夫五痔者一曰牡痔二曰牝痔三曰脈痔四曰腸痔五曰血痔牡痔生瘡肛邊有瘡癢痛腸痔者肛邊核痛發寒熱血痔者大便清血隨大便污衣又五痔有氣痔寒溫勞濕即發蛇蛻皮主之牡痔生肉如鼠乳在孔中頗出見外妨於更衣齲甲主之牡痔（藥驗作漏痔）從孔中起外腫五六日自潰出膿血猶如鼠乳時時潰膿血出牝痔者肛腫痛皮主之腸痔更衣出清血蜂房主之五藥皆下篩等分隨其病倍其主藥為三分旦以井花水服半方寸匕病甚者日暮服之亦可四五服禁寒冷食豬肉生魚菜房室惟得食乾白肉病差之後百日乃通房內又用藥導下部有瘡內藥瘡中無瘡內孔中又用野葛燒末刀圭內藥中服藥五日知二十日若三十日

愈痔痛通忌蕓菜

治五痔衆醫所不能愈者方

秦艽　白芷
厚朴　紫參
亂髮　鼠婦各一兩　雷丸　慕本酪二兩
石南　蠐螬半兩　貫衆三兩　豬後懸蹄十枚

右十三味合擣下篩以羊髓脂煎和服如梧子空腹飲下十五丸日二若劇者夜一服四日肛邊瘡止八日膿血盡鼠乳悉落百日六十日終身不復發又服益善忌魚猪肉等

槐子　乾漆
秦艽　白芷
黃耆　白斂
雷丸　丁香
附子酪二兩　吳茱萸根白皮酪四兩
桂心　黃芩
牡蠣　龍骨
木香　蒺藜

右十六味末之蜜丸飲服二十丸如梧子日三千金翼無白斂深師無黃耆云治苦暴有乾燥腫痛者有崩血無數者有鼠乳附核者有腸中煩癢者三五年皆殺人主忌飲酒及作勞犯之即發

小槐實丸主五痔十年者方

槐子三斤　白糖二斤　攀石　流黃酪一兩
大黃　乾漆　龍骨酪十兩

右七味擣篩四味甚三種石及糖並細切內銅器中一石米下蒸之以綿絞取汁以和藥令作丸併手丸之大如梧子陰乾酒服二十九日三稍增至三十九

槐子酒主五痔十年不差者方

槐東南枝細剉一石　槐子二斗

槐東南根碎三

右三味以大釜中安十六斛水煮取五斛澄取清更煎取

一石六斗炊兩斛黍米上麴三十斤釀之攪令調封泥七日酒熟取清飲適性常令小小醉合時更煮滓取汁淘米洗器不得用水須知此事忌生水故也

治痔猬皮丸方

猬皮一具　攀石　當歸　連翹
乾薑　附子　續斷　黃耆各三兩
乾地黃五兩　槐子三兩

右十味末之蜜丸飲服如梧子大十五丸亦再加至四十丸亦治漏集驗方無攀石地黃

治痔方

取槐耳赤雞一斤爲末飲服方寸匕日三即是槐樓也

又方

以蒲黃水服方寸匕日三良妙外臺云治腸痔每大便常有血者

又方　取桑耳作羹腹飽食之三日食之

猬皮丸主崩中及痔方

猬皮　人參　茯苓　白芷
槐耳　乾地黃　禹餘粮　續斷各二兩
蒲黃　黃耆　當歸　艾葉
橘皮　白斂　甘草各二兩　白馬蹄酒浸一宿
熬令黃　牛角鰓兩各四　鰻鱺魚頭二十枚　猪懸蹄甲二十二枚熬

右十九味末之蜜丸酒服如梧子二十九日再稍加

治痔下血及新產漏下方

好礬石一兩　附子一兩

右二味末之白蜜丸酒服如梧子日三稍加不過數

日便斷百日服之終身不發崔氏方有乾薑一兩

治五痔十年不差方

塗熊膽取差止神良一切方皆不及此

又方

七月七日多採槐子熟擣取汁內銅器中重綿密蓋著宅中高門上暴之二十日已上煎成如鼠屎大內穀道中日三亦主瘻百種瘡

又方

取生槐白皮十兩熟擣九如彈丸綿裹內下部中此病常食葅竹葉及煮羹粥大佳

又方

取三具鯉魚腸以火炙令香以綿裹之內穀道中一食久蟲當出食魚腸數數易之盡三枚差一方炙腸令香坐上蟲出經用有效

又方

治五痔及脫肛方

槐白皮二兩　薰草　辛夷　甘草

白芷各半兩　野葛六銖　巴豆七枚　漆子十枚

桃人十枚　猪脂半斤

右十味㕮咀煎三上三下去滓以綿沾膏塞孔中日四五過蟲死差止瘡痛大佳

治外痔方

真朱　雄黃

猪膏一斤　雌黃各一兩　竹茹三兩

右五味末之內猪膏中和調又和亂髮切半雞子大東向

虎頭　犀角

右二味各末之如雞子大和不中水猪脂大如雞子塗瘡上取差

煎三上三下駁焦出塩湯洗拭乾傅之亦治惡瘡瘑瘡

治五痔方

取槐根煮洗之

又方　用桃根煮洗

又方

猬皮大方三如指　熏黃棟大　熟艾大雞子

右三味穿地作孔調和取便熏之口中熏黃烟氣出爲佳火氣消盡即停停三日將息更熏之凡三度永差勿犯風冷羹臛將補愼猪雞等

治痔下部出膿血有蟲傍生孔竅方

槐白皮一擔剉內釜中煮令味極出置大盆中適寒温坐其中如浴狀蟲悉出冷又易之不過二三即差

治穀道瘡痛繞緣腫起裏許欲生肉突出方

槐白皮三升　甘草三兩　大豆三升以水七升急火煮取四升

右三味以豆汁煮取二升浸故帛薄之冷即易之日三五度

治穀道瘡痛痔瘡槐皮膏方

槐皮各五兩外臺作壓敲　楝實各五兩外臺作壓敲　甘草炙繁用蜂房

白芷各一兩　桃人六十枚　當歸三兩

赤小豆二合

右七味㕮咀以成煎猪膏一斤微火煎白芷黃藥成摩瘡上日再并道下部

傷發寫精血肛門痛蜂房膏　所損腎藏病方無當歸治腎勞虛或酒醉當風所爲肛門腫生瘡因酒勞

治穀道痛方

菟絲子熬黃黑和雞子黃以傅之日二

又方　取杏人熬令黃擣作脂以傅之

治大便孔卒痛如鳥啄方

以大小豆各一斗和擣內兩袋中蒸之令熱更互坐之差

久冷五痔便血灸脊中百壯

五痔便血失屎灸回氣百壯穴在脊窮骨上

疥癬第四論二首灸法四首方六十首

論曰凡瘡疥小秦艽散中加烏蛇肺一尺亦大效（千金翼云黃耆酒中加烏蛇肺一尺烏頭加之亦有大效小小瘡瘥十六味小秦艽散亦相當黃者細出第七卷中）

凡諸疥瘙皆用水銀豬脂研令極細塗之

治凡有瘡疥腰膀手足皆生瘢疥者方

薔薇根 黃連 芍藥 雀李根皮 各三兩

黃蘗 各三兩 石龍芮 苦參 黃耆

黃芩 各二兩 大黃 當歸 續斷 各一分

栝樓根四兩

右十三味末之蜜丸如梧子以薔薇飲服二十丸日三加至三十丸瘡疥差乃止乾疥白癬勿服（千金翼云所長瘥疽皆須服之）

治寒熱瘡及風疥

千年韭根 好礬石 雄黃 藜蘆 瓜蒂

胡粉 各一分 水銀 三分

右七味以枊木研水銀使盡用猪脂一升煮藜蘆韭根瓜蒂三沸去滓內諸藥和調令相得即成以傅之神良赦瞗

治癬瘡方

蘭茹 狼牙

當歸 羊蹄根

青葙 地榆

藜蘆 蒴藋 各二兩 蛇牀子 白斂 各六分

漏蘆二分

右十一味擣以苦酒漬一宿明旦以成煎豬膏四升煎之三上三下膏成絞去滓內後藥如左

雄黃　雌黃　硫黃　礬石　胡粉　松脂各二兩　水銀二兩

右七味細研看水銀散盡即傾前件膏中以十隻筋攪數百徧止用瓷器貯之密舉勿令泄氣煎膏法必微火急即不中用一切惡瘡疥癬疽漏痼瘕悉傅之不可近目及陰先研雄黃等令細候膏小冷即和攪傅之

治疥疽諸瘡方

水銀　胡粉各六分　黃連　黃蘗各八分　薑黃十分　礬石　蛇牀子　附子　苦參各三分

右九味水銀胡粉別研如泥餘為末以成煎豬膏合和研令調以傅之千金翼兎薑黃

治久疥癬方

丹砂　雄黃　雌黃劉消子無　亂髮

松脂　白蜜各一兩　豬脂一斤　蘭茹三兩　巴豆十四枚

右九味先煎髮消盡內松脂蜜三上三下去滓內諸末中更一沸止以傅之蠍千金翼用鼈蜜

又方

水銀　礬石一作礬石　雌黃劉消子無　亂髮

右四味為末以豬脂七合和攪不見水銀為熟傅之一方加藜蘆一兩又云蘭茹

治諸瘡疥癬久不差者方

水銀斤一　臘月豬脂斤五

右二味以鐵器中盪鼈用馬通火七日七夜勿住火出之

停冷取膏去水銀不妨別用以膏傅一切瘡無不應手立差 千金翼又用水銀粉和猪脂塗之

又方

取特牛尿 五升 羊蹄根 五升

右二味漬一宿日暴乾復內取尿盡止作末傅諸瘡等釷翼云和猪脂用更精

又方 拔取生烏頭十枚切煮汁洗之差

論曰凡諸瘡癬初生時或始痛癢即以種種單方救之或嚼塗之又以蒜墨和傅之千金翼又以薑黃傅之又以穀汁傅之又以鯉魚鮓糝傅之又以牛李子汁傅之若以此救不差乃以前諸大方治之

治細癬方

蛇牀子 白塩一作堊 羊蹄根 各一升 赤葛根 苦參 昌蒲 各半斤 黃連 莽草 各三兩

右八味咬咀以水七升煮取三升適寒温以洗身如炊一石米頃爲佳清澄後用當微温之滿三日止

又方

羊蹄根於磨石上以苦酒磨之以傅瘡上當先刮瘡以火炙乾後傅四五過千金翼云擣羊蹄根著甕器中以塗白蜜和之刮瘡令傷先

又方

羊蹄根五升以桑柴灰汁煮四五沸洗之凡方中用羊蹄根皆以日未出採之佳

以蜜和者傅之如炊一石米久拭去更以塗之若刮瘡處不傷即不差

又方

昌蒲末五斤以酒三升漬釜中蒸之使味出先絶酒一日一服一升若半升

又方
用乾荆子燒中央承兩頭取汁塗之先刮上令傷後傅之
治癬方
擣刺薊汁服之
又方 服地黃汁佳
又方 燒蛇蛻一具酒服
又方 服驢尿良
又方 擣莧菪根蜜和傅之 千金翼無根字
又方
熱揚煎餅不限多少日一遍薄之良亦治浸淫瘡
又方 醋煎艾塗之
又方 擣羊蹄根和乳塗之

又方
淨洗瘡取溺辦雀屎和傅之差止 千金翼云取溺辦尿和塗之
又方 水銀蕪荑和酥傅之
又方 日中午擣桃葉汁傅之
治濕癬肥瘡方
用大麻油傅之五日差
治癬久不差者方
取自死蛇燒作灰猪脂和塗即差
灸癬法
日中時灸病處影上三姓灸之呪曰癬中蟲毛戎戎
若欲治待日中
又法
八月八日日出時令病人正當東向戶長跪平舉兩

手持户兩邊取肩頭小垂際骨解宛宛中灸之兩火俱下各三壯若七壯十日愈

治小兒癖方

以蛇牀實擣末和猪脂以傳之

治瘧蠱方

以水銀和胡粉傳之

治身體搔癢狀如癬狀方

楮子枝三　猪胆具一　鹽升一　礬石兩一

右四味以苦酒一升合擣令熟以拭身體日三

治癉易方

以三年醋磨烏賊骨先布摩肉赤傳之

又方

醋磨硫黃塗之寂上集驗又磨附子硫黃上使熟將卧以布拭病上乃以藥傳之

又方

取途中先死蜣螂擣爛塗之當指令熱封之一宿差

又方

白斂　薰陸香

右二味揩上作末水服差

又方

硫黃　水銀　礬石　蛇蛻一具

右四味各等分擣篩以清漆合和之薄塗白處欲塗時以巴豆半截拭白處皮微破然後傳之不過三兩度

又方

硫黃　水銀　礬石　竈墨

右四味各等分擣篩內坩子中以葱葉中涕和研之臨卧時傳病上

九江散主白殿風及二百六十種大風方

當歸七分　石南六分　躑躅　秦艽

菊花　乾薑　防風　雄黃

麝香　丹砂　斑猫四枚　蜀椒

鬼箭羽　連翹　石長生　知母八分

蜈蚣三枚　蚕蟲　地膽十枚　附子四兩

鬼臼十一分　人參　石斛　天雄

王不留行　烏頭　獨活　防巳

莽草各十二分　水蛭百枚

右三十味諸蟲皆去足翅熬炙令熟爲散以酒服方寸匕日再其病入髮令髮白服之百日愈髮還黑

又方

天雄　白斂　黃芩酪三兩　乾薑四兩

附子一兩　商陸　躑躅酪一升

右七味治下篩酒服五分匕日三

治白殿方

礬石　硫黃

右二味各等分爲末酢和傅之

又方　平旦以手掉取韭頭露塗之極效

又方

以酒服生胡麻油一合日三稍稍加至五合慎生肉猪雞魚蒜等百日服五斗差

又方　羅摩草煮以拭之亦揩令傷擿白汁塗之

又方　石灰松脂酒主之方在卷末

又方　以蛇蛻皮熬摩之數百過弃置草中

又方　樹空中水洗桂末唾和塗之日三

又方

以水銀拭之令熱即消差數數拭之差乃止

白殿風灸左右手中指節去延外宛中三壯未差報之

凡身諸處白駁漸漸長似癬但無瘡可治之方

鰻鱺魚取脂塗之先指病上使痛然後塗之

治皮中紫赤疵痣去黶黯方

乾漆　雌黃

巴豆十枚五　炭皮斤

右六味治下篩以雞子白和塗故帛帖病上日二易

治赤疵方

用墨大蒜鮑魚合塗之

治贅疵痣方

雄黃　硫黃

真朱　礬石

巴豆　藺茹

右七味治下篩以真漆合和如泥以塗黑病上須成瘡及

去面黑皮中紫不耐漆人不得用以雞子白和之

去疣目方

藜蘆　酪一

七月七日以大豆一合拭疣目上三遍病疣人自種豆

於南屋東頭第二窗中豆生四葉以湯沃殺即差

又方　石硫黃指六七遍

又方　松柏脂合和塗之一宿失矣

又方

以猪脂瘡處指之令少許血出即差神驗不可加

又方

每月十五日月正中時望月以禿帚掃三七遍差

苦酒漬石灰六七日滴取汁點疣上小作疣即落

又方　杏人燒令黑研膏塗上

又方　取牛口中涎數塗自落

疣目着艾炷疣目上灸之三壯即除

惡疾大風第五論一首方十首

論曰惡疾大風有多種不同初得雖偏體無異而眉鬚已落有偏體已壞而眉鬚儼然有諸處不異好人而四肢腹背有頑處重者手足十指已有墮落有患大寒而重衣不暖有尋常患熱不能暫涼有身體枯槁者有津汁常不止者有身體乾癢徹骨搔之白皮如麩手下作瘡者外臺作卒作瘡有瘡痍荼毒重疊而生晝夜苦痛不已者有直置頑鈍不知痛癢者其色亦有多種有青黃赤白黑光明枯暗此候雖種種狀皃不同而難療易療皆在前人不由醫者何則此病一著無問賢愚皆難與語何則口順心違不受醫教直希望藥力不能求已故難療易療屬在前人不關醫藥予嘗手療六百餘人差者十分有一莫不一一親自撫養所以深細諳委之且共語看與難共語不受入即不須與療終有觸損病既不差乃勞而無功也又神仙傳有數十人皆因惡疾而致仙道何者皆由割棄塵累懷潁陽之風所以非止差病乃因禍而取福也故余所觀病者其中頗有士大夫乃至有異種名人及遇斯患皆愛戀妻好嗜著心髓不能割捨直望藥力未肯近求諸身若能絕其嗜慾斷其所好非但愈疾因茲亦可自致神仙余嘗問諸病人皆云自作不仁之行久久並為極猥之業於中仍欲更作云為雖有悔言而無悔心但能自新受師教命食進藥餌何有不除余以自觀年中將一病士入山教服松脂欲至百日鬚眉皆生由此觀之推須求之於已不可一仰醫藥

者也然有人數年患身體頑痺羞見妻子不告之令知其後病成狀臭分明乃云犯藥卒患此皆自誤然斯疾雖大療之於微亦可即差此疾一得遠者不過十年皆死近者五六歲而亡然病者自謂百年不死深可悲悼一遇斯疾即須斷鹽常進松脂一切公私物務釋然皆棄猶如脫屣凡百口味特須斷除漸漸斷穀不交俗事絶乎慶弔幽隱巖谷周年乃差差後終身愼房犯之還發茲疾有吉凶二義得之脩善即吉若還同俗類必是凶矣今略述其由致以示後之學者可覽而思焉

薗豆治惡疾方

細粒烏豆擇取摩之皮不落者取三月四月天雄烏頭苗及根淨去土勿洗擣絞取汁漬豆一宿漉出暴乾如此七反始堪服一服三枚漸加至六七枚日一

禁房室猪魚雞蒜畢身毛髮即生犯藥不差

岐伯神聖散治萬病癰疽癩疹癬風瘘骨肉疽敗百節痛眉毛髮落身體淫淫躍躍痛獲目痛皆爛耳聾齒齲痔瘻方

天雄	附子	茵芋 外臺作菌草	躑躅
細辛	烏頭	石南	乾薑 各一兩
蜀椒	防風	昌蒲 各二兩	白朮
獨活 各三兩			

右十三味治下篩酒服方寸匕日三勿增之

治惡疾狼毒散方

狼毒	秦艽	等分

右二味治下篩酒服方寸匕日三五十日愈

又方

煉松脂投冷水中二十徧蜜丸服二兩飢便服之日

三鼻柱斷離者三百日服之差斷鹽及雜食房室又天門
冬酒服百日愈
石灰酒主生毛髮眉鬚去大風方
石灰一石 拌水和濕蒸令氣足 松脂成煉十斤未之
上麴二斗 黍米一石
右四味先於大鎗內炒石灰以木札著灰中火出為度以
枸杞根剉五斗水一石五斗煮取九斗去滓以淋石灰三
徧澄清以石灰汁和清麴用汁多少一如釀酒法訖封四
七日開服恒令酒氣相及為度百無所忌不得觸風其米
消及飯糟一事已上不得使人畜犬鼠食之皆令深埋却
此酒九月作二月止恐熱隔上熱者服後進三五口冷飯
壓之婦人不能食飲黃瘦積年及瘧風不過一石即差其
於脂末初酘釀酒攤飯時均散著飯上待飯冷乃投之此
酒飯宜冷不爾即醋宜知之
治大風眉鬚落赤白癩病八風十二痺筋急肢節緩弱飛尸
遁注水腫癰疽瘡瘻惡瘡腳攣手折眼闇洞洩痰飲宿癖寒
冷方
商陸根二十馬耳切五斤 麴二十五斤
右二味合於甕中水一斛漬之炊黍米一石釀之如家法
使麴米相淹三酘畢密封三七日開看麴浮酒熟澄清溫
服三升輕者二升藥發吐下為佳宜食弱煮飯牛羊鹿肉
羹禁生冷醋及豬雞魚犬等
治風身體如蟲行方
鹽一斗水一石煎減半澄清溫洗浴三四遍差療切風
又方 以淳灰汁洗面不過一日
又方

以大豆漬飯漿水日二温洗面洗頭髮不淨加少麪
勿以水灌之不過十度洗

又方

成煉雄黃松脂等分蜜和飲服十丸如梧桐子大日
三百日愈愼酒肉臊臭鼓等

金澤文庫

朝奉郎守太常少卿充秘閣校理判登聞檢院上護軍賜緋魚袋臣林億等校正

解食毒第一
解百藥毒第二
解五石毒第三
蠱毒第四
胡臭漏腋第五
脫肛第六
癭瘤第七
癩病第八 論一首 方三十九首 除疥癬 妒精瘡附
解食毒第一 論一首 方三十九首

金澤文庫

論曰凡人跋涉山川不諳水土人畜飲啖誤中於毒素不知方多遭其蠱豈非枉橫也然而大聖又設其法以救養之正

爲貪生嗜樂忽而不學一朝逢遇便自甘心竟不識其所以
今述神農黃帝解毒方法好事者可少留意焉

治諸食中毒方

飲黃龍湯及犀角汁無不治也飲馬尿亦良

治食百物中毒方

掘厠傍地深一尺以水滿坑中取厠籌七枚燒令煙以投
坑中乃取水汁飲四五升即愈急者不可得但掘地著水即
取飲之

又方　含貝子一枚須臾吐食物差

又方　服生韭汁數升

治飲食中毒煩懣方

苦參三兩㕮咀以酒二升半煮取一升頓服之取吐愈

治食六畜肉中毒方

各取六畜乾屎末水服之佳若是自死六畜肉毒水服薑糜
末方寸匕須臾復與佳

又方　燒小豆一升末服三方寸匕神良

治食生肉中毒方

掘地深三尺取下土三升以水五升煮土五六沸取上清飲
一升立愈

治食牛肉中毒方

狼牙灰水服方寸匕良（猪一作牙）

又方　温湯服猪脂良

又方　水煮甘草汁飲之

治食牛馬肉中毒方

飲人乳汁良

治食馬肉血洞下欲死方

豉二百粒　杏人二十枚

右二味咬咀蒸之五升米下飯熟擣之再服令盡

又方　盡粮汁飲以浴即解

治食狗肉不消心中堅或腹脹口乾大渴急發熱狂言妄語或洞下方

杏人一升合皮研以沸湯三升和絞取汁分三服狗肉皆完片出即靜良驗

治食猪肉中毒方

燒猪屎末服方寸匕犬屎亦佳

治食百獸肝中毒方

頓服猪脂一斤佳亦治陳肉毒

治生食馬肝毒殺人方

牡鼠屎二七枚兩頭尖者是以水研飲之不差更作

治食野菜馬肝肉諸脯肉毒方

取頭垢如棗核大吞之起死人

又方　燒狗屎灰水和絞取汁飲之立愈

又方　燒猪骨末之水服方寸匕日三服

治漏脯毒方　張文仲云苧室漏水沾脯爲漏脯

擣韭汁服之良大豆汁亦得

治鬱肉濕脯毒方　張文仲云肉閉在密器中經宿者爲鬱肉

燒狗屎末水服方寸匕凡生肉熟肉皆不用深藏密蓋不泄氣皆殺人又肉汁在器中密蓋氣不泄者亦殺人

治肉在黍米中毒方

麴　兩以水一升鹽兩撮煮服之良

治中射罔脯毒方

末貝子水服如豆佳不差又服食餅臛中毒亦同用之
人以雉肉作羹臛因食皆吐下治之方
服犀角末方寸匕得靜甚良
凡食鵝鴨肉成病肖滿面赤不下食者治之方
服秫米泔良
治食魚中毒方
煮橘皮汁極冷飲之立驗肘後方云治食魚
治食魚中毒面腫煩亂及食鱸魚中毒欲死者方
剉蘆根舂取汁多飲良并治蟹毒亦可取蘆葦汁飲之愈
治食魚鱠及生肉住胃膈中不化吐之不出便成癥瘕方
厚朴三兩 大黃二兩
右二味咬咀以酒二升煮取一升盡服立消人強者加大
黃用酒二升煮取二升再服之

治食魚鱠不消方
大黃三兩切 朴消二兩
右二味以酒二升煮取一升頓服之仲景方有橘皮一兩
肘後方云治食猪肉遇冷不消必成癥下之方亦無橘皮
又方
舂馬鞭草飲汁一升即消去也薑亦良肘後方云亦
宜服諸吐藥
又方
煮魚皮灰水服之無完皮壞刀裝取之一名鮫魚皮古今
録驗云治食魚鮓傷毒
又方 燒魚皮灰水服方寸匕
又方
燒魚鱗水服方寸匕食諸鮑魚中毒亦用之
治食蟹中毒方

冬瓜汁服二升亦可食冬瓜

治食諸菜中毒方

甘草　貝齒　胡粉

右三種各等分治下篩以水和服方寸匕小兒尿乳汁共服二升亦好

治食山中樹菌毒方

人屎汁服一升良

解百藥毒第二論一首方十二首　解毒二十八條

論曰甘草解百藥毒此實如湯沃雪有同神妙矣人中烏頭巴豆毒甘草入腹即定中藜蘆毒葱湯下咽便愈中野葛毒土漿飲訖即止如此之事其驗如反掌要使人皆知之然人皆不肯學誠可歎息方稱大豆汁解百藥毒余每試之大驗絶不及甘草又能加之爲甘豆湯其驗尤奇有人服玉壺丸

治嘔不能已百藥與之不止藍汁入口即定如此之事皆須知之此則成規更不須試練也解毒方中條例極多若不指出一二學者不可卒知餘方例爾

百藥毒

甘草　薺苨

藍汁及實汁根汁

石藥毒

白鴨屎　人參汁

雄黃毒

防已

礬石毒

大豆汁　白鵝膏

金銀毒

大小豆汁

服水銀數兩即出　鴨血及屎汁
雞子汁及屎白燒猪脂和服水淋雞屎汁煮葱汁
鐵粉毒
礜石
防葵毒
葵根汁
桔梗毒
白粥
甘遂毒
大豆汁
芫花毒
防已　防風　甘草
大戟毒
桂汁

葛蒲汁
野葛毒
雞子清　葛根汁　甘草汁　鴨頭熱血　猪膏
雞屎　人屎
藜蘆毒
雄黄　煮葱汁　温湯
烏頭天雄附子毒
大豆汁　遠志　防風　棗肉　飴糖
射罔毒
藍汁　大小豆汁　竹瀝　大麻子汁
六畜血　貝齒屑　蚯蚓屎　藕茎汁
半夏毒
生薑汁及煮乾薑汁

蹲鴟毒　梔子汁

莨菪毒　薺苨　甘草　犀角　蟹汁　升麻

狼毒毒　杏人　藍汁　白斂　鹽汁　木占斯

巴豆毒　煮黃連汁　大豆汁　生藿汁 肘後云小豆藿

菖蒲汁　煮寒水石汁

蜀椒毒　葵子汁　桂汁　豉汁　人尿　冷水

土漿　蒜　雞毛燒吸煙及水調服

雞子毒

淳醋

斑猫元青毒　猪膏　大豆汁　鹽湯煮猪膏　巴豆

馬刀毒　清水

杏人毒　藍子汁

野芋毒　土漿　人糞汁

諸菌毒　掘地作坑以水沃中攪之令濁澄清飲之名地漿解一切毒藥發不問草石始覺惡即服此方

生麥門冬　葱白各八兩　豉一升

右三味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

解諸毒雞腸草散方

雞腸草　蔣草各二分　藍子一合　苦參一分

右八味治下篩水服方寸匕多飲水爲佳若爲蜂蛇等衆毒蟲所螫以刀刺螫上血出著藥如小豆許於瘡中令濕沾令濕取藥內瘡中隨瘡深淺令至底止有好血出即休若服藥有毒水服方寸匕毒解痛止愈

解毒藥散方

薺苨一分　藍并花三分

右二味七月七日取藍陰干擣篩水和服方寸匕日三

又方　中毒者取秦壯鷰毛二七枚燒灰服

解一切毒方

母猪屎水和服之又水三升三合和米粉飲之

解鴆毒及一切毒藥不止煩懣方

甘草　蜜各四分　粱米粉一升

右三味以水五升煮甘草取二升去滓歇大熱內粉粉湯中攪令勻調內白蜜更煎令熟如薄粥適寒溫飲一升佳

治食莨菪悶亂如卒中風或似熱盛狂病服藥即劇方

飲甘草汁藍青汁即愈

治野葛毒以死口噤者方

取青竹大兩節柱兩脇腰內冷水注之暖即易之須臾口開開即服藥立活惟須數易水

治鉤吻毒困欲死面青口噤逆冷身痙方　肘後方六物鉤吻葉莫食若相似而所生之傍無

他草又莖有毛
喉食之殺人

薺苨八兩㕮咀以水六升煮取三升冷如人體服五合日三

又方　煮桂汁飲之

夜二凡煮薺苨惟令濃佳

治腹中有鐵方

白折炭刮取末井花水服三錢不過再服

服藥過劑悶亂者方

吞雞子黃　飲藍汁

蕺荷汁　粳米瀋

黃連　飴糖　水和葛粉

解五石毒第三　論三首　證二十八條　方三十五首

論曰人不服石庶事不佳惡瘡疥癬溫疫瘧疾年年常患寢食不安興居常惡非止已事不康生子難育所以石在身中萬事休泰要不可服五石也人年三十已上可服石藥若素肥充亦勿妄服四十已上必須服之五十已上三年可服一劑七十已上一年可服一劑

又曰人年五十已上精華消歇服石猶得其力六十已上轉惡服石難得力所以常須服石令人手足溫暖骨髓充實能消生冷舉措輕便復耐寒暑不著諸病是以大須服凡石皆熟煉用之凡石之發當必惡寒頭痛心悶發作有時狀如溫瘧但有此兆無過取冷水淋之得寒乃止一切冷食惟酒須溫其諸解法備如後說其發皆疽腫方在第二十二卷中

又曰凡服石人甚不得雜食咸味雖百品具陳終不用重食其肉諸雜既重必有相賊聚積不消遂動諸石如法持心將攝得所石藥為益善不可加余年三十八九嘗服五六兩乳

自是以來深深體悉至於將息節度頗識其性養生之士宜
留意詳焉然其乳石必須土地者慎勿服之多有殺人甚於鴆毒紫
石白石極須外內映徹光淨皎然非此亦不可服寒石五石
更生散方舊說此藥方上古名賢無此漢末有何侯者行用
自皇甫士安已降有進餌者無不發背解體而取顛覆余自
有識性已來親見朝野仕人遭者不一所以寧食野葛不服
五石明其失大猛毒不可不慎也有識者遇此方即須焚之
勿久留也今但録主對以防先服者其方以從煙滅不復須
存爲含生害也

鍾乳對朮又對栝樓其治主肺上通頭腎朮動鍾乳腎塞短
氣鍾乳雖不對海蛤海蛤能動鍾乳
鍾乳動則目疼短氣有時朮動鍾乳直頭痛腎塞然鍾乳與
朮爲患不過此也雖所患不同其治一矣發動之始要有所由
始覺體中有異與上患相應便速服此葱白豉湯方

甘草　人參各三兩外臺用吳茱萸一升

葱白半斤　豉二升

右四味㕮咀先以水一斗五升煮葱白作湯澄取八升內藥
煮取三升分三服纔服便使人按摩搖動口中噤物然後
仰卧覆以暖衣汗出去衣服湯熱歇即便冷濤飯燥脯而
已若服此不解復服甘草湯方

甘草三兩　桂心二兩

右四味合服如上法若服此已解肺家猶有客熱餘氣復
服桂心湯方

桂心　麥門冬各三兩

葱白半斤　豉二升

右六味合服如前法此方与次後散發身躰生瘡
麥門冬湯方用重分兩小異

桂心　人參　甘草各二兩

流黃對防風又對細辛其治主脾腎通主腰脚防風動流黃煩熱脚疼腰痛或嗢忽無常或下利不禁防風細辛能動流黃而流黃不能動彼始覺發便服杜仲湯方

杜仲三兩　枳實　甘草　李核人酪二

梔子人枚十四　香豉外二

右六味合服如上法若不解復服大麥奴湯方

大麥奴四兩　甘草　人參　芒消

桂心酪二　麥門冬汁半

右六味合服如上法若服此已解脾腎猶有餘熱氣或冷復服人參湯方

人參　乾薑　甘草　當歸酪一　附子枚一

右五味合服如上法

白石英對附子其治主胃通主脾腎附子動白石英煩熱腹脹白石英動附子嘔逆不得食或口噤不開或言語難手脚疼痛如覺發宜服生麥門冬湯方

生麥門冬四兩　甘草　麻黃酪二　豉外二

右四味合服如上法不解更服大黃湯方

大黃三兩　豉升二

若煩加細辛五兩

右五味合服如上法頻服之得下便止不下服盡若熱勢未除視晴高而患渴復服栝樓根湯方

栝樓根　大麥奴各四兩　甘草二兩

葱白半升　豉升

右五味合服如上法稍一兩合服之隱約得一升許便可食少糜動口若已解胃中有餘熱復服芒消湯方

芒消　桂心酪二　通草　甘草酪三

白朮一兩 李核人二十枚 大棗十枚 人參二兩

右七味合服如上法若腹脹去芎消用人參二兩

紫石英對人參芎治主心肝通主腰脚人參動紫石英外臺細辛人參心急而痛或驚悸不得眠臥恍惚忘誤失性發狂昏昏欲眠或憒憒言語謇或差或劇乍寒乍熱或耳聾耳目闇又防風雖不對紫石英紫石英猶動防風外臺云防風雖不對紫石英而能動紫石英為藥中帝使人參緣防風動人參頭痛煩熱轉相發動令人亦心痛煩熱

人參 白朮各三兩 甘草外臺無桂心各二兩

右六味合服如上法若嗌乾盛加大黃黃芩梔子各三兩若忘誤狂發猶未除服麥門冬湯方外臺此方治躁石發

細辛一兩 豉三升 生麥門冬半斤 甘草三兩 人參一兩

右六味合服如上法若嗌乾盛加大黃黃芩梔子各三兩若忘誤狂發猶未除服麥門冬湯方外臺此方治躁石發

豉升二 葱白一升

右五味合服如上法溫牀暖覆牀下著火口中嚼物使徧身汗一日便解若忘有餘熱氣更服人參湯方

人參 防風 甘草各三兩 桂心二兩

生薑 白朮各一兩

右六味合服如上法

赤石脂對桔梗其治主心通至胸背桔梗動石脂心痛寒噤手脚逆冷心中煩悶赤石脂動桔梗頭痛目赤身體壯熱始覺發宜温清酒飲之隨能否須酒勢行則解亦可服大麥麥方

大麥熬令汗出燥止勿令大焦舂去皮細擣絹篩以冷水和服之千金翼云炒去皮淨淘蒸令熟暴乾熬令香乃未之

礬石無所偏對其治主胃發則令人心急口噤骨節疼強或節節生瘡始覺發即服葱白豉湯方外臺云服麥門冬湯

葱白半升 豉二升 甘草二兩

右三味以水六升煮取二升半分三服

若散發身體亟生瘡宜服生麥門冬湯方

生麥門冬五兩　人參一兩半　甘草三兩　桂心二兩　葱白伴　豉外二

右六味服如解鍾乳湯法

術對鍾乳術發則頭痛目疼或舉身壯熱解如鍾乳法

附子對白石英亦對赤石脂附子發則嘔逆手脚疼體強骨節痛或項強面目滿腫發則飲酒服麥白愈若不愈與白石英同解

人參對紫石英人參發則煩熱頭項強解與紫石英同

桔梗對赤石脂又對茯苓又對牡蠣桔梗發則頭痛目赤身體壯熱解與赤石脂同茯苓發則壯熱煩悶宜服大黃黃芩湯方

大黃　黃芩　梔子人各三兩　豉一升　葱白切一升

右五味吸咀以水六升煮取二升半分三服

牡蠣發則四肢壯熱心腹煩悶極渴解與赤石脂同乾薑無所偏對

海蛤對栝樓海蛤先發則手足煩熱栝樓先發則噤寒清涕出宜服栝樓根湯方

栝樓根　甘草各三兩　大黃一兩　梔子人十四枚

右四味合服如解鍾乳法

石流黃發通身熱兼腰膝痛

白石英發先腹脹後發熱

紫石英發乍寒乍熱

赤石脂發心噤身熱頭目赤

礬石發遍身發熱兼口噤

牡蠣發頭痛而煩滿熱
海蛤發心中發熱
茯苓發直頭痛
桔梗發頭面熱
石流黃與礜石桔梗牡蠣茯苓此五物發宜浴白石英亦可小
浴其餘皆不宜浴礜石發宜用生熟湯茯苓發熱多攻頭即
以冷水洗身清之
浴法初熱先用暖水後用冷水浴時愼不可洗頭垂沐可
以三升灌之凡藥宜浴便得解即佳不差可餘治之
赤石脂紫石英發宜飲酒得酒即解凡藥發或有宜冷或有
宜飲酒不可一槩也
又一法云寒食散發動者云草藥氣力易盡石性沈滯獨
主胃中故令數發欲服之時以絹袋盛散一匕著四合酒中

塞其口一宿之後飲盡之其酒用多少將御節度自如舊
法此則藥石之勢俱用石不住胃中何由而發事甚驗也
治食宿飯陳臭肉及羹宿菜發者宜服梔子豉湯方

梔子三七枚 香豉三升 甘草三兩

右三味㕮咀以水八升煎取三升分三服亦可加人參
葱白
失食發宜服葱白豉湯飲酒過醉發亦宜服葱白豉湯方

葱白一升 豉二升 乾薑五兩 甘草二兩

右四味㕮咀以水七升煮取三升分三服服湯不解宜服
理中湯方

人參 甘草 白朮各三兩 乾薑三兩

右四味㕮咀以水六升煮取二升半分三服
瞋怒太過發宜服人參湯方

人參　枳實　甘草　各九分
栝樓根　乾薑　白朮　各六分
右六味咬咀以水九升煮取三升分三服若短氣者稍稍數飲（千金翼大主散發氣逆心腹絞痛不得氣息命在轉瞬者）清色過多發但服苦酒湯方本闕
將冷太過發則多壯熱以冷水洗浴然後用生熟湯五六石灌之已食少暖食飲少熱酒行步自勞
將熱太過發則多心悶時時食少冷食若夏月大熱之時散發動多起於渴飲多所致水和少麨服之不差復作以差爲度
若大小便秘塞不通或淋瀝溺血陰中疼痛此是熱氣所致厭之即愈
厭法前以冷物厭少腹已又以熱物厭之又以冷物厭之
若小便數此亦是取冷所爲暖將理自愈

若藥發下利者乾服豉即斷能多益佳
凡服散之後忽身體浮腫多是取冷過所致宜服檳榔湯方
檳榔三十枚（咬咀其皮以湯七升煮取三升去滓內子末爲再服）搥碎以水八升煮取三升分再服（千金翼云子搥作末下篩）
凡散發瘡腫方
蔓菁子熬　杏人　黃連
胡粉各一兩　水銀二兩
右五味別搥蔓菁子杏人如膏以猪脂合研令水銀滅以塗上日三夜一
散發赤腫者當以膏摩之方
生地黃五兩　大黃一兩　杏人（四十枚）　生商陸三兩
右四味切醋漬一宿猪膏一升煎商陸令黑去滓摩之日三夜一

散發生細瘡方

黃連　芒消各五兩

右二味㕮咀以水八升煮黃連取四升去滓內芒消令烊漬布取帖瘡上數數易之多少皆煮之

散發瘡痛不可忍方

冷石二兩下篩粉瘡上日五六度即燥痛須臾定

治服散忽發動方

乾薑五兩㕮咀以水五升煮取三升去滓內蜜一合和絞頓服之不差重作

解散除熱鴨通湯方

白鴨通五升沸湯二斗半淋之澄清取二斗汁

麻黃八兩　豉三升　冷石二兩

甘草五兩　梔子人枚二十

右六味㕮咀以鴨通汁煮六升去滓內豉三沸分服五合若覺躰冷小便快關其間若熱猶盛小便赤促服之不限五合宜小勞之漸進食不可令食少但勿便多耳

解散治盛熱實不小便赤方

升麻　大黃　黃連　甘草　黃蘗各三兩　芍藥六兩　白鴨通五合　黃芩四兩　梔子人十四枚　竹葉一把　豉升

右十一味㕮咀以水三斗先煮鴨通竹葉取一斗二升去滓澄清取一斗內藥煮取三升分三服若上氣者加杏人五合腹滿加石膏三兩

下散法主藥發熱困方千金翼云凡散數發熱無賴下去之又云諸丹及金石等同用之

黍米一升作糜以成煎猪脂一斤和之令調宿不食旦空腹食之令飽晚當下藥神良不盡熱發更合服之

又方

肥猪肉伍　葱白　薤各半

右三味治如食法合煮之宿不食頻服之令盡不盡明日更服

壓藥發動數數患熱困下之方

猪腎脂一具不令中水以火炙之承取汁適寒溫一服三合一日夜五六服多至五六升二日藥稍稍隨大便下出

又方

作肥猪肉臛一升調如常法平旦空肚頓服令盡少時腹中雷鳴鳴定藥下隨下以器盛取用水濤之得石不盡更作如前服之

蟲毒第四論一首方二十首

論曰蟲毒千品種種不同或下鮮血或好臥闇室不欲光明或心性反常乍嗔乍喜或四肢沈重百節酸疼如此種種狀貞說不可盡亦有得之三年乃死急者一月或百日即死其死時皆於九孔中或於脇下肉中出去所以出門常須帶雄黃麝香神丹諸大辟惡藥則百蟲猫鬼狐狸老物精魅永不敢著人養生之家大須慮此俗亦有灸法初中蟲於心下捺便大炷灸一百壯并主猫鬼亦灸得愈又當足小指尖上灸三壯當有物出酒上得者有酒出飯上得者有飯出肉菜上得者有肉菜出即愈神驗皆於灸瘡上出

凡中蟲毒令人心腹絞切痛如有物嚙或吐下血皆如爛肉若不即治蝕人五藏盡乃死矣欲驗之法當令病人唾水沈者是蟲不沈者非蟲也

凡人患積年時復大便黑如漆或堅或溏或微亦者皆是蟲也

凡人忽患下血以斷下方治更增劇者此是中蟲也

凡卒患血痢或赤或黑無有多少此皆是蟲主毋鹿臛醬以斷痢藥處之此大非也

世有拙醫見患蟲脹者徧身腫滿四肢如故小便不甚澀以水病治之延日服水藥經五十餘日望得瘥愈日復增加奄至隕歿如此者不一學者當細尋方意消息用之萬不失一醫方千卷不盡其理所以不可一一備述云耳

凡人中蟲有人行蟲毒以病人者若服藥知蟲主姓名當使呼喚將去若欲知蟲主姓名者以敗鼓皮燒作末以飲服方寸匕須臾自呼蟲主姓名可語令去則愈又有以蛇涎合作蟲藥著飲食中使人得瘕病此一種積年乃死療之各自有藥江南山間人有此不可不信之

太上五蟲丸治百蟲吐血傷中心腹結氣堅塞咽喉語聲不出短氣欲死飲食不下吐逆上氣去來無常狀如鬼祟身體浮腫悶煩疼寒戰黃黑交狐狸作魅卒得心痛上攻胃脇痛如刀刺經年累歲著牀不起悉主之方

雄黃　椒目　巴豆　莽草　芫花
眞朱 外臺用木香　鬼臼　礬石　藜蘆 各四分
斑猫 三十枚　蜈蚣 二枚　獺肝 一分　附子 五分

右十三味末之蜜和更擣三千杵丸如小豆先食飲服一丸餘密封勿泄藥氣十丸爲一劑如不中病後日增一丸以下痢爲度當下蟲種種狀皃不可具述下後七日將息服一劑三十年百病盡除忌五辛

太一追命丸治百病若中惡氣心腹脹滿不得喘息心痛積聚臚脹疝瘕宿食不消吐逆嘔噦寒熱癆瘵蟲毒婦人產後餘疾方

蜈蚣一枚　丹砂　附子　楮谷石 一作礬石

雄黃　藜蘆　鬼臼各一分　巴豆二分

右八味末之蜜丸如麻子一服二丸日一服傷寒二日服一丸當汗出綿裹兩丸塞兩耳中下利服一丸二丸塞下部蟲毒服二丸在外萬病上在膈上吐膈下痢有瘡一丸塗之毒自出產後餘疾服一丸耳聾綿裹塞耳

治人得藥雜蟲方

斑猫六枚　桂心如指大　缶月下土如彈丸大　藜蘆如指大

右四味治下篩水服一錢匕下蟲蛇蝦蟆蜣蜋蜈毒毋俱出治蟲注四肢浮腫肌膚消索欬逆腹大如水狀死後轉易家人一名蟲脹方小品名雄黃丸萬病丸

雄黃　巴豆　莽草　鬼臼酪四　蜈蚣三枚

右五味末之蜜和擣三千杵密封勿泄氣勿宿食旦服如小豆一丸一炊不知更加一丸當先下清水次下蟲長數寸及下蛇又下鰕雞子或白如膏下後作葱豉粥補之百種瘕將息

治中蟲毒腹內堅如石面目青黃小便淋瀝病變無常處方

肘後古今錄驗方俱云用鐵精烏雞肝和丸如梧子以酒服三丸日再甚者不過十日千金用後方疑千金誤

羖羊皮方寸　犀角　芍藥　黃連

牡丹各一兩　梔子人七枚　薤荷四兩半

右七味㕮咀以水九升煮取三升分三服葛氏崔氏同無芍藥牡丹梔子用苦參升麻當歸

犀角丸治蟲毒百病腹暴痛飛尸惡氣腫方

犀角屑　羚羊角屑　鬼臼屑　桂心末各四錢匕

天雄　莽草　貝子五枚　蜈蚣一枚　巴豆五十枚　麝香二分

貞朱　雄黃各一兩　射罔如雞子黃大一枚

右十三味末之合擣蜜丸如小豆服一丸日二含咽不知少增之卒得腹滿蜚尸服如大豆許二丸若惡氣腫以苦酒和塗之縫袋子盛藥懸左臂辟不祥鬼疰蠱毒可以備急

治蠱毒方

蓄根 蓑荷根各三兩 蠱主姓名

右二味咬咀以水四升煮取二升頓服肘後方云治中蠱吐血或下血皆如爛肝者自知

又方

槲樹北陰白皮 桃根皮各五兩 蝟皮灰

亂髮灰一方寸匕 生麻子汁五升

右五味先煮槲皮桃根取濃汁一升和麻子汁髮灰等令勻患人少食旦服大升一升須臾著盆水以雞翎擿吐水中如牛涎犢胎及諸蟲並出

治蠱毒方

槲樹北陰白皮一大握長五寸水三升煮取一升空腹服即吐蟲出亦治中蠱下血

又方 蝟皮灰水服方寸匕亦出蟲

又方

五月五日桃白皮必效方云以東引者火炙之 大戟洛四分 班猫一分

右三味治下篩昌空腹以水一雞子許服八捻用二指相著如開頓服之若指頭相離取藥太多恐損人矣肘後方云服患更一服必效方云服半方寸匕其毒即出不出更一服李饒州云若以酒中得則以酒服以食中得以漿服之

蛇毒入菜果中食之令人得病名曰蛇蠱方

大豆末以酒漬絞取汁服半升

治諸熱毒或蠱毒卒中及口中吐血醫所不治方

取人屎尖七枚燒作火色置水中研之頓服即愈亦解百
毒時氣熱病之毒服已温覆取汗勿輕此方極神驗

治蠱吐下血方

櫰皮 廣五寸長一尺 蘆荻根 五寸如足大指小品方用薔薇根

右二味咬咀以水二升煮取一升頓服極下蠱

治中蠱下血日數十行方

巴豆 二七枚 藜蘆 元青 附子 礜石 各二分

右五味末之別治巴豆合篩和相得以綿裹藥如大豆內
下部中日三差

又方

苦瓠一枚以水二升煮取一升稍服之當下蠱及吐蝦
蟆蝌斗之狀一月後乃盡 范汪方云苦瓠毒當臨時量用之肘後方云用苦酒一升煮

治下血狀如雞肝腹中攪痛難忍者方

茜根 升麻 黃芩 各兩 地榆 白蘘荷 各四兩

右八味咬咀以水九升煮取二升半分三服此蠱利血用之

又方

桔梗 犀角 各三兩 桔梗 黃蘗

右二味各等分為末酒服方寸匕日三不能自服絞口與
之藥下心中當煩須臾自靜有頃下服至七日止可食猪
脾藏自補養治蠱下血如雞肝日夜不解欲死者皆用之

治腸蠱先下赤後下黃汁沫連年不差方

牛膝一兩搥碎切之以淳清酒一升漬一宿旦空腹服之
服便愈

北地太守酒主萬病蠱毒風寒熱方

烏頭 甘草 芎藭 黃芩 桂心

藜蘆　附子 兩各四　白斂　桔梗　半夏

柏子人　前胡　麥門冬 各六兩

右十三味七月麴十斤秫米一斛如醞酒法吸咀藥以綿
袋盛之沈於瓮底酒熟去糟還取藥滓青布袋盛之沈著
酒底泥頭秋七日夏五日冬十日空肚服一合日三以知
爲度藥有毒故以青布盛之服勿中止二十日大有病出
其狀如漆五十日病悉愈有婦人年五十被病連年腹中
積聚冷熱不調時時切痛遶臍絞急上氣胸滿二十餘年
服藥三七日所下三四升即愈又有女人病偏枯絶產服
二十日吐黑物大如刀帶長三尺許即愈其年生子又有
女人小得癲病服十八日出血二升半愈有人被杖崩內
疢卧著九年服藥十三日出黑血二三升愈有人耳聾十七
年服藥三十五日鼻中出血三升耳中出黃水五升便愈

右方玄熹平二年北地太守臣光上然此偏主蠱毒有人
中蠱毒者服無不愈極難差不過二七日所有效驗不備
出曾有一女人年四十餘偏枯羸瘦不能起長卧牀枕耳聾
一無所聞兩手不收已經三年余爲合之遂得平復如舊有
人中蠱毒而先患風服菌羊酒傷多吐出蟲數十枚遂愈
何況此酒而不下蟲也嘉其功效有異常方故具述焉

胡臭漏腋第五論一首　方十五首

論曰有天生胡臭有爲人所染臭者天生臭者難治爲人所
染者易治然須三年醋傳粉石散勿止并服五香丸乃可得
差勿言一度傳藥即差正可傳藥時暫得一差耳五香丸在
第六卷中凡胡臭人通忌食炙薑五辛治之終身不差

辛夷　芎藭　細辛　杜蘅　藁本各二

右五味㕮咀以淳苦酒漬之一宿煎取汁傳之欲傳取臨
卧時以差爲度

石灰散主胡臭方

石灰一升　青木香　楓香一作洗香　薰陸香
丁香各一兩　陽起石各二兩　橘皮　礬石四兩

右八味治下篩以綿作篆子麁如指長四寸展取藥使著
篆上以綃袋盛著腋下先以布揩令痛然後灸之

又方

青木香　附子　白灰各一兩　礬石半兩

右四味爲散著粉中常粉之附後無礬石

又方

赤銅屑以醋和銀器中炒極熱以布裹熨腋下冷復易

又方

槲葉切三升以水五升煮取一升用洗腋下即以白苦瓠
燒令煙出熏之數數作

又方

辛夷　細辛　芎藭　青木香各四分

右四味治下篩熏竟粉之

又方

馬齒菜一束擣碎以蜜和作團以綃袋盛之以泥紙裹厚
半寸暴干以火燒熟破取更以少許蜜和使熱勿令冷先
以生布揩之灸藥腋下藥痛久忍之不能然後以手中
勤兩臂

又方

牛脂　胡粉各等分

右二味煎令可丸塗腋下一宿即愈不過三劑附後方云合搗以塗

又方　伏龍肝作泥傅之

又方　三年苦酒和石灰傅之

治漏腋腋下及足心手掌陰下股裏常如汗濕臭者六物傅方

乾枸杞根　乾地黃微根肘後作乾薑微根　甘草各半兩　商陸根　胡粉　滑石各一兩

右作藥治下篩以苦酒少少和塗當微汗出易衣復更塗之不過三著便愈或一歲復發發復塗之

又方

水銀　胡粉外臺作粉霜　右二味以面脂研和塗之大良驗

又方

銀屑一分作銅屑　石灰三分　右二味合和綃囊盛汗出粉之妙

又方　正旦以尿洗腋下神妙

又方

黃礬石燒令汁尽治末綃袋盛粉之即差

脫肛第六方十三法三首

肛門主肺肺熱應肛門熱則閉塞大行不通腫縮生瘡宛通方

白蜜三升煎令燥冷水中調可得爲丸長六七寸許內肛門中到身向上頭面下少時取烊斯須即通洞泄

肛門主大腸大腸寒應肛門寒則洞瀉肛門滯出猪肝散方

猪肝一斤炙燥　黃連　芍藥各二兩　烏梅肉五兩　艾葉一兩　阿膠

右六味治下篩溫清酒二升服方寸匕半日再若不能酒

治肛門滯出僅止散方

與清白米飲亦得

故塵東壁土一升碎
右二味擣土爲散挹粉肛頭出處取皂莢炙暖更遞熨取
入則止
又方　炙故麻篋底按令入頻按令入永差
又方
故敗麻篋底
右二味燒灰細研爲散傳肛門滯出頭將覆底按入即不
出矣
治肛出方
礜石四兩　桂心尺一　蝟皮一枚
右三味治下篩飲服方寸匕日一服即縮愼舉重及急帶
衣斷房室周年乃佳附後方云治女人陰脫出外用鼈頭一枚爲四味
又方　女萎一升以器中燒坐上熏之即入

治脫肛方
蒲黃三兩以猪脂和傅肛上內之三三愈
治腸隨肛出轉廣不可入方
生栝樓根取粉以猪脂爲膏溫塗隨手抑按自得縮入
治積冷利脫肛方
枳實一枚石上磨令滑澤鑽安柄蜜塗炙令煖熨之冷更
易之取縮入止
又方　鐵精粉內上按令入即愈
治脫肛歷年不愈方
生鐵三斤以水一斗煮取五升出鐵以汁洗日再
又方
用死鼈頭一枚燒令煙絕治作屑以傅肛門上進以手按之
病寒冷脫肛出炙臍中隨年壯

脫肛歷年不愈灸橫骨百壯
又灸龜尾七壯龜尾即後窮骨是也

瘦瘤第七 灸法十三首 證一條

治石癭氣癭勞癭土癭五癭等方

海藻　昆布　海蛤　通草　龍膽　礬石煅　松蘿各等分

右九味治下篩酒服方寸匕日三禁食魚猪肉五辛生菜諸難消之物十日知二十日愈

五癭丸方

取鹿蹯以佳酒浸令沒多炙乾內酒中更炙令香含咽汁味盡更易盡十具愈

又方

小麥麪一升　特生礬石十兩　海藻一兩

右三味以三年米醋漬小麥麪暴乾各擣爲散合和服一方寸匕日四五服藥含極乃咽之禁薑五辛猪魚生菜大吹大讀誦大叫語等

又方

昆布　松蘿　海蛤　通草　海藻各三兩　桂心

右七味治下篩酒服方寸匕日三

又方

海藻　昆布　半夏　細辛　土瓜根　松蘿各一兩　通草　白斂各二兩　龍膽各三兩

右十味治下篩酒服方寸匕日再不得作重用力

又方

昆布二兩洗切如指大醋漬含咽汁盡愈

又方

海藻一斤小品三兩　小麥麪一升

右二味以三年醋一升漬麪末暴乾往反醋盡合擣為散酒服方寸匕日三已愈努力崔氏如療三十年癭瘤

又方

昌蒲二兩　海蛤　白斂　續斷

海藻　松蘿　桂心　蜀椒

半夏　到掛草各一兩　神麴三兩　羊靨百枚

右十二味治下篩以羊牛髓脂為丸如梧子日服三丸

癭上氣短氣炙肺輸百壯

癭上氣胷滿炙雲門五十壯

癭惡氣炙天府五十壯千金翼云又炙胷堂百壯

癭勞氣炙衝陽隨年壯

癭炙天瞿三百壯橫三間寸炙之

癭氣面腫炙通天五十壯

癭炙中封隨年壯在兩足趺上曲尺宛宛中

諸癭炙肩髃左右相對宛宛處男左十八壯右十七壯女右十八壯左十七壯或再三取差止

又炙風池百壯俠項兩邊

又炙兩耳後髮際一百壯

又炙頭衝一作頭衝頭衝在伸兩手直向前令臂著頭對鼻所注處炙之各隨年壯千金翼云名臂臑

凡肉瘤勿治治則殺人愼之刖後方去不得針炙

陷腫散治二三十年癭瘤及骨瘤脂瘤石瘤肉瘤膿瘤血瘤或息肉大如柸杯升斗十年不差致有漏潰令人骨消肉盡悸寤寐不安身體癭縮愈而復發方或堅或輭或潰令人驚

烏賊骨　石流黃各一分　白石英　紫石英
鍾乳各二分　丹參三分　琥珀　附子
胡薰屑　大黃　乾薑各四分

右十一味治下篩以韋囊盛勿泄氣若瘡濕即傅若瘡乾猪脂和傅日三四以乾為度若汁不盡者至五劑十劑止藥令人不痛若不消加芒消二兩佳

治癭瘤方

海藻　乾薑各二兩　昆布　桂心
逆流水柳鬚各一兩　羊靡七枚陰乾
右六味末之蜜丸如小彈子大含一丸咽津

又方

礬石　芎藭　當歸　大黃　黃連
芍藥　白斂　黃芩各二分　吳茱萸一分

右九味治下篩雞子黃和之塗細故布上隨瘤大小厚薄帖之乾則易若藥熟常作膿旨細細從孔中出也探却膿血盡著生肉高者平癰瘤潰漏又金瘡復起如故

生肉膏主癰瘤潰漏又金瘡百瘡方

當歸　附子　甘草　白芷
芎藭各一兩　蘼白二兩　生地黃三兩

右七味㕮咀以猪脂三升半煎白芷黃去滓稍以傅之旦三

又方

以狗屎溲雞子傅之去膿水如前方說傅生肉膏取差方在第二十二卷

癭水癭針灸易治

陰癭第八論二首　方二十七首

論曰癭有四種有腸癭水癭腸癭卵脹氣癭水癭腸癭水癭針灸法十首

治癲丸方

桃人枚卅　桂心　澤瀉　蔾蘼子

地膚子　防風　防葵　橘皮

茯苓　五味子　芍藥各二兩　細辛

牡丹皮　海藻各一兩　狐陰一具　蜘蛛五十枚

右十六味末之蜜和服十丸如梧子稍稍加至三十丸

又方

取楊柳枝脚指大長三尺二十枚水煮令極熟以故布及氈

摋腫處取熱柳枝更互柱之如此取差

治癲疝卯偏大氣上作脹不能動方

牡丹皮　防風各二兩

右二味治下篩酒服方寸匕日三肘後方云小品方用桂心鼓鐵十日愈嬰兒以乳汁和大豆許與之

治卒癲以蒲橫度口如廣折之一倍增之布著少腹大橫文令度中央上當臍勿使偏僻灸度頭及中央合二處隨年壯好自養勿舉重大語怒言大笑又牽陰頭正上灸莖頭所極又牽下向轂道又灸所極又牽向左右髀直行灸莖所極各隨年壯又灸足厥陰在左灸右在右灸左三壯在足大指本節間

卯偏大上入腹灸三陰交在內踝上八寸隨年壯

卯偏大癲病灸肩井在肩解臂接處隨年壯

男癲灸手季指端七壯病在右可灸左左者灸右

男陰卯偏大癲病灸關元百壯

男陰卯大癲病灸玉泉百壯

多不灸之及泉陰穴亦在其外

男陰卯偏大癲病灸泉陰穴在屈骨下陰以其處里報之穴在屈骨下陰以其處里報在橫骨邊

癲病陰卒腫者令並足合兩拇指令爪相並以一艾炙兩爪端方角處一丸令頓上兩爪角各令半丸上爪指佳七壯愈

男陰卯大癲病炙足太陽五十壯三報之

又炙足太陰五十壯在內踝上一夫

男陰卯大癲病炙大指三毛中隨年壯

又炙足大拇指內側去端一寸赤白肉際隨年壯雙炙之

又炙橫骨兩邊二七壯俠莖是

陰癲炙足大指下理中十壯隨腫邊炙之 肘後方云炙足大指第二節下橫文正中央五壯 姚氏古炙大指本三壯

男兒癲先將兒至碓頭祝之曰坐汝令兒某甲陰囊癲故炙汝三七二十一枚炙訖便牽小兒令雀頭下向著囊縫當陰頭炙縫上七壯即消已驗艾炷猶簪頭許

大凡男癲當騎碓軸以莖伸置軸上齊陰莖頭前炙軸木上

隨年壯

論曰有人自少至長陰下常有乾癬者宜依癬方主之有五勞七傷而得陰下瘡濕搔之黃汁出者宜用補汎散主之有陰精瘡者以妬精方治之夫妬精瘡者男子在陰頭節下婦人在玉門內並似甘瘡作臼齊食之大痛甘即不痛也

凡虛熱石熱當路門冷濕傷肌熱聚在裏變成熱及水病腫滿腹大氣急大小便不利腫如皮紙盛水皆光晃如老蠶色陰莖堅腫為瘡水出此皆腎熱虛損強取風陰濕傷脾胃故也治之法內宜依方服諸利小便藥外以此葵葵子湯洗四肢竟以葱白膏傅之別以豬蹄湯洗莖上葵葵子湯方

葵黎子　赤小豆各一升　白皮一升　葱心青皮一升　菘菜子二升　蒴藿五升

右六味㕮咀以水二斗煮取八升以淋洗腫處
猪蹄湯治服石發熱因勞損熱盛當風露卧並腫方
猪蹄（二双） 葶藶子（五合） 黄蘗（五兩） 蒴藋（三升） 葱白膏方
葱白 菘菜子 丹參 蜚蠊子（各半升） 猪膏（五斤） 雄黄（一兩研） 礬石（二兩研） 甘草（一尺切）
右三味以水五升煮減半洗之（集驗方無礬石甘草二味）
治陰腫皮癢方
熬桃人令香爲末酒服方寸匕日三
有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜疼悶（外臺作夜即痛悶）
不得眠方
取生椒擇之令淨以布帛裹著丸囊令厚半寸須臾熱氣通日再易之取消差止
又方 擣覓菜根傅之
又方
煮大薊根汁服一升日三不過三劑愈
又方 醋和熱灰熨之
又方 盆月下土雞子白和傅之
又方 醋和麪熨之
又方 末車前子飲服之
陰腫痛灸大敦三壯

治卒陰痛如刺汗出如雨方

小蒜　韭根　楊枏根格一

右三味合燒以酒灌之及熱以氣蒸之即愈

治陰痛方

甘草　石蜜

右二味等分爲末和乳塗之

治妬精瘡方

用銀釵綿裹以臘月猪脂熏黃火上煖以釵烙瘡上令熟

取乾槐枝燒煙塗之

又方

麝香　黃蘗

青礬

右三味等分爲末小便後傅上不過三度

治陰蝕瘡方

蒲黃一升　水銀二兩

右二味研之令成粉傅之即愈差止小便後即傅之

又方

以肥猪肉五斤水三斗煮肉令極爛去肉以湯令極熱便

以漬瘡中冷即愈

又方

狼牙兩把切以水五升煮取一升温洗之日五度

治陰蝕生瘡或癢方

雄黃　礬石各三分　麝香半分

右三味治下篩爲粉粉瘡上即差

治陰惡瘡方

蜜煎甘草末塗之葛氏云比見有人患陰頭腫坎下瘡欲斷者以猪肉湯消洗之并用黃蘗黃連末塗之

治男女陰瘡方

石流黃末以傅瘡上

治男女陰瘡生瘡方

嚼胡麻傅之佳

治陰下生瘡洗湯方

地榆　黃蘗各八兩

右二味㕮咀以水一斗五升煮取六升去滓適冷暖用洗之亦佳

瘡日再只煮黃蘗汁洗之亦佳

備急千金要方卷第二十四

備急千金要方卷第二十五　備急

朝奉郎守太常卿充秘閣校理製誥兼閤校理充護軍賜紫魚袋臣林億等校正

卒死第一　厭鬼　中惡　自縊　卒死

蛇毒第二　虺蛭　蝮蠆　蜂　蠭螋　射工　沙虱　水毒　猫鬼　馬咬　猘狗毒　附

溺　凍　酒　附

被打第三　從高墮下　惡刺　著漆　附　竹木刺

火瘡第四　灸瘡　金瘡　毒矢　附

卒死第一　方九十四首　灸法十首

卒死無脉無他形候陰陽俱竭故也治之方

面上即牛肯舐

牽牛臨鼻上三百息牛舐必差牛不肯舐著監汁塗

又方

牛馬矢絞取汁飲之無新者水和乾者亦得　附後方云乾者以人溺解之此偏鵲法

又方　灸尻尖尻兩脇下（脩急方云又治尸厥）
卒死針間使各百餘息
又灸鼻下人中一名鬼客（治厥死不自覺者方）
慎燈火勿令人手動牽牛臨其上即覺若卒不能語
取東門上雞頭末之以酒服
治卒厥死方
搗韭汁灌鼻孔中（張仲景云）
治鬼厥不語方
末伏龍肝吹鼻中
又方
末皂莢如大豆許吹鼻中嚏則氣通起死人（集驗方云治中惡）
辟厭鬼方
雄黃如棗大係左臂下令人終身不魘鬼（張文仲云男左女右）
魘灸兩足大指聶毛中各二七壯（肘後方云華佗法又救卒死中惡）
治中惡方
葱心黃剌鼻孔中血出愈（肘後方云入七八寸無苦使目中血出崔氏云男左女右）
又方　大豆二七粒末雞子黃并酒相和頓服
又方　使人尿其面上愈（肘後方云此偏鵲法）
治中惡弃蠱毒方
冷水和伏龍肝如雞子大服之必吐
又方　温二升猪肪頓服之
又方　車軸脂如雞子大酒服之
中惡炙胃管五十壯愈
治卒忤方（此病即今人所謂中惡者與卒死鬼擊亦相類爲治皆參取而用之）
鹽八合以水三升煮取一升半分二服得吐即愈（備急

方出鬼擊治若小便不通筆頭七枚燒作灰末水和服之即通

又方

犢子屎半盞酒三升煮服之亦治霍亂肘後方出治鬼擊大牛亦可用

又方

臘月野狐腸燒末以水服方寸匕死鼠灰亦佳

又方　書墨末之水服一錢匕

卒忤死灸手十指爪下各三壯餘治同上方備急方出治卒死而張目反折者

又灸人中三壯又灸肩井百壯又灸間使七壯又灸巨闕百壯還魂湯主卒感忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絶無復覺㠯死絞口噤不開去齒下湯湯入口不下者分病人髮左右捉踏肩引之藥下復增取盡一升須臾立蘇方

麻黃三兩　桂心二兩　甘草一兩　杏人七十粒

右四味㕮咀以水八升煮取三升分三服肘後方出張仲景方无桂心用三味

卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿欲絶方

雄黃粉酒服一刀圭日三血化爲水

鬼擊之病得之無漸卒著人如刀刺狀胷脇腹內絞急切痛不可抑按或即吐血或鼻口出或下血一名鬼排治之方

雞屎白如棗大　青花麻一把

右二味以酒七升煮取三升熱服須臾發汗若不汗熨斗盛火灸兩脇下使熱汗出愈

又方

艾如雞子大三枚以水五升煮取一升頓服之

又方　吹酢少許鼻中

鬼擊灸人中一壯立愈不差更灸

又灸臍上一寸七壯及兩踵白肉際取差又灸臍下一寸

三壯

夫五絶者一曰自縊二曰墻壁壓踏三曰溺水四曰魘寐五曰產乳絶悉治之方

取半夏一兩細下篩吹一大豆許內鼻中即活忽下温者一日亦可治

治自縊死方

凡救自縊死者極須按定其心勿截繩徐徐抱解之心下尚温者以髮能覆口鼻兩人吹其兩耳

又方

強卧以物塞兩耳竹筒內口中使兩人痛吹之塞口傍無令氣得出半日死人即噫噫即勿吹也

又方　擣皂莢細辛屑如胡豆大吹兩鼻中

又方　藍青汁灌之

又方　刺雞冠血出滴著口中即活男雌女雄

又方

雞屎白如棗大酒半盞和灌口及鼻中佳

又方　葱葉吹皂莢末兩鼻中逆出更吹

又方

梁上塵如大豆各內一小竹筒中四人各捉一箇同時吹兩耳兩鼻即活

又方　雞血塗喉下

又方

尿鼻口眼耳中并捉頭髮一撮如筆管大掣之立活

自縊死灸四肢大節陷大指本文名曰地神各七壯

治熱暍方

取道上熱塵土以塵心上少冷即易氣通止

又方　仰卧暍人以熱土壅臍上令人衆之臍中温即愈

又方　可飲熱湯亦可内少乾薑橘皮甘草煮飲之稍稍咽勿頓使飽但以熱土及熬灰土壅臍上佳

又方　地黄汁一盞服之

又方　濃煮葈取汁二升飲之即愈不差更灌

又方　水半升和麪一大抄服之

又方　張死人口令通以煖湯徐徐灌口中小拳死人頭令湯入腹須臾即蘇

又方　灌地漿一盞即愈

又方　使人噓其心令煖易人爲之

又方　抱狗子若雞著心上尉之

又方　屋上南畔瓦熱尉心亦令易之

治落水死方

以竈中灰布地令厚五寸以甑側著灰上令死人伏於甑上使頭小垂下抄鹽二方寸匕内竹管中吹下孔中即當吐水水下因去甑下死人著灰中壅身使出鼻口即活

又方

掘地作坑熬數斛灰内坑中下死人覆灰濕徹即易之勿令大熱煿人灰冷更易半日即活

又方

取大甑傾之死人伏其上令死人口臨甑口然葦火二七把燒甑中當死人心下令煙出小入死人鼻口

中鼻口中水出盡則活火盡復益之常以手候死人
身及骸勿令甚熱當令火氣能使死人心下足得暖卒
無骸者於岸側削地如骸空下如竈燒令煖以死人
著上亦可用車載爲之勿令隱其腹令死人低頭水
得出并炒灰數斛令暖以粉身濕更易温者
又方 但埋死人煖灰中頭足俱没惟開七孔
又方
倒懸死人以好酒灌鼻中又灌下部又酢灌鼻亦得
又方 綿裹皂莢內下部中水出盡則活
又方 裹石灰內下部中須更水出
又方 熬沙覆死人面上下有沙但出鼻口耳沙冷濕即易
又方 竈中灰二石埋死人從頭至足出七孔即可

又方
屈兩脚著生人兩肩上死人背向生人背即負持走
行吐出水便活
落水死解死人衣灸臍中凡落水經一宿猶可活
治冬月落水凍四肢直口噤尚有微氣者方
以大器中熬灰使煖盛以囊薄其心上冷即易心煖
氣通目得轉口乃開可温尿粥稍稍吞之即活若不
先温其心便持火灸身冷氣與火爭即死
治凍爛瘡方
猪後懸蹄以夜半時燒之研細篩以猪脂和傅亦治
小兒
治入水手足腫痛方
生胡麻擣薄之

治酒醉中酒恐爛五藏方

以湯著槽中漬之冷復易夏亦用湯

又法

凡醉不得安卧不動必須使人搖轉不住特忌當風席地及水洗飲水交接

又方　搗茆根汁飲二升

治飲酒頭痛方

竹筎五兩以水八升煮取五升去滓令冷內破雞子五枚攪勻更煮二沸飲二升使盡差

治飲酒腹滿不消方

煮藍湯以竹筒灌大孔中

治飲酒中毒方

煮大豆三沸飲汁三升

又方　酒漬乾槿汁服之

治病酒方

豉　慈白　各一升

右二味以水四升煮取二升頓服之

治飲酒房勞虛受熱積日不食四月中熱飲酒不已酒入百脉心氣虛令人錯謬失常方

芍藥　括樓根　人參　白薇

枳實　知母　各二兩　甘草一兩　生地黃八兩

酸棗人　茯神　各三兩　外臺茯苓一兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分爲三服

治連月飲酒咽喉爛舌上生瘡方

大麻人　黃芩　各二兩　附子一枚用黃蘗一兩

右二味末之蜜和丸含之　千金翼用黃蘗二兩

治酒醉不醒方

葛根汁一斗二升飲之取醒止肘後方云治大醉飲酒令人不醉方

柏子人 麻子人 各二合

右二味治下篩為一服進酒三倍

又方

葛花 小豆花 各等分

右二味合為末服三方寸匕飲時仍進葛根汁芹汁及枇杷葉飲並能倍酒

又方 九月九日菊花末臨飲服方寸匕

又方 小豆花葉陰乾百日末服之

又方 五月五日取井中倒生草枝陰乾末酒服之

飲酒令無酒氣方

乾葛 菁根二七枚三徧蒸末兩分酒後水服之

治惡酒健噉方

空井中倒生草燒灰服之勿令知

又方 取其人牀上塵和酒飲之

斷酒方

酒七升著餅中熟朱砂半兩著酒中急塞餅口安著猪圈中任猪搖動經十日取酒服飲尽

又方

腦月鼠頭灰 柳花

右二味等分為末黄昏時酒服一柸

又方 正月一日酒五升淋碓頭擣一下取飲之

又方

故氈中蓁耳子七枚燒作灰黄昏時煖一柸酒呪言

與病狂人飲也勿令知之後不喜飲酒也

又方 白猪乳汁一升飲之永不飲酒

又方 刮馬汗和酒与飲終身不飲

又方 虎屎中骨燒末和酒与飲

又方 麤鷓屎灰水服方寸匕永斷

又方 取毛鷹鷂一過吐毛水煮去毛頓服

又方 故紡車絃燒灰和酒与服

又方 驢駒衣燒灰酒飲方寸匕

又方 自死蠐螬乾擣末和酒与飲永世聞酒名即嘔神驗

又方 酒客吐中肉七枚陰乾燒末服之

又方 酒漬汗靴替一宿旦空腹与即吐不喜見酒

又方 白狗乳汁酒服之

又方 臈月馬腦和酒服之

治因熱逐涼睡熟有蛇入口中挽不出方

以刀破蛇尾內生椒三兩枚裹著須臾即出 肘後方云艾灸蛇尾即出若無火以刀周匝割蛇尾截令皮斷乃捋皮倒脫即出

治蛇入人口并七孔中者方

割毋猪尾頭瀝血著口中即出

又方

以患人手中指等截三歲大猪尾以器盛血傍蛇寫口中拔出之

治卒爲蛇繞不解方

以熱湯淋之無湯令人尿之

治蛇蠍螫方

服小蒜汁滓薄上 肘後方云治蝮蛇螫

雄黃　乾薑　烙等

右二味爲末和射罔著竹筒中帶行有急用之

又方　雄黃末傳瘡上日一

又方　用銅青傳瘡上

又方　搗大蒜和胡粉傳之

又方　雞屎二七枚燒作灰投酒服之

又方

以熨圍上令童男尿著中燒鐵令赤投中冷復燒著

三三度差

又方　口嚼大豆葉塗之良

又方　猪脂和鹿角灰塗之

又方　鹽四兩水一斗煮汁沸定以湯浸冷易之

又方　搗紫菀取汁飲一升以滓封瘡以少水灌之

又方　熟搗葵取汁服之以滓圍瘡上令消

治蛇齧方

人屎厚塗帛裹即消

治蛇毒方

消蠟注瘡上不差更消注之

又方　以母猪耳中垢傅之（附後方云牛耳中垢亦宜用）

治蝮蛇毒方

令婦人尿瘡上

又方　令婦人騎度三過又令坐上

又方　末薑薄之乾復易

又方　以射罔塗腫上血出即愈

又方　生麻楮葉合搗以水絞去滓漬之

治衆蛇毒方

又方　梳中垢如指大長一寸泉和傅之

又方　灸梳汗出熨之

又方　取合口椒葫荽苗等分擣傅之無不差

又方　男子陰間毛二七枚合之有汁即咽却秘方

衆蛇螫灸上三七壯無艾以火頭稱瘡孔大小熱之

入山苦辟衆蛇方

乾薑　麝香　雄黃

右三味等分麤擣以絳袋盛帶之男左女右蛇毒塗瘡

（集驗方云如無麝香以射罔和帶之救急方云以蜜和爲膏塗良）

又方　常燒羖羊角使煙出蛇則去矣

治蛇螫人瘡已愈餘毒在肉中搖搖痛癢方

大蒜　小蒜各一升

右二味合擣之熱湯淋以汁灌瘡大良

治蛇骨刺人毒痛方

鐵精如大豆內管中吹內瘡中良

又方　燒死鼠末傅之

治虎咬瘡方

煮葛根令濃以洗之十徧飲汁及擣爲散以葛根汁

服方寸匕日五甚者夜二

治虎嚙瘡方

青布急卷爲繩止一物燒一頭燃內竹筒中注瘡口

重瘡妙

又方　煮鐵令濃洗瘡

又方　嚼栗子塗之良

辟虎法

凡入山燒水牛羖羊角虎狼蛇皆走

論曰凡見一切毒螫之物必不得起惡心向之亦不得殺之若輒殺之於後必遭螫毒難差愼之愼之

治蠍毒方

凡蠍有雌雄雄者痛止在一處雌者痛牽諸處若是雄者用井底泥塗之温則易雌者用當瓦屋溝下泥傅之若值無雨可用新汲水從屋上淋下取泥

又方

取齒中殘飯傅之又猪脂封之又射罔封之又硇砂和水塗上立愈

治蠍螫方

若著手足以冷水漬之水微暖則易之著餘處者冷水浸故布揄之小暖則易

又方 生烏頭末唾和傅之

治蜂螫毒方

取瓦子摩其上唾三七遍置瓦子故處

治蜂螫方

蜜五合 蠟二兩 猪脂五合

右三味和煎如膏候冷以塗之

又方 燒牛屎灰苦酒和塗之

又方 燒蜂房末膏和塗之 肘後方云先煑蜂房洗之又燒塗之

又方 齒垢塗之

又方 嚼塩塗之

又方 尿泥塗之

又方 以人尿新者洗之

又方　反手捻地上土傳之

論曰凡蠷螋蟲尿人影著處便令人病瘡其狀身中忽有處瘙痛如蟲刺亦如刺蟲所教畫後起細瘡瘡作聚如菜萸子狀也四邊赤中央有白膿如黍粟亦令人皮肉急舉身惡寒壯熱劇者連起竟腰脇胷也治之法初得之摩犀角塗之止其毒治如火丹法余以武德中六月得此疾經五六日覺心悶不佳以他法治不愈又有人教畫地作蠷螋形以刀子細細盡取蠷螋腹中土就中以唾和成泥塗之再塗即愈將知天下萬物相感莫曉其由矣

治蠷螋尿方

殺羊羔燒灰臘月猪脂和封之

又方　擣豉封之

又方　酢和胡粉塗之

治蠷螋尿瘡方

燒鹿角爲末以苦酒和傅瘡上已有汁者燒道傍弊蒲蓆傅之

又方

槐白皮半斤切以苦酒二升漬半日刮去瘡處以洗

又方　以猪脂薑棗中土和傅之

又方　熟嚼莧菜以水和塗燥復易之

又方　馬鞭草熟擣以傅之燥則易之

又方　取吳茱萸東行根下土酢和塗之

治三種射工蟲毒方

論曰江南有射工毒蟲一名短狐一名蜮其蟲形如甲蟲外
云正黑狀如大飛生有一長角在口前如弩據臨其角端曲如上弩以
氣爲矢因水勢以射人人或聞其在水中鈚鈚作聲要須得
水沒其口便射人此蟲畏鵜鵜能食之其初始證候先惡寒
噤瘧寒熱筋急仍似傷寒亦如中尸便不能語朝旦小蘇晡
夕輒劇寒熱悶亂是其證始得三四日當急治之稍遲
者七日皆死初未有瘡但惡寒噤瘧其成瘡似蠷螋尿亦似
瘧痟瘡射工中瘡有三種其一種瘡正黑如鼈子皮周邊悉
赤或衣犯之如有芒刺痛其一種作瘡久久穿或睛間寒熱
其一種如火灼燋起此者最急數日殺人備急方云有四種
治射工中人寒熱或發瘡偏在一處有異於常方
取鬼臼葉一把內苦酒漬之熟擣絞取汁服一升日三
又方 犀角二兩 升麻三兩 烏扇根二兩

右三味㕮咀以水四升煮取一升半去滓分再服相去一
炊頃盡更作
又方
取生吳茱萸莖葉一握斷去前後取握中熟擣以水
二升煮取七合頓服之
又方 取葫切帖瘡灸七壯
又方 取蜈蚣大者一枚火炙之治末和苦酒以傳瘡上
又方 赤莧菜擣絞取汁一服一升日四五服
又方 白雞屎取白頭者三枚湯和塗中毒處
治射工中人已有瘡者方
取芥子擣令熟苦酒和厚塗瘡上半日痛便止
又方
取狼牙葉冬取根擣之令熟薄所中處又飲四五合汁

治射工中三種瘡方

烏扇根三兩　升麻二兩

右二味㕮咀以水三升煮得一升適寒温盡服之滓薄瘡上

治江南毒氣惡核射工暴腫生瘡五香散方

甲香　犀角　鼈甲　薰陸香　升麻

烏翣　丁香　青木香　沈香　黄連

甘草　牡蠣　羚羊角　黄芩各四分　吳茱萸三分

薰蘆六分

右十六味治下篩中射工毒及諸毒皆水服方寸匕日三以雞子白和塗腫上乾易之并以水和少許洗之

野葛膏主射工惡核卒中惡毒方

野葛外一　茵芋　躑躅　附子　丹砂各一兩

巴豆　烏頭　蜀掇各五　雄黄　大黄各一兩

右十味治下篩不中水猪膏三斤煎三上三下去滓內丹砂雄黄末攪至凝以棗核大摩痛上勿近眼凡合名膏皆不用六畜産婦女人小兒雞犬見之惟須清淨矣

治沙虱毒方

斑猫二枚熬一枚末服之又燒一枚令烟絶末著瘡中

又方

大蒜十枚止一物合皮安熱灰中炮令熱去皮刀斷頭熱拄所著毒處

又方　麝香　大蒜

右二味和擣以羊脂和著小筒中帶欲用取傅瘡上

又方　雄黄　朱砂

右三味等分五月五日日中時童子合之用傅瘡上

山水中陰濕草木上石蛭著人則穿齧人肌膚行人肉中浸

淫瘭起如蟲行道治之方
凡行山路草木中常以臘月猪膏和鹽塗脚脛及足
指間趺上及著鞋韈蛭不得著人也已著者灸斷其
道即愈
治水毒方
論曰凡山水有毒蟲人涉水中人似射工而無物其診法初
得之惡寒微似頭痛目匡疼心中煩懊四肢振惙腰背百節
皆強兩膝痛或翕翕而熱但欲睡旦醒暮劇手足逆冷至肘
膝二三日腹中生蟲食人下部肛中有瘡不痛不癢令人不
覺不急治過六七日下部出膿潰蟲上食人五藏熱盛毒煩
下利不禁八九日良醫不能治矣覺得之急早視其下部若
有瘡正赤如截肉者陽毒最急若瘡如鯉魚齒者爲陰毒猶
小緩要皆殺人不過二十日也欲知是中水與非者當作五
六升湯以小蒜五升吮咀投湯中消息勿令大熱去滓以浴
之是水毒身體當發赤斑無異者非也當以他病治也
治中水毒方
又方
取梅若桃葉擣絞取汁三升許或乾以少水絞取汁
飲之小兒不能飲以汁傳乳頭與喫
又方
擣蒼耳汁服一升又以綿裹杖沾汁道下部日二過
即差
又方
蓼一把擣以酒和絞取汁一升服之不過三服外臺肘後作蒟菜葉
又方 藍一把擣水解以塗浴面目身體令徧
又方
擣蛇苺根末水飲之并道下部生者用汁凡夏月行

常多齎此藥屑入水以方寸匕投水上流無所畏又
辟射工凡洗浴以少許投水盆中即無復毒
治人忽中水毒手足指冷或至肘膝者方
浮萍草燒乾末之酒服方寸匕
又方 吳茱萸一升 生薑切一升半 犀角
升麻 橘皮洛二 烏梅十四枚
右六味㕮咀以水七升煮取二升分二服
治猫鬼野道病歌哭不自知赤蛇燒作灰以井花水服方寸匕日
五月五日自死未著地者取之陰乾百日末之
一針灸方在第十四卷中
又方 臘月死猫兒頭灰水服一錢匕日二
治猫鬼眼見猫狸及耳聲雜有所聞方
相思子 蓖麻子 巴豆各一枚 朱砂末 蠟各四銖

右五味合擣作丸先取麻子許大含之即以灰圍患人前
頭著一斗灰火吐藥火中沸即畫火上作十字其猫鬼逆
皆死矣
治蜘蛛咬人方
人尿煑又油淀煑又炮薑貼之又猢孫屎傳之
又方 烏麻油和胡粉如泥塗上乾則易之
治馬齧人及蹋人作瘡毒腫熱痛方
馬鞭梢長三寸 鼠屎二七枚
右二味合燒末以猪膏和塗之立愈方云治遂成瘡久不愈者肘後
治馬齧人陰卵脫出方
推內之以桑皮細作線縫之破烏雞取肝細剉以封之且忍勿小便即愈

治犬馬齧及馬骨刺傷人及馬血入舊瘡中方

取灰汁熱漬瘡常令汁器有火數易汁勿令爛人肉三數日漬之有腫者炙石熨之日二消止

治馬血入瘡中方

服人糞如雞子復以糞薄瘡上

又方　取婦人月水傅之神良

治剥死馬馬骨傷人毒攻欲死方

便取馬腸中屎以塗之大良燃臺方云取其屎炙服方寸匕

治馬汁馬毛入人瘡中腫痛欲死方

以水漬瘡數易水便愈又以石灰傅之

又方　飲法酒法醋時飲服方寸匕

又方　燒雞毛翎末以酒服方寸匕

又方　以沸湯令得所浸洗之取差

論曰凡春末夏初犬多發狂必誠小弱持杖以預防之防而不免者莫出於灸百日之中一日不關者方得免難若初見瘡差痛定即言平復者此最可畏大禍即至死在旦夕凡狂犬咬人著訖即令人狂精神已別何以得知但看灸時一度火下即覺心中醒然惺惺了了方知咬已即狂是以深須知此此病至重世皆輕之不以為意坐之死者每年常有吾初學醫未以為業有人遭此將以問吾吾了不知報荅以是經吾手而死者不一自此銳意學之一解已來治者皆愈方知世無良醫枉死者半此言非虛故將來學者非止此法餘一方皆須沈思留心作意慇懃學之乃得通曉莫以粗解一兩種法即謂知訖極自誤也聊因方末申此二言不盡意耳

又曰凡猘犬咬人七日輒應一發三七日不發則脫也要過

百日乃得免耳每到七日輒當擣韭汁飲之一二升又當終
身禁食犬肉蜜蝗蛹食此則發死不可救矣瘡未愈之間禁食
生魚及諸肥膩冷食但於飯下蒸魚及於肥羹中食便發矣
不宜飲酒能過一年乃佳 集驗方云若重發者生食蟾蜍鰌鱓
知初得齧便為之則後不發也 絶良亦可燒多食之不必令其人

猘犬齧人方

擣地榆絞取汁塗瘡無生者可取乾者以水煮汁飲
之亦可末之服方寸匕日三兼傅之過百日止

又方 頭髮 猬皮
右二味各等分燒灰水和飲一柸口噤者折齒內藥

又方 擣韭絞取汁飲一升日三瘡愈止亦治愈後復發者

又方 以豆醬清塗之日三四

又方 刮虎牙若骨服方寸匕 小品方云刮狼牙或虎骨末
服已發狂如猘犬者服之即愈

治猘犬毒方

燒虎骨傅瘡及熨又微熬杏人擣研取汁服之良又
取燈盞殘油灌瘡口此皆禁酒猪肉魚生菜

又方 用韭根故柂二枚以水二升煮取一升頓服

又方 蝦蟇灰粥飲服方寸匕

又方

桃東南枝白皮一握水二升煮取一升分二服吐出
犬子

又方 服良姜子七枚日一

又方 取猘犬腦傅上後不復發

又方 梅子末酒服之

治狂犬齧人方

蛇脯一枚炙去頭擣末服五分匕日三

又方　青布浸汁服三升
又方　飲驢尿一二升
又方　擣萇荄根和鹽傅日三
凡猘犬所齧未盡其惡血毒者灸上一百壯已後當日灸一
　壯若不血出刺出其血百日灸乃止禁飲酒猪犬肉
治凡犬齧人方
　熬杏人五合令黑碎研成膏傅之
又方　取竈中熱灰以粉瘡中帛裹繫之
又方　以沸湯和灰雞塞瘡上
又方　燒犬尾末傅瘡日三
又方　燒白死蛇一枚令焦末內瘡孔中
又方　以頭垢少少內瘡中
又方　鼠屎臘月猪膏和傅之外臺方云用鼠一枚猪膏煎傅之

又方　火炙蠟以灌瘡中
又方
　飲生薑汁一升小品方云治狂犬咬韭汁亦佳外臺方云亦治已差後復發者
又方　以熱牛屎塗之佳
又方　以苦酒和灰塗瘡中
又方
　水洗瘡任血出勿止之水洗不住取血自止以綿裹之差
治小兒狗齧方
　月一日以水一升灌之勿令狗王打狗若月盡日三外水灌之
治猪齧方
　松脂煉作餅子貼上

又方　屋霤中泥塗上
被打第三論一首
方九十三首

論曰凡破打損血悶搶心氣絕不能言可壁開口尿中令下咽即醒又墮落車馬及車輾木打已死者以死人安著以手袖掩其口鼻眼上壹食頃活眼開與熱小便貳升

治被打擊頭眼青腫方

灸肥猪肉令熱搶上（肘後方云治血聚皮膚間不消散者）

又方　灸猪肝貼之

又方　新熱羊肉封之

又方　大豆黃末水和塗之

又方　墻上朽骨唾於石上研摩塗之乾即易

治從高墮傷折疾痛煩躁啼叫不得臥方

取鼠屎燒末以猪膏和塗痛上即急裹之（肘後方云又裹骨破碎）

治從高墮下及爲木石所迮或因落馬凡傷損血瘀凝積氣絕欲死無不治之方

取淨土五升蒸令溜分半以故布數重裹之以熨病上勿令大熱恐破肉冷則易之取痛止即已凡有損傷皆以此法治之神效已死不能言者亦活三十年者亦差

治墮車馬間馬鞍及諸物隱蹙體肉斷方

以酢和麪塗之

當歸散治落馬墮車諸傷腕折臂脚痛不止方

當歸　桂心　澤蘭（各六分）　芍藥　蜀椒　附子（各二分）　甘草（五分）

右七味並熬令香治下篩酒服方寸匕日三凡是傷損皆服之十日愈小兒亦同（救急方云治墜馬落車被打傷腕折臂叫喚痛聲不絕服此散吟吸）

之間不復人痛十三日筋骨相連

黃耆散治腕折方

黃耆　芍藥各三兩　當歸　乾地黃
附子　續斷　桂心　乾薑
通草各二兩　大黃一兩　蜀椒一合　烏頭半兩

右十二味治下節酒服方寸匕日三

治折骨續筋方

乾地黃　當歸　羌活　苦參各二分

右四味治下節酒服五分匕日三　千金翼無大黃

治腕折骨損痛不可忍者方

以大麻根及葉擣取汁飲一升無生麻煮乾麻汁服亦主墮墜撾打瘀血心腹滿短氣

治被傷筋絕方

取蟹頭中腦及足中髓熬之內瘡中筋即續生

治腕折四肢骨碎及筋傷蹉跌方

生地黃不限多少熟擣用薄所損傷處　肘後方去小品方闌擣熬之以裹傷處以竹綳夾裹令遍綳令急勿令轉動一日可十易三日差若血聚在折處以刀子破去血重物所頻迮得瘀血者

治四肢骨碎筋傷蹉跌方

以水二升漬豉三升取汁服之

又方

酒服鹿角散方寸匕日三肘後方治從高墮下若爲

又方　羊腦一具　胡桃脂

右四味擣和調如膏傳生布裹之

又方　筋骨傷初破時以熱馬屎傳之無瘢

又方

大豆二升水五升煮取二升以淳酒六七升合和豆

汁服之一日盡如湯沃雪附後方去滓一進熱血無大豆用小豆佳

治頭破腦出中風口噤方

大豆一斗熬去腥勿使太熟擣末熟蒸之氣徧合甑下盆中以酒一斗淋之溫服一升覆取汗傳杏人膏

療上

治被傷風入四體角弓反張口噤不能言或產婦墮胎凡得此者用紫湯大重者不過五劑方在第八卷中

治被打傷破腹中有瘀血方

蒲黃一升　當歸　桂心各三兩

右三味治下篩以酒服方寸匕日三夜一

又方

劉寄奴　延胡索　骨碎補各一兩

右三味㕮咀以水二升煎取七合復內酒及小便各一合

熱溫頓服

又方

生地黃汁三升酒一升半煮取二升七合分三服附後方治從高墮下瘀血心面青短氣欲死者服

又方　未詳若子傳療上

蠐螬　蜚蠊

桂心二兩　大黃五兩

水蛭十枚各三　桃人五十枚

右六味㕮咀以酒水合五升煮取三升分五服

治被打腹中瘀血并治婦人瘀血消之爲水白馬蹄散方

白馬蹄燒令煙盡擣篩酒服方寸匕日三夜一

治有瘀血若其人喜忘不欲聞人聲胷中氣塞短氣方

甘草兩　茯苓二兩　杏人五十枚

右三味㕮咀以水二升煮取九合分二服

治被毆擊損傷聚血腹滿煩悶方

豉一升以水三升煮三沸分再服不差更作豉如上法

子煮如豉法不差更作豉如上法

治丈夫從高墮下傷五藏微者唾血甚者吐血及金瘡傷經崩中皆主之方

阿膠　艾葉

右四味㕮咀以水八升煮取三升去滓內膠令消分二服

羸人三服兼治女人產後崩傷下血過多虛喘腹中絞痛下血不止者服之悉愈

治男子傷絶或從高墮下傷五藏微者唾血甚者吐血及金瘡傷經者大膠艾湯方

阿膠二兩　乾地黃　芍藥各三兩　乾薑一兩　甘草　當歸

右八味㕮咀以水八升煮取三升去滓內膠令烊分再服

羸人三服此湯治婦人產後崩傷下血過多虛喘欲死腹中激痛下血不止者神良

治墮馬落車及樹崩血腹滿短氣方

大豆五升以水一斗煮取二升去豆一服令盡劇者不過三作

治腹中瘀血痛在腹中不出滿痛短氣大小便不通方

荊芥半分　蠐螬三十枚　大黃　芍藥各三兩　蒲黃五兩　當歸　桂心　甘草各三兩　桃人三十枚

右九味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

桃人湯治從高墮下落大木車馬傷腹中有血不得氣息方

桃人十四枚　大黃　消石　甘草各一兩

蒲黃一兩半　大棗一枚十

右六味㕮咀以水三升煮取一升絞去滓適寒温盡服之當下下不止漬麻汁一柸飲之即止

治墮落瘀血桃人湯方

桃人五十枚　大黃四兩　芒消三兩　桂心當歸

甘草各二兩　蚼蟲　水蛭各二十枚

右八味㕮咀以水八升煮取三升絞去滓適寒温服一升日三服深師方無芒消

治瘀血湯方

大黃五兩　桃人五十枚　蚼蟲　蠐螬

水蛭各三十枚　桂心二兩

右六味㕮咀以酒水各五升合煎得三升適寒温飲一升日三服

竹皮湯治為兵杖所加木石所迮血在胷背及脇中痛不得氣息方

青竹刮取箔炙令焦燥合擣之下篩以酒一升煮之沸止一服盡之三服愈

治腕折瘀血方

大黃如指節大一枚　雞子大二枚　亂髮雞子大二枚

右三味以布方廣四寸以繞亂髮燒之㕮咀大黃桃人以酒三升煮取一升盡服之血盡出

乱髮如雞子大灸久用敗蒲蓆一握長三尺灸桃人肆拾玖枚多少煎湯成內酒蒲蓆半領煎湯以浴一大盞次下大黃分温為三服別剉敗差利及浴水赤勿悔即瘀血也

又方

桃人四十枚　亂髮一握

酒三升煮取一升盡服之血盡出肘後云仲景方用大黃三兩緋帛子如手大灸

衣被密覆服藥須通利數行痛楚立

大黃六兩　桂心二兩　桃人六十枚

右三味咬咀以酒六升煮取三升分三服當下血差

治從高墮下有瘀血方

蒲黃八兩　附子一兩

右二味爲末酒服方寸匕日三不知增之以意消息

從高墮下崩中方

當歸　大黃各三分

右二味治下篩酒服方寸匕日三

治墮落車馬心腹積血嗢吐無數方

乾藕根末以酒服方寸匕日三如無取新者擣汁服

治腕折瘀血蒲黃散方

蒲黃一分　當歸

右二味治下篩先食酒服方寸匕日三

治腕折瘀血方

蛀蟲二十枚去翅足　牡丹

右二味治下篩酒服方寸匕血化爲水備急方云治久宿不去者二味等分

又方　萹蓄草汁飲之亦可服子

又方

凡被打及產後惡血及一切血皆煮續骨木汁三升飲之

治杖瘡方

石灰一斗　新猪血

右二味和爲丸熟燒之破更丸燒三徧止末傳之

又方　服小便良

又方　益月下土細末油和塗羊皮上臥之

治竹木刺在皮中不出方
羊屎燥者燒作灰和豬脂塗刺上若不出重塗乃言不覺刺出時一云用乾羊屎末
治久刺不出方
服王不留行即出兼取根末貼之
治刺在人肉中不出方
煮山韮麥汁飲之日三差止
又方
用牛膝根莖生者併擣以薄之即出瘡雖已合猶出也
又方 温小便漬之
又方 嚼敗塗之
又方 嚼白梅以塗之 附後方 用烏梅
又方 白茅根燒末以膏和塗之亦治瘡因風致腫

又方 燒鹿角末以水和塗之立出久者不過一夕
治竹木刺不出方
薔薇灰水服方寸匕日三十日刺出
又方 燒鼈盆柄灰酒服二寸匕
又方 酸棗核燒末服之
又方 頭垢塗之即出
治惡刺方
苦瓠開口內小兒尿煮兩三沸浸病上
又方 莨菪根水煮漫之冷復易神方
又方 濃煮大豆汁漬取差
又方 李葉棗葉擣絞取汁點之即效
治惡刺并狐尿刺方
以烏父驢尿漬之

又方　白馬尿温漬之

凡因瘡而腫痛劇者數日死或中風寒或中水或中狐尿刺

治之方

燒黍穰若牛馬屎若生桑條取得多煙之物燒熏汁出愈

又方　熱蝸肉瘡中新瘡亦善

又方

以鳧公英草摘取根莖白汁塗之惟多塗爲佳差止

余以貞觀五年七月十五日夜左手中指肯觸着庭樹至曉遂患痛不可忍經十日痛曰深瘡曰高大色如熟小豆色嘗聞長者之論有此治方試復爲之手下則愈痛亦即除瘡亦即差不過十日尋得平復此大神効故疏之蜀人名冒瓜菜關中名苟乳

治瘡中水腫方

山灰白灰胡粉等分脂和塗瘡孔上水出痛即止

治卒刺手足中水毒方

擣韭及藍置上以火炙熱徹即愈

治瘡因風致腫方

櫟木根皮一斤濃煮內塩一把漬之

治破傷風腫方

厚塗杏人膏然麻燭遥炙之

凡因瘡而腫痛者皆中水及中風寒所作其腫入腹則殺人

治之方

温桑灰汁漬冷復温之常令熱神秘

治刺傷中風水方

刮箭羽下漆塗之

又方　燒魚目灰傅之

又方　服黑牛熱泉一服二升三服即止

又方　煮韭熟搗之

又方　蠟一兩熱炙尉薄裹上令水出愈

凡八月九月中刺手足犯惡露腫殺人不可輕也治之方

生桑枝三枚內瘡灰中推引之令極熱斫斷正以頭

柱瘡口上熱盡即易之盡三枚則瘡自爛仍取薤白

擣細裹著熱灰中使極熱去綿取薤白薄瘡上以布

帛急裹之若有腫者便取之用薤白第一佳

治漆瘡方

生柳葉三斤以水一斗五升細切煮得七升適寒溫

洗之曰三（附後方云柳皮尤妙）

又方　以磨石下淳泥塗之取差止大驗

又方　蓮葉燥者一斤以水一斗煮取五升洗瘡上曰再

又方　貫衆治末以塗上乾以油和之即愈

又方　羊乳汁塗之

又方　芒消五兩湯浸以洗之

又方　礬石著湯中令消洗之

又方　七姑草擣封之（救急方云七姑草和芒消塗之）

又方　取猪膏塗之

又方　宜豬猪肉爵穀塗之

又方

濃煮鼠杳葉以洗漆上亦可擣葉取汁以塗之

火瘡第四（論二首　呪法二首）　方七十三首

論曰凡火燒損慎以冷水洗之火瘡得冷熱氣更深轉入骨

壞人筋骨難差初被火燒急以向火炙雖大痛強忍之一食

久即不痛神驗治火燒悶絶不識人以新尿冷飲之及冷水和蜜飲之口噤紋開與之然後治之方

梔子 枚四十　白斂　黃芩 酪五

右三味㕮咀以水五升合煎令水氣歇去滓冷之以淋瘡令溜去火熱毒則肌得寬也作二日任意用膏傅湯散治之

治火瘡敗壞方

柏白皮　生地黃　蛇銜　黃芩

梔子人　苦竹葉 酪一分

右六味㕮咀以羊髓半升煎之三上三下去滓塗瘡上差止

治火爛瘡膏方

柏白皮 四兩　竹葉

右三味㕮咀以猪脂一斤半煎三上三下去滓冷以傅之

又方　榆白皮嚼熟塗之

治火燒瘡方

死鼠頭一枚臘月猪膏煎令消盡以傅乾即傅差不作瘢神効亦治小兒火瘡

又方　丹參無多少以羊脂猪髓腦煎

治火瘡敗壞方

柏白皮切以臘月猪膏合淹相得煮四五沸色變去滓傅瘡上 附後方云桃白皮

治火瘡方

末熬油麻和梔子人塗之惟厚為佳已成瘡者燒白糖灰粉之即燥立差

治一切湯火所傷方

初著即以女人精汁塗之差

治湯沃人肉爛壞方

杏人 附子各二兩 甘草一兩 羊脂五兩 松脂雞子大

右五味咬咀以不中水豬膏五兩煎塗之

灸及湯火所損晝夜啼呼止痛滅瘢方

羊脂 松脂各二分 豬膏一 蠟各一分

右四味取松脂破銚中切脂膠爵蠟著松明上少傾微火燒

諸物皆消以盃承汁傳松明是肥松木節也

治灸瘡方

甘草 當歸各一兩 羊脂各六分 蠟三兩

右四味咬咀以猪膏五合煎去滓傳之

又方 凡灸瘡不差日別灸上六七壯自差

又方 松脂五兩 胡麻卅臺用 羊脂各六分 蠟三兩

右三味合煎塗紙貼之日三

又方 塗車軸脂

又方

石灰一兩細末絹篩猪脂和相得微火上煎數沸以

煖湯先洗瘡訖以布裹灰熨瘡上三過便以藥貼瘡

上灸之又擣薤傳之

治灸瘡痛腫急方

擣竈下黃土以水和煮令熱漬之

治灸瘡薤白膏生肉止痛方

薤白貳兩 羊髓壹合

右四味咬咀合煎以白芷色黃藥成去滓取傳之日三

灸瘡膿壞不差方

臘月猪脂壹升 薤白壹握 當歸貳兩 白芷壹合

胡粉壹兩

右三味先煎薤白令黃去之綿裹石灰一兩煎數沸去之入胡粉內膏中令調塗故布貼之日三

又方　白蜜一合　烏賊骨貳枚壹兩

右二味相和塗之

治灸瘡中風冷腫痛方

但向火炙之瘡得熱則瘡快至痛止日六七炙愈

治針灸瘡血出不止方

燒人屎灰以傅之

又方　死蜣螂末豬脂塗之

論曰治金瘡者無大小冬夏及始初傷血出便以石灰厚傅裹之既止痛又速愈無石灰亦可用若瘡甚深未宜速合也凡金瘡出血其人必渴當忍之者內少滑石令瘡不時合也凡金瘡出血其人必渴當忍之噉燥食并肥脂之物以止渴慎勿鹹食若多飲粥及漿犯即血動溢出殺人又忌嗔怒大言笑思想陰陽行動作勞多食酸鹹飲酒熱羹臛膻葷瘡差後猶爾出百日半年乃可復常也治金瘡大散方

五月五日平旦使四人出四方各於五里內採一方草木莖葉每種各半把勿令漏脫一事日正午時細切碓擣并石灰極令爛熟一石草斷一斗石灰先鑿桑樹皮蔽之以麻擣石灰極密泥之令不泄氣又以桑皮纏之使牢至九月九日午時取出陰乾百日藥成擣之日暴令乾更擣綃篩貯之凡一切金瘡傷折出血登時以藥封裹治使牢勿令動轉不過十日即差不腫不膿不畏風若傷後數日始得藥須煖水洗之令血出即傅之此藥大驗平生無事宜多合之以

備急卒金瘡之要無出於此雖突厥質汗黃未
能及之肘後方云用百草心五月五日作七月七日出

治金瘡方

燒乾梅作炭擣末之傳一宿即差亦治被打傷

又方 礜石末傳之止痛斷血

又方 桑白皮裹或石灰封之妙

又方 麻葉三斤以水三升小品方治毒箭所傷熟煮取二升半爲一服

又方 飲麻子汁數升

又方 蚯蚓屎以水服方寸匕日三

又方 杏人石灰細末猪脂和封亦主犬馬金瘡止痛大良

地黃膏治金瘡火瘡灸瘡不能差方

生地黃 切壹升擣絞取汁三合 薰陸香 松脂各貳兩 羊腎脂伍合煎杏人 蠟各貳兩 石鹽壹兩研如粉

烏麻油貳升

右八味先下蠟微火令消次內羊脂令消次下油次下松脂令消次下杏人次下薰陸次下地黃汁次下石鹽以微火煎之令地黃汁水氣盡以綿濾停凝一切諸瘡初傷皆傳之日三夜二愼生冷猪肉雞魚此膏治瘡法先食惡肉不著痂先從內差乃至平復無痂不畏風不膿大大要妙

治金瘡血出不止方

煮桑根十沸服一升即止

又方 柳絮封之

又方 擣車前汁傳之血即絶連根收用亦效

又方 以人精塗之

又方 飲人尿三升愈

又方 以蜘蛛幕貼之血即止

治驚瘡血出不止方

取葱葉炙取汁塗瘡上即止若爲婦人所驚者取婦
人中衣火炙令熱以熨瘡上

又方

取豉三升漬熱湯食頃絞去滓內蒲黃三合頓服之
及作紫湯方在產婦中

又方　蒲黃一升　當歸二兩

右二味治下篩酒服方寸匕日二服

治金瘡腹中瘀血二物湯方

大麻子三升　大葱白二十枚

右使數人各擣令熟著九升水煮取一升半頓服之若血
出不盡腹中有膿血更合服當吐膿血耳

治金瘡出血多虛竭內補散方

蒗蓉　甘草　芍藥　乾薑各一兩　蜀椒三兩　乾薑二兩

當歸　芎藭　桂心　黃芩　人參

厚朴　吳茱萸　白及　阿膠　黃耆各一兩

右十四味治下篩以酒服方寸匕日三

又方

當歸三兩　芍藥五分　乾薑三分　辛夷五分　甘草二分

右五味治下篩酒服方寸匕日三夜一

治金瘡內漏方

還自取瘡中血著拯中水和服愈

又方　七月七日麻勃一兩　蒲黃二兩

右二味酒服一錢匕日五夜三

治金瘡內漏血不出方

牡丹皮爲散水服三指撮立尿出血

治金瘡內塞散方

黃耆　當歸　苦參　白芷
乾薑　黃芩　芍藥　續斷 酪二兩
附子 酥兩枚　細辛 一兩　鹿茸 三兩

右十一味治下篩先食酒服五分匕日三稍增至方寸匕

治金瘡煩滿方

赤小豆一升以苦酒漬之熬令燥復漬滿三日令色黑服方寸匕日三

治金瘡苦痛方

楊木白皮熬令燥末之服方寸匕日三又末傅瘡中愈

凡金瘡若刺瘡瘡痛不可忍百治不差者方

葱一把以水三升煮令數沸漬洗瘡止痛良

治金瘡煩痛大便不利方

大黃　黃芩

右二味等分末之蜜和先食服如梧桐子十九日三

治金瘡破腹腸突出欲令入方

取人屎乾之以粉腸即入矣

治金瘡中筋骨續斷散方

續斷 五兩　乾地黃　當歸　苁蓉　甘草　附子 酪各一兩　芎藭　細辛　蛇銜　地榆 酪四兩

右十五味治下篩酒服一方寸匕日三

治被傷腸出不斷者方 附後方云治腸出欲作大麥粥汁洗腸推內之常研米粥飲之二十日稍稍作強糜百日後乃可歩耳

滋石　滑石　鐵精 酪三兩

右三味末粉腸上後用磁石米飲服方寸匕日五夜二腸即入

治金瘡血不止令噀之法

呪曰某甲今日不良爲某所傷上告天皇下告地王清血莫出濁血莫揚良藥百裹不如熟噀日二七痛噀之即止

又法

我按先師本法男師在左女師在右上白東王公下白西王母北斗七星黃姑織女請制水之法清旦明呪不痕不膿不疼不痛羅肺得肺羅肝得肝羅肉得肉不任軀姥僊夫自來小兒爲曰不吉不良某甲爲刀斧槊箭熊虎湯火所傷三噀三呵平復如故急急如律令此法不復須度受但存念稽急敬誦之非止治百毒所傷亦治癰疽隨所患轉後語呼之良驗一切瘡毒並皆用之

治金瘡矢在肉中不出方

白斂　半夏

右二味等分治下篩酒服方寸匕日三淺瘡十日出深瘡二十日出終不住肉中

治箭鏃及諸刃在咽喉胷膈諸隱處不出者方

牡丹皮一分　白蘞二分　肘後作白斂

右二味治下篩以酒服方寸匕日三出

又方　取栝樓汁塗箭瘡上即出

又方　酒服瞿麥方寸匕日三差

治卒爲弓弩矢所中不出或肉中有聚血方

取女人月經布燒作灰屑酒服之

治卒被毒矢方

擣藍汁一升飲之并薄瘡上若無藍取青布漬絞汁飲之并淋瘡中鏃不出擣死鼠肝塗之鼠腦亦得

又方　內鹽臍中灸之

又方　煎地黃汁作丸服之百日矢當出

又方　煮蘆根汁飲三升

又方　多飲葛根汁并治一切金瘡

治中射罔箭方

藍子五合　升麻八兩　甘草　王不留行各四兩

右四味治下篩冷水服二方寸匕日三夜二又以水和塗瘡乾易之

治毒箭所中方

末雄黃傳之當沸汁出愈

又方　末貝齒服一錢匕大良

又方　擣葛根汁飲之葛白屑熬黃傳瘡止血

治針折入肉中方

刮象牙末水和聚著折針上即出

又方　以鼠腦塗之

又方　磁石吸鐵者著上即出

備急千金要方卷第二十五

金澤文庫

備急千金要方卷第二十六 食治

朝奉郎守秘書少卿兼校理判登聞檢院護軍賜緋魚袋臣林億等校正

序論第一
果實第二
菜蔬第三
穀米第四
鳥獸第五 虫魚附

金澤文庫

序論第一

仲景曰人體平和惟須好將養勿妄服藥藥勢偏有所助令人藏氣不平易受外患夫含氣之類未有不資食以存生而不知食之有成敗百姓日用而不知水火至近而難識余慨其如此聊因筆墨之暇撰五味損益食治篇以啓童稚庶勤而行之有如影響耳

河東衛汎記曰扁鵲云人之所依者形也亂於和氣者病也理於煩毒者藥也濟命扶危者醫也安身之本必資於食救疾之速必憑於藥不知食宜者不足以存生也不明藥忌者不能以除病也斯之二事有靈之所要也若忽而不學誠可悲夫是故食能排邪而安藏腑悅神爽志以資血氣若能用食平痾釋情遣疾者可謂良工長年餌老之奇法極養生之術也夫爲醫者當須先洞曉病源知其所犯以食治之食療不愈然後命藥藥性剛烈猶若御兵之猛暴豈容妄發發用乖宜損傷處衆藥之投疾殃濫亦然高平王熙稱食不欲雜雜則或有所犯有所犯者或有所傷或當時雖無災苦積久爲人作患又食噉魚肉果實取益人者而食之凡常飲食每令節儉若貪味多餐臨盤大飽食訖覺腹中彭亨短氣或致暴疾仍爲霍亂又夏至以後迄至秋分必須愼

肥膩餅臛酥油之屬此物與酒漿瓜果理極相妨夫在身所以多疾者皆由春夏取冷太過飲食不節故也又魚鱠諸腥冷之物多損於人斷之益善乳酪酥等常食之令人有筋力膽幹肌體潤澤卒多食之亦令膿脹泄利漸漸自已

黃帝曰五味入於口也各有所走各有所病酸走筋多食酸令人癃不知何以然少俞曰酸入胃也其氣濇以收也上走兩膲兩膲之氣濇不能出入不出即流於胃中胃中和温即下注膀胱膀胱走胞胞薄以契得酸則縮卷約而不通水道不利故癃也陰者積精(作筋)之所終聚也故酸入胃走於筋也

鹹走血多食鹹令人渴何也苔曰鹹入胃也其氣走中膲注於諸脉脉者血之所走也與鹹相得即血凝凝則胃中汁泣汁泣則胃中乾渴(甲乙云注疑則胃中竭)渴則咽路焦故舌乾喜渴血脉者中膲之道也故鹹入胃走於血(皇甫士安云腎合三膲血)

脉雖屬肝心而爲中膲之道故膲入而走血也

辛走氣多食辛令人慍心何也荅曰辛入胃也其氣走於上膲上膲者受使諸氣而營諸陽者也薑韭之氣熏蒸營衛不時受之却溜於心下故慍慍痛也辛者與氣俱出故氣盛也

苦走骨多食苦令人變嘔何也荅曰苦入胃也其氣燥而涌泄五穀之氣皆不勝苦其入下管下管者三膲之道皆閉則不通不通故氣變嘔也齒者骨之所終也故苦入胃而走骨入而復出齒必稿踈(踈望甫士安云水火相濟故骨氣通於心)

甘走肉多食甘令人惡心何也荅曰甘入胃也其氣弱劣不能上進於上膲而與穀俱留於胃中甘入則柔緩柔緩則蚘動蚘動則令人惡心其氣外通於肉故甘走肉則肉多粟起而胝(皇甫士安云其氣外通於皮故曰甘入走皮矣皮者肉之蓋皮雖屬肺氣與肉連躰故甘潤肌肉并於皮也)

黃帝問曰穀之五味所主可得聞乎伯高對曰夫食風者則有靈而輕舉食氣者則和靜而延壽穀者則有智而勞神食草者則愚癡而多力食肉者則勇猛而多嗔是以肝木青色宜酸心火赤色宜苦脾土黃色宜甘肺金白色宜辛腎水黑色宜鹹肉爲五藏外主五行色配五方

五藏所合法肝合筋其榮爪心合脉其榮色脾合肉其榮脣肺合皮其榮毛腎合骨其榮髮

五藏不可食忌法多食酸則皮槁而毛夭多食苦則筋急而爪枯多食甘則骨痛而髮落多食辛則肉胝而脣寒多食鹹則脉凝泣而色變

五藏所宜食法肝病宜食麻犬肉李韭心病宜食麥羊肉杏薤脾病宜食稗米牛肉棗葵肺病宜食黃黍雞肉桃葱腎病宜食大豆黃卷豕肉栗薤(素問云肝色青宜食甘粳米牛肉棗葵皆甘心色赤宜食酸小豆犬

肉李韭皆酸肺色白宜食苦麥羊肉杏薤皆苦
鹹大豆豕肉栗藿皆鹹腎色黑宜食辛黍雞肉桃葱皆辛
五味動病法酸走筋筋病勿食酸苦走骨骨病勿食苦甘走
肉肉病勿食甘辛走氣氣病勿食辛鹹走血血病勿食鹹
五味所配法
米飯甘素問云粳米甘　麻酸素問云小豆酸　大豆鹹　麥苦　黃黍辛
棗甘　李酸　栗鹹　杏苦　桃辛　牛甘　犬酸　豕鹹
羊苦　雞辛　葵甘　韭酸　藿鹹　薤苦　葱辛
五藏病五味對治法肝苦急急食甘以緩之肝欲散急食辛
以散之用酸瀉之禁當風心苦緩急食酸以收之心欲耎急
食鹹以耎之用甘瀉之禁濕食厚衣脾苦濕急食苦以燥之
脾欲緩急食甘以緩之用苦瀉之禁溫食飽食濕地濡衣肺
苦氣上逆急食苦以泄之肺欲收急食酸以收之用辛
瀉之禁無寒飲食寒衣腎苦燥急食辛以潤之開腠理潤致

津液通氣也腎欲堅急食苦以結之用鹹瀉之无犯焠煞无
熱衣溫食是以圣毋藥攻邪五穀為養五肉為益五果為助五
菜為充精以食氣氣養精以榮色形以食味味養形以生力
此之謂也神藏有五五二十五種形藏有四方四時四季
四肢共為五九四十五以此輔神可長生久視也精順五氣
以為靈也若食氣相惡則傷精也形受味以成也若食味不
調則損形也是以聖人先用食禁以存性後制藥以防命也
故形不足者温之以氣精不足者補之以味氣味温補以存
形精歧伯云陽為氣陰為味味歸形形歸氣氣歸精精歸化
精食氣形食味化生精氣為氣氣傷於味陰味出下竅陽氣出上竅味厚者為陰薄者為陽氣厚者為陽氣薄者為陰
之陽氣厚則發泄厚則祕塞素問發熱作壯火之氣衰少火之氣壯壯火
薄則發泄厚則祕塞素問發熱作壯火之氣衰少火之氣壯壯火

食氣氣食少火壯火散氣少火生氣味辛甘發散爲陽酸苦涌泄爲陰陰勝則陽病陽勝則陰病陰陽調和人則平安春七十二日少省酸增甘以養脾氣秋七十二日少省辛增酸以養肝氣夏七十二日少省苦增辛以養肺氣秋七十二日少省辛增酸以養肝氣冬七十二日少省甘增鹹以養腎氣

果實第二十九條

檳榔味辛温澁無毒消穀逐水除淡澼殺三蟲去伏尸治寸白豆蔻味辛温澁无毒温中主心腹痛止吐嘔去口氣臭蒲桃味甘辛平无毒主筋骨濕痺益氣倍力強志令人肥健耐飢忍風寒久食輕身不老延年治腸間水調中可作酒常飲益人逐水利小便

覆盆子味甘辛平无毒益氣輕身令髮不白

大棗味甘辛熱滑无毒主心腹邪氣安中養脾氣助十二經平胃氣通九竅補少氣津液身中不足大驚四肢重可和百藥補中益氣強志除煩悶心下懸治腸澼久服輕身長年不飢神仙

生棗味甘辛多食令人熱渴氣脹若寒熱羸瘦者彌不可食傷人

藕實味苦甘寒無毒食之令人心歡止渴去熱補中養神益氣力除百病久服輕身耐老不飢延年一名水芝生根寒止熱渴破留血

雞頭實味甘平無毒主濕痺要脊膝痛補中除暴疾益精氣強志意耳目聰明久服輕身不飢耐老神仙

芰實味甘辛平無毒安中補五藏不飢輕身一名菱蕾帝云七月勿食生菱芰作蟯虫

栗子味鹹温無毒益氣厚腸胃補腎氣令人耐飢生食之甚

治腰脚不遂

櫻桃味甘平濇調中益氣可多食令人好顏色美志性

橘柚味辛温無毒主胷中瘕滿逆氣利水穀下氣止嘔欬除膀胱留熱停水破五淋利小便治脾不能消穀却胷中吐逆霍亂止瀉利去寸白久服去口臭下氣通神輕身長年一名橘皮陳久者良

津符子味苦平滑多食令人口爽不知五味

梅實味酸平濇無毒下氣除熱煩滿安心止肢體痛偏枯不仁死肌去青黒誌惡疾止下利好唾口乾利筋脉多食壞人齒

柿味甘寒濇無毒通鼻耳氣主腸澼不足及火瘡金瘡止痛

木瓜實味酸鹹温濇無毒主濕痺氣霍亂大吐下後脚轉筋不止其生樹皮無毒亦可煮用

榧實味甘平濇無毒主五痔去三蟲殺蠱毒鬼疰惡毒

甘蕉味甘平濇無毒下氣和中補脾氣利大腸止渴去煩解酒毒

奚棗味苦冷濇無毒多食動宿病益冷氣發欬嗽

羊味辛平滑有毒寬腸胃充肌膚滑中一名土芝不可多食動宿冷烏羊味苦甘微寒滑無毒主消渴癉熱益氣一名藉姑一名水萍三月採

杏核人味甘苦温冷而利有毒主欬逆上氣腸中雷鳴喉痺下氣產乳金瘡寒心奔豚驚癇心下煩熱風氣去來時行頭痛解肌消心下急殺狗毒五月採之其一核兩人者害人宜去之杏實高生味極酸其中核猶未鞕者採之暴乾食之甚止渴去冷熱毒扁鵲云杏人不可久服令人目盲眉鬚落動一切宿病

桃核人味苦甘辛平無毒破瘀血閉瘕邪氣殺小蟲治欬

逆上氣消心下鞕除卒暴赤血破瘀瘕通月水止心痛七月採凡一切果核中有兩人者並害人不在用其質味酸無毒多食令人有熱黃帝云飽食桃入水浴成淋病

李核人味苦平無毒主僵仆蹉跌血骨痛實味苦酸微溫濇無毒除固熱調中宜心不可多食令人虛黃帝云李子不可和白蜜食蝕人五內

梨味甘微酸酢寒濇有毒除客熱氣止心煩不可多食令人寒中金瘡產婦勿食令人萎困寒中

林檎味酸苦平濇無毒止渴好唾不可多食令人百脉弱

柰子味酸苦寒濇無毒耐飢益心氣不可多食令人臚脹久病人食之病尤甚

安石榴味甘酸濇無毒止咽燥渴不可多食損人肺

枇杷葉味苦平無毒主嘔不止下氣正爾削取生樹皮嚼之

少少咽汁亦可煮汁冷服之大佳

胡桃味甘冷滑無毒不可多食動痰飲令人惡心吐水吐食

枸杞葉味苦平濇無毒補虛羸益精髓諺云去家千里勿食蘿摩枸杞此則言強陽道資陰氣速疾也

蘿摩味甘平一名苦丸無毒其葉厚大作藤生摘之有白汁出人家多種亦可生啖亦可蒸煮食之補益與枸杞葉同

瓜子味甘平寒無毒令人光澤好顏色益氣不飢久服輕身耐老又除胷滿心不樂久食寒中可作面脂一名水芝一名白瓜子即冬瓜人也八月採白冬瓜味甘微寒無毒除少腹水脹利小便止消渴

凡瓜味甘寒滑無毒去渴多食令陰下瘡濕生瘡發黃疸黃帝云九月勿食被霜瓜向冬發寒熱及温病初食時即令人

欲吐也食竟心內作停水不能自消或為反胃凡瓜入水沈者食之得冷病終身不差

越瓜味甘平無毒不可多食動寒熱多瘧病積瘀血熱胡瓜味甘寒有毒不可多食令人多忘

早青瓜味甘寒無毒食之去熱煩不可久食令人多忘冬葵子味甘寒無毒主五藏六腑寒熱羸瘦破五淋利小便婦人乳難血閉久服堅骨長肌肉輕身延年十二月採葉甘寒滑無毒宜腑久食利胃氣其心傷人百藥忌食心心有毒黃帝云霜葵陳者生食之動五種流飲飲盛則吐水凡葵菜和鯉魚鮓食之害人四季之月土王時勿食生葵菜令人飲食不化發宿病

莧菜實味甘寒滑無毒主青盲白翳明目除邪氣利大小便去寒熱殺蚘虫久服益氣力不飢輕身一名馬莧一名莫實即馬齒莧菜也治反花瘡

小莧菜味甘大寒滑無毒可久食益氣力除熱不可共鼈肉食成癰瘕蕨菜亦成癰瘕

邪蒿味辛溫滑無毒主胷膈中臭惡氣利腸胃

苦菜味苦大寒滑無毒上五藏邪氣厭穀胃痺腸澼大渴熱中暴疾惡瘡久食安心益氣聰察少卧輕身耐老耐飢寒一名荼草一名選一名遊冬冬不死四月上旬採

薺菜味甘溫滑無毒利五藏輕身益氣宜久食蕪菁子明目九蒸暴療黃疸利小便久服神仙根主消風熱毒腫不可多食令人氣脹

菘菜味甘溫滑無毒久食通利腸胃除胷中煩解消渴本是

蔓菁也種之江南即化爲菘亦如枳橘所生土地隨變
芥菜味辛温無毒歸脾除腎邪大破敎逆下氣利九竅明耳
目安中久食温中又云寒中其子味辛辛亦歸脾有毒主喉
痺去一切風毒腫黄帝云芥菜不可共兎肉食成惡邪病
苜蓿味苦平滿無毒安中利人四體可久食
荏子味辛温無毒主敎逆下氣温中補髓其葉主調中去臭
氣九月採陰乾用之油亦可作油衣
蔘實味辛温無毒明目温中解肌耐風寒下水氣面目浮腫
却癰疽其葉辛歸舌治大小腸邪氣利中益志黄帝云蔘食
過多有毒發心痛和生魚食之令人脫氣陰核疼痛求死婦
人月事來不用食蔘及蒜喜爲血淋帶下二月勿食蔘傷人
腎扁鵲云蔘久食令人寒熱損骨髓殺丈夫陰氣少精
葱實味辛温無毒宜肺辛歸頭明目補中不足其莖白平滑

可作湯主傷寒寒熱骨肉碎痛能出汗治中風面目浮腫喉
痺不通安胎殺桂其毒門葉温辛歸目除肝中邪氣安中利五
藏益目精發黄疸殺百藥毒其根鬚平主傷寒頭痛葱中涕
及生葱汁平滑止尿血解藜蘆及桂毒黄帝云食生葱即嘔
蜜變作下利食燒葱并嘔蜜擁氣而死正月不得食生葱令人
面上起遊風
格葱味辛微温無毒除瘴氣惡毒久食益膽氣強志其子主
洩精
薤味苦辛温滑無毒宜心辛歸骨主金瘡瘡敗能生肌肉輕
身不飢耐老菜芝也除寒熱去水氣温中散結氣利產婦病
人諸瘡中風寒水腫生擣傅之鯁骨在咽不下者食之則去
黄帝云薤不可共牛肉作羹食之成瘕疾韭亦然十月十一
月十二月勿食生薤令人多涕唾

韭味辛酸温濇無毒辛歸心宜肝可久食安五藏除胃中熱不利病人其心腹有固冷者食之必加劇其子主夢泄精尿色白根煮汁以養髮黃帝云霜韭凍不可生食動宿飲飲盛必吐水五月勿食韭損人滋味令人乏氣力二月三月宜食韭大益人心

白蕺荷味辛微温濇無毒主中蠱及瘡病搗汁服二合日二生根主諸瘡

荼菜味甘苦大寒無毒時行壯熱解風熱惡毒

紫蘇味辛微温無毒下氣除寒中其子尤善

雞蘇味辛微温濇無毒主吐血下氣一名水蘇

羅勒味苦辛温平濇無毒消停水散毒氣不可久食濇榮衛諸氣

燕萁味辛平熱滑無毒主五内邪氣散皮膚骨節中淫淫温行毒去三蟲能化宿食不消逐寸白散腹中温温喘息一名無姑一名藪藩盛器物中甚辟水蛭其氣甚臭此即山榆子作之凡榆葉味甘平滑無毒主小兒癇小便不利傷暑熱困悶煮汁冷服生榆白皮味甘冷無毒利小便破五淋花主小兒頭瘡

胡荽子味酸平無毒消穀能復食味葉不可久食令人多忘華佗云胡荽菜患胡臭人患口氣臭齒齒人食之加劇腹内患邪氣者彌不得食食之發宿病金瘡尤忌

海藻鹹寒滑無毒主癭瘤結氣散頭下鞕核痛者腸内上下雷鳴下十二水腫利小便起男子陰氣

昆布味鹹寒滑無毒下十二水腫癭瘤結氣瘿瘡破積聚

菌菖味辛平無毒安心氣養五藏補中益氣長毛髮久食不死白

兔食之仙

吳茱萸一名蜀茱味甘微寒滑無毒花定心氣葉除客熱利腸
胃不可久食鈍人志性若食之被狗齧者瘡永不差
藿味鹹寒滑無毒宜腎主大小便數去煩熱
香菜味辛微温主霍亂腹痛吐下散水腫煩心去熱
甜瓠味甘平滑無毒主消渴惡瘡鼻口中肉爛痛其葉味甘
平主耐飢肥鵲云患脚氣虛脹者不得食之其患永不除
薄味甘寒滑無毒主消渴熱痺多食動痔病
落葵味酸寒無毒滑中散熱實悅澤人面一名天葵一名蘩露
蘩蔞味酸平無毒主積年惡瘡痔不愈者五月五日日中採
之即名滋草一名雞腸草乾之燒作焦灰用扁鵲云丈夫患
惡瘡陰頭及莖作瘡膿爛疼痛不可堪忍久不差者以灰一
分蚯蚓新出屎泥二分以少水和研緩如煎餅熨以泥瘡上
乾則易之禁酒麪五辛并熱食等黃帝云蘩蔞合鮑魚食之
發消渴病令人多忘別有一種近水渠中溫濕處冬生其狀
類胡荽亦名雞腸菜可以療痔病一名天胡荽
蕺味辛微温有小毒主蠷螋尿瘡多食令人氣喘不利人腳
多食腳痛
葫味辛温有毒辛歸五藏散癰疽瘡除風邪殺蠱毒氣
獨子者最良黃帝云生葫合青魚鮓食之令人腹內生瘡腸
中腫又成疝瘕多食生葫行房傷肝氣令人面無色四月八
月勿食葫傷人神損膽氣令人喘悸脇肋氣急口味多爽
小蒜味辛温無毒辛歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃氣
温中除邪痺毒氣五月五日採暴乾葉主心煩痛解諸毒小
兒丹瘭不可久食損人心力黃帝云食小蒜噉生魚令人奪氣
陰核疼求死三月勿食小蒜傷人志性
茗葉味苦鹹酸冷無毒可久食令人有力悅志微動氣黃帝

云不可共韭食令人身重
蕃荷菜味苦辛温無毒可久食却腎氣令人口氣香潔主辟
邪毒除煩斈瘥形瘦疲倦者不可久食動消渴病
蒼耳子味苦甘温葉味苦辛微寒滑有小毒主風頭寒痛風
濕痺四肢拘急攣痛去惡肉死肌膝痛溪毒久服益氣耳目
聰明強志輕身一名胡菜一名地葵一名蝳施一名常思蜀
人名羊負來秦名蒼耳魏人名隻刺黃帝云戴甲蒼耳不可
共猪肉食害人食甜粥復以蒼耳甲下之成走注又患兩脇
立秋後忌食之
食菜黃味辛苦大温無毒每九月採停陳久者良其子閉口者
有毒不任用止痛下氣除欬逆去五藏中寒冷温中諸冷實
不消其生白皮主中惡腹痛止齒痠其根細者去三蟲寸白
黃帝云六月七月勿食菜黃傷神氣令人起伏氣咽喉不通
徹賊風中人口僻不能語者取菜黃一升去黑子及合口者
好豉三升二物以清酒和煮四五沸取汁冷服半升日三得小
汗差蠆螫人嚼菜黃封上止
蜀椒味辛大熱有毒主邪氣温中下氣留飲宿食能使痛者
癢癢者痛久食令人之氣失明主欬逆逐皮膚中寒冷去死
肌濕痺痛心下冷氣除五藏六腑寒百骨節中積冷温痺大
風汗自出者止下利散風邪合口者害人其中黑子有小毒
下水仲景云熬用之黃帝云十月勿食椒損人心傷血脉
乾薑味辛熱無毒主肩中滿欬逆上氣温中止漏血出汗逐
風濕痺腸辟下利寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚
間結氣止唾血生者尤良
生薑味辛微温無毒辛歸五藏主傷寒頭痛去淡下氣通汗
除鼻中塞欬逆上氣止嘔吐去肾膈上臭氣通神明黃帝云

八月九月勿食薑傷人神損壽胡居士云薑殺腹內長蟲久
服令人少志少智傷心性
葷葵味苦平無毒久服除人心煩急動痰冷身重多懈惰
芸臺味辛寒無毒主霧腳痛者不可食必加
劇又治油腫丹毒益胡臭解禁呪之葷出五明經其子主夢
中泄精與鬼交者胡居士云世人呼爲寒菜甚辣胡臭人食
之病加劇隴西兵羌中多種食之
竹笋味甘微寒無毒主消渴利水道益氣力可久食患冷人
食之心痛
野苣味苦平無毒久服輕身少睡黃帝云不可共蜜食之作
痔白苣味苦平無毒益筋力黃帝云不可共酪食必作蟲
茴香菜味苦辛微寒濇無毒主霍亂辟熱除口氣臭肉和水
煮下少許即無臭氣故曰茴香醬臭末中亦香其子主蛇咬
瘡久不差搗傅之又治九種腫瘻
蕈菜味苦寒無毒主小兒火丹諸毒腫去暴熱
藍菜味甘平無毒久食大益腎填髓腦利五藏調六腑胡居
士云河東隴西羌胡多種食之漢地尠有其葉長大厚煮食
甘美經冬不死春亦有英其花黃生角結子子甚治人多睡
萹竹葉味苦平濇無毒主浸淫瘙疹疥殺三蟲女人陰蝕
扁鵲云煮汁與小兒冷服治蛔蟲
斷菜味苦酸冷濇無毒益筋力去伏熱治五種黃病生瘕絞
汁冷服一升日二黃帝云五月五日勿食一切菜發百病凡
一切菜熟煮熱食時病差後食一切肉并蒜食音行房病發
必死時病差後未健食生青菜者手足必青腫時病差未健
食青菜音行房病更發必死十月勿食被霜菜令人面上無
光澤目濇痛又瘧發心痛暑疼或致心瘧發時手足十指爪皆

青困瘧

穀米第四十七條

薏苡人味甘温無毒主筋拘攣不可屈伸久風濕痺下氣久服輕身益力其生根下三蟲名醫云薏苡人除筋骨中邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食一名薏苡一名感米蜀人多種食之

胡麻味甘平無毒主傷中虛羸補五内益氣力長肌肉填髓腦堅筋骨療金瘡止痛及傷寒温瘧大吐下後虛熱困乏久服輕身不老明耳目耐寒暑延年作油微寒主利大腸產婦胞衣不落生者摩瘡腫生秃髮去頭面遊風一名巨勝一名狗虱一名方莖一名鴻藏葉名青蘘主傷暑熱花主生秃髮七月採最上摽頭者陰乾用之

白麻子味甘平無毒宜肝補中益氣肥健不老治中風汗出逐水利小便破積血風毒腫復血脉產後乳餘疾能長髮可爲沐藥久服神仙

粳味甘微温無毒補虛冷益氣力止腸鳴咽痛除唾血却卒噉大豆黄卷味甘平無毒主久風濕痺筋攣膝痛除五藏胃氣結積益氣止毒去黑誌面黡潤澤皮毛宜腎生大豆味甘平冷無毒生擣淳酢和塗之治一切毒腫并止痛煮汁冷服之殺鬼毒逐水脹除胃中熱却風痺傷中淋露下瘀血散五藏結積内寒殺烏頭三建解百藥毒不可久服令人身重其熬屑味甘温平無毒主胃中熱去身腫除痺消穀止腹脹九月採黄帝云服大豆屑忌食猪肉炒豆不得與一歲已上十歲已下小兒食食音噉猪肉必擁氣死

赤小豆味甘鹹平冷無毒下水腫排膿血一名赤豆不可久服令人枯燥

青小豆味甘鹹温平濇無毒主寒熱熱中消渴止泄利小便除吐逆卒澼下腹脹滿一名麻累一名胡豆黄帝云青小豆合鯉魚鮓食之令人肝至五年成乾痟病

大豆豉味苦甘寒濇無毒主傷寒頭痛寒熱辟瘴氣惡毒煩躁滿悶虚勞喘吸兩脚疼冷殺六畜胎子諸毒

大麥味鹹微寒滑無毒宜心主消渴除熱久食令人多力健行作蘗温消食和中熬末令赤黒擣作麨止泄利和清醬漿服之日三夜一服

小麥味甘微寒無毒養肝氣去客熱止煩渴咽燥利小便止漏血唾血令女人孕必得易作麪六月作者温無毒主小兒癇食不消下五痔蟲平胃氣消穀止利作麪温無毒不能消熱止煩不可多食長宿癖加客氣難治

青粱米味甘微寒無毒主胃痺熱中除消渴止泄利利小便

白粱米味甘微寒無毒除煩熱益氣

粟米味鹹微寒無毒養腎氣去骨痺熱中益氣

陳粟米味苦寒無毒主胃中熱消渴利小便

丹黍米味苦微温無毒主乾逆上氣霍亂止泄利除熱去煩渴白黍米味甘辛温無毒宜肺補中益氣不可久食多熱令人煩黄帝云五種黍米合葵食之令人成痼疾又以脯腊著五種黍米中藏儲食之云令人閉氣

陳廩米味鹹酸微寒無毒除煩熱下氣調胃止泄利黄帝云久藏脯腊安米中滿三月人不知食之害人

蘗米味苦微温無毒主寒中下氣除熱

秫米味甘微寒無毒主寒熱利大腸治漆瘡
酒味苦甘辛大熱有毒行藥勢殺百邪惡氣黃帝曰暴下後
飲酒者膈上變爲伏熱食生菜飲酒莫炙腹令人腸結偏鷰
云久飲酒者腐腸爛胃潰髓蒸筋傷神損壽醉當風卧以
扇自扇成惡風醉以冷水洗浴成疼痺大醉汗出當以粉粉
身令其自乾發成風痺常日未沒食訖即莫飲酒終身不乾
嘔飽食訖多飲水及酒成痞僻
黃豆味甘微温無毒和中下氣其葉平主霍亂吐下不止
穬米味甘平無毒益氣安中補虛和胃宜脾
粳米味辛苦平無毒主心煩斷下利平胃氣長肌肉温又云生
者冷燸者熱
糯米味苦温無毒温中令人能食多熱大便鞕
酢味酸温澁無毒消癰腫散水氣殺邪毒無運偏鷰云多食
酢損人骨能理諸藥消毒
喬麥味酸微寒無毒食之難消動大熱風其葉生食動刺風
令人身癢黃帝云作麪和豬羊肉熱食之不過八九頓作熱
風令人眉鬚落又還生仍希少淫邪已北多患此疾
塩味鹹温無毒殺鬼蠱邪注毒氣下部墮瘡傷寒寒熱能吐
肖中痰癖止心腹卒痛堅肌骨不可多食傷肺喜欬令人色
膚黑損筋力偏鷰云塩能除一切大風疾痛者炒熨之黃帝
云食甜粥音食塩即吐或成霍亂

鳥獸第五 四十條

人乳汁味甘平無毒補五藏令人肥白悅澤馬乳汁味辛温
無毒止渴牛乳汁味甘微寒無毒補虛羸止渴入生薑葱白
止小兒吐乳補勞羊乳汁味甘微温無毒補寒冷虛乏少血
色令人熱中驢乳味酸寒一云大寒無毒主大熱黃疸止渴

母猪乳汁平無毒主小兒驚癇以飲之神妙

馬牛羊酪味甘酸微寒無毒補肺藏利大腸黃帝云食甜酪音即食大酢者變作血瘕及尿血華佗云馬生羊酪蚰蜒入耳者灌之即出

沙牛及白羊酥味甘微寒無毒除胃中客氣利大小腸治口瘡牦牛酥味甘平無毒去諸風濕痺除熱利大便去宿食醍醐味甘平無毒補虛去諸風痺百練乃佳甚去月蝕瘡瘀積聚寒熱羸瘦者食熊肉味甘微寒微温無毒主風痺不仁筋急五緩若腹中有髓補中填骨久服增年

熊肉同又去頭瘍白禿面默黯食飲嘔吐久服強志不飢輕身長年黃帝云一切諸肉者煞不熟生不斂者食之成瘕熊及猪二種脂不可作燈其烟氣入人目失明不能遠視

羖羊角味酸苦温微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒泄心畏驚悸除百節中結氣及風傷蠱毒吐血婦人產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼久服安心益氣輕身勿令中濕有毒髓味甘温無毒主男子女人傷中陰陽氣不足却風熱止毒利血脉益經氣以酒和服之亦可久服不損人

青羊膽汁冷無毒主諸瘡能生人身脉治青盲明目肺平補心主憂慮膈中逆氣腎補腎氣虛弱益精髓頭骨主小兒驚癎煮以浴之蹄肉平主丈夫五勞七傷肉味苦甘大熱無毒主煖中止痛字乳餘疾及頭腦中大風汗自出虛勞寒冷能補中益氣力安心止驚利產婦不利時患人頭肉平主風眩瘦疾小兒驚癎丈夫五勞七傷其骨熱主虛勞寒中羸瘦其宿有熱者不可食生脂止下利脫肛去風毒婦人產後腹中

絞痛肚主胃反治虛羸小便數止虛汗薰帝云羊肉共酢食之傷人心亦不可共生魚酪和食之害人凡一切羊蹄甲中有珠子白者名羊懸筋食之令癲羊肚共飯飲常食久久成反胃作噎病甜粥共肚食之令人多噦喜吐清水羊腦猪腦男子食之損精氣少子若欲食者研之如粉和醋食之初不如不食佳青羊肝和小豆食之令人目少明一切羊肝生共椒食之破人五藏傷心最損小兒彌忌水中柳木及白楊木不得銅器中煮殺羊肉食之丈夫損陽女子絶陰暴下後不可食羊肉髓及骨汁成煩熱難解還動利凡六畜五藏著草自動搖及得鹹酢不變色又墮地不汗又與犬犬不食者皆有毒殺人六月勿食羊肉傷人神氣

沙牛髓味甘温無毒安五藏平胃氣通十二經脉理三焦約

温骨髓補中續絶傷益氣力止泄利去消渴皆以清酒和煖服之肝明目膽可丸百藥味苦大寒無毒除心腹熱渴止下利去口焦燥益目精心主虛忘腎去濕痺補腎氣益精齒主小兒牛癇肉味甘平無毒主消渴止唾涎出安中益氣力養脾胃氣不可常食發宿病自死者不任食喉嚨主小兒哽黄犍沙牛黑牯牛尿味苦辛微温平無毒主水腫腹脚俱滿者利小便黄帝云烏牛白死北首者食其肉害人一切牛盛熱時卒死者撥不堪食食之作腸癰患甲蹄牛食其蹄中拒筋令人作肉刺獨肝牛肉食之殺人牛食蛇者獨肝患疥牛馬肉食令人身體癢牛肉共猪肉食之必作寸白蟲直爾黍米白酒生牛肉共食亦作寸白大忌人下利者食自死牛肉必劇一切牛馬乳汁及酪共生魚食之成魚瘕六畜脾人一生莫食十二月勿食牛肉傷人神氣

馬心主喜忘肺主寒熱葵肉味辛平冷無毒主傷中除
熱下氣長筋強腰脊壯健強志利意輕身不飢黃帝云白馬
自死食其肉害人白馬玄頭食其腦令人癲白馬鞍下烏色
徹肉裏者食之傷人五藏下利者食馬肉必加劇白馬青蹄
肉不可食一切馬汗氣及毛不可入食中害人諸食馬肉心
煩悶者飲以美酒則解白酒則劇五月勿食馬肉傷人神氣
野馬陰莖味酸鹹溫無毒主男子陰痿縮少精肉辛平無毒主
人馬癇筋脉不能自收周痺肌不仁病死者不任用
驢肉味酸平無毒主風狂愁憂不樂能安心氣病死者不任
用其頭燒却毛煮取汁以浸麴釀酒甚治大風動搖不休者
皮膠亦治大風
狗陰莖味酸平無毒主傷中丈夫陰痿不起
狗腦主頭風痺下部蟲瘡中息肉肉味酸鹹溫無毒宜腎安

五藏補絕傷勞損久病大虛者服之輕身益氣力黃帝云白
犬合海鮀食之必得惡病白犬自死不出舌者食之害人犬
春月多狂若鼻赤起而燥者此欲狂其肉不任食九月勿食
犬肉傷人神氣
狍卵味甘溫無毒除陰莖中痛驚癎鬼氣蠱毒除寒熱賁豚
主五痔伏熱在腹中腸癰內蝕取酒浸半日炙焦用之大猪
四蹄小寒無毒主傷撻諸敗瘡毒猪蹄寒無毒煮汁服之下
乳汁甚解石藥毒大猪頭肉平無毒補虛之氣力去驚癎鬼
毒寒熱五痓腦主風眩心平無毒主驚邪憂悲虛悸氣逆
婦人產後中風聚血氣驚恐腎平無毒除冷利理腎氣通膀
胱肝味苦平無毒主明目猪喙微寒無毒主凍瘡痛瘡胜微寒

無毒補中益氣止渴斷暴利虛弱腸微寒無毒主消渴小便數補下膲虛竭其肉間脂肪平無毒主煎諸膏藥破冷結散猪肉味苦酸冷無毒主狂病多日不愈凡猪肉味苦微寒宜腎有小毒補腎氣虛竭不可久食令人少子精發宿病弱筋骨閉血脉虛人肌有金瘡者食之瘡尤甚猪血平澀無毒主卒下血不止羙清酒和炒服之又主中風絶傷頭中風眩及諸淋露貫肫暴氣黃疸云凡猪肝肺共魚鱠食之作癰疽猪肝共鯉魚腸魚子食之傷人神狍腦損男子陽道臨房不能行事八月勿食猪肺及粘和食之至冬發疽十月勿食猪肉損人神氣

鹿頭肉平主消渴多夢妄見者生血治癰腫並筋主勞損蹄肉平主脚膝骨中疼痛不能踐地骨主內虛續絶傷補骨可作酒髓味甘温主丈夫婦人傷中脉絶筋急痛欬逆以酒和服腎平主補腎氣肉味苦温無毒補中強五藏益氣力肉生者主中風口僻不正細細剉之以薄僻上華佗云和生椒擣薄之使人專看之正則急去之不爾復牽向不僻處角錯取屑一升白蜜五升煑之微火熬令小變色暴乾更擣篩服方寸匕日三令人輕身益氣力強骨髓補絶傷黃帝云鹿膽白者食其肉害人白鹿肉不可和蒲白作羹食發惡瘡五月勿食鹿肉傷人神氣胡居士云鹿性驁烈多別良草恠食九物餘者不嘗群處必依山岡産歸下澤饗神用其肉者以其性烈清淨故也凡餌藥之人不可食鹿肉服藥必不得力所以然者以鹿常食解毒之草是故能制毒散諸藥故也九草者葛葉花鹿葱鹿藥白蒿水芹甘草齊頭蒿山茅耳蕎麦

麈骨微温無毒主虛損泄精肉味甘温無毒補益五藏髓益

氣力悅澤人面麤黯無膽所以怯弱多驚恐黃帝云五月勿食
麤肉傷人神氣
麋脂味辛温無毒主癰腫惡瘡死肌寒熱風寒濕痺四肢拘
緩不收風頭腫氣通腠理柔皮膚不可近男子陰令痿一名
宮脂十月取黃帝云生麤肉共雉肉食之作固疾
肉共雉肉食之令人心痛生麤肉共蝦汁合食之令人心痛
固疾
齒虎頭骨治風邪虎眼睛主驚癎
豹肉味酸温無毒宜腎安五藏補絶傷輕身益氣久食利人
狸肉温無毒補中輕身益氣亦治諸注黃帝云正月勿食虎
豹狸肉傷人神損壽
兔肝主目闇肉味辛平濇無毒補中益氣止渴兔無脾所以
能走也黃帝云兔肉和獺肝食之三日必成遁尸共白雞肝
心食之令人面失色一年成癉黃共薑食變成霍亂共白雞
肉食之令人血氣不行二月勿食兔肉傷人神氣
生鼠微温無毒主蹉折續筋補骨擣薄之三日一易
獺肝味甘有小毒主鬼疰蠱毒却魚鯁止久嗽皆燒作灰酒
和服之獺肉味甘温無毒主時病疫氣牛馬時行病皆煮取
汁停冷服之六畜灌之
狐陰莖味甘平有小毒主女子絶產陰中瘕小兒陰癩卵腫
肉并五藏及腸肚味甘微寒有毒主蠱毒寒熱五藏固冷小
兒驚癇大人狂病見鬼黃帝云麝肉共鵲肉食之作癥瘕
野猪青蹄不可食及獸有歧尾不可食家獸自死共鱠汁食之作疽瘡十
不可食獸赤足者不可食野獸自死北首伏地
一月勿食經夏臭脯成水病作頭眩丈夫陰瘡甲子日勿食

一切獸肉大吉鳥飛投人不肯去者口中必有物開看無者
拔一毛放之大吉一切禽獸自死無傷處不可食三月三日
勿食鳥獸五藏及一切果菜五辛等物大吉
丹雄雞肉味甘微溫無毒主女人崩中漏下赤白沃補虛溫
平無毒主傷中消渴小便數而不禁腸澼泄利補益五藏絶
中能愈久傷乏瘡不肯差者通神殺惡毒黃雌雞肉味酸鹹
傷五勞益氣力雞子黃微寒主除熱火灼爛瘡痤可作虎魄
毒下氣去狂邪安五藏傷中消渴烏雄雞肉味甘溫無毒補
神物卵白汁微寒主目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小
中止心痛黑雌雞肉味甘平無毒除風寒濕痺五緩六急安
兒泄利婦人產難胞衣不出生吞之白雄雞肉味酸微溫無
胎黃帝云一切雞肉合魚肉汁食之成心瘕雞冥五色者食
其肉必狂若有六指四距玄雞白頭家雞及野雞鳥生子有文

八字雞及野鳥死不伸足爪此種食之害人雞子白共蒜食
之令人短氣雞子共鼈肉蒸食之害人雞肉獺肉共食作遁
尸注藥所不能治食雞子嗽生葱變成短氣雞肉犬肝腎共
食害人生葱共雞犬肉食令人穀道終身流血烏雞肉合鯉
魚肉食生癰疽雞兔犬肉和食必泄利野雞肉共家雞子食
之成遁尸鬼纏身四肢百節疼痛小兒五歲已下飲乳未
斷者勿食雞肉二月勿食雞子令人常惡心丙午日食雞雉
肉丈夫燒死目盲女人血死妄見四月勿食暴雞肉作內疽
在胷腋下出漏孔丈夫少陽婦人絶孕虛勞乏氣八月勿食
雞肉傷人神氣
雉肉酸微寒無毒補中益氣止泄利久食之令人瘦嘴主蟻
瘻黃帝云八月建酉日食雉肉令人短氣八月勿食雉肉損
人神氣

白鵝脂主耳卒聾消以灌耳毛主射工水毒肉味辛平利五藏
鵞肪味甘平無毒主風虛寒熱肉補虛亟除客熱利藏腑利
水道黃帝云六月勿食鵞肉傷人神氣
鴛鴦肉味苦微温無毒主瘻瘡清酒浸之灸令熱以薄之亦
灸服之又治夢思慕者
鴈肪味甘平無毒主風攣拘急偏枯血氣不通利肉味甘平
無毒久服長髮髭鬚眉益氣不飢輕身耐暑黃帝云六月勿
食鴈肉傷人神氣
越鵱屎味辛平有毒主殺蠱毒鬼注逐不祥邪氣破五瘽利
小便熬香用之治口瘡肉不可食之入水爲蛟龍所殺黃帝
云十一月勿食鼠肉鵱肉損人神氣
石蜜味甘平微寒無毒主心腹邪氣驚癇癡安五藏治諸不
足益氣補中止腹痛解諸藥毒除衆病和百藥養脾氣消
心煩食飲不下止腸澼去肌中疼痛治口瘡明耳目久服強
志輕身不飢耐老延年神仙一名石飴白如膏者良是今諸
山崖處蜜也青赤蜜味酸噉食之令人心煩其蜂黑色似蝨
黃帝云七月勿食生蜜令人暴下發霍亂蜜蠟味甘微温無
毒主下利膿血補中續絶傷除金瘡益氣力不飢耐老白蠟
主久泄澼羞後重見血者補絶傷利小兒久服輕身不飢生於
蜜房或木石上惡菀花百合此即今所用蠟也
蝮蛇肉平有毒釀酒去癩疾諸九瘻心腹痛下結氣除蠱毒
其腹中吞鼠平有小毒主鼠瘻
原蠶雄蛾味鹹温有小毒主益精氣強男子陽道交接不倦
甚治泄精不用相連者
鰷魚味甘無毒主百病
鰻鱺魚味甘大温有毒主五痔瘻殺諸蟲

鮆魚肉味甘大温黑者無毒主補中養血治瀉痢五月五日取頭骨平無毒燒服止久利

鱓魚徒河反　平無毒主少氣吸吸足不能立地黃帝云四月勿食蛇肉鱓肉損神害氣

烏賊魚骨味鹹微温無毒主女子漏下赤白經汁血閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕痕無子驚氣入腹腹痛環臍脅丈夫陰中痛而腫令人有子肉味酸平無毒益氣強志

鯉魚肉味甘平無毒主欬逆上氣癰黃止渴黃帝云食桂竟食鯉魚肉害人腹中宿癥病者食鯉魚肉害人

鮒魚味甘平無毒主一切瘡燒作灰和醬汁傅之日二又去腸癰黃帝云魚白目不可食之魚有角食之發心驚害人魚無腸膽食之三年丈夫陰痿不起婦人絶孕魚身有黑點不可食魚目赤作鱠食成瘕病作鮓食之害人一切魚共菜食之作蛔蟲蟯蟲一切魚尾食之不益人多有勾骨著人咽害人魚有角白背不可食之魚有角食之發心驚害人魚無全腮食之發癰疽鮭魚赤鱗不可食魚無腮不可食魚魚有毒不可食之三月庚寅日勿食魚大惡五月五日勿以鯉魚子共猪肝食必不消化成惡病下利者食一切魚必加劇致困難治穢飯鮫肉臭魚不可合食之害人三月勿食鮫龍肉及一切魚肉令人飲食不化發宿病傷人神氣失氣恍惚鼈肉味甘平無毒主傷中益氣補不足療脚氣黃帝云五月五日以鼈子食之作癰黃鼈腹下成五字不可食鼈肉兎肉和芥子將賈食之損人鼈三足食之害人鼈肉共莧蕨菜食之作鼈瘕害人

鼈殼味酸寒有毒主心腹中邪熱宿結痛噎僻面腫散漆燒之致鼠其黃解結散血愈漆瘡養筋益氣黃帝云鼈目相向足

斑者食之害人十二月勿食解蠶鼈損人神氣又云鼈臛肉共猪肉食之害人秋果菜共鼈肉食之令人短氣飲酒食鼈肉并菰白菜食之令人心痛三日一發蝦鱠共猪肉食之令人常蚌共菜食之令人生寒熱六甲日勿食鼈鼈之肉害人心神螺惡心多唾損精色蝦無鬚眼腹下通烏色者食之害人大忌勿輕十一月十二月勿食蝦蚌著甲之物

備急千金要方卷第二十六

朝奉郎守太常少卿兼秘閣校理判登聞檢院護軍賜緋紫袋臣林億等校正

養性序第一
道林養性第二
居處法第三
按摩法第四
調氣法第五
服食法第六
黃帝雜忌第七
房中補益第八
養性序第一 十條

扁鵲云黃帝說晝夜漏下水百刻凡一刻人百三十五息十刻一千三百五十息百刻一萬三千五百息人之居世數息

之間信哉嗚呼昔人歎逝何可不爲善以自補邪五常思一
日一夜有十二時十日十夜百二十時百日百夜一千二百
時千日千夜一萬二千時萬日萬夜一千二萬時此爲三十
年若長壽者九十年只得三十六萬日萬夜一千二萬時百年之內斯須之間
數時之活朝菌蟪蛄不足爲喻焉可不自攝養而馳騁六情
孜孜汲汲追名逐利干詐萬巧以求虛譽沒齒而無厭故養
性者知其如此於名於利亦若存若亡於非名非利亦若存若
亡所以沒身不殆也余慨時俗之多僻皆放逸以殞亡聊因
暇日粗述養性篇用獎人倫之道好事君子與我同志焉
夫養性者欲所習以成性性自爲善不習無不利也性既自
善內外百病皆悉不生禍亂災害亦無由作此養性之大經
也善養性者則治未病之病是其義也故養性者不但餌藥飡
霞其在兼於百行百行周備雖絕藥餌足以遐年德行不克

縱服玉液金丹未能延壽故夫子曰善攝生者陸行不遇虎
兕此則道德之祐也豈假服餌而祈遐年哉聖人所以藥餌
者以救過行之必也故愚者抱病歷年而不修一行纏痾沒
齒終無悔心此其所以岐和長逝彭跗永歸良有以也稽康
曰養生有五難名利不去爲一難喜怒不除爲二難聲色不
去爲三難滋味不絕爲四難神慮精散爲五難五者必存雖
心希難老口誦至言咀嚼英華呼吸太陽不能不迴其操不
夭其年也五者無於胷中則信順日躋道德日全不祈善而
有福不求壽而自延此養生之大旨也然或有服膺仁義無
衰今時之人年至半百而動作皆衰者時代異邪將人失之
甚泰之累者抑亦其亞歟
黃帝問於岐伯曰余聞上古之人春秋皆度百歲而動作不
也岐伯曰上古之人其知道者法則陰陽和於術數飲食有

常節起居有常度不妄作勞故能形與神俱而盡終其天年
度百歲乃去今時之人則不然以酒爲漿以妄爲常醉以入
房以欲竭其精以耗散其眞不知持滿不時御神務快其心
逆於生樂起居無節故半百而衰也夫上古聖人之教也下
皆爲之虛邪賊風避之有時恬惔虛無眞氣從之精神守內
病安從來是以其志閑而少欲其心安而不懼其形勞而不
倦氣從以順各從其欲皆得所願故甘其食美其服素問作美其食
任其服樂其俗高下不相慕故其民日朴是以嗜欲不能勞其
目淫邪不能惑其心愚智賢不肖不懼於物合於道數故皆
能度百歲而動作不衰者其德全不危也是以人之壽天在
於摶節若消息得所則長生不死恣其情慾則命同朝露也
岐伯曰人年四十而陰氣自半也起居衰矣年五十體重耳
目不聰明也年六十陰痿氣力大衰九竅不利下虛上實涕

泣俱出故曰知之則強不知則老同出名異智者察同愚者
察異愚者不足智者有餘有餘則耳目聰明身體輕強年老
復壯壯者益理是以聖人爲無爲之事樂恬淡之味能縱欲
使志得虛無之守故壽命無窮與天地終此聖人之治身也
春三月此謂發陳天地俱生萬物以榮夜卧早起廣步於庭
被髮緩形以使志生生而勿殺與而勿奪賞而勿罰此春氣
之應養生之道也逆之則傷肝夏爲寒變奉長者少
夏三月此謂蕃秀天地氣交萬物華實夜卧早起毋厭於日
使志無怒使華英成秀使氣得泄若所愛在外此夏氣之應
養長之道也逆之則傷心秋爲痎瘧奉收者少冬至重病
秋三月此謂容平天氣以急地氣以明早卧早起與雞俱興
使志安寧以緩秋刑收斂神氣使秋氣平毋外其志使肺氣
清此秋氣之應養收之道也逆之則傷肺冬爲飧泄奉藏

者少

冬三月此謂閉藏水冰地坼無擾乎陽早卧晚起必待日光使志若伏若匿若有私意若已有得去寒就温毋泄皮膚使氣亟奪此冬氣之應養藏之道也逆之則傷腎春爲痿厥則奉生者少

天有四時五行以生長收藏以寒暑燥濕風人有五藏化爲五氣以生喜怒悲憂恐故喜怒傷氣寒暑傷形暴怒傷陰暴喜傷陽故喜怒不節寒暑失度生乃不固人能依時攝養故得免其夭枉也

仲長統曰王侯之宫美女兼千卿士之家侍妾數百晝則以醇酒淋其骨髓夜則房室輸其血氣耳聽淫聲目樂邪色醲醲内不出遊外不返王公得之於上豪傑馳之於下及至生産不時孕育太早或童孺而擅氣或疾病而搆精氣薄惡血脉不充既出胞藏養護無法又蒸之以綿纊爍之以五味胎傷孩病而胞未及堅剛復縱情欲重重相生病病相孕國無良醫醫無審術姦佐其間過謬常有會有一疾莫能自免當今少百歲之人者豈非所習不純正也

抱朴子曰或問所謂傷之者豈色欲之間乎荅曰亦何獨斯哉然長生之要其在房中上士知之可以延年除病其次不以自伐若年當少壯而知還陰丹以補腦采七益於長俗作谷者不服藥物不失一二百歲也但不得仙耳不得其術者古人方之於淩孟以盛湯羽苞之蓄火又且才所不逮而強思之傷也力所不勝而強舉之傷也深憂重恚傷也悲哀憔悴傷也喜樂過度傷也汲汲所欲傷也戚戚所患傷也久談言笑傷也寢息失時傷也挽弓引弩傷也沈醉嘔吐傷也飽食即卧傷也跳足喘乏傷也惟呼哭泣傷也陰陽不交傷也積

傷至盡盡則早亡盡則非道也是以養性之士唾不至遠行不疾步耳不極聽目不極視坐不久處立不至疲臥不至懻先寒而衣先熱而解不欲極飢而食食不可過飽不欲極渴而飲飲不欲過多飽食過多則結積聚渴飲過多則成痰癖不欲甚勞不欲甚佚不欲流汗不欲多唾不欲奔走車馬不欲極目遠望不欲多啖生冷不欲飲酒當風不欲數數沐浴不欲廣志遠願不得規造異巧冬不欲極温夏不欲窮涼不欲露卧星月不欲眠中用扇大寒大熱大風大霧皆不欲冒之五味不欲偏多故酸多則傷脾苦多則傷肺辛多則傷肝鹹多則傷心甘多則傷腎此五味刻五藏五行自然之理也凡言傷者亦不即覺也謂久即損壽耳是以善攝生者卧起有四時之早晚興居有至和之常制調利筋骨有偃仰之方祛疾閑邪有吐納之術流行榮衛有補寫之法節宣勞逸有與奪之要忍怒以全陰抑喜以養陽然後先服草木以救虧缺後服金丹以定無窮養性之理盡於此矣夫欲快意任懷自謂達識知命不涅異端極情肆力不勞持久者聞此言也雖風之過耳電之經目不足喻也雖身枯於留連之中氣絶於綺紈之際而甘心焉亦安可告之以養性之事哉匪惟不納乃謂妖訛也而望彼信之所謂以明鑒給矇瞽以絲竹娛聾夫者也

魏武與皇甫隆令曰聞卿年出百歲而體力不衰耳目聰明顏色和悦此盛事也所服食施行道引可得聞乎若有可傳想可密示封內隆上疏對曰臣聞天地之性惟人爲貴人之所貴莫貴於生唐荒無始劫運無窮人生其間忽如電過每一思此罔然心熱生不再來逝不可追何不抑情養性以自保惜今四海垂定太平之際又當須展才布德當由萬年萬

年無窮當脩道道甚易知但莫能行昌常聞道人蒯京已年一百七十八而甚丁壯言人當朝朝服食玉泉琢齒使人丁壯有顏色去三蟲而堅齒玉泉者口中唾也朝旦未起早嗽津令滿口乃吞之琢齒二七遍如此者乃名曰練精嗽津令滿口乃吞之咽中土地俗好猛康云穰歲多病饑年少疾信哉不虛是以關中土地俗好儉嗇廚膳儲羞不過葅醬而已其人少病而壽江南嶺表其處饒足海陸鮮肴無所不備土俗多疾而人早夭比方仕子遊官至彼遇其豐贍以為福祐所臻是以尊卑長幼恣口食噉夜長醉飽四體熱悶赤露眠卧宿食不消未逾朞月大小皆病或患霍亂脚氣脹滿或寒熱瘧痢惡核丁腫或癰疽痔漏或偏風猥退不知醫療以至於死凡如此者比肩皆是惟云不習水土都不知病之所由靜言思之可謂太息者也學者先須識此以自誡慎

抱朴子曰一人之身一國之象也胷腹之位猶宮室也四支之列猶郊境也骨節之分猶百官也神猶君也血猶民也氣猶民所以全其身民散則國亡氣竭則身死死者不可生也亡者不可存也是以至人消未起之患治未病之疾醫之於無事之前不追於既逝之後夫人難養而易危也氣難清而易濁也故能審威德所以保社稷割嗜欲所以固血氣然後真一存焉三一守焉百病却焉年壽延焉

道林養性第二

真人曰雖常服餌而不知養性之術亦難以長生也養性之道常欲小勞但莫大疲及強所不能堪耳且流水不腐戶樞不蠹以其運動故也養性之道莫久行久立久坐久卧久視久聽蓋以久視傷血久卧傷氣久立傷骨久坐傷肉久行傷

筋也仍莫強食莫強酒莫強舉重莫憂思莫大怒莫悲愁莫
大懼莫跳踉莫多言莫大笑勿汲汲於所欲勿悁悁懷忿恨
皆損壽命若能不犯者則得長生也故善攝生者常少思少
念少慾少事少語少笑少愁少樂少喜少怒少好少惡行此
十二少者養性之都契也多思則神殆多念則志散多慾則
志昏多事則形勞多語則氣之多笑則藏傷多愁則心懾多
樂則意溢多喜則忘錯昏亂多怒則百脉不定多好則專迷
不理多惡則憔悴無懽此十二多不除則榮衛失度血氣妄
行喪生之本也惟無多無少者幾於道矣是知勿外緣者眞
人初學道之法也若能如此者可居温疫之中無憂疑矣既
屏外緣會須守五神肝心脾肺腎從四正言行坐立言最不得浮思妄
念心想欲事惡邪大起故孔子曰思無邪也常當習黄帝内
視法存想思念令見五藏如懸磬五色了了分明勿輟也仍

可每旦初起面向午展兩手於膝上心眼觀氣上入頂下達
涌泉旦旦如此名曰迎氣常以鼻引氣口吐氣小微吐之不
得開口復欲得出氣少入氣多每欲食送氣入腹每欲食氣
爲主人也凡心有所愛不用深愛心有所憎不用深憎並皆
損性傷神亦不用深毀常須運心於物平等如
覺偏頗尋改正之居貧勿謂常貧居富莫謂常富居貧富之
中常須守道勿以貧富易志改性識達道理似不能言有大
功德勿自矜伐美藥勿離手善言勿離口亂想勿經心常以
深心至誠恭敬於物愼勿詐善以悦於人終身爲善爲人所
嫌勿得起恨事君盡禮人以爲諂當以道自平其心道之所
在其德不孤勿言行善報以自怨仇居處勿令心有
不足若有不足則自抑之勿令得起人知止足天遺其禄所
至之處勿得多求多求則心自疲而志苦若夫人之所以多

病當由不能養性平康之日謂言常然縱情恣慾心所欲得則便爲之不拘禁忌欺罔幽明無所不作自言適性不知過後一一皆爲病本及兩手摸空白汗流出口唱皇天無所逮及皆以生平麤心不能自察一至於此但能少時內省身心則自知見行之中皆長諸痾將知四百四病身手自造本非由天及一朝病發和緩不救方更誹謗醫藥無效神仙無靈故有智之人受惜性命者當自思念深生恥媿誡勒身心常修善事也至於居處不得綺靡華麗令人貪婪無厭乃患害之源但令雅素淨潔無風雨暑濕爲佳衣服器械勿用珍玉金寶增長過失使人煩惱根深厨膳勿使脯肉豐盈常令儉約爲佳然後行作鵝王步語作含鍾聲眠作師子臥（右脇著地坐也）每日自詠歌玄美食須熟嚼生食不麤吞問我居止處大宅揔林村胎息守五藏氣至骨成仙又歌曰日食三箇棗每不

臀而自消錦繡爲五藏身着蓑掃袍修心既平又須愼言語凡言語讀誦常想聲在氣海中（臍下也）每日初入後勿言語讀誦寧待平旦也旦起欲專言善事不欲先計校錢財又食上不得語語而食者常患腎背痛亦不用寢臥多言笑寢不得語言者言五藏如鍾聲不懸則不可發聲行不得語若欲語須住乃語行語則令人失氣冬至日止可語不可言自言曰言荅人曰語言有人來問不可不荅自不可發言也仍勿觸冷開口大語爲佳言語既愼仍節飲食是以善養性者先飢而食先渴而飲食欲數而少不欲頓而多則難消也常欲令如飽中飢飢中飽耳蓋飽則傷肺飢則傷氣鹹則傷筋酢則傷骨故每學淡食食當熟嚼使米脂入腹勿使酒脂入腸人之當食須去煩惱（暴數爲煩惱侵觸爲惱）如食五味必不得暴嗔多令人神驚夜夢飛揚每食不用重肉喜生百病常須少食肉多食

飯及少葅菜并勿食生菜生米小豆陳臭物勿飲濁酒食麪使塞氣孔勿食生肉傷胃一切肉惟須煮爛停冷食之食畢當嗽口數過令人牙齒不敗口香熱食訖以冷酢漿嗽口者令人口氣常臭作墨齒病又諸熱食鹹物後不得飲冷酢漿水喜失聲成尸咽凡熱食汗出勿當風發瘂頭痛令人目澀多睡每食訖以手摩面及腹令津液通流食畢當行步躊躇計使中數里來行畢使人以粉摩腹上數百遍則食易消大益人令人能飲食無百病然後有所修爲快也飽食即卧乃生百病不消成積聚飽食仰卧成氣痞作頭風觸寒來者寒未解食熱食成刺風人不得夜食又云夜勿過醉飽食勿精思爲勞苦事有損餘虛損人常須日在巳時食訖則不須飲酒終身無干嘔勿食父母本命所屬肉令人命不長勿食自巳本命所屬肉令人魂魄飛揚勿食一切腦大損人茅屋漏水墮諸脯肉上食之成瘕結凡暴肉作脯不肯干者害人祭神肉無故自動食之害人飲食上蜂行住食之必有毒害人腹內有宿病勿食陵鯉魚肉害人濕食及酒漿臨上看之不見人物影者勿食之成卒注若已食腹脹者急以藥下之每十日一食葵葵滑所以通五藏擁氣又是菜之主不用合心食之又飲酒不欲使多多則速吐之爲佳勿令至醉即終身百病不除久飲酒者腐爛腸胃潰髓蒸筋傷神損壽醉不可以當風向陽令人發強又不可當風卧不可令人扇之皆即得病也醉不可露卧及卧黍穰中發癩瘡醉不可強食或發癰疽或發瘡或生瘡醉飽不可以走車馬及跳躑醉不可以接房醉飽交接小者面黑玆嗽大者傷絕藏脉損命凡人飢欲坐小便若飽則立小便愼之無病又忍尿不便膝冷成痺忍大便不出成氣痔小便勿努令兩足及膝冷大便不用呼

氣及強努令人腰疼目澀宜任之佳凡遇山水瘴中出泉者
不可久居常食良作瘿病又深
食以調時愼脫着凡人旦起着衣反者便着之吉衣光者當
戶三振之曰殃去吉濕衣及汗衣皆不可久着令人發瘡及
風瘙大汗能易衣佳不易者急洗之不爾令人小便不利凡
大汗勿偏脫衣吉得偏風半身不遂春天不可薄衣令人傷
寒霍亂食良不消頭痛脫着既時須調寢處凡人卧春夏向東
秋冬向西頭勿北卧及墻北亦勿安床凡欲眠勿歌詠不祥
起上床坐先脫左足卧勿當舍脊下卧訖勿留燈燭令魂魄
及六神不安多愁怨人頭邊勿安火爐日久引火氣頭重目
赤睛及鼻乾夜卧當耳勿有孔吹人即耳聾夏不用露面卧
令人面皮厚喜成癬或作面風冬夜勿覆其頭得長壽凡人
眠勿以脚懸踏高處久成腎水及損房足冷人每見十步直

墻勿順墻卧風利吹人發癲及體重人汗勿跋床懸脚久成
血痺兩足重腰疼又不得晝眠令人失氣且邪惡從口入久而成消渴
力暮卧常習閉口口開即失氣且邪惡從口入久而成消渴
及失血色屈膝側卧益人氣力勝正偃卧按孔子不尸卧故
曰睡不厭跋覺不厭舒凡人舒睡則有鬼痛魔邪凡眠先卧
心後卧眼人卧一夜當作五度反覆常逐更轉凡夜魘勿
燃燈喚之定死無疑閙喚之吉亦不得近而急喚夜夢惡不
須說旦以水面東方噀之呪曰惡夢著草木好夢成寶玉即
無咎矣又夢之善惡並勿說為吉衣食寢處皆適能順時氣
者始盡養生之道故善攝生者無犯日月之忌無失歲時之
和須知一日之忌暮無飽食一月之忌晦無大醉一歲之忌
暮無遠行終身之忌暮無然燭行房暮常護氣也凡氣冬至
起於涌泉十一月至膝十二月至股正月至臀名三陽成二

月至膊三月至項四月至項純陽用事陰亦放此故四月十
月不得入房避陰陽純用事之月也每冬至日於北壁下厚
鋪草而卧云受元氣每八月一日已後即微火煖足勿令下
令無生意常欲使氣在下勿欲泄於上春凍未泮衣欲下厚
上薄養陽收陰繼世長生養陰收陽禍則滅門故云冬時天
地氣閉血氣伏藏人不可作勞出汗發泄陽氣有損於人也
又云冬日凍腦春秋腦足俱凍此聖人之常法也春欲晏卧
早起夏及秋欲侵夜乃卧早起冬欲早卧而晏起皆益人雖
云早起莫在雞鳴前雖言晏起莫在日出後凡冬月忽有大
熱之時夏月忽有大涼之時皆勿受之人有患天行時氣者
皆由犯此也即須調氣息使寒熱平和即免患也每當臘日
勿歌舞犯者必凶常於正月寅日燒白髮吉凡寅日剪手甲
午日剪足甲又燒白髮吉

居處法第三

凡人居止之室必須周密勿令有細隙致有風氣得入小覺
有風勿強忍之久坐必須急急避之久居不覺使人中風古
來忽得偏風四肢不隨或如角弓反張或失音不語著皆由
忽此耳身既中風諸病總集邪氣得便遣此致卒者十中有
九是以大須周密無得輕之愼焉愼焉所居之室勿塞井及
水漬令人聾瞎

凡在家及外行卒逢大颶風暴雨震電昏暗大霧此皆是諸
龍鬼神行動經過所致宜入室閉戶燒香靜坐安忘以避之
待過後乃出不尔損人或當時雖未苦於後不佳矣又陰霧
中亦不可遠行

凡家中有經像行來先拜之然後拜尊長每行至則峻坐焉
凡居家不欲數沐浴若沐浴必須密室不得大熱亦不得大

冷皆生百病冬浴不必汗出霖霖沐浴後不得觸風冷新沐
髮訖勿當風勿濕縈髮勿濕頭卧使人頭風眩悶髮禿面黑
齒痛耳聾頭生白屑飢忌浴飽忌沐沐訖須進少許食飲乃
出夜沐髮不食即目昏令人心虛饒汗多夢又夫妻不用同日
沐浴常以晦日浴朔日沐吉凡炊湯經宿洗人體成癬洗面
無光洗脚即疼痛作斷瞎熱泔洗頭冷水濯之作頭風飲
水沐頭亦作頭風時行病新汗解勿冷水洗浴損心包不能復
凡居家常戒約內外長幼有不快即須早道勿使隱忍以爲
無苦過時不知便爲重病遂成不救小有不好即按摩捺捺
令百節通利洩其邪氣凡人無問有事無事常須旦別踴脊
背四肢一度頭項苦令熟蹋即風氣時行不能著人此大要
妙不可具論

凡人居家及遠行隨身常有熟艾一升備急丸辟鬼丸生肌

更畜餘藥此等常不可闕少及一兩卷百一備急藥方并帶
辟毒蚰蜒蜂蠍毒藥隨身也
凡人自覺十日已上康健即須灸三數穴以洩風氣每日必
須調氣補寫按摩導引爲佳勿以康健便爲常然常須安不
忘危預防諸病也灸法當須避人神第二十禁忌法在卷中凡畜手
力細累春秋皆須與轉寫藥一度則不中天行時氣也

按摩法第四法二首

天竺國按摩此是婆羅門法

兩手相捉細捩如洗手法

兩手淺相叉翻覆向背

兩手相捉共按脞左右同

兩手相重按脞徐徐捩身左右同

以手如挽五石力弓左右同
作拳向前築左右同
如拓石法左右同
作拳却頓此是開胷左右同
大坐斜身偏欹如排山左右同
兩手抱頭宛轉脾上此是抽脇
兩手據地縮身曲脊向上三舉
以手反搥背上左右同
大坐伸兩脚即以一脚向前虛掣左右同
兩手拒地迴顧此是虎視法左右同
立地反拗身三舉
兩手急相叉以脚踏手中左右同
起立以脚前後虛踏左右同

大坐伸兩脚用當相手勾所申脚著膝中以手按之左右同
右十八勢但是老人日別能依此三徧者一月後百病除
行及奔馬補益延年能食眼明輕健不復疲乏
老子按摩法
兩手擦脾左右捩身二七遍
兩手捻脾左右紐肩二七遍
兩手抱頭左右紐腰二七遍
左右挑頭二七遍
一手抱頭一手托膝三折左右同
兩手托頭三舉之
一手托頭一手托膝從下向上三遍左右同
兩手攀頭下向三頓足
兩手相捉頭上過左右三遍

兩手相叉托心前推却挽三遍
兩手相叉著忽三遍
曲腕築肋挽肘左右亦三遍
左右挽前後拔各三遍
舒手挽項左右三遍
反手著膝手挽肘覆手著膝上左右亦三遍
手摸肩從上至下使遍左右同
兩手空拳築三遍
外振手三遍內振三遍覆手振亦三遍
兩手相叉反覆攪各七遍
摩紐指三遍
兩手反搖三遍
兩手反叉上下紐肘無數單用十呼

兩手空聳三遍
兩手下頓三遍
兩手相叉頭上過左右申肋十遍
兩手拳反背上搥脊上下亦三遍 之搥猶也
兩手反捉上下直脊三遍
覆掌捌腕內外振三遍
覆掌前聳三遍
覆掌兩手相叉交橫三遍
覆手橫直即聳三遍
若有手患令從上打至下得熱便休
舒左脚右手承之左手捺脚從聳上至下直脚三遍右手捺脚
亦爾
前後挨足三遍

左挨足右挨足各三遍
前後却挨足三遍
直脚三遍
紐胜三遍
内外振脚三遍
若有脚患冷者打熱便休
紐胜以意多少頓脚三遍
却直脚三遍
虎據左右紐肩三遍
推天托地左右三遍
左右排山負山拔木各三遍
舒手直前頓申手三遍
舒兩手兩膝亦各三遍

舒脚直反頓申手三遍
挨内脊外脊各三遍

調氣法第五

彭祖曰道不在煩但能不思衣食不思声色不思勝負不思曲直不思得失不思榮辱心無煩形勿極而兼之以導引行氣不已亦可得長年千歲不死凡人不可無思當以漸遣除之彭祖曰和神道氣之道當得密室閉戸安牀煖席枕高二寸蜂蠆不能毒壽三百六十歲此隣於眞人也每日夕旦夕者是陰陽三百息耳無所聞目無所見心無所思如此則寒暑不能侵半正身偃卧瞑目閉氣於脊膈中以鴻毛著鼻上而不動經

轉換之時凡旦五更初暖氣至順申眼開是上生氣至名曰陽息而陰消暮日入後冷氣至凜凜然時乃至牀坐睡倒是下生氣至名曰陽消而陰息氣至常出入天地日月山川河海人畜草木一切万物躰中一代謝往来無一時休息一進如海水之一朝夕是天地之道也消息之道也面向午展兩手

於脚膝上徐徐按捺肢節即口吐濁氣鼻引清氣凡吐者去故氣亦名吐納者取新氣亦名生氣故老子經云玄牝之門天地之根綿綿若存用之不勤言口鼻天地之門可以出納陰陽死生之氣也良久徐徐乃以手左托右托上托下托前托後托瞑目張口叩齒摩眼押頭拔耳挽髮放臂欠噦發陽振動也雙作隻作反手爲之然後制挈足仰振數八十九十而止仰下徐徐定心作禪觀之法閉目存思想見空中太和元氣如紫雲成蓋五色分明下入毛際漸漸漸入頂如雨初晴雲入山透皮入肉至骨至腦漸漸下入腹中四肢五藏皆受其潤如水滲入地若徹則覺腹中有声汩汩然意專思存不得外緣斯須即覺元氣達於氣海須臾則自達於涌泉則覺身躰振動兩脚踡曲亦令牀坐有声拉拉然則名一通二通三通乃至日別得三通五通則身躰悅懌面色光輝髭毛潤澤耳目精明令人食美氣力強健百病皆去五年十歲長存不忘得滿千万通則去仙不遠矣人身虛無但有遊氣氣息得理即百病不生若消息失宜即諸病競起善攝養者須知調氣方爲調氣方凡調氣之法夜半後日中前氣生得調日中後夜半前氣死不得調調氣之時則仰卧牀鋪厚輭枕高下共身平舒手展脚兩手握大母指節去身四五寸兩脚相去四五寸數數叩齒飲玉漿引氣從鼻入腹足則停止有力更取久住氣悶從口細細吐出盡還從鼻細細引入出氣一准前法閉口以心中數數冬耳不聞恐有誤乱兼以手下篒能至千則去仙不遠矣若天陰霧惡風猛寒勿取氣也但閉之若患寒熱及卒患癰疽不問日中疾患未發前一食間即調如其不得好差明日依式更調之若患心冷病氣即呼出若肺病即噓出若熱病氣即吹出若

肝病即呵出若脾病即吸出若腎病即四出夜半後八十一
鷄鳴七十二平旦六十三日出五十四辰時四十五巳時三
十六欲作此法先左右道引三百六十遍
病有四種一冷痺二氣疾三邪風四熱毒若有患者安心調
氣此法無有不差也
凡百病不離五藏五藏各有八十一種疾冷熱風氣計成四
百四病事須識其相類善以知之
心藏病者躰冷熱相法心色赤患者夢中見人著赤衣持赤
刀杖火來怖人療法用呼吹二氣呼療冬吹治熱
肺藏病者胷背滿脹四肢煩悶相法肺色白患者喜夢見美
女美男詐親附人共相抱持或作父母兄弟妻子療法用噓
氣出
肝藏病者憂愁不樂悲思喜頭眼疼痛相法肝色青夢見人
著青衣捉青刀杖或師子虎狼來恐怖人療法用呵氣出
脾藏病者體上遊風習習遍身痛煩悶相法脾色黃通主色
夢或作小兒擊歷又邪猶人或如旋風團欒轉治法用唏氣出
腎藏病者體冷陰囊面目惡瘥相法腎色黑夢見黑衣及獸
物捉刀杖相怖用吗氣出
冷病者用大呼三十遍細呼十遍呼法鼻中引氣入口中吐
氣出當令聲相逐呼字而吐之熱病者用大吹五十遍細吹
十遍吹如吹物之吹當使字氣聲似字肺病者用大噓三十
遍細噓十遍肝病者用大呵三十遍細呵十遍脾病者用大
唏三十遍細唏十遍腎病者用大吗五十遍細吗三十遍此
十二種調氣法若有病依此法恭敬用心無有不差皆須左
右道引三百六十遍然後乃為之

服食法第六

論曰凡人春服小續命湯五劑及諸補散各一劑夏大熱則
服腎瀝湯三劑秋服黃耆等九一兩劑冬服藥酒兩三劑立
春日則止此法終身常平爾則百病不生矣俗人見淺但知鈎
吻之殺人不信黃精之益壽但識五穀之療飢不知百藥之
濟命但解施瀉以生育不能秘固以頤養故有服餌方焉鄙
惜曰夫欲服食當尋性理所宜審玲瞹之適不可見彼得力
我便服之初御藥皆先草木次石是爲將藥之大較也所謂
精麁相代階篤以至精者也夫人從少至長體習五穀卒不
可一朝頓遺之凡服藥物爲益遲微則無充飢之驗然積年
不已方能骨髓填實五穀俱然而自斷今人多望朝夕之效
求目下之應府藏未充便以絕粒穀氣始除藥未有用又將
御女形神與俗無別以此致弊胡不怪哉服餌大體皆有次
第不知其術者非止交有所損卒亦不得其力故服餌大法

必先去三蟲三蟲既去次服草藥好得藥力次服木藥好得
力訖次服石藥依此次第乃得遂其藥性庶事安穩可以延
齡矣

去三蟲方

生地黃汁三升東向竈葦火煎三沸內清漆二升以
荊匕攪之日移一尺內眞丹三兩復移一尺內瓜子
末三升復移一尺內大黃末三兩微火勿令焦候之
可丸先食服如梧子大一丸日三濁血下鼻中三十
日諸蟲皆下五十日百病愈面色有光澤

又方

漆二升　蕪菁子一升　大黃一兩　酒半升

右四味以微火合煎可丸先食服如梧子三丸十日濁血
下出鼻中三十日蟲皆爛下五十日身老澤一年行及奔

馬消息四體安穩乃可服草藥其餘法在三蟲篇中備述

服天門冬方

天門冬暴乾擣下篩食後服方寸匕日三可至十服

小兒服尤良與松脂若蜜丸服之益善惟多弥佳

又方

擣取汁微火煎取五斗下白蜜一斗胡麻炒末二升合煎攪之勿息可丸即上火下大豆黃末和爲餅徑三寸厚半寸一服一枚日三百日已上得益此方最上妙包衆方法釀酒服始傷多無苦多即吐去病世方在第十四卷中前道人年近三百而少常告皇甫隆云但取天門冬去心皮切乾之酒服方寸匕日三令人不老補中益氣愈百病也天門冬生奉高山谷在東嶽名淫羊食在中嶽名天門冬在西嶽名管松在南嶽名百部在北嶽名無不愈在原陸山阜名顛棘雖然處處有之異名其實一也在北陰地者佳取細切烈日乾之久服令人長生氣力百倍治虛勞絶傷年老衰損羸瘦偏枯不隨風濕不仁冷痺心腹積聚惡瘧癰疽腫癩疾重者周身膿壞鼻柱敗爛服之皮脫蟲出顏色肥白此無所不治亦治陰蝕瘡耳聾目闇久服白髮黑齒落生延年益命入水不濡服二百日後悟泰疾損拘急者緩羸劣者強三百日身輕三年走及奔馬三年心腹固疾皆去

服地黃方

生地黃五十斤擣之絞取汁澄去滓微火上煎減過半內白蜜五升攪之令相得可丸乃止服

如雞子一枚日三令人肥白

又方

地黃十斤細切以淳酒二斗漬三宿出暴乾反復內之取酒盡止與甘草巴戟天厚朴乾漆覆盆子各一斤擣下篩食後酒服方寸匕日三加至二匕使人老者還少強力無病延年

作熟乾地黃法

採地黃去其鬚葉及細根擣絞取汁以漬肥者著甑中土若米無在以蓋上蒸之一時出暴燥更內汁中又蒸汁盡止便乾之亦可直切蒸之半日數以酒灑之使周匝至夕出暴乾可擣蜜丸服之

種地黃法

先擇好地黃赤色虛軟者深耕之臘月逆耕凍地彌好擇肥大好地黃根切長四五分至一二寸許一可種一畝二三月種之作畦畔相去一尺生後隨

壅數芸之至九月十月視其葉小衰乃掘取一畝得二十許斛擇取大根水淨洗其細根乃剪頭尾輩亦洗取之日暴令極燥小舂乃以竹刀切長寸餘許白茅露埳下蒸之密蓋上亦可囊盛土填之從旦至暮當熏不盡黑者明日又擇取蒸之先時已擣其細碎者取汁銅器煎之如薄飴於是以地黃內汁中周匝出暴乾又內盡汁止率百斤生者令得二十斤取

初八月九月中掘者其根勿令大老強蒸則不消盡有筋脉初以地黃內甑中時先用銅器承其下以好酒淋地黃上令汗汁後下入器中取以併和煎汁佳

黃精膏方

黃精一石去鬚毛洗令淨潔打碎蒸令好熟押得汁
復煎去上遊水得一斗內乾薑末三兩桂心末一兩
微火煎之看色欝黃便去火待冷盛不津器
中酒五合和服二合常帶末食前旦一服舊皮脫顏色
變光花色有異鬚髮更改欲長服者不須和酒內生
大豆黃絶穀食之不飢渴長生不老

服烏麻法

取黑皮眞檀色者烏麻隨多少水拌令潤勿過濕蒸
令氣遍即出下暴之使乾如此九蒸九擣去上皮末
食前和水若酒服二方寸匕日三漸漸不飢絶穀久
服百病不生常服延年不老

飲松子方

七月七日採松子過時即落采可得治服方寸匕日
三四一云一服三合百日身輕三百日行五百里絶
穀服昇仙渴飲水亦可和脂服之若九如梧桐子大
服十九

餌柏實方

柏子人二升擣令細淳酒四升漬攪之如泥下白蜜
二升棗膏三升擣令可九入乾地黃末白朮末各一
升攪和九如梧子日二服每服三十九二十日萬病
皆愈

服松脂方

百鍊松脂下篩以蜜和內筒中勿令中風日服如博
碁一枚博碁長三寸方一寸日三漸漸月別服一斤
不飢延年亦可淳酒和白蜜如餳日服一二兩至半
斤凡取松脂老松皮自有聚脂者最第一其根下有

傷折處不見日月者得之名曰陰脂彌良惟衡山東行五百里有大松皆三四十圍乃多脂又法五月刻大松陽面使向下二十四株株可得半升亦煮其老節根處者有脂得用仙經玄常以三月入衡山之陰取不見日月松脂煉而餌之即不召而自來服之百日耐寒暑二百日五藏補益服之五年即見西王母仙經又云諸石所生三百六十五山其可食者滿谷陰懷中松脂耳其谷正從衡山嶺直東四百八十里當橫捷正在橫嶺東北行過其南入谷五十里窮穴有石城白鶴其東方有大石四十餘丈狀如白松松下二丈有小穴東入山有丹砂可食其南方陰中有大松大三十餘圍有三十餘株不見日月皆可取服之

採松脂法

以日入時破其陰以取其脂脂膏等分食之可以通神靈鑿其陰陽為孔令方五寸深五寸還以皮掩其孔無令風入風入則不可服以春夏時取之取訖封塞勿洩以泥塗之東北行丹砂穴有陰泉水可飲此弘農車君以元封元年入北山食松脂十六年復下居長安東市在上谷牛頭谷時往來至秦嶺上年常如三十者

煉松脂法

松脂七斤以桑灰汁一石煮脂三沸接置冷水中凝復煮之凡十遍脂白矣可服今谷在衡州東南攸縣界此松脂與天下松脂不同

餌茯苓方

茯苓十斤去皮酒漬密封之十五日出之取服如博
碁日三亦可屑服方寸凡餌茯苓皆湯煮四五沸或
以水漬六七日

茯苓蘇方

茯苓 五斤 炙 汁煮十遍 凝水煮十遍 清水煮十遍 松脂 五斤 煮如茯苓法 海次煮四十遍

生天門冬 五斤 去心皮 暴乾作末 牛酥 三斤 煉 三十遍

白蜜 三斤 煎令沫盡 蠟 三斤 煉 三十遍

右六味各擣篩以銅器重湯上先內酥次蠟次蜜消訖內
藥急攪之勿住務令大均內甕器中密封之勿洩氣先一
日不食欲不食先須喫好美食令極飽然後絕食即服二
兩二十日後服四兩又二十日後八兩細丸之以咽中下
爲度第二度以四兩爲初二十日後八兩又三十日二兩
第三度服以八兩爲初二十日二兩二十日四兩合一百
八十日藥成自後服三丸將補不服亦得恒以酥蜜消息
之美酒服一升爲佳合藥須取四時王相日特忌刑殺厭
及四激休廢等日大凶此彭祖法

茯苓膏方 千金翼名凝靈膏

茯苓 十斤 去皮 松子人 二斤 柏子人 各十斤

茯苓淨 松脂 四十

右四味皆依法煉之松柏人不煉擣篩白蜜二斗四升內
銅器中湯上微火煎一日一夕次第下藥攪令相得微火
煎七日七夜止丸如小棗每服七丸日三欲絕穀頓服取
飽即得輕身明目不老 此方後一本有茯苓酥杏人酥地黃酥三方然諸本並無又千金翼

中已有苓酥不添

服枸杞根方 主養性遐齡

枸杞根切一石水一斗以小麥一斗乾淨擇內汁中漬一宿曝二往反令

汁盡曝乾擣末酒服方寸匕日二一年之中以二月八月各合一劑終身不老

枸杞酒方

枸杞根一百二十斤切以東流水四石煮一日一夜取清汁一石清麴一斗如家酒法熟取清貯不津器中内乾地黃末二斤半桂心乾薑澤瀉蜀椒末各一升商陸末二升以絹袋貯内酒底緊塞口埋入地三尺堅覆上三七日沐浴整衣冠再拜平曉向甲寅地日出處開之其酒赤如金色旦空腹服半升十日萬病皆愈三十日瘢痕滅惡疾人以水一升和酒半升分五服愈(千金翼又云若欲服石者取河中清白石如雞卵大者二枚以水三升煮一沸以此酒半升即合置中須臾熟可食)

餌雲母水方療萬病

上白雲母二十斤薄辟手以露水八斗作湯分半洗洗雲母如此再過又取二斗作湯内共消十斤以雲母木器中漬之二十日出絹袋盛懸屋上勿使見風令燥以水漬鹿皮爲囊揉挺之從旦至中乃以細絹下篩滓復揉挺令得好粉五斗餘者棄之取粉一斗内崖蜜二斤攪令如粥内生竹筩中薄削之漆固口埋北垣南岸下入地六尺覆土春夏四十日秋冬三十日出之當如澤爲成若洞洞不消者更埋三十日出之先取水一合内藥一合攪和盡服之日三水寒溫盡百在服十日小便當變黃此先療勞氣風疹也二十日腹中寒癖消三十日齲齒除更新生四十日不畏風寒五十日諸病皆愈顏色日少長生神仙吾目驗之所以述録

鍊鍾乳粉法

鍾乳一斤不問厚薄但取白淨光色好者即任用非此者不堪用先泥鐵鎚可受四五斗者為罏貯水令滿去口三寸餘即得常令如此勿使出水也乳著金銀甕甕中任有用之乃下鎚中令水沒甕上二寸餘即得常令如此勿使出水也微火燒之日夜不絶水欲竭即添成煖水每一周時輒易水洗鎚井洮乳七日七夜出之淨洮乾內瓷鉢中玉椎縛格少著水研之一日一夜急著水攪令大濁澄取濁汁其乳麤者自然著底作末者即自作濁水出即經宿澄取其麤著底者准前法研之凡五日五夜皆細逐水作粉好用澄鍊取暴乾即更於銀鉢中研之一日候入肉水洗不落者佳

鍾乳散治虛羸不足六十已上人瘦弱不能食者百病方

成鍊鍾乳粉三兩上當薰參石斛乾薑各三分

右四味擣下篩三味與乳合和相得均分作九貼平旦空腹溫淳酒服一貼日午後服一貼黃昏後服一貼三日後准此服之凡服此藥法皆三日一劑三日內止食一升半飯一升肉肉及飯惟爛不得服葱豉問曰何故三日少食勿得飽也荅曰三夜乳在腹中熏補藏府若此飽食即推藥出腹所以不得飽食也何故不得生食由食生故即損傷藥力藥力既損脂肪亦傷所以不得食生食也何故不得食葱豉豉葱豉殺藥故不得食也三日服藥既盡三日內須作美食補之任意所便仍不用葱豉及鞭食也三日補訖還須准式服藥如前盡此一斤乳訖其氣力當自知耳不能具述一得此法其後服十斤二十斤任意方便可知也

西嶽真人靈飛散方

雲母粉一斤　茯苓八兩　鍾乳粉　柏子人
人參千金翼作白朮　續斷　桂心各七兩　菊花十五兩
乾地黃十二兩
右九味爲末生天門冬十九斤取汁漬藥內銅器中蒸一
石二斗黍米熟暴乾爲末先食飲服方寸匕日一三
日力倍五日血脉充盛七日身輕十日面色悅澤十五日
行及奔馬三十日夜視有光七十日白髮盡落故齒皆去
更取二十一匕白蜜和擣三百杵丸如梧子大作八十一
枚暴乾丸皆映徹如水精珠欲令髮齒時生者吞七枚日
三即出髮禾白齒不落者但服散五百年乃白如前法服
已白者餌藥至七百年乃落入山日吞七丸絶穀不飢余
得此方已來將踰三紀頃者但美而悅之疑而未敢措手
積年詢訪屢有好名人曾餌得力遂服之一如方說但能

業之不已功不徒棄耳

黃帝雜忌法第七

旦起勿開目洗面令人目澀失明饒淚清旦常言喜事勿惡
言聞惡事即向所來方三唾之吉又勿嗔怒勿叱咤咄呼勿
嗟歎勿唱忝何名曰請禍勿立膝坐而交臂膝上勿令髮覆
面皆不祥勿舉足向火勿對竈罵詈凡行立坐勿背日吉勿
面北坐又思不祥起凡欲行來常存魁綱在頭上所向皆吉
若欲征戰存斗柄在前以指敵吉勿面北冠帶凶勿向西北
唾犯魁綱神凶勿欠唾唾不用遠成肺病令人手足重及背
痛欠嗽亦勿向西北大小便勿殺龜蛇勿怒目視日月喜令
人失明行及乘馬不用迴顧則神去人不用鬼行踏粟凡過
神廟慎勿輒入入必恭敬不得舉目恣意顧瞻當如對嚴君
馬乃享其福耳不爾速獲其禍亦不得返首顧視神廟忽見

龍蛇勿興心驚怪亦勿注意瞻視忽見鬼怪變異之物即強
抑之勿怪呪曰見怪不怪其怪自壞又路行及衆中見殊妙
美女愼勿熟視而愛之此當魑魅之物使人深愛無問空山
曠野稠人廣衆之中皆亦如之凡山水有沙虱處勿在中浴
害人欲渡者隨驢馬後急渡不傷人有水弩處射人影即死
欲渡水者以物打水其弩即散急渡不傷人諸山有孔云入
採寶者惟三月九月餘月山閉氣交死也凡人空腹不用見
尸臭氣入鼻舌上白起口常臭欲見尸者皆須飲酒見之能
辟毒遠行觸熱塗中逢河勿洗面生烏黑

房中補益第八

論曰人年四十已下多有放恣四十已上即頓覺氣力一時
衰退衰退既至衆病蜂起又而不治遂至不救所以彭祖曰
以人療人眞得其眞故年至四十須識房中之術夫房中

術者其道甚近而人莫能行其法一夜御十女閉固而已此
房中之術畢矣兼之藥餌四時勿絕則氣力百倍而智慧日
新然此方之作也非欲務於淫佚苟求快意務存節欲以廣
養生也非苟欲強身力幸女色以縱情意在補益以遣疾也
此房中之微旨也是以人年四十已下即服房中之藥者皆
所以速禍愼之愼之故年未滿四十者不足與論房中之事
貪心未止兼餌補藥倍力行房不過半年精髓枯竭惟向死
近少年極須愼之人年四十已上常服鍊乳散不絕可以不
老又餌雲母足以愈疾延年人年四十已上勿服瀉藥常餌
補藥大佳昔黃帝御女一千二百而登仙而俗人以一女伐
命知與不知豈不遠矣其知道者御女甚不多耳凡婦人不
必須有顏色妍麗但得少年未經生乳多肌肉益也若足財
力選取細髮目精黑白分明體柔膚輭肌膚細滑言語聲音

和調四肢骨節皆欲足肉而骨不大其陰及掖皆不欲有毛有毛當輭細不可極於相者但蓬頭蜷面槌項結喉雄聲大口高鼻麥齒目精渾濁口頷有毛骨節高大髮黃少肉隱毛多而且強又生逆毛與之交會皆賊命損壽也凡御女之道不欲令氣未感動陽氣微弱即以交合必須先徐徐嬉戲使神和意感良久乃可令得陰氣陰氣推之須臾自強所謂弱而內迎堅急出之進退欲令疎遲情動而止不可高自投擲顛倒五藏傷絕精脉生致百病但數交而愼密者諸病皆愈年壽日益去仙不遠矣不必九一三五之數也能百接而不施瀉者長生矣若御女多者可採氣採氣之道但深接勿動使良久氣上面熱以口相當引取女氣而吞之可疎疎進退意動便止緩息眠目偃卧道引身體更強可復御他女也數數易女則得益多人常御一女陰氣轉弱爲益亦少陽道法

火陰家法水水能制火陰亦消陽久用不止陰氣逾陽陽則轉損所得不補所失但能御十二女而不復施瀉者令人不老有美色若御九十三女而自固者年萬歲矣凡精少則病精盡則死不可不愼數交而一瀉精氣隨長不能使人虛也若不數交而即瀉則不得益瀉之精氣自然生長但遲微不如數交接不瀉之速也凡人習交合之時常以鼻多內氣口微吐氣自然益矣交會畢蒸熱是得氣也以昌蒲末三分白粱粉傅摩令燥既使強盛又濕瘡不生也凡欲施瀉者當閉口張目閉氣握固兩手左右上下縮鼻取氣又縮下部及吸腹小偃脊脅急以左手中兩指抑屏翳穴長吐氣并琢齒千遍則精上補腦使人長生若精妄出則損神也仙經曰令人長生不老先與女戲飲玉漿玉漿口中津也使男女感動以左手握持思存丹田中有赤氣內黃外白變爲

日月俳佪丹田中俱入泥垣兩半合成一因閉氣深內勿出入但上下徐徐咽氣情動欲出急退之此非上士有智者不能行也其丹田在臍下三寸許兩半放形而一謂日月相揄者也思作日月想合徑三寸許兩半放形而一謂日月相揄者也雖出入仍思念所作者勿廢佳也又曰男女俱仙之道深內勿動精思臍中赤色大如雞子形乃徐徐出入情動乃退一日一夕可數十爲定令人益壽男女各息意共存思之可猛念之御女之法能一月再泄一歲二十四泄皆得二百歲有顏色無疾病若加以藥則可長生也人年二十者四日一泄三十者八日一泄四十者十六日一泄五十者三十日一泄六十者閉精勿泄若體力猶壯者一月一泄凡人氣力自有強盛過人者亦不可抑忍久而不泄致生癰疽若年過六十而有數旬不得交合意中平平者自可閉固也昔正觀初有

一野老年七十餘詣余云數日來陽氣益盛思與家嫗晝寢春事皆成未知垂老有此爲善惡耶余荅之曰是大不祥子獨不聞膏火乎夫膏火之將竭也必先暗而後明明止則滅今足下年邁桑榆久當閉精息欲茲忽春情猛發豈非反常耶竊謂足下憂之子其勉歟後四旬發病而死此其不愼之効也如斯之輩非一且疏一人以昜將來耳所以善攝生者凡覺陽事輒盛必謹而抑之不可縱心竭意以自賊也若一度制得則一度火滅一度增油若不能制縱情施瀉即是膏火將滅更去其油可不深自防所患人少年時不知道知道亦不能信行之至老乃知道便以晚矣病難養也晚而自保猶得延年益壽若年少壯而能行道者得仙速矣或曰年未六十當閉精守一爲可爾否曰不然男不可無女女不可無男無女則意動意動則神勞神勞則損壽若念真正無可思

者則大佳長生也然而萬無一有強抑鬱閉之難持易失使人漏精尿濁以致鬼交之病損一而當百也其服食藥物見第二十卷中

御女之法交會者當避丙丁日及弦望晦朔大風大雨大霧大寒大暑雷電霹靂天地晦冥日月薄蝕虹蜺地動若御女者則損人神不吉損男百倍令女得病有子必顛癡頑愚瘖瘂聾聵攣跛盲眇多病短壽不孝不仁又避日月星辰火光之下神廟佛寺之中井竈圊厠之側塚墓尸柩之傍皆悉不可夫交合如法則有福德大智善人降託胎中仍令性行調順所作和合家道日隆祥瑞競集若不如法則有薄福愚癡惡人來託胎中仍令父母性行凶險所作不成家道日否殃咎屢至雖生成長家國滅亡夫禍福之應有如影響此乃必然之理可不再思之若欲求子者但待婦人月經絶後一日三日五日擇其王相日及月宿在貴宿日以生氣時夜半後乃施瀉有子皆男必壽而賢明高爵也以月經絶後二日四日六日施瀉有子必女過六日後勿得施瀉既不得子亦不成人

王相日

春甲乙　夏丙丁　秋庚辛　冬壬癸

月宿日

正月一日　六日　九日　十日　十一日　十二日
十四日　二十一日　二十四日　二十九日
二月四日　七日　八日　九日　十日　十二日
十四日　十九日　二十二日　二十七日
三月一日　二日　五日　七日　八日
十日　十七日　二十日　二十五日

四月三日　四日　五日　六日　八日　十日
　十五日　十八日　二十二日　二十八日
五月一日　二日　三日　四日　五日　六日　十二日
　十五日　二十日　二十五日　二十六日　三十日
六月一日　三日　十日　十三日　十八日　二十三日
　二十六日　二十七日　二十八日　二十九日
七月一日　八日　十一日　十六日　二十一日　二十四日
　二十五日　二十六日　二十七日　二十九日
八月五日　八日　十日　十三日　十八日　二十一日
　二十三日　二十四日　二十五日　二十六日
九月三日　六日　十一日　十六日　十九日　二十日
　二十一日　二十二日　二十四日
十月一日　四日　九日　十日　十四日　十七日
　十八日　十九日　二十日　二十一日　二十四日
十一月一日　六日　十六日　十九日　二十日
十二月四日　九日　十三日　十四日　十五日
　十七日　二十四日
若合春甲寅乙卯　夏丙午丁巳　秋庚申辛酉
冬壬子癸亥與此上件月宿日合者尤益
黃帝雜禁忌法曰人有所怒血氣未定因以交合令人發癰疽又不可忍小便交合使人淋瘁中痛面失血色及遠行疲乏來入房爲五勞虛損少子且婦人月事未絕而與交合令人成病得白駮也水銀不可近陰令人消縮麂猪二脂不可近陰令陰痿不起

朝奉郎守太常少卿充秘閣校理判登聞檢院護軍賜緋魚袋臣林億等校正

平脉大法第一
診五藏脉輕重第二
指下形狀第三
五藏脉所屬第四
分別病形狀第五
三關主對法第六
五藏積聚第七
陰陽表裏虛實第八
何時得病第九
扁鵲華佗察聲色要訣第十
五藏六腑氣絶證候第十一

四時相反及脉第十二
診脉動止投數疎數死期年月第十三
扁鵲診諸反逆死脉要訣第十四
診百病死生訣第十五
三部虛實訣死生第十六

平脉大法第一

論曰夫脉者醫之大業也既不深究其道何以爲醫者哉是以古之哲醫窮察俯仰不與常人同域造次必於醫顛沛必於醫故能感於鬼神通於天地可以濟衆可以依憩若與常人混其波瀾則庶事墮壞使夫物類將何仰焉由是言之學者必當屏棄俗情凝心於此則和鵲之功因茲可得而致也經曰診脉之法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脉未盛絡脉調均氣血未亂故乃可診有過之脉（脉經云過此非也）切脉動靜而視精明察五色觀五藏有餘不足六腑彊弱形之盛衰可以此參伍訣生死之分也

又曰平脉者皆於平旦勿食勿語消息體氣設有所作亦如食頃師亦如之既定先診寸口初重指切骨定畢便漸舉指令指不厚不薄與皮毛相得如三菽之重於輕重之間隨人彊弱肥瘦以意消息進退舉按之宜稱其浮沉諸類應於四時五行與人五藏相應不爾者以其輕重相薄尋狀論實暑得失

凡人稟形氣有中適有躁靜皆各不同氣脉潮動亦各隨其性韻故一呼而脉再至呼吸定息之間復一至合爲五至此爲平和中適者也春秋日夜正等無餘分時也其餘日則其呼而脉至多吸而脉至少或吸而脉至多呼而脉至少此則不同如冬夏日夜長短之異也凡氣脉呼吸

法晝夜變通倣四時然於呼吸定息應五至之限無有虧僻猶晷刻與四時有長短而歲功日數無遺也若人有羸有壯其呼吸雖相壓遏而晝夜息度隨其漏刻是謂呼吸家晝夜變通倣四時

夫診脉當以意先自消息壓取病人呼吸以自同而後察其脉數計於定息之限五至者為平人若有盈縮尋狀論病源之所宜也

問曰何謂三部脉蒼曰寸關尺也凡人脩短不同其形各異有尺寸分三關之法從肘腕中橫文至掌魚際後文却而十分之而入取九分是為尺從魚際後文却還度取十分之一則是寸寸十分之而入取九分之中則寸口也此處其骨自高故云陰得尺內一寸陽得寸內九分從寸口入却行六分為關分從關分又入行六分為尺分

又曰從魚際至高骨却行一寸其中名曰寸口從寸口至尺名曰尺澤故曰尺寸寸主射前名曰關陽出陰入以關為界如天地人為三界寸主射上焦膈及皮毛竟手上部關主射中焦腹及腰中部尺主射下焦小腹至足下部此為三部法象三才天地人頭腹足為三元也夫十二經皆有動脉獨取寸口以訣五藏六腑死生吉凶之候者何謂也然寸口者脉之大會手太陰之動脉也人一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉行六寸人一日一夜凡一万三千五百息脉行五十度周於其身漏水下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度為一周(脛時也)故五十度而復會於手太陰太陰者十脉法三百六十日也寸口也即五藏六腑之所終始故法取於寸口人有三百六

診五藏脉輕重法第三

初持脉如三菽之重與皮毛相得者肺部金秋三月庚辛之氣
如六菽之重與血脉相得者心部火夏三月丙丁之氣
如九菽之重與肌肉相得者脾部土王四季季夏戊己之氣
如十二菽之重與筋平者肝部木春三月甲乙之氣
按之至骨舉之來疾者腎部水冬三月壬癸之氣
心肺俱浮何以別之然浮而大散者心也濇弱如水行舟勝重
肺也法金惨濇
腎肝俱沈何以別之然牢而長者肝也如卉生苗吐穎
按之耎舉指來實者腎也
脾者中州故其脉在中是陰陽之脉也千金翼云遲緩而長者脾也

指下形狀第三

浮脉舉之有餘按之不足浮於指下
沈脉舉之不足按之有餘乃重按之得

濇脉細而遲往來難且散或一止復來一日浮而短一日短而止或如散
滑脉往來前却流利展轉替然與數相似一日浮中如有力一日澁澁如欲脫
洪脉極大在指下一日而大浮
細脉小大於微常有但極細耳
微脉極細而輭或欲絶若有若無一日小也一日手下快一日薄一日按之如欲盡也
弦脉舉之無有按之如張弓弦狀一曰如張弓弦按之不移又曰如浮緊乃爲弦也
緊脉數如切繩狀一曰如索之無常
遲脉呼吸三至去來極遲一曰舉之不足按之盡牢舉之無有
數脉去來促急一曰一息六七至一曰數者進之名
緩脉去來亦遲小駃於遲一曰浮大而輭陰與陽同等
弱脉極輭而沈細按之欲絶指下一曰按之乃得舉之即無
動脉見於關上無頭尾大如豆厥厥動摇
伏脉極重指著骨乃得一曰關上沈不出名曰伏一曰手下裁動一曰按之不足舉之無有

芤脉浮大而軟按之中央空兩邊實一曰指下無兩傍有
軟脉極軟而浮細一曰按之無有舉之有餘一曰細小如軟千金翼軟作濡
虛脉遲大而軟按之不足隱指豁豁然空
實脉大而長微彊按之隱指幅幅然一曰沈浮皆得
促脉來去數時一止
結脉往來緩時一止復來脉結者生
代脉來數中止不能自還因而復動脉代者死
散脉大而散散者氣實盛虛有表無裏
革脉有似沈伏實大而長微弦千金翼以革爲牢
弦與緊相類　浮與芤相類一曰浮與洪相類
奕與弱相類　微與濇相類
沈與伏相類　緩與遲相類又曰軟與遲相類
革與實相類翼作牢與實相類
滑與數相類

心部在左手關前寸口亦名人迎
肝部在左手關上
腎部在左手關後尺中
肺部在右手關前寸口亦名氣口
脾部在右手關上
腎部在右手關後尺中

脉法讚云

肝心出左　脾肺出右　腎與命門
俱出尺部　魂魄穀神　皆見寸口
左主司官　右主司府　左大順男
右大順女　關前一分　人命之主
左爲人迎　右爲氣口　神門決斷

兩在關後　人無二脉　病死不愈
諸經損減　各隨其部　三陰三陽（一云按察陰陽）
誰先誰後　陰病治官（官藏內也）陽病治府（府外也）
奇邪所舍　如何捕取　審而知者
針入病愈
脉有三部　陰陽相乘　榮衛氣血
因息遊布　津液流通　隨時動作
候象形容　春弦秋浮　上下於中
察色觀脉　大小不同　一時之間
變無經常　尺寸參差　或短或長
上下乖錯　或存或亡　病輒改易
進退低昂　心迷意惑　動失紀綱

願爲纎陳　令得分明　師曰子之所問
道之根源　脉有三部　尺寸及關
榮衛流行　不失衡銓　腎沈芤洪
肺浮肝弦　此自常經　不失銖分
出入昇降　漏刻周旋　水下二刻
脉一周身　旋復寸口　虛實見焉
變化相乘　陰陽相干　風則浮虛
寒則緊弦　沈潛水畜　支飲急弦
動弦爲痛　數洪熱煩　設有不應
知變所緣　三部不同　病各異端
太過可怪　不及亦然　邪不空見
終必有姦　審察表裏　三焦別分
知邪所舍　消息診看　料度腑藏

獨見若神

分別病形狀第五

脉數則在腑遲則在藏

脉長而弦病在肝脉經作出於肝

脉小血少病在心扁鵲云脉大而洪出於心

脉下堅上虛病在脾胃

脉滑一作澁而微浮病在肺

脉大而堅病在腎扁鵲云小而緊

脉滑者多血少氣

脉澁者少血多氣

脉大者血氣俱多又云脉來大而堅者血氣俱實

脉小者血氣俱少又云脉來細而微者血氣俱虛沈細滑疾者熱

遲緊為寒脉經云洪數滑疾為熱濇遲沈細為寒

脉盛滑緊者病在外熱

脉小實而緊者病在內冷

脉小弱而濇謂之久病

脉滑浮而疾者謂之新病

脉浮滑其人外熱風走刺有飲難治

脉沈而緊上焦有熱下寒小便數時苦絞痛下利重

脉沈而細下焦有寒小便不得冷即便下

脉浮緊直滑直者外熱內冷不得大小便

脉洪大緊急病速進在外苦頭發熱癰腫

脉細小緊急病速進在中寒為疝瘕積聚腹中刺痛

脉沈重而直前絶者病血在腸間

脉沈重而中散者因寒食成癰

脉直前而中散絶者病消渴（一云病浸淫瘡）
脉沈重前不至寸口徘徊絶者病在肌肉遁尸
脉左轉而沈重者氣微腸在胃中
脉右轉出不至寸口者内有肉瘕
脉累累如貫珠不前至有風寒在大腸伏留不去
脉累累如止不至寸口輭者結熱在小腸膜中伏留不去
脉直前左右彈者病在筋骨中也
脉後而左右彈者病在血脉中脉血也
脉前大後小即頭痛目眩
脉前小後大即胷滿短氣
上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死
上部無脉下部有脉雖困無所苦
夫脉者血之府也長則氣治短則氣病數則煩心大則病進

上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰細（一云滑）則氣少濇則心痛渾渾革革至如涌泉病進而危弊弊綽綽其去如弦絶者死短而急者病在上長而緩者病在下沈而弦急者病在内浮而洪大者病在外脉實者病在内脉虚者病在外在上為表在下為裏浮為在表沈為在裏滑為實為下（又為陽氣衰）數為虚為熱浮為風為虚動為痛為驚沈為水為實（又為鬼疰）弱為虚為悸遲則為寒濇則少血緩則為虚洪則為氣（一作熱）緊則為寒弦數為瘧瘧脉自弦弦數多熱弦遲多寒微則為虚代散則死弦為痛痹（為風作浮疰）偏弦為欲雙弦則脇下拘急而痛其人濇濇惡寒脉大寒熱在中伏者霍亂安卧脉盛謂之脫血凡亡汗肺中寒飲冷水欬嗽下利胃中虚冷此等其脉並緊

浮大者中風頭重鼻塞
浮而大者風

浮而緩皮膚不仁風寒入肌肉
滑而浮散者攤緩風　滑而澁而緊痺病
浮洪大長者風眩癲疾
大堅疾者癲病
弦而鉤發下如刀刺狀如蜚尸至困不死
緊而急者遁尸
洪大者傷寒熱病
浮洪大者傷寒秋吉春成病
浮而滑者宿食
浮滑而疾者食不消脾不磨
短疾而滑酒病
浮而細滑傷飲

遲而濇中寒有癥結
駛而緊積聚有擊痛
弦急而瘕小腹痛又爲癖病一作痺病
遲而滑者脹
盛而緊白脹
弦小者寒癖
沈而弦者懸飲內痛
弦數有寒飲冬夏難治
緊而滑者吐逆
小弱而濇胃反
遲而緩者有寒
微而緊者有寒
沈而遲腹藏有冷病

微弱者有寒少氣
實緊胃中有寒苦不能食時時利者難治一作時時嘔噦難治
滑數心下結熱盛
滑疾胃中有熱
緩而滑曰熱中
沈而急病傷暑暴發虛熱
浮而絶者氣
辟大而滑中有短氣
浮短者其人肺傷諸氣微少不過一年死法當嗽也
沈而數中水冬不治自愈
短而數心痛心煩
弦而緊胗痛藏傷有瘀血一作有寒血
沈而滑爲下重亦爲背胗痛

脉來細而滑按之能虛因急持直者僵仆從高墮下病在內
微浮秋吉冬成病
微數雖甚不成病不可勞
浮滑疾緊者以合百病久易愈
陽邪來見浮洪
陰邪來見沈細
水穀來見堅實
脉來乍大乍小乍長乍短者爲祟
脉來洪大婦婦者祟
脉來沈沈澤澤四肢不仁而重土祟
脉與肌肉相得久持之至者可下之
弦小緊者可下之
緊而數寒熱俱發必下乃愈

弦遲者宜溫藥

緊數者可發其汗

三關主對法第六

諸浮諸弦諸沈諸緊諸澁諸滑若在寸口膈以上病頭部若在
關上胃以下病腹部若在尺中腎以下病腰脚部

平寸口脉主對法

寸口脉滑而遲不沈不浮不長不短爲無病左右同法

寸口太過與不及寸口之脉中手短者曰頭痛中手長者曰
足脛痛中手促上擊者曰肩背痛

寸口脉沈而堅者曰病在中

寸口脉浮而盛者曰病在外

寸口脉沈而弱者曰寒熱及亦痕少腹痛熱一作氣又作中

寸口脉沈而弱髮必墮落

寸口脉沈而緊苦心下有寒時時痛有積邪

寸口脉沈而滑者肖中有水氣面目腫有微熱爲風水

寸口脉沈大而滑沈即爲血實滑即爲氣實血氣相搏入藏
即死入腑即愈

寸口脉沈肖中短氣

寸口脉沈而喘者寒熱

寸口脉浮而滑頭中痛

寸口脉浮大按之反澁尺中亦微而澁故知有滯氣宿食

寸口脉弦而緊弦即衛氣不行衛氣不行即惡寒水流走腸間
寸口脉緊或浮膈上有寒肺下有水氣

脉緊上寸口者中風風頭痛亦如之翼云亦爲傷寒頭痛

脉弦上寸口者宿食降者頭痛

寸口脉弦大婦人半生漏下男子亡血失精

寸口脉微而弱微即惡寒弱則發熱當發不發骨節疼煩當
煩不煩與極汗出
寸口脉微而弱氣血俱虛男子吐血婦人下血嘔汁出
寸口脉動而弱動即為驚弱即為悸
寸口脉緩而遲緩即為虛寒虛寒相搏則欲温食良
冷即咽痛
寸口脉遲而緩遲則為寒緩即為氣寒氣相搏則絞而痛
寸口脉遲而澁遲即為寒澁為少血
脉來過寸入魚際者遺尿脉出魚際逆氣喘息
寸口脉但實者心勞
寸口脉瀺瀺如羹上肥陽氣微連連如蜘蛛絲陰氣衰
兩手前部陽絶者苦心下寒寒毒喙中熱
寸口脉偏絶則臂偏不遂其人兩手俱絶者不可治

寸口脉來暫大暫小者陰絡也苦陰風痺應時自發身洗洗也
寸口脉來暫小暫大者陽絡也苦皮膚病汗出惡寒下部不仁
寸口脉浮中風發熱頭痛宜服桂枝湯葛根湯針風池風府
向火炙身摩治風膏覆令汗出
寸口脉緊苦頭痛是傷寒宜服麻黄湯發汗針眉衝顳顬摩
傷寒膏
寸口脉微苦寒為衄宜服五味子湯麻黄茅萸膏令汗出
寸口脉數即為吐以有熱在胃管中宜服藥吐之及針
胃管服除熱湯若傷寒七八日至十日熱在中煩滿渴者宜
服知母湯
寸口脉洪大肖脇滿宜服生薑湯白薇丸亦可紫菀湯下之
針上管期門章門
寸口脉緩皮膚不仁風寒在肌肉宜服防風湯以藥薄尉之

佳灸諸治風穴

寸口脉滑陽實胃中雍滿吐逆宜服前胡湯針太陽巨闕寫之

寸口脉弦心下悒悒微頭痛心下有水氣宜服甘遂丸針期門寫之

寸口脉弱陽氣虛弱自汗出宜服茯苓湯內補散將適飲食消息勿極勞針胃管補之

寸口脉澁是胃氣不足宜服乾地黃湯自養調和飲食針胃管三里作補之

寸口脉乳吐血微乳者衄血空虛去血故也宜服竹皮湯黃土湯灸膻中

寸口脉伏胷中逆氣噎塞不通是諸氣上衝胷中宜服前胡湯大三建九針巨闕寫之

寸口脉沈胷中引脇痛胷中有水氣宜服澤漆湯針巨闕寫之

寸口脉軟弱自汗出是虛損病宜服乾地黃湯署預丸內補散牡蠣散并粉針大衝補之

寸口脉遲上焦有寒心痛咽酸吐酸水宜服附子湯生薑湯茱萸丸調和飲食以暖之

寸口脉實即生熱在脾肺嘔逆氣塞虛則生寒在脾胃食不消化熱即宜服竹葉湯葛根湯寒即茱萸丸生薑湯

寸口脉細發熱嘔吐宜服黃芩龍膽湯吐不止宜服橘皮桔梗湯灸中府

平開脉主對法

開上脉浮而大風在胃中張口肩息心下澹澹食欲嘔

開上脉微浮積熱在胃中嘔吐逆是爲病方欲來不出一二日

開上脉滑而大小不均必吐蚘蟲心健忘

復欲發動其人欲多飲飲即注利如利止者生不止者死

關上脉緊而滑者蚘動
關上脉弦而長（大一作實）有痛如刀刺之狀在臍左右上下（脉經云有積在臍左右上下）
關上脉弦而長（大一作實）按之不減有力為中焦實有伏結在脾肺氣塞實執荏胃中
關上脉襜襜大而尺寸細者其人必心腹冷積癖瘕結聚欲熱飲食
關上脉時來時去乍大乍小乍踈乍數者胃中寒熱羸劣不欲飲食如瘧狀
關上脉浮腹滿不欲食浮為虛滿宜服平胃丸茯苓湯生薑前胡湯針胃管先寫後補之
關上脉緊為實宜服茱萸當歸湯又加大黃二兩佳（脉經云又大佳）湯而治之佳）黃針巨闕下管寫之

關上脉微胃中冷心下拘急宜服附子湯生薑湯附子丸針巨闕補之
關上脉數胃中有客熱宜服知母湯（一作除）丸除熱湯針巨闕上管寫之
關上脉緩不欲食此脾胃氣不足宜服平胃丸補脾湯又針章門補之
關上脉滑胃中有熱滑為熱實氣滿故不欲食食即吐逆宜服朴消麻黃湯平胃丸（一作宜服紫菀湯平胃丸）參大平胃丸針胃管寫之
關上脉弦胃中有冷心下厥逆脉弦胃氣虛宜服茱萸湯溫調飲食針胃管補之
關上脉弱胃氣虛胃中有客熱脉弱為虛熱作病且說云有熱不可大攻之熱去即寒起正宜服竹葉湯針胃管補之
關上脉細虛腹滿宜服生薑湯茱萸當椒湯白薇丸針灸三管

關上脉澁血氣逆冷脉澁爲血虛宜服乾地黃湯四補散針足大衝上補之

關上脉乳大便去血宜服生地黃并生竹皮湯灸膈輸若重下去血針關元甚者服龍骨丸關元一作曰關

關上脉伏有水氣溏泄宜服水銀丸針關元利小便止溏泄便止

關上脉洪胃中熱必煩滿宜服平胃丸針胃管先寫後補之

關上脉沈心下有冷氣苦滿吞酸宜服白薇丸茯苓丸附子湯針胃管補之

關上脉輭苦虛冷脾氣弱重下病宜服赤石脂湯女萎丸針關元補之

關上脉遲胃中寒宜服桂枝丸茱萸湯針胃管補之

關上脉實胃中痛宜服梔子湯茱萸烏頭丸針胃管補之

關上脉牢脾胃氣塞盛熱即腹滿嚮嚮宜服紫菀丸寫脾丸針灸胃管寫之

平尺脉主對法

尺脉浮者客陽在下焦

尺脉弱下焦冷無陽氣上熱衝頭面

尺脉弱寸彊胃絡脉傷

尺脉偏滑疾面赤如醉外熱則病

尺脉細微溏泄下冷利素問云尺寒脉細謂之後泄

尺脉虛小者足脛寒痿痺脚疼

尺脉澁下血不利多汗素問云尺澁脉滑謂之多汗

尺脉沈而滑者寸白虫

尺脉細而急者筋攣痺不能行

尺脉大者熱在脬中小便赤痛

尺脉麤常熱者謂之熱中腰胯疼小便赤熱
尺脉按之不絶婦人血閉與關相應和滑者男子氣血實婦
人即爲娠娠
尺脉來而斷絶者男子小腹有滯氣婦人月水不利
尺寸俱輕弱內溫熱手足逆冷汗出
尺寸俱沈關上無有者苦心下喘
尺寸俱沈關上若有苦寒心下痛陰中冷胠痺
尺寸俱微少心力不欲言血氣不足其人胠弱短氣
尺寸俱數手足頭面有熱俱遲有寒手足頭面有冷風
尺脉浮下熱風小便難宜服瞿麥湯滑石散針橫骨關元寫之
尺脉緊臍下痛宜服當歸湯多灸天樞針關元補之
尺脉微厥逆小腹中拘急有寒氣宜服小建中湯針氣海
尺脉數惡寒臍下熱痛小便赤黃宜服雞子湯白魚散針橫
骨寫之
尺脉緩胠弱下腫一無此四字小便難有餘瀝宜服滑石湯瞿麥
散針橫骨寫之
尺脉滑血氣實經脉不利宜服朴消煎大黃湯下去經血針
關元寫之
尺脉弦小腹痠小腹及胠中拘急宜服建中湯當歸湯針氣
海寫之
尺脉弱氣少發熱骨煩宜服前胡湯乾地黃茯苓湯針關元
補之
尺脉澁足脛逆冷小便赤宜服附子四逆湯針足太衝補之
尺脉乾下焦虛小便去血宜服竹皮生地黃湯多冊田關元
尺脉伏小腹痛癥瘕水穀不化宜服大平胃丸桔梗丸針關
元補之

尺脉沈腰背痛宜服腎氣丸針京門補之
尺脉輭脚不收風痺一無此小字五字宜服矍麥湯白魚散針關元寫之
尺脉牢腹滿陰中急宜服葶藶子葉萸丸針丹田關元中極
尺脉遲下焦有寒宜服桂枝丸針氣海關元寫之
尺脉實小腹痛小便不禁宜服當歸湯加大黃一兩利大便
針關元補之

五藏積聚第七

人病有積有聚有穀氣一作谷繫夫積者藏病終不移也聚者腑病發作有時展轉痛移為可治也穀氣者脇下牽痛按之則愈愈復發為穀氣夫病以愈不得復發今病復發即為穀氣世諸積大法脉來而細輭附骨者為積也寸口結積在胷中微出寸口積在臍傍上關上結積在臍傍微下關者積在少腹尺中結積在氣衝上關上積在心下脉出在左積在左脉出在右積在右脉兩出積在中央各以其部處之寸口沈而橫者脇下及腹中有橫積痛其脉弦腹中急痛腰背痛相引腹中有寒疝瘕

脉弦緊而細微者癥也夫寒痺癥癥瘕積聚之脉狀皆弦緊若在心下即小弦緊在胃管即關弦緊在臍下即尺弦緊一曰關脉長弦有積在臍左右上下

又脉癥法左手脉橫癥在右脉頭大在上頭小在下

又一法橫脉見左積在右見右積在左偏得洪實而滑亦為積弦緊亦為積為寒痺為疝痛內有積不見脉難治見一脉相應為易治諸不相應為不合治也左手脉大右手脉小上病在左脅下病在左足右手脉大左手脉小上病在右脅下

病在右足脉弦而伏者腹中有癰不可轉也必死不治脉來細而沈時直者身有癰腫若腹中有伏梁脉來沈而虛者泄注也脉來小沈實者胃中有積聚不可下食即吐

陰陽表裏虛實第八

弦爲少陽緩爲陽明洪爲太陽三陽也微爲少陰遲爲厥陰沈爲太陰三陰也

脉有一陰一陽一陰三陽有一陽一陰一陽二陰一陽三陰如此言之寸口有六脉俱動耶然經言如此者非有六脉俱動也謂浮沈長短滑濇也凡脉浮滑長者陽也沈濇短者陰也所以言一陰一陽者謂脉來沈而滑也二陰二陽者謂脉來浮滑而長也一沈也所以言一陽一陰者謂脉來浮而濇也一陽二陰者謂脉來長而沈濇也一陽三陰者謂脉來沈濇而短時一浮也各以其經所在言病之逆順也

脉有陽盛陰虛陰盛陽虛何謂也然浮之損小沈之實大故曰陰盛陽虛沈之損小浮之實大故曰陽盛陰虛是謂陰陽虛實之意也凡脉浮大數動長滑陽也沈濇弱弦短微陰也陽病見陰脉者逆也主死陰病見陽脉者順也主生開前爲陽開後爲陰陽數即吐陰微即下陽弦則頭痛陰弦即腹痛以依陰陽察病也又尺脉爲陰寸脉爲陽陰脉常沈而遲寸開爲陽陽脉但浮而速有表無裏邪之所止得鬼病何謂表裏寸尺爲表開爲裏兩頭有脉開中絶不至也尺脉上不至開爲陰絶寸脉下不至開爲陽絶陰絶而陽微死不治呼爲表屬腑吸爲裏屬藏陽微不能呼陰微不能吸呼吸不足肖中短氣弱反在關濡反在巔微在其上濇反在下微即陽氣不足沽熱汗出濇即無血厥而且寒

諸腑脉爲陽主熱　諸藏脉爲陰主寒　陽微則汗
陰浮自下（脉經作陰微作陽）　陽數口生瘡
陰乳下血（脉經作陰滴即下血）　無陽即厥　無陰即嘔
寸口脉浮大而疾者名曰陽中之陽煩滿身熱頭痛腹
中熱
寸口脉沈細者名曰陽中之陰病苦悲傷不樂惡聞人聲少
氣時汗出陰氣不通（不通一作併）　臂不能舉（藥源作臂偏不舉）
尺脉沈細者名曰陰中之陰病苦兩脛酸疼不能久立陰氣
衰小便餘瀝陰下濕癢
尺脉滑而浮大者名曰陰中之陽病苦小腹痛滿不能溺溺
即陰中痛大便亦然
尺脉牢而長開上無有此爲陰干陽其人苦兩脛重少腹引
腰痛
寸口壯大尺中兌有此爲陽干陰其人苦腰背痛陰中傷足
脛寒
人有三虛三實者何謂也然有脉之虛實有病之虛實有診
之虛實脉之虛實者脉來濡者爲虛牢者爲實也病之虛實
者出者爲虛入者爲實言者爲虛不言者爲實緩者爲虛急
者爲實也診之虛實者癢者爲虛痛者爲實外痛內快爲外
實內虛內痛外快爲內實外虛故曰虛實也
問曰何謂虛實邪吾邪氣盛則實精氣奪則虛何謂重實所
謂重實者大熱病氣熱脉滿是謂重實也
脉盛皮熱腹脹前後不通悗瞀爲五實
脉細皮寒氣少洩痢注前後飲食一不入爲五虛
何時得病第九

何以知人露卧得病陽中有陰也何以知人春得病無肝脉也無心脉夏得病無肺脉入陰也何以知人秋得病無腎脉冬得病無脾脉四季之月得病

扁鵲華佗察聲色要訣第十

病人五藏已奪神明不守聲嘶者死

病人循衣縫譫言者不可治

病人陰陽俱絶掣衣掇空妄言者死

病人妄語錯乱及不能語者不治熱病者可治

病人陰陽俱絶失音不能言者三日半死

病人兩目皆有黃色起者其病方愈

病人面黃青者不死青如草滋死

病人面黃目赤者不死赤如蚯血死

病人面黃白者不死白如拮骨死

病人面黃目黑者不死黑如炲死

病人面目俱等者不死

病人面黑青者不死

病人面青目白者死

病人面赤目青者六日死

病人面黃目青者九日必死是謂亂經飲酒當風邪入胃經

病人面赤目白者十日死憂恚思慮心氣內索面色反好急

求棺槨

病人面白目黑者死此謂榮華已去血脉空索

病人面黑目白者八日死腎氣內傷病因留積

病人面青目黃者五日死病人著牀心痛短氣脾竭內傷百日復愈能起徬徨因坐於地其立倚牀能治此者可謂神良

病人面無精光若土色不受飲食者四日死
病人目無精光及牙齒黑色者不治
病人耳目鼻口有黑色起入于口者必死
病人黑色出於額上髮際下直鼻眷兩顴上者亦死在五日中
病人及健人黑色若白色起入目及鼻口者死在三日中
病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之如黑者死
病人面黑脣青者死
病人面青脣黑者死
病人面黑兩脅下薄不能自轉反者死
病人目回回直視肩息者一日死
病人陰結陽絶目精脫恍惚者死
病人陰陽絶竭目瞑陷者死
病人眉系傾者七日死
病人口如魚口不能復閉而氣出多不返者死
病人口張者三日死
病人脣青人中反者三日死
病人脣反人中滿者死
病人脣口忽乾者不治
病人脣腫齒焦者死
病人齒忽變黑者十三日死
病人舌卷卵縮者必死
病人汗出不流舌卷黑者死
病人髮直者十五日死
病人髮如乾麻善怒者死

病人髮鬚眉衝起者死
病人爪甲青者死
病人爪甲白者不治
病人手足爪甲下肉黑者八日死
病人榮衛竭絕面浮腫者死
病人卒腫其面蒼黑者死
病人手掌腫無文者死
病人臍腫反出者死
病人陰囊葉俱腫者死
病人脉絕口張足腫者五日死
病人足趺腫嘔吐頭重者死
病人足趺上腫兩膝大如斗者十日死
病人卧遺屎不覺者死
病人尸臭者不可治
肝病皮白肺之日庚辛死
心病目黑腎之日壬癸死
脾病脣青肝之日甲乙死
肺病頰赤目腫心之日丙丁死
腎病面腫脣黃脾之日戊己死
青欲如蒼壁之澤不欲如藍
赤欲如帛裹朱不欲如赭
白欲如鵝羽不欲如鹽
黑欲如重漆不欲如炭
黃欲如羅裹雄黃不欲如黃土

診五藏六腑氣絕證候第十一

病人肝絕八日死何以知之面青但欲伏眠目視而不見人

汗一作泣出如水不止一日死
病人膽絕七日死何以知之手足爪甲青呼罵不休一日死
病人筋絕九日死何以知之眉爲之傾
病人心絕一日死何以知之肩息回視立死一日半亭
病人腸一云小腸絕六日死何以知之髮直如乾麻不得伸白
汗不止
病人脾絕十二日死何以知之口冷足腫腹熱臚脹泄利不
覺出無時度一日五日死
病人胃絕五日死何以知之脊痛腰中重不可反覆一日半腸平九日死
病人肉絕六日死何以知之耳乾舌皆腫溺血大便赤泄一日足腫九日死
病人肺絕三日死何以知之口張但氣出而不還一日鼻口虛張短氣
病人大腸絕不治何以知之泄利無度利絕則死

病人腎絕四日死何以知之齒爲暴枯面爲正黑目中黃色
腰中欲折白汗出如流水一日平七日人中死
病人骨絕齒黃落十日死
諸浮脉無根者皆死已上五藏六腑爲根也

診四時相反脉第十二

春三月木王肝脉治當先至心脉次之肺脉次之腎脉次之
此爲王相順脉也到六月土王脾脉當先至而反不至反得
腎脉此爲腎反脾也七十日死何謂腎反脾期五月六月忌丙
丁脾反肝三十日死何謂脾反肝春肝脉當先至而反不至
脾脉先至是謂脾反肝期正月二月忌甲乙腎反肝三歲死
何謂腎反肝春肝脉當先至而反不至腎脉先至是謂腎反
肝期七月八月忌庚辛腎反心二歲死何謂腎反心夏心脉

當先至而反不至腎脉先至是謂腎反心期六月忌戊己此中不論肺金之氣踈略未論指南又推五行亦頗顛倒待求別録上

凡療病察其形與神氣色澤脉之盛衰病之新故乃可治之形氣相得色澤以浮脉從四時此為易治形氣相失色天不澤脉實堅甚脉逆四時此為難治

逆四時者春得肺脉夏得腎脉秋得心脉冬得脾脉其至皆懸絶滑者曰逆春夏沈澁秋冬浮大病熱脉靜泄痢脉大脫血脉實病在中脉堅實病在外脉不實名逆四時皆難療也

凡四時脉皆以胃氣為本雖有四時王相之脉無胃氣者難差也何謂胃脉來弱以滑者是也命曰易治

診脉動止投數踈數死期年月第十三

脉一動一止二日死一經云一日死

脉二動一止三日死

脉三動一止四日死或五日死

脉四動一止六日死

脉五動一止七日死或五日死

脉六動一止八日死

脉七動一止九日死

脉八動一止十日死

脉九動一止九日死又云十一日死一經云十三日死若立春死

脉十動一止立春死一經云立夏死又云立秋死

脉十一動一止立夏死一經云立秋死一經云立冬死

脉十二動十三動一止立冬死一經云立夏死

脉十四動十五動一止立

脉二十動一止一歲死若立秋死
脉二十一動一止二歲死
脉二十五動一止二歲死
脉三十動一止二歲死一經去一歲死又去立冬死
脉三十五動一止三歲死若三歲死
脉四十動一止四歲死
脉五十動一止五歲死不滿五十動一止五歲死
五行氣畢陰陽數窮榮衛出入經脉通流晝夜百刻五德相生脉來五十投而不止者五藏皆受氣即無病也
脉來四十投而一止者五藏無氣却後四歲春草生而死
脉來三十投而一止者三藏無氣却後三歲麥熟而死
脉來二十投而一止者三藏無氣却後二歲桑椹赤而死
脉來十投而一止者四藏無氣歲中死得節不動出清明死

遠不出穀雨死矣
脉來五動而一止者五藏無氣却後五日而死
脉一來而久住者宿病在心主中治
脉二來而久住者病在肝枝中治
脉三來而久住者病在脾下中治
脉四來而久住者病在腎間中治
脉五來而久住者病在肺枝中治
五脉病虛羸人得此者死所以然者藥不得而治針不得而及盛人可治氣全故也

扁鵲診諸反逆死脉要訣第十四

扁鵲曰夫相死脉之氣如羣鳥之聚一馬之馭糸水交馳之狀如懸石之落出筋之上藏筋之下堅關之裏不在榮衛伺候交射不可知也

脉病人不病脉來如屋漏雀啄者死（屋漏者其來既絶而止時時復起而不相連屬也雀啄者脉來甚數又經而疾絶止復頓來也）經言得病七八日脉如屋漏雀啄者死（脉彈人手如黍米也）脉來如彈石去如解索者死（彈石者碎急也解索者動數而隨散亂無復次緒也）

脉困病人脉如蝦之游如魚之翔者死（蝦游者蒋蒋而起尋復退沒不知所在久乃復起魚翔者似不行而但掉尾動頭身搖而久住者是也）

脉如懸薄卷索者死脉如轉豆者死脉如偃刀者死脉涌涌不去者死

脉忽去忽來暫止復來者死脉中俠者死脉分絶者死（上下分散也）

脉有表無裏者死經名曰結去即死何謂結

脉在指下如麻子動搖屬腎名曰結去死近也

脉五來不復增減者死經名曰代何謂代脉五來一止也脉七來是人一息半時不復增減亦名曰代正死不疑

經言病或有死或有不治自愈或有連年月而不已其死生存亡可切脉而知之耶然可具知也設病者若閉目不欲見人者脉當得肝脉弦急而長而反得肺脉浮短而濇者死

病若開目而渴心下牢者脉當得緊實而數反得沈滑而微者死

病若吐血復衄者脉當得沈細而反得浮大牢者死

病若大腹而洩脉當微細而澀反得緊大而滑者死此之謂也

經言形脉與病相反者死奈何然病若頭痛目痛脉反短濇者死

病若腹痛脉反浮大而長者死

病若腹滿而喘脉反滑利而沈者死

病若四肢厥逆脉反浮大而濇者死千金翼云脉大者生沈遲細者難治
病若耳聾脉反浮大而緩者死
病若目眩眩脉反大而緩者死
左有病而右痛右有病而左痛下有病而上痛上有病而下痛此爲逆逆者死不可治
脉來沈之絶濡浮之不止推手者半月死一作半日
脉來微細而絶者人病當死
人病脉不病者生脉病人不病者死
人病尸厥呼之不應脉絶者死脉當大反小者死
肥人脉細小如絲欲絶者死
羸人得躁脉者死
人身澀而脉來往滑者死
人身滑而脉來往澀者死

人身小而脉來往大者死
人身大而脉來往小者死
人身短而脉來往長者死
人身長而脉來往短者死
尺脉上應寸口太遲者半日死脉經云尺脉不應寸時如馳半日死

診五藏六腑十二經脉皆有相反有一反逆即爲死候也 診百病死生要訣第十五

凡診脉當視其人大小長短及性氣緩急脉之遲速大小長短皆如其人形性者吉反之者凶
診傷寒熱盛脉浮大者生沈小者死傷寒已得汗脉沈小者生浮大者死
温病三四日以下不得汗脉大疾者生脉細小難得者死不治脉經時行作瘟瘧時行
温病時行大熱其脉細小者死

温病下利腹中痛甚者死不治
温病汗不出出不至足者死厥逆汗出脉堅彊急者生虚緩者死
熱病二三日身體熱腹滿頭痛食飲如故脉直而疾者八日死四五日頭痛腹痛而吐脉來細彊十二日死八九日頭不疼身不痛目不赤色不變而反利脉來牒牒按之不彈手時大心下堅十七日死
熱病七八日脉不轉（一作喘）不散（一作數）者當瘖瘖後三日温汗不出者死
熱病七八日其脉微細小便不利加暴口燥脉代舌焦乾黑者死
熱病未得汗脉盛躁疾得汗者生不得汗者難差
熱病已得汗脉靜安者生脉躁者難治

熱病脉躁盛而不得汗者此陽之極也十死不治
熱病已得汗脉常躁盛陰氣之極也亦死（太素作陽極）
熱病已得汗常大熱不去者亦死（大一作專）
熱病已得汗熱未去脉微躁者慎不得刺治也
熱病發熱甚者其脉陰陽皆竭慎勿刺不汗出必下利
診人被風不仁痿躄其脉虛者生（巢源云數者生虛堅急疾者死）
診癲病虛則可治實則死
癲疾脉實堅者生脉沈細小者死
診人心腹積聚其脉堅彊急者生虛弱者死又實彊者生沈者死其脉大腹大脹四肢逆冷其人脉形長者死（一作視卒視）腹脹滿便亦不可療
診頭痛目痛久視無所見者死（一作視）

血脉大時絶極下血脉小疾者死
心腹痛痛不得息脉細小遲者死
腸澼便血身熱則死寒則生
腸澼下白沫脉沈則生浮則死
腸澼下膿血脉懸絶則死滑大則生
腸澼之屬身熱脉不懸絶滑大者生懸濇者死以藏期之
腸澼下膿血脉沈小流連者生數疾且大有熱者死
腸澼筋攣其脉小細安靜者生浮大緊者死
洞洩食不化下膿血脉微小者生緊急者死
洩注脉緩時小結者生浮大數者死
噩蝕陰痒其脉虚小者生緊急者死
欬嗽脉沈緊者死浮直者生浮輭者生小沈伏匿者死
欬嗽羸瘦脉形堅大者死

欬脫形發熱脉小堅急者死肌瘦下脫形熱不去者死
欬而嘔腹脹且洩其脉弦急欲絶者死
吐血衄血脉滑小弱者生實大躁者死
汗出若衄其脉小滑者生大實大者死
唾血脉緊噩者死滑者生
吐血而欬上氣其脉數有熱不得卧者死
傷寒家欬而上氣其脉數散者死謂其人形損故也
上氣脉數者死謂其形損故也
上氣喘息低昂其脉滑手足温者生脉澁四肢寒者死
上氣面浮腫肩息其脉大不可治加利必死 一作又甚
上氣注液其脉虚濇濇伏匿者生堅強者死
寒氣上攻脉實而順滑者生實而逆澁則死 太素大寒氣暴上脉滿實
何如曰實而滑則生實而尽滿者脉急大堅尺滿而不逆則死其形尽滿何如曰卑形者順如是則生逆則死何

謂順則生逆則死曰所謂順者手足温也所謂逆者手足寒也

消渴其脉數大者生細小浮短者死

瘖癃脉實大病久可治脉懸小堅急病久不可治

消渴脉沉小者生實堅大者死

水病脉洪大者可治微細者不可治

水病脹閉其脉浮大輭者生沉細虛小者死

水病腹大如鼓脉實者生虛者死

卒中惡吐血數升脉沉數細者死浮大疾快者生

卒中惡腹大四肢滿脉大而緩者生緊而浮者死緊細而微者亦生

病瘡腰脊彊急瘈瘲者皆不可治

寒熱瘈瘲其脉代絶者死

金瘡血出太多其脉虛細者生數實大者死

金瘡出血脉沈小者生浮大者死

所瘡出血一二石脉來大二十日死

所刺俱有病多少血出不自止斷者脉止脉來大者七日死

從高顛仆內有血腹脹滿其脉堅彊者生小弱者死

人爲百藥所中傷脉微細者死洪大而速者生脉經作遲速

人病甚而脉不調者難差

人病甚而脉洪易差

人陰陽俱結者見其上齒如熟小豆其脉躁者死結一作竭

人內外俱虛身躰冷而汗出微嘔而煩擾手足厥逆躰不得安靜者死

脉實滿手足寒頭熱春秋生冬夏死

老人脉微陽贏陰彊者生脉炎大加息者死

陰弱陽彊脉至而代奇月而死

尺脉濇而堅爲血實氣虛也其發病腹痛逆滿氣上行此爲
婦人胞中絶傷有惡血久成結瘕得病以冬時黍糸祭赤而死
尺脉細而微者血氣俱不足細而來有力者是穀氣不充病
得節輒動黍糸葉生而死此病秋時得之
左手寸口脉偏動乍大乍小不齊從寸口至関関至尺三部
之位處處動搖各異不同其人病仲夏得之此脉桃花落高
死花一作葉
右手寸口脉偏沈伏乍小乍大朝來浮大暮夜沈伏浮大即
太過上出魚際沈伏即下不至関中往來無常時時復來者
揄葉枯落而死葉一作莢
右手尺部脉三十動一止尒頃更還二十動一止尒動尒踈
不與息數相應其人雖食穀猶不愈蘩草生而死
左手尺部脉四十動而一止止而復來來逆如循直木如循

張弓弦緪緪然如雨人共引一索至立春而死脉經作至立冬死

診三部脉虛實証死生第十六

凡三部脉大都欲等只如小人細人婦人脉小輭小兒四五
歲者脉呼吸八至細數吉千金翼云大人而脉細人細而脉大人而脉細
而躁人壯而脉緩性緩而脉躁人壯而脉緩而反此爲順則易治凡脉細人
則難治五歲者脉自
兒四
駛疾呼吸八至也
三部脉或至或不至冷氣在胃中故令脉不通
三部脉虛其人長病得之死虛而濇長病亦死虛而滑亦死
虛而緩亦死虛而弦急癲病亦死
三部脉實而大長病得之死實而滑長病得之生卒病得之
死實而緩亦生實而緊亦生實而緊急癲病可治之
三部脉羸非稱其人病便死
三部脉羸非其人得之死

三部脉麤長病得之死卒病得之生
三部脉細而數亦生微而緊亦生
三部脉微而伏長病得之死
三部脉輭長病得之不治自愈治之死卒病得之生
三部脉浮而結長病得之死浮而滑長病亦死
三部脉浮而數長病風得之生卒病得之死
三部脉乾長病得之生
三部脉弦而數長病得之生卒病得之死
三部脉革長病得之死卒病得之生
三部脉堅而數如銀釵股蟲毒病必死數而輭蟲毒病得之生
三部脉瀲瀲如羹上肥長病得之死卒病得之生
三部脉連連如蜘蛛絲長病得之死卒病得之生
三部脉如霹靂長病得之死卒病得之生
三部脉如麤長病得之死
三部脉如角弓長病得之死
三部脉累累如貫珠長病得之死
三部脉如水淹然流長病不治自愈治之反死
三部脉如屋漏長病十四日死
三部脉如雀啄長病七日死（脉經云十日死）
三部脉如釜中湯沸朝得暮死夜半得日中死日中得夜半死
三部脉急切腹間病又婉轉腹痛針上下差

金澤文庫

千金要方二十八

千金要四脈

浮沉滑澁洪細微促

軟虛芤促　結代散革

遲數緩動伏弦

人迎大小寸三脈為尺脈

備急千金要方卷第二十九 針灸上

朝奉郎守尚藥奉御秘閣校理判登聞檢院護軍賜緋魚袋臣林億 等校正

明堂三人圖第一

三陰三陽流注第二上下

針灸禁忌第三

五藏六腑傍通第四

用針略例第五

灸例第六

大醫針灸宜忌第七

明堂三人圖第一 仰人十四門 側人十六門 伏人十門

夫病源所起本於藏腑藏腑之脉竝出手足循環腹背無所不至往來出沒難以測量將欲指取其穴非圖莫可備預之要非灸不精故經曰湯藥攻其內針灸攻其外則病無所逃

金澤文庫

矣方知針灸之功過半於湯藥矣然去聖久遠學徒蒙昧孔穴出入莫測經源濟弱扶危臨事多惑余慨其不逮聊因暇隙鳩集今古名醫明堂玉匱述針灸經一篇用補私關庶依圖知穴按經識分則孔穴親疎居然可見矣舊明堂圖年代久遠傳寫錯悞不足指南今一依甄權等新撰爲定云耳若依明堂正經人是七尺六寸四分之身今半之爲圖人身長三尺八寸二分其孔穴相去亦皆半之以五分爲寸其尺用夏家古尺司馬六尺爲步即江淮吳越所用八寸小尺是也其十二經脉五色作之奇經八脉以緑色爲之三人孔穴共六百五十穴圖之於後亦覩之便令了耳仰人三百八十二穴背人一百九十四穴側人一百七十四穴穴名共三百四十九單穴四十八名雙穴三百一名

仰人明堂圖 十四門一百五十七穴内三十二穴單一百二十五穴雙

仰人頭面三十六穴遠近法第一

頭部中行上星在顱上直鼻中央入髮際一寸陷容豆

顖會在上星後一寸陷者中

前頂在顖會後一寸半骨陷中

百會在前頂後一寸半頂中心

頭第二行五處在頭上去上星傍一寸半

承光在五處後一寸不灸二本言一寸半

通天在承光後一寸半

頭第三行臨泣在目上眥直上入髮際五分陷者中

目窗在臨泣後一寸　正營在目窗後一寸

正面部中行神庭在髮際直鼻柱端　水溝在鼻柱下人中

素髎在鼻柱端

兌端在脣上端　齦交在脣内齒上斷縫

承漿在頤前下脣之下　廉泉在頷下結喉上舌本
面部第二行曲差俠神庭傍一寸半在髮際
攢竹在眉頭陷中　精明在目內眥外
巨窌俠鼻傍八分直瞳子　迎香在和窌上一寸鼻孔傍
禾窌直鼻孔下俠水溝傍五分
面部第三行陽白在眉上二寸直瞳子
承泣在目下七分直瞳子不灸　四白在目下一寸
地倉俠口傍四分　大迎在曲頷前一寸二分骨陷中動脉
面部第四行本神俠曲差傍一寸半在髮際三云直耳上入
髮際四分　絲竹空在眉後陷中不灸
瞳子窌在目外去眥五分一名太陽一名前開
面部第五行頭維在額角髮際本神傍一寸半不灸
顴窌在面輒骨下下廉陷中

上關在耳前上廉起骨開口取之　一名客主人
下關在客主人下耳前動脉下空下廉合口有空張口則閉
頰車在耳下曲頰端陷者中
肩部中央直下七穴遠近法第二
天突在頸結喉下五寸宛宛中
旋機在天突下一寸陷中仰頭取之
華蓋在旋機下一寸陷中仰而取之
紫宮在華蓋下一寸六分陷中　亶中在玉堂下一寸六分
玉堂在紫宮下一寸六分陷中
橫直兩乳間　中庭在亶中下一寸六分陷中
肩部第三行六穴遠近法第三
俞府在巨骨下去旋機傍各二寸陷者中仰而取之
或中在俞府下一寸六分陷中仰卧取之

神藏在或中下一寸六分陷中仰而取之
靈墟在神藏下一寸六分陷中仰卧取之墟或作墻
神封在靈墟下一寸六分
步郎在神封下一寸六分陷中仰而取之

胷部第三行六穴遠近法第四

氣户在巨骨下俠俞府兩傍各二寸陷中仰而取之
庫房在氣户下一寸六分陷中仰而取之
屋翳在庫房下一寸六分陷中仰而取之
膺窗在屋翳下一寸六分　乳中禁不灸刺
乳根在乳下一寸六分陷中仰而取之

胷部第四行六穴遠近法第五

雲門在巨骨下俠氣户兩傍各二寸陷中動脉應手舉臂取之
中府在雲門下一寸云一寸六分乳上三肋間動脉應手陷中　周榮在中府下一寸六分陷中仰而取之
胷鄉在周榮下一寸六分陷中仰而取之
天谿在胷鄉下一寸六分舉臂取之

食竇在天谿下一寸六分陷中仰而取之

腹部第一行十四穴遠近法第六

鳩尾在臆前蔽骨下五分不灸刺　巨闕在鳩尾下一寸
上管在巨闕下一寸去蔽骨三寸　中管在上管下一寸
建里在中管下一寸　下管在建里下一寸
水分在下管下一寸臍上一寸　臍中禁不刺
陰交在臍下一寸
石門在臍下二寸女子不灸　關元在臍下三寸
中極在臍下四寸
曲骨在橫骨之上中極下一寸毛際陷中

腹第二行十一穴遠近法第七

幽門在巨闕傍半寸陷中 心藏卷云俠巨闕兩邊相去各一寸

通谷在幽門下一寸

陰都在通谷下一寸

石關在陰都下一寸 一名石關

商曲在石關下一寸 一名高曲

肓輸在商曲下一寸直臍傍各五分

中注在肓輸下五分

四滿在中注下一寸 肺藏卷云俠丹田

氣穴在四滿下一寸 婦人方上卷云在關元左邊二寸是右二寸名子戶

大赫在氣穴下一寸 腎藏卷云在屈骨端三寸

橫骨在大赫下一寸 腎藏卷云名屈骨在陰上橫骨中央宛曲如卻月中央是

腹第三行十二穴遠近法第八

不容在幽門傍各一寸五分去任脉二寸直四肋端相去四寸

承滿在不容下一寸

梁門在承滿下一寸

關門在梁門下一寸太一上

太一在關門下一寸

滑肉門在太一下一寸

直臍傍二寸 脾藏卷云名長谷俠臍相去五寸一名循際

天樞一名長谿去肓輸一寸半

外陵在天樞下半寸大巨上

大巨在臍下一寸兩傍各二寸長谿下二寸

水道在大巨下三寸

歸來在水道下二寸 外臺作三寸

氣衝在歸來下一寸鼠蹊上一寸 素問刺熱論注云在腹脅下橫骨兩端鼠蹊上一寸動脉應手

腹第四行七穴遠近法第九

期門在第二肋端不容傍各一寸半上直兩乳

日月在期門下五分

腹哀在日月下一寸半

大橫在腹哀下二寸直臍傍甲乙云三寸

腹結在大橫下一寸三分

府舍在腹結下三寸

衝門上去大橫五寸在府舍下橫骨兩端約中

手太陰肺經十穴第十

少商在手大指端內側去爪甲角如韭葉

魚際在手大指本節後內側散脉中

大泉在手掌後陷者中此即太淵也避唐祖名當時改之今存此名不改正恐後人將為別是一穴也

經渠在寸口陷者中不灸

列缺在腕上一寸半手大陰胳別走陽明

孔最在腕上七寸手太陰郤也

俠白在天府下去肘五寸動脉　尺澤在肘中約上動脉

臑會在臂前廉去肩頭三寸甲乙此穴在肩部外臺屬大腸銅人經屬三焦

手厥陰心主經八穴第十一

中衝在手中指端去爪甲如韭葉陷者中

勞宮在掌中央動脉

大陵在掌後兩骨間

內關在掌後去腕二寸外臺作五寸

間使在掌後三寸兩筋肋間　手心主胳別走少陽

郤門在掌後去腕五寸外臺云去腕五寸手厥陰郤也

曲澤在肘內廉下陷者中屈肘得之

天泉在腋下二寸舉腋取之

手少陰心經八穴第十二

少衝在手小指內廉之端去爪甲如韭葉

少府在手小指大節後陷者中直勞宮大節又作本節

神門在掌後兌骨端陷者中

陰郤在掌後動脉中去腕半寸手少陰郤也

通理在腕後一寸手少陰胳別走太陽

靈道在掌後一寸半

極泉在腋下筋間動脉入骨

足太陰脾經十一穴第十三

隱白在足大趾端內側去爪甲如韭葉

大都在足大趾內本節後陷中 肝藏卷云在足大趾本節內側白肉際
太白在足大趾內側核骨下陷中
公孫在足大趾本節後一寸足太陰胳別走陽明
商丘在足內踝下微前陷中
三陰交在內踝上八寸骨下陷中
漏谷在內踝上六寸骨下陷中
地機一名脾舍在膝下五寸足太陰郄也
陰陵泉在膝下內側輔骨下陷者中伸足得之
血海在膝臏上內廉白肉際二寸半一作三寸
箕門在魚腹上筋間動應手陰市內
足陽明胃經十五穴第十四
厲兌在足大趾次趾之端去爪甲角如韭葉
內庭在足大趾次趾外間

宋本缺據元版補刊

陷谷在足大指次指外間本節後去內庭三寸
衝陽在足跗上五寸骨間去陷谷三寸一云二寸
解谿在衝陽後一寸半
豐隆在外踝上八寸足陽明絡別走太陰
下廉一名下巨虛在上廉下三寸 條口在下廉上一寸
巨虛上廉在三里下三寸 三里在膝下三寸脛骨外
犢鼻在膝臏下骱上陷解大筋中
陰市一名陰鼎在膝上三寸伏兔下 第二十卷云在膝上當伏兔下行二寸臨膝取之
伏兔在膝上六寸不灸 髀
梁丘在膝上二寸兩筋間或云三寸足陽明郄也
伏人明堂圖十門一百五穴內六穴單八十九穴雙
伏人頭上第一行五穴遠近法第一
後頂在百會後一寸半 強

腦戶在枕骨上彊間後一寸半不灸
風府在項後入髮際一寸大筋內宛宛中不灸
瘖門在項後髮際宛宛中不灸
頭上第二行三穴遠近法第二
胳却在通天後一寸半
玉枕在胳却後七分半俠腦戶傍一寸三分起肉枕骨上入
髮際三寸
天柱俠項後髮際大筋外廉陷者中
腦空在承靈後一寸半俠玉枕傍枕骨下陷中一名顳顬
風池在顳顬後髮際陷中
伏人耳後六穴遠近法第四
頭息在耳後青脉間
瘈脉在耳本雞足青脉不灸
完骨在耳後入髮際四分
浮白在耳後入髮際一寸
竅陰在完骨上枕骨下
髃風在耳後陷中按之引耳中
脊中第一行十一穴遠近法第五
大椎在第一椎上陷中
陶道在大椎下節間
身柱在第三椎下節間
神道在第五椎下節間
至陽在第七椎下節間
筋縮在第九椎下節間
脊中在第十一椎下節間不灸
懸樞在第十三椎下節間
命門在第十四椎下節間
腰輸在第二十一椎下節間
長彊在脊骶端
脊中第二行二十一穴遠近法第六
大杼在項後第一椎下兩傍各一寸半陷中

風門一名熱府在第二椎下兩傍各一寸半
肺輸在第三椎下兩傍各一寸半肺藏卷云對乳引繩度之
心輸在第五椎下兩傍各一寸半
膈輸在第七椎下兩傍各一寸半
肝輸在第九椎下兩傍各一寸半第八卷云第九椎節脊中
膽輸在第十椎下兩傍各一寸半
脾輸在第十一椎下兩傍各一寸半輸是脾穴　胃輸在第十二椎下兩傍各一寸半第八卷云脾輸無定所隨四季月臆病即灸藏
三焦輸在第十三椎下兩傍各一寸半
腎輸在第十四椎下兩傍各一寸半
大腸輸在第十六椎下兩傍各一寸半
小腸輸在第十八椎下兩傍各一寸半
膀胱輸在第十九椎下兩傍各一寸半

中膂輸在第二十椎下兩傍各一寸半
白環輸在第二十一椎下兩傍各一寸半
上竅在第一空臀髁下一寸俠脊兩傍
次竅在第二空俠脊陷中　中竅在第三空俠脊陷中
下竅在第四空俠脊陷中　會陽在陰尾骨兩傍

脊中第三行十三穴遠近法第七

附分在第二椎下附項內廉兩傍各三寸
魄戶在第三椎下兩傍各三寸
神堂在第五椎下兩傍各三寸
譩譆在肩胛內廉俠第六椎下兩傍各三寸
膈關在第七椎下兩傍各三寸
魂門在第九椎下兩傍各三寸外臺云十椎下
陽綱在第十椎下兩傍各三寸外臺云十一椎

意舍在第十一椎下兩傍各三寸外臺云九椎下
胃倉在第十二椎下兩傍各三寸
肓門在第十三椎下兩傍各三寸
志室在第十四椎下兩傍各三寸
胞肓在第十九椎下兩傍各三寸
秩邊在第二十一椎下兩傍各三寸
手少陽三焦經十七穴第八
關衝在手小指次指之端去爪甲角如韭葉
掖門在小指次指間陷者中
中渚在小指次指本節後間陷中
陽池在手表腕上陷者中
外關在腕後二寸陷中手少陽脉別走心主
支溝在腕後三寸兩骨間陷中

會宗在腕後三寸空中手少陽郄也
三陽絡在臂上大交脉支溝上一寸不刺
四瀆在肘前五寸兩筋間陷者中屈肘得之
天井在肘後外大骨後一寸陷中
清冷泉在肘上三寸伸肘舉臂取之淵泉字亦是
消濼在肩下臂外開腋斜肘分下行
天宗在秉風後大骨下陷中外臺小腸經屬
曲垣在肩中央曲胛陷者中按之應手痛
肩外俞在肩胛上廉去脊三寸陷者中
肩中俞在肩胛內廉去脊二寸陷者中
手太陽小腸經九穴第九
小澤在手小指端外側去爪甲一分陷中

前谷在手小指外側本節前陷中
後谿在小指外側本節後陷中
腕骨在手外側腕前起骨下陷中
陽谷在手外側腕中兌骨之下陷中
養老在手踝骨上一空在後一寸陷者中手太陽郄也
支正在腕後五寸手太陽絡別走少陰
小海在肘內大骨外去肘端五分
肩貞在肩曲胛下兩骨解間肩髃後陷者中外臺在三焦經
足太陽膀胱經十七穴第十
至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉
通谷在足小指外側本節前陷中
束骨在足小指外側本節後陷中
京骨在足外側大骨下赤白肉際陷中
申脉陽蹻所生在外踝下陷中容爪甲
金門在足外踝下陷中一名關梁足太陰郄也
僕參一名安耶在足跟骨下陷中
崑崙在足外踝後跟骨上陷中
承山一名魚腹一名傷陽山一名肉柱在兌踹腸下分肉間陷者中
承筋一名踹腸一名直腸在踹陽在外踝上七寸足太陽絡別走少陽
中不刺　合陽在膝約中央下三寸
委中在膕中央約文中動脉
委陽在足太陽之前少陽之後出於膕中外廉兩筋間扶承下六寸
浮郄在委陽上一寸屈足得之
附門在肉郄下六寸
部在尻臀下股陰下文中一云尻臀下橫文中扶承一名肉郄一名陰關一名皮

側人明堂圖 六門八十七穴雙

側人耳頸二十穴遠近法第一

頷厭在曲周顱顙上廉　懸顱在曲周顱顙中
懸釐在曲周顱顙下廉　天衝在耳上如前三寸
率谷在耳上入髮際一寸半　曲鬢在耳上髮際曲隅陷中
角孫在耳郭中間開口有空　和窌在耳前宛髮下動脉
耳門在耳前起肉當耳缺　聽會在耳前陷中張口得之
聽宮在耳中珠子大如赤小豆　天容在耳下曲頰後
天牖在頸筋缺盆上天容後天柱前完骨下髮際上一寸
缺盆在肩上橫骨陷中　扶突在氣舍後一寸半
天窗在曲頰下扶突後動應手陷中
天鼎在頸缺盆直扶突曲頰下一寸人迎後
人迎在頸大脉應手俠結喉傍以候五藏氣不灸
水突在頸大筋前直人迎下氣舍上一本云水突在曲頰下一寸近後
氣舍在頸直人迎俠天突陷中
側脇十穴遠近法第二
章門一名長平在大橫文外直臍季肋端
京門在監骨腰中季肋本俠脊
帶脉在季肋下一寸八分
五樞在帶脉下三寸一云在水道下一寸半
維道在章門下五寸三分監骨上
居髎在長平下八寸三分髀樞中風卷云脾門在脾下
泉脾在脾下三寸宛宛中與脾是也一名泉脾脾即淵腋
大包在泉脾下三寸
輒筋在脾下三寸復前行一寸著肋
天池在乳後一寸脾下著肋直脾掫肋間

側人手陽明大腸經二十穴遠近法第三

商陽在手大指次指內側去爪甲角如韭葉

二間在手大指次指本節前內側陷者中

三間在手大指次指本節後內側陷者中

合谷在手大指次指歧骨間

陽谿在腕中上側兩筋間陷中

偏歷在腕後三寸手陽明脉別走太陰

温留在腕後小上五寸大上六寸一作小上手陽明郄也

下廉在輔骨下去上廉一寸　上廉在三里下一寸

三里在曲池下二寸按之肉起允肉之端

曲池在肘後轉屈肘曲骨之中

肘窌在肘大骨外廉陷中

五里在肘二行向裏大脉中不刺

臂臑在肘上七寸　腨肉端

肩窌在肩端臑上斜舉臂取之

秉風俠天窌外肩上髃後舉臂有空

肩井在肩上陷解中缺盆上大骨前

天窌在肩缺盆中上毆骨之際陷者中

肩髃在肩端兩骨間　按脉極篇云在肩外頭近後以手之有解宛中外臺名扁骨

巨骨在肩端上行兩叉骨間陷中

足少陽膽經十五穴遠近法第四

竅陰在足小指次指之端去爪甲如韭葉

俠谿在足小指次指歧間本節前

地五會在足小指次指本節後不灸

臨泣在足小指本節後間陷者中去俠谿一寸半

丘墟在足外踝如前陷者中去臨泣三寸

付陽在外踝上三寸太陽前少陽後筋骨間
懸鍾一名絕骨在外踝上三寸動者中足三陽脉
陽輔在外踝上輔骨前絕骨端如前三分許去丘墟七寸
光明在足外踝上五寸足少陽郄也少陽脉別走厥陰
外丘在外踝上七寸足少陽郄也少陽所生
陽交一名別陽一名足窌陽維郄在外踝上七寸邪屬三陽
分肉間一本云上二寸踝 陽陵泉在膝下一寸外廉陷中
關陽在陽陵泉上三寸一本云關陵 犢鼻外
中瀆在髀骨外膝上五寸分肉間 鐍銚在髀樞中
足厥陰肝經十一穴第五
大敦在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中
行間在足大指間動應手陷中
太衝在足大指本節後二寸或一寸半陷中
中封在足內踝前一寸仰足取之伸足乃得
蠡溝在足內踝上五寸脛骨中與少陰相值一名中都
中郄在內踝上七寸脛骨中與少陰相值一名中都
膝關在犢鼻下三寸陷者中足厥陰郄也甲乙經云二寸甲乙又以中郄爲厥陰郄
曲泉在膝輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝乃得
陰包在膝上四寸股內廉兩筋間 五里在陰廉下二寸動脉
陰廉在羊矢下去氣衝二寸動脉
足少陰腎經十一穴第六
涌泉一名地衝在足心陷中屈足捲指宛宛中 肝藏卷云在脚心大指下大筋
然谷一名龍泉在足內踝前起大骨下陷者中 婦人方上卷云在內踝前直下一寸
大谿在足內踝後跟骨上動脉陷者中
大鍾在足跟後衝中足少陰胳別走太陽
水泉在大谿下一寸內踝下足少陰郄也

照海陰蹻脉所生在足內踝下
伏留一名昌陽一名伏白在足內踝上三寸陷中
交信在內踝上二寸少陰前太陰後廉筋骨間築賓在內
踝上踹分中
陰谷在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝
而得之　會陰一名屏翳在大便前小便後兩陰間
已上三人圖共三百四十九穴

手三陰三陽穴流注法第二上

凡孔穴所出爲井　所注爲滎　所流爲輸
所過爲源　所行爲經　所入爲合

灸刺大法

春取滎　夏取輸　季夏取經
秋取合　冬取井

肺出少商爲井手太陰脉也流於魚際爲滎注於大泉爲輸
過於列缺爲源行於經渠爲經入於尺澤爲合

心出於中衝爲井心包脉也流於勞宮爲滎注於大陵爲
輸過於內關爲源行於間使爲經入於曲澤爲合

心出於少衝爲井手少陰脉也流於少府爲滎注於神門爲
輸過於通里爲源行於靈道爲經入於少海爲合

大腸出於商陽爲井手陽明脉也流於二間爲滎注於三間
爲輸過於合谷爲源行於陽谿爲經入於曲池爲合

三焦出於關衝爲井手少陽脉也流於腋門爲滎注於中渚
爲輸過於陽池爲源行於支溝爲經入於天井爲合

小腸出於少澤爲井手太陽脉也流於前谷爲滎注於後谿
爲輸過於腕骨爲源行於陽谷爲經入於小海爲合

足三陰三陽穴流注法第二下

胃出於厲兌爲井足陽明脉也流於內庭爲滎注於陷谷爲
輸過於衝陽爲源行於解谿爲經入於三里爲合
膽出於竅陰爲井足少陽脉也流於俠谿爲滎注於臨泣爲
輸過於丘墟爲源行於陽輔爲經入於陽陵泉爲合
膀胱出於至陰爲井足太陽脉也流於通谷爲滎注於東骨
爲輸過於京骨爲源行於崑崙爲經入於委中爲合
脾出於隱白爲井足太陰脉也流於大都爲滎注於太白爲
輸過於公孫爲源行於商丘爲經入於陰陵泉爲合
肝出於大敦爲井足厥陰脉也流於行間爲滎注於太衝爲
輸過於中封爲源行於中郄爲經入於曲泉爲合
腎出於涌泉爲井足少陰脉也流於然谷爲滎注於太谿爲
輸過於水泉爲源行於伏留爲經入於陰谷爲合

針灸禁忌法第三

針禁忌法

大寒無刺 素問云天寒無刺天溫無疑

月生無瀉

月郭空無治

新內無刺

已刺無內

大怒無刺

已刺無怒

大勞無刺

已刺無勞

大醉無刺

已刺無醉

大飽無刺

已刺無飽

大飢無刺

已刺無飢

大渴無刺

已刺無渴

乘車來者卧而休之如食頃乃刺之

步行來者坐而休之如行十里頃乃刺之

大驚大恐必定其氣乃刺之 刺中心一日死其動爲噫

刺中肺三日死其動爲欬　刺中肝五日死其動爲語
刺中脾十五日死其動爲吞
刺中腎三日死其動爲嘘（刺中五藏死口變動出素問刺禁篇又診要經終篇云中心者環死中脾者五日死中腎者七日死中肺者五日死又四時刺逆從篇云中心一日死其動爲噫中肝五日死其動爲語中肺三日死其動爲吞注云此三論皆岐伯之言而不同者傳之誤也）
刺中膽一日半死其動爲嘔
刺中膈爲傷中不過一歲必死
刺跌上中大脉血出不止死
刺陰股中大脉出血不止死
刺面中流脉不幸爲盲
刺客主人內陷中脉爲內漏爲聾
刺頭中腦戶入腦立死
刺舌下中脉大過血出不止爲瘖
刺足下布胳中脉血不出爲腫
刺足少陰脉重虛出血爲舌難以言
刺臂太陰脉出血多立死
刺郄中大脉令人仆脫色
刺氣衝中脉血不出爲腫鼠鼷
刺肘中內陷氣歸之爲不屈伸　刺脊間中髓爲傴
刺陰股下三寸內陷令人遺溺
刺乳上中乳房爲腫根蝕
刺缺盆中內陷氣泄令人喘欬逆
刺小腹中膀胱弛弱出令人小腹脹
刺手魚腹內陷爲腫　刺腋下脇間內陷令人欬
刺目眶上陷骨中脉爲漏爲盲
刺關節中液出不得屈伸　上關刺不可深
神庭禁不可刺

缺盆刺不可深　顱息刺不可多出血
臍中禁不可刺　左角刺不可久留
雲門刺不可深（經云雲門刺不可深今則都忌不刺學者宜詳悉之）
五里禁不可刺　伏兔禁不可刺（按甲乙足陽明經伏兔刺入五分則不當禁）
三陽絡禁不可刺　伏留刺無多見血
承筋禁不可刺　然谷刺無多見血
乳中禁不可刺　鳩尾禁不可刺
灸禁忌法
頭維禁不可灸　承光禁不可灸
腦戶禁不可灸　風府禁不可灸
瘖門禁不可灸　陰市禁不可灸
下關耳中有干適低無灸
耳門耳中有膿及適低無灸

人迎禁不可灸　陽關禁不可灸
絲竹空灸之不幸使人目小及盲　承泣禁不可灸
脊中禁不可灸　乳中禁不可灸
痰脉禁不可灸　右門女子禁不可灸
白環輸禁不可灸　氣衝灸之不幸不得息
泉腋灸之不幸生膿蝕經渠禁不可灸　伏兔禁不可灸
地五會禁不可灸　鳩尾禁不可灸

五藏六腑變化無窮散在諸經其事隱沒難得具知今纂集相附以為傍通俾學者少留意推尋造次可見矣

五藏六腑變化傍通訣第四

五藏　腎水一次　心火二次　肝木三　肺金四　脾土五
六腑　膀胱　小腸　膽　大腸　胃　三焦

五藏經　足少陰　手少陰　足厥陰　手太陰　足太陽
六腑經　足少陽　手陽明　足陽明　手少陽　手太陽
五藏脉　沈濡　洪盛　弦長　浮短　緩大
五藏所兩　二斤四兩（又云斤兩　十二兩（三毛四分）　二斤三兩（二葉右葉　三斤三兩（二葉兩葉）　二斤三兩
六腑斤兩　九兩一銖　二斤七兩　三兩三銖　二斤十二兩　二斤四兩
六腑之尺　縱廣七寸（又云九寸）　長三寸（廣三寸四分）　三寸三分　一丈二尺（廣六寸）　大尺五寸
六腑所受　九升合（又云九升九合）　二升半　一合（難經作三合）　一升　三升五升
五藏官　後宮列女　帝王　上將軍（又為郎官）　大匠（又為將軍）　諫議大夫
六腑官　水曹掾　監倉吏　將軍梁曹吏　監倉掾　內醬吏
五藏輸　十四推　五推　九推　三推　十一推
六腑輸　十九推　十八推　十推　十六推　十二推　十三推
五藏募京門　巨闕　期門　中府　章門
六腑募　中極　關元　日月　天樞　中管　石門

五藏脉出涌泉　中衝（心胞絡經　少衝）　大敦　少商　隱白
流（甲乙作留）然谷　勞宮（心經流少府）　行間　魚際　大都
注　大溪　大陵（心經注神門）　大敦　少衝　大泉　太白
過　水泉　內關（心經過通里）　中封　列缺　公孫
行　伏留　間使（心經行靈道）　中郄　經渠　商丘
入　陰谷　曲澤（心經入少海）　曲泉　尺澤　陰陵泉
六腑脉出至陰　少澤　竅陰　商陽　厲兌　關衝（三焦經與心包經同）
流　通谷　前谷　俠谿　二間　內庭　腋門
注　束骨　後溪　臨泣　三間　陷谷　中渚
過　京骨　腕骨　丘墟　合谷　衝陽　陽池
行　臬嶺　陽谷　陽輔　陽溪　解溪　支溝
入　委中　小海　陽陵泉　曲池　三里　天井
五竅　耳（二陰）　舌口　目　鼻　唇

五養	骨	精	血	脉	筋	皮毛	氣	肉
五液	唾		汗	涕	淚	漐	涎	
五聲	呻	噫	言	呼	哭	歌		
六氣	呬		吹	呼	呵	噓	唏	
五神	志	精	神	魄又作脉神	血魂	氣魄	意智又作營意	
五有餘病脹滿			笑不止					
五不足病厥逆			憂一作悲					
六情	惡哀		怵慮一作惠好	好喜一作喜靑	威怒		樂愚	
	貪狼		廉貞					
八性	欲忌		友愛					
五常	智謀		禮哲					
五事	聽聰		視明					
五咎	急		豫					

五穀　大豆　麥　麻　稻　黍　稷
五果　栗　杏　李　桃　棗
五菜　藿　薤　韭　葱　葵

論曰假令人腎心肝肺脾爲藏則膀胱小腸膽大腸胃爲腑足少陰爲腎經足太陽爲膀胱脉經下至五藏五果五菜皆爾觸類長之他皆倣此 外臺續添二十三條本非金匱之舊今更不附入

用針略例第五

夫用針刺者先明其孔穴補虛瀉實送堅付濡以急隨緩榮衛常行勿失其理夫爲針者不離乎心口如衡索目欲內視消息氣血不得妄行針入一分知天地之氣針入二分知呼吸出入上下水火之氣針入三分知四時五行五藏六腑逆順之氣針皮毛腠理者勿傷肌肉針肌肉者勿傷筋脉針筋脉者勿傷骨髓針骨髓者勿傷諸絡

東方甲乙木主人肝膽筋膜魂
南方丙丁火主人心小腸血脉神
西方庚辛金主人肺大腸皮毛魄
北方壬癸水主人腎膀胱骨髓精志
中央戊己土主人脾胃肌肉意智
針傷筋膜者令人悗視失魂
傷血脉者令人煩乱失神
傷皮毛者令人上氣失魄
傷骨髓者令人呻吟失志
傷肌肉者令人四肢不收失智
此爲五乱因針所生若更失度者有死之憂也所謂針能殺生人不能起死人謂愚人妄針必死不能起生人也
又須審候与死人同狀者不可爲醫與正國同政者不可爲

謀雖聖智神人不能活一死人存亡國也故曰危邦不入亂邦
不居凡愚人貪利不曉於治亂存亡危身滅族彼此俱喪亡
國破家亦醫之道也

凡用針之法以補瀉為先呼吸應手漢補瀉校外計經繆有
法則陰陽不相干震為陽氣始於寅兌為陰氣終於戌為坎
太玄華冬至之日夜半一陽爻生離為太陽精之象欲補從卯南補不足
戶巽為地虛欲瀉從酉北天門乾針入因日明到午針出隨月光輕
向午午為日月光之位如此思五行氣以調榮衛用以將息之是曰隨
身寶

凡用鋒針針者除疾速也先補五呼刺入五分留十呼刺入
一寸留二十呼隨師而將息之刺急者深內而久留之刺緩
者淺內而疾發針刺大者微出其血刺滑者疾發針淺內而
久留之刺澁者必得其脉隨其逆順久留之疾出之壓其穴
勿出其血諸小弱者勿用大針然氣不足宜調以百藥餘三
針者正中破癰腫結息肉也亦治久疾也火針亦用鋒針
以油火燒之務在猛熱不熱即於人有損也隔日一報三報
之後當膿水大出為佳

巨闕太倉上下管此之一行有六穴忌火針也大瘕堀當傳
針轉動須史為佳

每針常須看脉好乃下針脉惡勿亂下針也下針一宿發
熱惡寒此為中病勿怪之

灸例第六

凡孔穴在身皆是藏腑榮衛血脉流通表裏往來各有所主
臨時救難必在審詳人有老少躰有長短膚有肥瘦皆須精
思商量准而折之无得一槩致有差失其尺寸之法依古者
八寸為尺仍取病者男左女右手中指上第一節為一寸亦

有長短不定者即取手大拇指第一節橫度爲一寸以意消息巧拙在人其言一夫者以四指爲一夫又以肌肉文理節解縫會宛陷之中及以手按之病者快然如此子細安詳用心者乃能得之耳

凡經云橫三間寸者則是三灸兩間一寸有三灸灸有三分三壯之處即爲一寸黃帝曰灸不三分是謂徒冤炷務大也小弱炷乃小作之以意商量

凡點灸法皆須平直四躰无使傾側灸時孔穴不正無益於事徒破好肉耳若坐點則坐灸之臥點則臥灸之立點則立灸之反此亦不得其宛矣

凡言壯數者若丁壯遇病病根深篤者可倍多於方數其人老小羸弱者可復減半依偏鵲灸法有至五百壯千壯皆臨時消息之明堂本經多云針入六分灸三壯更無餘論曹氏

灸法有百壯者有五十壯者小品諸方亦皆有此仍須准病輕重以行之不可膠柱守株

凡新生兒七日以上周年以還不過七壯炷如雀屎大

凡灸當先陽後陰言從頭向左而漸下次後從頭向右而漸下先上後下皆以日正午巳後乃可下火灸之時謂陰氣未至灸無不著午前平旦穀氣虛令人癲眩不可針灸也慎之其大法如此卒急者不可用此例

灸之生熟法腰巳上爲上部腰巳下爲下部外爲陽部榮內爲陰部衛故藏腑周流名曰經絡是故丈夫四十巳上氣在腰老嫗四十巳上氣在乳是以丈夫先衰於下婦人先衰於上灸之生熟亦宜撙而節之法當隨病遷變大法外氣務生內氣務熟其餘隨宜耳頭者身之元首人神之所法氣口精上歸於頭頭者諸陽之會也故頭病必

宜審之灸其穴不得亂灸過多傷神或使陽精玄熟令陰魄再卒是以灸頭正得滿百脊背者是體之橫梁五藏之所繫著太陽之會令陰陽動發冷熱成疾灸太過熟大害人也臂脚手足者人之枝幹其神繫於五藏六腑隨血脉出能遠近採物臨深履薄養於諸經其地狹淺故灸宜少灸過多即內神不得入精神閉塞否滯不仁即臂不舉故四肢之灸不宜太熟也然腹藏之內爲性貪於五味無厭成疾風寒結痼水穀不消宜當熟之然大杼脊中腎輸膀胱八髎可至二百壯心主手足太陰可至六七十壯三里太谿太衝陰陽二陵泉上下二廉可至百壯腹上下管中管太倉關元可至百壯若病重者皆當三報之乃愈病耳若治諸沈結寒冷病莫若灸之宜熟若治諸陰陽風者身熱脉大者以鋒針刺之間日一報之若治諸邪風鬼注痛處少氣以毫針去之隨病輕重用之表針內藥隨時用之消息將之與天同心百年永安終無橫病此要略說之非賢勿傳秘之凡微數之脉愼不可灸傷血脉燋筋骨凡汗已後勿灸此爲大逆脉浮熱甚勿灸

頭面目咽灸之最欲生少手臂四肢灸之欲須小熟亦不宜多灸背腹灸之尤宜大熟其腰脊欲須少生大體皆須以意商量臨時遷改應機千變萬化難以一準耳其温病隨所著而灸之可百壯餘少至九十壯大杼胃管可五十壯手心主手足太陽可五十壯三里曲池太衝可百壯皆三報之乃可愈耳風勞沈重九部盡病及毒氣爲疾者不過五十壯亦宜三報之若攻藏腑成心腹疹者亦宜百壯若卒暴百病鬼魅所著者灸頭面四肢宜多灸腹背宜少其多不過五十其少不減三五七九壯凡陰陽濡風口喝僻者不過三十壯三日一報報如前徵者三報重者九報此風氣濡微細入故宜緩

火温氣推排漸抽以除耳若卒暴催迫則流行細入成固疾
不可愈也故宜緩火凡諸虛疾水穀沈結流離者當灸腹背
宜多而不可過百壯大凡人有卒暴得風或中時氣凡百所
苦皆須急灸療慎勿忍之停滯也若王相者可得無佗不爾
漸久後皆難愈深宜知此一條凡人吳蜀地遊官體上常須
三兩處灸之勿令瘡斷差則瘴癘溫瘧毒氣不能著人也
裏當其處不問孔穴即得便使成瘡處即云阿是灸刺皆驗
故曰阿是穴也

太醫針灸宜忌第七

論曰欲行針灸先知行年宜忌及人神所在不與禁忌相應
即可今具如左
木命人行年在木則不宜針及服青藥火命人行年在火則

不宜汗及服赤藥土命人行年在土則不宜吐及服黃藥金
命人行年在金則不宜灸及服白藥水命人行年在水則不
宜下及服黑藥凡醫者不知此法下手即困若遇年命厄會
深者下手即死

推天醫曰忌等月忌及日忌傍通法

月傍通正二三四五六七八九十十一十二
天醫卯寅丑子亥戌酉申未午巳辰
四激戌戌戌丑丑丑辰辰辰未未未
月殺戌巳午未寅卯辰巳午未申酉
月刑巳子辰申午丑寅酉未亥卯戌

巽外臺云丑戌未辰丑戌未辰丑戌未辰

浮師治病吉
忌針灸
忌針灸
忌灸針
忌針灸
不可舉百事凶千金
不療病

六害巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午
右天醫上呼師避病吉若刑害上凶

推行年醫法
年至子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥
天醫卯戌子未酉亥辰寅巳午丑申

求歲天醫法
常以傳送加太歲太一下爲天醫

求月天醫法
陽月以大吉陰月以小吉加月建功曹下爲鬼道傳
送下爲天醫

推避病法
以小吉加月建登明下爲天醫可於此避病

推治病法
以月將加時天醫加病人年治之差

喚師法
未卯巳亥　酉鬼所在喚師凶

推行年人神法
臍心肘咽口頭脊膝足
一二三四五六七八九
十十一十二十三十四十五十六十七十八
九十二十一二十二三十三四二十五二十六二十七
二十九三十三十一三十二三十三三十四三十五三十六
三十七三十八三十九四十四十一四十二四十三四十四四十五
四十六四十七四十八四十九五十五十一五十二五十三五十四
五十五五十六五十七五十八五十九六十六十一六十二六十三
六十四六十五六十六六十七六十八六十九七十七十一七十二

七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一
八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十
右九部行神歲移一部周而復始不可針灸
推十二部人神所在法
心辰 唉卯頭寅眉丑 千金翼 脊骨 脊子腰亥腹戌項酉足申膝未陰午股巳
一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二
十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四
二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六
三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八
四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十
六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二
七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四
八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六

右十二部人神所在並不可針灸及損傷慎之
日辰忌
一日足大指　二日外踝
三日股內　四日腰
五日口舌咽懸癰　六日足小指 千金翼 外臺云手小指
七日內踝　八日足腕
九日尻　十日背腰
十一日鼻柱 千金翼云及眉　十二日髮際
十三日牙齒　十四日胃管
十五日遍身　十六日胃乳
十七日氣衝 千金翼云及脇　十八日腹內
十九日足趺　二十日膝下
二十一日手小指　二十二日伏兔

二十三日肝輸　二
二十五日足陽明　二
二十七日膝　二
二十九日膝脛顳顬三
十干十二支人神忌日
甲日頭乙日項丙日髆丁日胃脇戊日腹
巳日背庚日肺辛日胛壬日腎癸日足
又云甲乙日忌寅時頭　丙丁日忌辰時耳
戊巳日忌午時髮
壬癸日忌酉時足
子日目　丑日耳　寅日口外臺云肖面
卯日鼻外臺云在脾　辰日腰　巳日手外臺云頭口
午日心　未日足外臺云兩足心　申日頭外臺云在肖
酉日背外臺云脛　戌日項外臺云脊　亥日頂外臺云脛
建日申時頭外臺云足　除日酉時膝外臺云眼
滿日戌時腹　平日亥時腰背
定日子時心　執日丑時手
破日寅時口　危日卯時鼻
成日辰時脣　收日巳時足外臺云頭
開日午時耳　閉日未時目

右件時不得犯其處殺人

十二時忌

子時踝　丑時頭　寅時目　卯時面耳外臺云在項
辰時項外臺云在面　巳時肩外臺云在乳　午時脊脇　未時腹
申時心　酉時背脚外臺云在膝　戌時腰陰　亥時股

又立春春分脾立夏夏至肺立秋秋分肝立冬冬至心四季

十八日腎已上竝不得醫治凶
凡五藏主時不得治及忌針灸其經絡凶
又正月丑　二月戌　三月未　四月辰
五月丑　六月戌　七月未　八月辰
九月丑　十月戌　十一月未　十二月辰
又春左脇秋右脇夏在臍冬在腰皆凶
又每月六日十五日十八日二十二日二十四日小盡日療
病令人長病
戊午甲午此二日大忌刺出血服藥針灸皆凶千金翼云不出月凶
甲辰　庚寅　乙卯　丙辰　辛巳此日針灸凶
壬辰　甲辰　巳巳　丙午　丁未此日男忌針灸
甲寅　乙卯　乙酉　乙巳　丁巳此日女人特忌針灸
甲子　壬子　甲午　丙辰　丁巳　辛卯　癸卯
乙亥此日忌針灸餘外臺云甲子日天子會壬子日百王
辰日諸矣會辛卯日大夫會甲午日太子會丁巳日三公會丙
卯日大人會乙亥日巳上大夫會癸
又男避除女避破男忌戊女忌巳
凡五辰　五酉　五未　及八節先後各一日皆凶
論曰此等法竝在諸部不可尋究故集之一處造次易知所
以省披討也

備急千金要方卷第三十針灸下

朝奉郎守尚藥奉御秘閣校理判登聞檢院上護軍賜紫緋魚袋臣林億等校正

孔穴主對法

論曰凡云孔穴主對者穴名在上病狀在下或一病有數十穴或數病共一穴皆臨時斟酌作法用之其有須針者即針刺以補寫之不宜針者直爾灸之然灸之大法但其孔穴與針無忌即下白針若温針訖乃灸之此為良醫其脚氣一病最宜針之若針而不灸灸而不針皆非良醫也針灸而藥藥不針灸尤非良醫也但恨下里間知針者鮮耳所以學者深須解用針熨針白針皆須妙解知針知藥固是良醫

頭面第一項目鼻耳口舌齒咽喉附

心腹第二腎胸脇大小便淋瀝水腫脹滿不能食嘔吐泄利吐血瘀逆上氣

背第三

腰第四

手第五

足第六

四肢第七

婦人第八

小兒第九

傷寒第十

雜病第十一

灸法第十二

禁灸第十三

四肢第三　手臂附　腰脊　脚　脊背　膝附

風痺第四　痺痛　尸厥　中惡　尸注附

熱病第五　黃疸　霍亂　附

癭瘤第六　痔漏　癰疽　陰病　附

雜病第七

婦人第八　小兒附

頭面第一

頭病

神庭　水溝主寒熱頭痛喘渴目不可視

頭維　大陵主頭痛如破（甲乙云喘逆煩悶嘔吐流汗難言）

崑崙　曲泉　飛揚　前谷　少澤

通里主頭眩痛

竅陰　強間主頭痛如錐刺不可以動

腦戶　通天　腦空主頭重痛

消濼主寒熱痺頭痛

攢竹　承光　腎輸　絲竹空

和髎主風頭痛

神庭主風頭眩善嘔煩滿

上星主風頭眩顏清

顱會主風頭眩頭痛顏清

上星主風頭引頷痛

天牖　風門　崑崙　關元　開衝主風眩頭痛

瘈脉主風頭耳後痛

合谷　五處主風頭熱

前頂　後頂　頷厭主風眩偏頭痛

玉枕主頭半寒痛（甲乙云頭眩半寒）

天柱　陶道　大杼　一本神作孔最　後谿主頭痛
目窓　中渚　完骨
京骨　臨泣　小海
陽陵泉主頭痛寒熱汗出不惡寒
項病
少澤　前谷　後谿
主項強急痛不可以顧
消濼　本神　通天　強間　風府　瘖門　天柱　風池
齗交　天衝　陶道　外丘　通谷　至枕主項如拔不可
左右顧
天容　前谷　角孫　腕骨　支正主頸腫項痛不可顧
天容主頸項攣不能言
飛陽　涌泉　頷厭　後頂主頸項疚歷節汗出

角孫主頸頷柱滿
面病
攢竹　齗交　至枕主面赤頰中痛
巨窌主面惡風寒頰腫痛
上星　顖會　前頂　腦戶　風池主　鼻淵
天突　天窗主面皮熱
賢輸　內關主面赤熱
行間主面蒼黑
大衝主面塵黑
天窗主頰腫痛
中渚主顳顬痛頷顱熱痛面赤
縣顱主面皮赤痛
目病

大敦主目不欲視大息
大都主目眩
承漿 前頂 天柱 腦空 目窓主目眩瞑
天柱 陶道 崑崙主目眩又目不明目如脫
腎輸 內關 心輸 復留 大泉 腕骨 中渚 攢竹
精明 百會 委中 崑崙 天柱 本神 大杼 頷厭
通谷 曲泉 後頂 絲竹空 胃輸主目疏疏不明惡風寒
陽白主目瞳子痛癢遠視疏疏昏夜無所見
掖門 前谷 後谿 腕骨 神庭 百會 天柱 風池
天牖 心輸主目泣出
至陰主目腎
丘墟主視不精了了目腎瞳子不見
後谿主皆爛有腎

前谷 京骨主目中白腎
京骨主目反白白腎從內皆始
精明 斷交 承泣 四白 風池 巨窌 瞳子窌
上星 肝輸主目淚出多眵瞖內皆赤痛癢生白膚腎
天牖主目不明耳不聰
照海主目痛視如見星
肝輸主熱病差後食五辛多患眼闇如雀目
陽白 上星 本神 大都 曲泉 俠谿 三間 前谷
攢竹 玉枕主目系急 目上插
絲竹空 前頂主目上插增風寒
承泣主目瞤動與項口相引 (動与項口參相引 瞤絆口不能言)
申脉主目反上視若赤痛從內皆始

三間　前谷主目急痛
大衝主下肢痛
陽谷　大衝　鼻齆主目急痛赤腫
曲泉主目赤腫痛
束骨主目瞤赤
陽谿　陽谷主目痛赤
商陽　巨窌　上關　承光　童子窌　絡却主青盲无所見
顴窌　內關主目赤黃
掖門主目澁暴變
期門主目青而歐
二間主目皆傷
風池　腦戶　玉枕　風府　上星主目痛不能視先取譆
譆後取天牖風池

大泉主目中白睛青
俠谿主外眥赤痛逆寒泣出目穬
鼻病
神庭　攢竹　迎香　風門　合谷　至陰　通谷　主鼻
鼽清涕出
曲差　上星　迎香　素窌　水溝　斷交　通天　禾窌
風府主鼻窒喘息不利鼻喎僻多涕鼽衄有瘡
水溝　天牖主鼻不收涕不知香臭（甲乙云鼻鼽不得息及衄不止）
斷交主鼻中息肉不利鼻頭額顁中痛鼻中有蝕瘡
承靈　風池　風門　譆譆
腦空　竅陰主鼻管瘜發為齆鼻
風門　五處主時時嚏不已
肝輸主鼻中酸

中管三間偏歷厲兌承筋京骨崑崙承山
飛揚隱白主頭熱鼻鼽衄
中管主鼻聞焦臭
復留主涎出鼻孔中痛
京骨申脉主鼻中衄血不止淋瀝
厲兌京骨前谷主鼻不利涕黃
天柱主不知香臭
耳病
上關下關四白百會顱息翳風耳門頷厭
天窻陽谿關衝掖門
天容聽會聽宮中渚主耳痛鳴聾
天牖瘈主暴聾
少商主耳前痛
曲池主耳痛
外關會宗主耳渾渾淳淳聾無所聞
前谷後谿主耳鳴仍取偏歷大陵
腕骨陽谷肩貞竅陰俠谿主頷痛引耳嘈嘈耳鳴
無所聞
商陽主耳中風聾鳴刺入一分留一呼灸三壯左取右右取左如食頃
口病
承泣四白巨窌禾窌上關大迎顴骨強間
風池迎香水溝主口喎僻不能言
頰車懸顱窌主口僻痛惡風寒不可以嚼
外關內庭三里大泉甲乙云口僻刺大間引而下之商丘主僻噤
水溝齦交主口不能禁水漿喎僻

斷交 上關 大迎 翳風主口噤不開引鼻中
合谷 氷溝主脣吻不收瘖不能言口噤不開商丘主口噤不開
曲鬢主口噤
地倉 大迎主口緩不收不能言
下關 大迎 翳風主口失欠下牙齒痛
膽輸 商陽 小腸輸主口乾食飲不下
勞宮 少澤 三間 大衝主口熱口乾口中爛
兌端 目窗 正營 耳門主脣吻強上齒齲痛
大谿 少澤主咽中乾口中熱唾如膠
曲澤 章門主口乾
陽陵泉主口苦溢中介介然
光明 臨泣主喜齘齒頰 一作
京骨 陽谷主白齘齒脣頰 一作

解谿主口痛齘舌
勞宮主大人小兒口中腫腥臭
舌病
廉泉 然谷 俞乙作谷 陰谷主舌下腫難言舌瘖涎出
風府主舌緩瘖不能言舌急語難
扶突 大鍾 竅陰主舌本出血
魚際主舌上黃身熱
尺澤主舌乾脇痛
關衝主舌卷口乾心煩悶
支溝 天窗 扶突 曲鬢 靈道主暴瘖不能言
中衝主舌本痛
天突主俠舌縫脉青 復留主舌卷不能言
齒病

厲兌　三間　衝陽　偏歷　小海　合谷　內庭
復留主齲齒
大迎　顴竅　聽會　曲池主齒痛惡寒
浮白主牙齒痛不能言
陽谷　正營主上牙齒痛
陽谷　按門　商陽　二間　四瀆主下牙齒痛
角孫　頰車主牙齒不能嚼
下關　大迎　腎風　完骨主牙齒齲痛
曲鬢　衝陽主齒齲
喉咽病
風府　天窗　勞宮主喉痓痛
扶突　天突　天谿主喉鳴暴忤氣哽
少商　大衝　經渠主喉中鳴
魚際主喉中焦乾
水突主喉咽腫
按門　四瀆主呼吸短氣咽中如息肉狀
間使主痓中如扼押乙作間
少衝主酸咽
少府　蠡溝主痓中有氣如息肉狀
中渚　支溝　內庭主痓痛
復留　照海　大衝　中封主痓乾
前谷　照海　中封主咽偏腫不可以咽
涌泉　大鍾主咽中痛不可內食
然谷　大谿主痓內腫氣走咽喉而不能言
風池主喉咽僂引項攣手不收
喉痺

完骨 天牖 前谷主喉痺頸項腫不可俛仰頰腫引耳後
中府 陽交主喉痺胃滿塞寒熱
天容 缺盆 大杼 膈輸 雲門 尺澤 三間 厲兌
涌泉 然谷主喉痺哽咽寒熱
天鼎 氣舍 膈輸主喉痺哽噎咽腫不得消食飲不下
天突主喉痺咽乾急
旋璣 鳩尾主喉痺咽腫水將不下
三間 陽谿主喉痺咽如哽
大陵 偏歷主喉痺噎乾
神門 合谷風池主喉痺
三里 温留 曲池 中渚 豐隆主喉痺不能言
關衝 竅陰 少澤主喉痺舌卷口乾
凡喉痺脇中暴逆先取衝脉後取三里雲門各瀉之又刺手

小指端出血立已

心腹第二

胃脇
通谷 章門 曲泉 膈輸 期門 食竇 陽谷 石門
主胃脇支滿
本神 顱息主胃脇相引不得傾側
大杼 心輸主胃中鬱鬱
肝輸 脾輸 志室主兩脇急痛
腎輸主兩脇引痛
神堂主胃腹滿
三間主胃滿腸鳴
期門 缺盆主胃中熱息賁脇下氣上
陽谿 天容主胃滿不得息

曲池　人迎　神道　章門　中府　臨泣　天池　旋機
府輸主肾中滿
支滿主脇腋急痛
腕骨　陽谷主脇痛不得息
豐隆　丘墟主肾痛如刺
竅陰主脇痛欬逆
臨泣主季脇下支痛肾痺不得息
陽輔主肾脇痛
陽交主肾滿腫
環跳　至陰主肾脇痛無常處腰脇相引急痛
大白主肾脇脹切痛甲乙云鳴切痛不脇
然骨主肾中寒欬唾有血
大鍾主肾喘息脹

膽輸　章門主脇痛不得卧肾滿歐無所出
大包主肾脇中痛
華蓋　紫宮　中庭　神藏　靈墟　胃輸　俠谿　步郎
商陽　上廉　三里　氣戶　周榮　上管　勞宮　涌泉
陽陵泉主肾脇拄滿
膻中　天井主肾心痛
臑窓主肾脇癰腫　乳根主肾下滿痛
雲門主肾中暴逆
雲門　中府　隱白　期門　肺輸　魂門　大陵主肾中痛
鳩尾主肾滿欬逆
巨闕　間使主肾中澹澹
大泉主肾滿欬呼肾臑痛
中管　承滿主脇下堅痛
梁門主肾下積氣
關元　期門　少商主脇下脹

經渠　丘墟主胥背急胥中彭彭
尺澤　少澤主短氣脇痛心煩　間使主胥痺背相引
魚際主痺走胥皆不得息　少衝主胥痛口熱
凡胥滿短氣不得汗皆針補手太陰以出汗

心病

支溝　大谿　然谷主心痛如錐刺甚者手足寒至節不息
者死　大都　太白主暴泄心痛不得反側　甲乙云不得息痛無常處
臨泣主胥痺心痛不得反側
行間主心痛色蒼蒼然如死灰狀終日不得太息
通谷　巨闕　大倉　心輸　膻中　神府主心痛
通里主卒痛煩心心中懊憹數欠頻伸心下悸悲恐
期門　長強　天突　俠白　中衝主心痛短氣
尺澤主心痛彭彭然煩悶亂少氣不足以息

腎輸　復留　大陵　雲門主心痛如懸
章門主心痛而嘔　大泉主心痛上搶心不欲食
建里主心痛上搶心不欲食息賁唾血厥心痛善噦心疝太息
鳩尾主心寒脹滿不得食息賁唾血厥心痛善噦心疝太息
上管主心痛有三蟲多涎不得反側
中管主心痛難以俛仰　甲乙云身寒心如不容
期門主心切痛喜噫酸
靈道主心痛悲恐相引瘈瘲　肓門主心下大堅
間使主心懸如飢　然谷主心如懸少氣不足以息
郄門　曲澤　大陵主心痛　少衝主心痛而寒
商丘主心下有寒痛又主脾虛令人病不樂好太息
凡卒心痛汗出刺大敦出血立已
凡心實者則心中暴痛虛則煩惋然不能動失智內關主之

腹病

復留一中封 腎輸 承筋 陰包 承山 大敦主小腹痛

氣海主少腹痂氣遊行五藏腹中切痛

石門 商丘主少腹堅痛下引陰中

關元 委中 照海 大谿主少腹熱而偏痛

膀胱輸 陰谷主腹脹胃管暴痛及腹積聚肌肉痛

高曲主腹中積聚時切痛 一名商曲

四滿主腹辟切痛 天樞主腹中盡痛

外陵主腹中盡疼 崑崙主腹痛喘暴滿

氣衝主身熱腹痛 腹結主繞臍痛搶心

衝門主寒氣滿腹中積痛疼淫濼

間使主寒中少氣 隱白主腹中寒冷氣脹喘

復留主腹厥痛 鳩尾主腹皮痛搔養

水分 石門主少腹中拘急痛

巨闕 上管 石門 陰蹻主腹中滿暴痛汗出

中極主腹中熱痛

行間主腹痛而熱上柱心心下滿

大谿主腹中相引痛 涌泉主風入腹中少腹痛

豐隆主胃痛如刺腹苦刀切痛

脹滿病

中極主少腹積聚堅如石小腹滿

通谷主結積留飲癖癰胃滿飲食不消

膀胱輸主堅結積聚

胃管 三焦輸主少腹積聚堅大如盤胃脹食飲不消

上管主心下堅積聚冷脹

三里 章門 京門 厥宛 內庭 陰谷 絡却 崑崙

商丘　陰陵泉　曲泉　陰谷主腹脹滿不得息

隱白主腹脹逆息

解谿主腹大下重　尺澤主腹脹喘振慄

肝輸　包肓主少腹滿　大鍾主腹滿便難

日月　大橫主少腹堅腫　水道主少腹脹滿痛引陰中

委中主少腹堅腫　關元主寒氣入腹

懸樞主腹中積上下行　懸鍾主腹滿

脾輸　大腸輸主腹中氣脹引脊痛食飲多而身羸瘦名曰

食晦先取脾輸後取季肋　高曲主腹中積聚

陰市主腹中滿痿厥少氣　丘墟主大疝腹堅

京門主寒熱腸脹

肓輸主大腹寒疝胞寒悗大　天樞主腹脹腸鳴氣上衝胸

氣衝主腹中大熱不安腹有大氣暴腹脹滿蓬淫樂

大衝主羸瘦恐懼氣不足腹中悒悒

期門主腹大堅不得息脹痺滿少腹尤大

太陰郄主腹滿積聚

衡門主寒氣腹滿腹中積聚疼痛

巨闕　上管主腹脹五藏脹心腹滿

中管主腹脹不通痓大便堅憂思損傷氣積聚腹中甚痛作

膿腫往來上下

陰交主五藏遊氣　中極主寒中腹脹

太谿主腹中脹腫　三里行間　曲泉主腹膜滿

陷谷主腹大滿喜噫　衝陽主腹大不嗜食

解谿主厥氣上柱腹大　隱白主腹滿喜嘔

五里主心下脹滿而痛上氣

太白　公孫主腹脹食不化鼓脹腹中氣大滿

商丘主腹中滿嚮嚮然不便心下有寒痛
漏谷主腸鳴強欠心悲氣逆腹膜滿急
陰陵泉主腹中脹不嗜食脇下滿腹中盛水脹逆不得卧
蠡溝主數噫恐悸氣不足腹中悒悒
凡腹中熱喜渴涎出是蛔也以手聚而按之堅持勿令得移
以大針刺中管久持之中不動乃出針
凡腹滿痛不得息正仰卧屈一膝申一脚並氣衝針入三寸
氣至寫之
陰都主心滿氣逆腸鳴復留 陽綱主腸鳴而痛
陷谷 温留 漏谷 胃輸主腹滿而鳴
上廉主腸鳴相追逐 膲窌主腸鳴泄注
章門主腸鳴盈盈然 臍中主腸中常鳴上衝於心
太白 公孫主腸鳴

陰交主腸鳴濯濯如有水聲
大小便病
豐隆主大小便澀難
長強 小腸輸主大小便難淋瘧
水道主三焦約大小便不通 營衝四穴主大小便不利
秩邊 包肓主瘧閉下重大小便難
會陰主陰中諸病前後相引痛不得大小便
大腸輸 八窌主大小便利
陽綱主大便不節小便赤黃腸鳴泄注
承扶主尻中腫大便直出陰胞有寒小便不利
盆骨端主小便不利大便泄數并灸天樞
勞宮主大便血不止尿赤
大鍾主大便難
大谿主尿黃大便難

中窮　石門　承山　中管　大鍾　大谿　承筋
主大便難　　肓輸主大便乾腹中切痛
崑崙主不得大便　石關主大便閉寒氣結心堅滿
中注　浮郄主少腹熱大便堅
上廉　下廉主小便難黃　腎輸主小便難赤濁骨寒熱
會陰主小便難竅中熱　橫骨　大巨　期門主小腹滿小便難陰下縱
大敦　箕門　委中　委陽主陰跳遺小便難
少府　三里主小便不利瘧
中極　蠡溝　漏谷　承扶　至陰主小便不利失精
陰陵泉主心下滿寒中小便不利
關元主胞閉塞小便不通勞熱石淋

京門照海主尿黃水道不通
京門主溢飲水道不通溺黃
包肓　秩邊主瘧閉下重不得小便黃
陰交　石門　委陽主小腹堅痛引陰中不得小便
關元主石淋臍下三十六疾不得小便并灸足大陽
列缺主小便熱痛　大陵主目赤小便如血
承漿主小便赤黃或時不禁
完骨　小腸輸　白環輸　膀胱俞輸主小便赤黃
中管主小腸有熱尿黃　前谷　委中主尿赤難
陰谷主尿難陰痿不用　中封　行間主振寒溲白尿難痛
關元主傷中尿血
凡尿青黃赤白黑青取井黃取輸赤取滎白取經黑取合
復留主淋　關元通泉主胞轉氣淋又主小便數

陰陵泉　關元主寒熱不節腎病不可以俛仰氣逢尿黃
氣衝主腹中滿熱淋閉不得尿
曲泉主逢閉陰痿
然谷主逢血
復留主血淋
大衝主淋不得尿陰上痛
曲骨主小腹脹血逢小便難　通里主遺溺
關門　中府　神門主遺尿（甲乙中府作委中）
陰陵泉　陽陵泉主失禁遺尿不自知
泄痢病
京門　然谷　陰陵泉主洞泄不化
交信主泄痢赤白漏血
復留主腸僻便膿血泄痢後重腹痛如痤狀

脾輸主泄痢不食食不生肌膚
小腸輸主泄痢膿血五色重下腫痛
丹田主泄痢不禁小腹絞痛
關元　大谿主泄痢不止
天樞主冬月重感於寒則泄當臍痛腸胃間遊氣切痛
腹哀主便膿血寒中食不化腹中痛
足澤主嘔泄上下出兩脇下痛束骨主腸澼泄
太白主腹脹食不化喜嘔泄有膿血
地機主溏瘕腹中痛藏痺
大衝曲泉主溏泄痢泄下血　長強主頭重洞泄
腎輸　章門主寒中洞泄不化
會陽主腹中有寒泄注腸澼便血
三焦輸　小腸輸　下窮　意舍　章門主腸鳴臚脹欲泄注

中窌主腹脹飧泄　十六
大腸輸主腸鳴腹膜腫暴洩
消渴
承漿意舍關衝然谷主消渴嗜飲
勞宮主苦渴食不下　意舍主消渴身熱面目黃
曲池主寒熱渴　陷白主飲渴
行間　大衝主盜泉乾善渴　商丘主煩中渴
水腫
公孫主頭面腫　水溝主水腫人中滿
胃倉主水腫臚脹食飲不下惡寒
章門主身濶石水身腫　屋翳主身腫皮痛不可近衣
中府　間使　合谷主面腹腫
陰交石門主水脹水氣行皮中小腹皮敦敦然小便黃氣滿
關元主小腹滿石水　四滿　然谷主大腹石水

關門主身腫身重
天樞　豐隆　厲兌　陷谷　衝陽主面浮腫
氣衝主大氣石水
天府主身脹逆息不得卧風汗身腫喘悶多唾
解谿主風水面附腫顏黑　豐隆主四肢腫身癊
上廉主風水腫　三里主水腹脹皮腫
陷谷　列缺主面目癰腫　大敦主大腹腫脹臍腹邑邑
臨泣主腋下腫胃中滿　天牖主乳腫缺盆中腫
丘墟　陽蹻主腋下腫寒熱頸腫
崑崙主腰尻腫踹跟腫　復留　豐隆主風逆四肢腫
曲泉主腹腫　陰谷主寒熱腹偏腫
列缺主汗出四肢腫　完骨　巨窌主頭面氣附腫
陽陵泉主頭面腫

凡頭目癰腫留飲胃脘支滿刺隕谷出血立已　不能食病
豐隆主不能食
天樞　厲兌　內庭主食不化不嗜食俠臍急
維道主三焦有水氣不能食　中封主身黃有微熱不嗜食
然谷　內庭　脾輸主不嗜食
胃輸　腎輸主胃中寒脹食多身羸瘦
胃輸主嘔吐筋攣食不下不能食
大腸輸　周榮主食不下喜飲
陽綱　期門　少商　勞宮主飲食不下
章門主食飲不化入腹還出熱中不嗜食苦吞而閒食臭傷
飽身黃酸疼羸瘦
中庭　中府主膈寒食不下嘔吐還出
食竇主膈中雷鳴察察隱隱常有水聲

巨闕主膈中不利　上管　中極主飢不能食
凡食飲不化入腹還出先取下管後取三里瀉之
凡不嗜食刺然谷多見血使人立飢
嘔吐病
商丘主脾虛令人病寒不樂好太息多寒熱喜嘔
俞府　靈墟　神藏　巨闕主嘔吐腎滿
率谷主煩滿嘔吐　天容主欬逆嘔沫
胃輸　腎輸主嘔吐　中庭中府主嘔逆吐食下還出
曲澤主逆氣嘔涎　石門主嘔吐
維道主嘔逆不止　陽陵泉主嘔宿汁心下澹澹
少商　勞宮主嘔吐　絕骨主病熱欲嘔
商丘　幽門　通谷主喜嘔大鍾　大谿主煩心滿嘔

魄門陽關主嘔吐不住多涎唾
巨闕　胃倉主吐食　膈輸主吐食又灸章門胃管
大敦主噦噫又灸石關　內廷主喜頻伸數欠惡聞人音
吐血病
上管　不容　大陵　主嘔血
胃堂　脾輸　手心主　間使　胃管　天樞　肝輸　魚際
勞宮　肩輸　大谿主唾血吐血
郄門主衄血嘔血　大泉　神門主唾血振寒嘔血上氣
手少陰郄主吐血　委中　隱白主衄血女子漏血
行間主短氣嘔血腎背痛
大衝主面唇色白時時歐血　然谷主欬唾有血
涌泉主衄不止　然谷主欬唾有血
凡內損唾血不足外無膏澤地五會主之刺入三分特忌灸

凡唾血瀉魚際補尺澤
欬逆上氣
天容　廉泉　魄戶　氣舍　譩譆　扶突主欬逆上氣喘息歐沫鹵禁（甲乙云陽氣大逆上喘渴坐伏不得息取之天容上氣肖痛取之咽嚥廉泉欬逆上氣魄戶及氣舍譩譆喘息扶突主之唾沫天容譩譆主之）
頭維主喘逆煩滿歐沫流汗
缺盆　心輸　肝輸　巨闕　鳩尾主欬唾血
期門　右手屈臂中橫文外骨上主欬逆上氣
缺盆　膻中　巨闕主欬嗽
然谷　天泉　陷谷　肩堂　章門　曲泉　天突　雲門
肺輸　臨泣　肩井　風門　行間主欬逆
維道主欬逆不止　天府主上氣喘不得息
扶突主欬逆上氣喘中鳴喘

鳩尾主噫喘脅滿欬嘔
期門主喘逆卧不安席欬脇下積聚
經渠主欬逆上氣喘掌中熱
大陵主欬逆寒熱發
少商　大陵主欬逆喘
勞宮主氣逆噫不止
支溝主欬面赤而熱
前谷主欬而脅滿
欬喘曲澤出血立已又主卒
欬唾噫善欬氣無所出先取三里後取太白章門賁豚
章門　石門　陰交主賁豚上氣
陰交　關元主賁豚寒氣入小腹

先引腰後引少腹腰臍少腹痛堅痛引陰中不得小便兩丸
彎石門主之賁豚氣上腹臍堅痛下引陰中不得小便兩丸
主陰交之

睨戶　中府主肺寒熱呼吸不得卧欬逆上氣嘔沫喘氣相
追逐　肺輸　腎輸主喘欬心氣百病
或中　石門主欬逆上氣涎出多唾
大包主大氣不得息　天池主氣喉鳴
天突　華蓋主欬逆上氣心煩
紫宮　玉堂　大谿主欬逆上氣
膻中　華蓋主短氣不得息
輸府　神藏主欬逆上氣喘不得息
或中　雲門主欬逆上氣淡出多唾呼吸喘悸坐不安席
步郎　安都主膈上不通呼吸少氣喘噫
氣戶　雲門　天府　神門主喘逆上氣呼吸肩息不知食味
庫房　中府　周榮　尺澤主欬逆上氣呼吸多士澤沫膿血
中府主肺系急欬輸肖痛
經渠　行間主喜欬

中極主貢豚上搶心甚則不得息
天樞主貢豚脹疝（呷乙氣疝嘔酒腫潰豚煩）
歸來主貢豚卵上入引莖痛　期門主貢豚上下
然谷主胷中寒脉代時不至寸口少腹脹上搶心

四肢第三

手病

掖門主手臂痛
肩貞主手髃小不舉
少商主手不仁
大陵主手攣不伸
大陵主手製掣
曲澤主手青逆氣
中衝勞宮少衝大泉　經渠　列缺主手掌熱附中痛
巨闕主手清
陰交主手肘拘攣
列缺主手臂身熱
內關主手中風熱
間使主手痛
神門　少海主手臂攣
養老主手不得上下
腕骨　中渚主五指製掣不可屈伸
尺澤主製掣痛手不可伸
曲池主手不可舉重腕急肘中痛難屈伸
陽谿主臂腕外側痛不舉　心輸　肝輸主筋急手相引

臂肘病

尺澤　閑衝　外開　竅陰主臂不及頭
前谷　後谿　陽谿主臂重痛肘攣
臑會　支溝　曲池　腕骨　肘窌主肘節痺臂酸重腕急
痛肘難屈伸
腕骨　前谷　曲池　陽谷主臂腕急腕外側痛脫如拔
天井　外關　曲池主臂痿不仁

大泉　經渠主臂內廉痛
肩窌　天宗　陽谷主臂痛　開衝主肘疼不能自帶衣
魚際　靈道主肘攣柱滿
間使主肘內廉痛
曲池　開衝　三里　中渚　陽谷　尺澤主肘痛時寒
地五會陽輔　申脉　委陽　天池　臨泣主腋下腫
中肌輸　譩譆主腋攣
肩背病
氣舍主肩腫不得顧
天井主肩痛痿痺不仁肩不可屈伸肩肉髒木
曲池　天窌主肩重痛不舉
肩貞　開衝　肩髃主肩中熱頭不可以顧
巨骨主肩臂酸重　支溝　開衝主肩臂

清冷泉　陽谷主肩不舉不得帶衣
天宗主肩重臂痛　肩外輸主肩甲痛而寒至肘
曲垣主肩甲周痺　後谿主肩臑痛
腕骨主肩臂疼　養老　天柱主肩痛欲折
涌泉主肩背頸項痛
天牖　缺盆　神道　大杼　天突　水道巨骨主肩背痛
膈輸　譩譆　京門　尺澤主肩背寒痙肩甲內廉痛
前脘主肩腋前痛與胃相引
列缺主肩背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手而脅凡實則
肩背熱背汗出四肢暴腫虛則肩寒慄氣不足以息
腰脊病
神道　谷中　腰輸　長強　大杼　膈關　水分　脾輸
小腸輸　膀胱輸主腰脊急強

腰輸長強　膀胱輸
小腸輸　中船輸　白環輸主腰脊痂痛
次窌主腰下至足不仁
次窌　胞肓　承筋主腰脊痛惡寒
志室　京門主腰痛脊急
三里　陰市　陽輔　承筋主腰痛不可以顧
束骨　飛揚　承筋主腰痛如折
申脉　大衝　陽蹻主腰痛不能舉
崑崙主脊強背尻骨重　合陽主腰脊痛引腹
委中主腰痛俠脊至頭几几然凡腰脚重痛於此刺出血
固宿疹亦皆立已
委陽　胻門甲乙云腰痛得俛不得仰　太白　陰陵泉　行間主腰痛不可俛仰

扶承主腰脊尻臀股陰寒痛
涌泉主腰脊相引如解甲乙云腰痛大便難
大鍾主腰脊痛　陰谷主脊內廉痛
陽輔主腰痛如錘居中腫痛不可以欬欬則筋縮急諸節痛
上下無常寒熱　附分主背痛引頭
膈關　秩邊　京骨主背強惡寒痛脊強難以俛仰
京門甲乙云腰不可以俛石開主脊痓及折

脚病
崑崙主脚如結踝如別
京骨　承山　承筋　商丘主脚攣　行間主厥足下熱
然谷主足不能安脛酸不能久立
中都主足下熱脛寒不能久立濕痺不能行
陰陵泉主足痺痛

承山　承筋主脚腨酸脚急跟痛脚筋急痛兢兢
復留主脚後廉急不可前却足跗上痛
京骨　然谷　腎輸主足寒　僕參主足跟中踝後痛
大谿主手足寒至節　大谿　次卻　膀胱輸主足清不仁
地倉　大泉主足踒躃不能行　光明主痿躄坐不能起
浮白主足緩不收　天柱　行間主足不任身
衝陽　三里　僕參　飛揚　復留　完骨主足痿失履不收
條口　三里　承山　承筋主足下熱不能久立
風府　腰輸主足不仁
丘墟主腕不收坐不得起　髀樞脚痛
陽輔　陽交　陽陵泉主髀樞膝骨痺不仁
環跳　束骨　交信　陰交　陰舍主髀樞中痛不可舉
臨泣　三陰交主髀中痛不得行足外皮痛

申脉　隱白　行間主脛中寒熱
太衝　涌泉主脛酸　付陽主腨外廉骨痛
飛揚主腨中痛　復留主脛寒不能自温
至陰主風寒從足小指起脉痺上下
至陽主脛疼四肢重少氣難言
厲兌　條口　三陰交主脛寒不得卧
內庭　環跳主脛痛不可屈伸
陽閒　環跳　承筋主脛痺不仁
涌泉　然谷主五指盡痛足不踐地
凡髀樞中痛不可牽以毫針寒而留之以月生死爲息數亡已
膝病
風市主兩膝攣痛引脇拘急躄躠或青或焦或枯或黧如腐
木　曲泉主膝不可屈伸

中封主少氣身重濕膝腫內踝前痛
大衝主膝內踝前痛
解谿　條口　丘墟　太白主膝股腫脥酸轉筋
合陽主膝股重　上廉主風水膝腫
犢鼻主膝中痛不仁
梁丘　曲泉　陽關主筋攣膝不得屈伸不可以行
陰市主膝上伏兎中寒
髀關主膝寒不仁痠痺不得屈伸
陷谿　陽關主膝痛
光明主膝痛脛熱不能行手足偏小
犢鼻主膝不仁難跪
膝關主膝內廉痛引臏不可屈伸連腹引唉咽痛
凡犢鼻腫可灸不可刺若其上堅勿攻攻之即死

章門主四肢解惰喜怒
曲泉　付陽　天池　大巨　支溝　小海　絕骨
前谷主四肢不舉
五里　三陽絡　天井　厥允　三間主嗜卧四肢不欲動搖
列缺主四肢厥喜笑
復留　豐隆　大都主風逆四肢腫　照海主四肢淫濼

風痺第四

風病

率谷主醉酒風熱發兩目眩痛甲乙云不能飲食煩滿嘔吐
完骨主風頭耳後痛煩心悶僻頭項搖頭痛牙車急甲乙云及足不收失履口
天柱主風眩
天府　曲池　列缺　百會主惡風邪氣泣出喜忘

陽谷主風眩驚手捲泄風汗出腰項急甲乙手捲作手腕痛
陰蹻主風暴不知人偏枯不能行　絕骨主風勞身重
解谿主風從頭至足面目赤　臨泣主大風目痛甲乙云目外眥痛
俠谿主肩中寒如風狀頭眩兩頰痛　涌泉主風入腹中
付陽主痿厥風頭重痛　崑崙主狂易大風
照海主大風默默不知所痛視如見星
內關主手中風熱
商陽主耳中風生
天井主大風默默不知所痛悲傷不樂
後溪主風身寒
上關主瘈瘲沫出寒熱痙引骨痛
巨闕　照海主瘈瘲引膂腹短氣
中脘輸主瘈瘲引膂腹短氣
脾輸　膀胱輸主熱痙引骨痛
肝輸主筋寒熱痙筋急手相引
天井　神道　心輸主悲愁恍惚悲傷不樂
命門主瘈瘲裏急腰腹相引
魚際主痙上氣失音不能言　通理主不能言
濕痺
曲池　列缺主身濕搖時時寒
風市主緩縱痿痺脇腸疼冷不仁
中瀆主寒氣在分肉間痛苦痺不仁
陽關主膝外廉痛不可屈伸脛痺不仁
懸鍾主濕痺流腫髀髁筋急瘈脛痛
豐隆主身濕
陽陵泉主髀痺引膝股外廉痛不仁筋急

絶骨主髀樞痛膝脛骨搔酸痺不仁筋縮諸節酸折
曲泉主卒痺病引臏下節　漏谷主久濕痺不能行
商丘主骨痺煩滿
臨泣主身痺洗淅振寒
凡身體不仁先取京骨後取中封絶骨皆寫之

癲疾

偏歷　神庭　攢竹　本神　聽宮　上星　百會　聽會
築賓　陽谿　後頂　強間　腦戸　脅却　玉枕主癲疾嘔
攢竹　小海　後頂　強間主癎發瘈狂走不得臥心中煩
兌端　齦交　承漿　大迎　絲竹空　禽會　天柱
商丘　主癲疾嘔沫寒熱瘈互引
承漿　大迎主寒熱悽厥鼓頷癲痙口噤
上關主瘈瘲沫出寒熱痙

絲竹空　通谷主風癎癲疾延沫狂煩滿
腦戸　聽會　風府　聽宮　腎風主骨痿眩狂瘈瘲口噤
喉鳴沫出瘖不能言
金門　僕參主癲疾馬癎
解谿　陽蹻主癲疾
商丘主癎瘈
尺澤　然谷主癲疾手臂不得上頭
列缺主熱癎驚而有所見
飛揚　太乙　滑肉門主癲疾狂吐舌
長強主癲疾發如狂面皮敦敦者不治
偏歷主癲疾多言耳鳴口僻
温溜　僕參主癲疾吐舌鼓頷狂言見鬼
曲池　少澤主瘈瘲癎疾

筋縮　曲骨　陰谷　行間主驚癇狂走癲疾
間使主善悲驚狂面赤黃瘧不能言
陽谿　天井主驚瘈
天井　小海主癲疾羊癇吐舌羊鳴戾頸
懸釐　束骨主癲疾玄引善驚羊鳴
天衝主頭痛癲疾玄引數驚悸
身柱主癲疾瘈瘲怒欲殺人身熱狂走譫言見鬼
風池　聽會　復留主寒熱癲什
完骨主癲疾僵仆狂癡
通谷主心中憒憒數欠癲心下悸咽中澹澹恐
天柱主卒暴癇眩
五處　身柱　委中　委陽　崑崙主脊強及折瘈瘲癲疾
頭痛

腦空　束骨主癲疾大瘦頭痛
風府　崑崙　束骨主狂易多言不休
風府　肺輸主狂走瘈恍惚不樂
胳却　聽會　身柱主狂走瘈
天柱　臨泣主狂易多言不休目上反
支正　魚際　合谷　少海　曲池　腕骨主狂言
驚恐
溫留　掖門　京骨主狂仆
神門　陽谷主笑若狂
陽谿　陽谷主吐舌戾頸妄言
巨闕　築賓主狂易妄言怒罵
衝陽　豐隆主狂妄行登高而歌棄衣而走
下巨虛主狂言非常

勞宮　太陵主風熱善怒心中悲喜思慕歔欷喜笑不止
曲澤　太陵主心下澹澹喜驚
陰交　氣海　大巨主驚不得卧　大巨主善驚
陰蹻主卧驚視如見鬼
大鍾　郄門主驚恐畏人神氣不足
然谷　陽陵泉主忘中怵惕恐如人將捕之
解谿主癲癎而驚
少府主數噫恐悸氣不足　少衝主大息煩滿少氣悲驚
厲兌主多卧好驚　行間主心痛數驚憨悲不樂
神門主數噫恐悸不足　掖門主喜驚妄言面赤
三間　合谷　厲兌主吐舌戾頸喜驚　巨闕主驚悸少氣
通里主心下悸
手少陰　陰郄主氣驚心痛

後谿主泣出而驚　脫骨主煩滿驚
卒尸厥
隱白　大敦主卒尸厥不知人脉動如故
中極　僕參主恍惚尸厥煩痛
金門主尸厥暴死
內庭主四厥手足悶者久持之厥熱腦痛腹脹皮痛者使人
久持之
邪客於手足少陰大陰足陽明之絡此五絡者皆會於耳中
上絡左角五絡俱竭令人身脉動如故其形無所知其狀若
尸刺足大指內側爪甲上去端如韭葉後刺足心後取足中
指爪甲上各一痏後取手大指之內去爪甲如韭葉後刺手
心主少陰兌骨之端各一痏立已不已以筒吹其兩耳中立
已不已拔其左角髮方寸燔治飲以淳酒一桮不能飲者灌

之立已
卒中惡
百會　玉枕主卒起僵仆惡見風寒
通天　胳却主暫起僵仆
大杼主僵仆不能久立煩滿裏急身不安席
飛尸遁注
天府主卒中惡風邪氣飛尸惡注鬼語遁尸
豐隆主厥逆足卒青痛如刺腹若刀切之狀大便難煩心狂
見鬼好笑卒面四肢腫
旁廷在腋下四肋間高下正與乳相當乳後二寸陷中俗名
注市舉掖取之刺入五分灸五十壯主卒中惡飛尸遁注胷
脇滿
九曲中府在旁廷注市下三寸刺入五分灸三十壯主惡風

邪氣遁尸內有瘀血

熱病第五

熱病
魚際　陽谷主熱病振慄鼓頷腹滿陰痿色不變
經渠　陽池　合谷　支溝　前谷　內庭　後谿　腕骨
陽谷　厲兌　衝陽　解谿主熱病汗不出
孔最主臂厥熱痛汗不出皆灸刺之此穴可以出汗
列缺　曲池主熱病煩心心悶先手臂身熱瘈瘲脣口聚鼻
張目下汗出如珠（甲乙云兩頭下三寸）
中衝　勞宮　大陵　間使　開衝　少衝　陽谿　天窌
主熱病煩心心悶而汗不出掌中熱心痛身熱如火浸淫煩
滿舌本痛
勞宮主熱病三日已往不得汗怵惕（甲乙云主熱病煩滿而欲嘔噦三日已往不得

汗怵惕胃脇不可反側欬滿溺赤小便血衄不止嘔吐氣逆噫不止鍼中痛食不下善渴口中爛掌中熱歇嘔

間使主熱病煩心喜噦胃中澹澹喜動而熱

曲澤主傷寒温病身熱煩心口乾燥甲乙云心澹澹善驚身熱附瘈善搖頭顏清汗出不過眉傷寒温病曲澤主之

通理主熱病先不樂數日

掖門　中渚　通理主熱病先不樂頭痛面熱先汗三間主氣身熱喘喘甲乙云寒熱口乾身熱喘息眼目急痛善驚

温留主傷寒寒熱頭痛噦衄肩不舉

曲池主傷寒餘熱不尽

上管　曲差　上星　陶道　天柱　上窌　懸釐　風池命門　膀胱俞主煩滿汗不出

飛揚主下部寒熱汗不出身重

五處　攢竹　正營　上管　缺盆　中府主汗出寒熱

承漿主汗出衄血不止

巨闕主煩心喜嘔甲乙云心腹脹噫煩熱善嘔腸中不通

百會主汗出而嘔痙

商丘主寒熱好嘔

懸顱主熱病頭痛身熱

玉枕　大杼　肝輸　心輸　膈輸　陶道主汗不出悽慘惡寒

懸釐　鳩尾主熱病偏頭痛引目外眥

少澤主振寒小指不用頭痛

大椎主傷寒熱盛煩嘔

膈輸　中府主寒熱皮肉骨痛少氣不得卧支滿

列缺主寒熱掌中熱

神道　關元主身熱頭痛進退往來

曲泉主身熱頭痛汗不出

膈輸主嗜卧怠惰不欲動搖身當濕不能食
三焦輸主頭痛食不下
魚際主頭痛不甚汗出
腎輸主頭身熱亦振慄腰中四肢淫濼欲嘔
天井主振寒頭項痛
肩井　關衝主寒熱悽索氣上不得卧
尺澤主氣膈喜嘔鼓頷不得汗煩心身痛
肩貞主寒熱項歷適甲乙云耳鳴無聞引缺盆肩中熱痛痺小不舉
委中主熱病俠脊痛
大都主熱病汗出且厥足清外臺云汗不出厥手足清
太白主熱病先頭重顏痛煩悶心身熱熱爭則腰痛不可以俛仰又熱病滿悶不得卧身重骨痛不相知
支正　少海主熱病先腰脛酸喜渴數飲食身熱項痛而強

振寒寒熱甲乙云主振寒寒熱肘攣頭眩痛虛則生瘧頭腫實則小者瘧疥
衝陽主振寒而欠　後谿主身熱惡寒
復留主寒熱無所安汗出不止風逆四肢腫
光明主腹足清寒熱汗不出
凡熱病煩心足寒清多汗先取然谷後取大谿大指間動脉皆先補之
熱病先腰脛酸喜渴數飲身清則項痛而寒且酸足熱不欲言頭痛顛顛然先取涌泉及太陽井滎熱中少氣厥寒灸之熱去灸涌泉三壯煩心不嗜食灸涌泉熱去四逆喘氣偏風身汗出而清皆取俠谿
凡熱病刺陷谷足先寒寒上至膝乃出針身痺洗淅振寒季脇支滿痛
凡温病身熱五日已上汗不出刺大泉留針一時取針若未

滿五日者禁不可刺

凡好太息不嗜食多寒熱汗出病至則喜歐歐已乃衰即取公孫及井輸實則腸中切痛厥頭面腫起煩心狂多飲不嗜卧虛則鼓脹腹中氣大滿熱痛不嗜食霍乱公孫主之

黃疸

然谷主黃疸一足寒一足熱喜渴甲乙云舌縱煩滿

章門主傷飽身黃

中封　五里主身黃時有微熱甲乙云不嗜食膝內廉內踝前痛少氣身弊重

太衝主黃疸熱中喜渴

脊中主黃疸腹滿不能食

脾輸主黃疸喜欠不下食脇下滿欲吐身重不欲動

中管　大陵主目黃振寒

勞宮主黃疸目黃

大谿主黃疸甲乙云消癉善渴便難盬中腫痛氣走喉咽而不能言手足腫痛唾血口中熱唾如膠

脾輸　胃管主黃疸

霍亂

巨闕　關衝　支溝　公孫　陰陵泉主霍亂

期門主霍亂泄注

太陰　大都　金門　僕參主厥逆霍亂

魚際主胃逆霍乱

三里主霍乱遺矢失氣　解谿主膝重脚轉筋太白主霍亂逆氣

大泉主眼青轉筋乍寒乍熱缺盆中相引痛

金門　僕參　承山　承筋主轉筋霍亂

承筋主卒疭癈脚酸甲乙云霍乱脛不仁

丘墟主脚急腫痛戰掉不能久立附筋足攣

竅陰主四肢轉筋

委中　委陽主筋急身熱
凡霍亂頭痛嗜臥滿呼吸喘鳴窮窘不得息人迎主之
凡霍亂泄出不自知先取太谿後取大谷之原

瘧病

列缺　後谿　少澤　前谷主瘧寒熱
陽谷主瘧脇痛不得息
飛揚主狂瘧頭眩痛痓反折
太鍾主多寒少熱
太谿主熱多寒少（甲乙云瘧閉戶而處惡寒厭足熱甚熱少欲開區）
商丘主寒瘧腹中痛
中封主色蒼蒼然太息振寒
丘墟主瘧振寒（甲乙云掖下腫）
崑崙主瘧多汗（甲乙云腰痛不能仰目如脫項如拔俛）
衝陽主瘧先寒洗淅甚久而熱熱去汗出
臨泣主瘧日西發　俠谿主瘧寒熱足痛
然谷主溫瘧汗出　天府主瘧病
少海主瘧背振寒（甲乙云頭痛引少腹中痛引肘掖腰脊四肢不舉）
天樞主瘧振寒熱盛狂言
少商主振慄鼓頷
商丘　神庭　上星　百會
前谷　光明　至陰　大杼主疾瘧熱
陰都　少海　商陽　三間　中渚主身熱瘧病
太泉　太谿　經渠主瘧欬逆心悶不得卧寒熱
列缺主瘧甚熱　陽谿主乍寒乍熱瘧
大陵　腕骨　陽谷　少衝主瘧寒熱
合谷　陽池　俠谿　京骨主瘧寒熱

譩譆 支正 小海主風瘧 温留主瘧面赤腫
偏歷主風瘧汗不出
三里 陷谷 俠谿 飛揚主痎瘧少氣
天井主瘧食時發心痛悲傷不樂
少澤 復溜 崑崙主瘧寒汗不出
厲兌 內庭主瘧不嗜食惡寒
衝陽 束骨主瘧從脚脛起

癭瘤 癭瘤第六

天府 臑會 氣舍主癭瘤癭氣咽腫 俠乙 御天 甲天 窻府
腦戶 通天 消濼 天突 主頸有大氣
通天主癭灸五十壯骨堂羊 矢灸一百壯
痔瘻

飛揚主痔篡傷痛
支溝 章門主馬刀腫瘻 絶骨主瘻馬刀披腫
商丘 復留主痔血泄後重
大迎 五里 臂臑主寒熱頸瘰癧
天突 章門 天池 支溝主漏
天突 天窻主漏頸痛 勞宮主熱痔 會陰主痔與陰相通者死
俠谿 陽輔 太衝主披下腫馬刀瘻
承筋 承扶 委中 陽谷主痔痛披下腫
商丘主痔骨蝕喜驚夢
竅陰主癰疽頭痛如錐刺不可以動動則煩心
太陵 支溝 陽谷 後谿主疝疥
癲疝
曲泉主癲疝陰跳痛引臍中不尿陰瘻

中都主癪疝崩中
合陽　中郄主癪疝崩中腹上下痛腸澼陰暴敗痛
照海主四肢淫濼身悶陰暴起疝
大谿主胞中有大疝瘕積聚與陰相引
商丘主陰股內痛氣癖狐疝走上下引小腹痛不可以俛仰
關元主癪疝
巨闕主狐疝
中管主衝疝冒死不知人
腎中　石門　天樞　氣海主少腹疝氣遊行五藏疝繞臍
衝脅不得息甲乙云臍疝繞臍痛衝脅不得息灸臍中臍疝繞臍痛石門主之臍疝繞臍痛時止天樞主之
石門主腹滿疝積　關元主暴疝痛
大敦主卒疝暴痛陰跳上入腹寒疝陰挺出偏大腫臍腹中邑邑不樂小便難而痛灸刺之立已左取右右取左甲乙云海主之照

大衝主狐疝厥
陰郄　衝門主疝癪瘕陰疝
大陰郄　大巨主癪疝偏枯
四滿主臍下疝積甲乙云胞中有血
天樞主氣疝歐
交信主氣瘧癪疝陰急股樞膊內廉痛
中封主癪疝瘧暴痛痿厥身躰不仁
氣衝主癪陰腫痛陰痿莖中痛兩丸騫痛不可仰卧
曲泉主癪疝陰跳痛引莖中不得尿
大陰郄　衝門主疝癪瘕陰疝
少府主陰痛實時挺長寒熱陰暴痛遺尿偏虛則暴癢氣逆
卒疝小便不利
陰市主寒疝下至腹膝髀腰痛如清水小大一作腹諸疝按之下至膝上伏兔中寒疝痛腹脹滿痿少氣
大衝　中封　地機主癪疝精不足
中極主失精　魚際主陰濕腹中餘疾

五樞主陰疝兩尤上下少腹痛
陰交　石門主兩尤驚
大衝主兩尤驚縮腹堅不得臥甲乙云環脐痛陰寒兩尤縮腹堅痛不得臥
大赫　然谷主精溢陰上縮
會陰主陰頭寒　曲泉主陰痿
陰谷主陰痿不用小腹急引陰內廉痛
行間主莖中痛

雜病第七　論一首

膏肓輸無所不治主羸瘦虛損夢中失精上氣欬逆狂惑忘誤取穴法令人正坐曲脊申兩手以臂著膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動搖從胛骨上角摸索至胛骨下頭其間當有四肋三間灸中間依胛骨之裏肋間空去胛骨容側指許摩胎肉之表肋間空處按之自覺牽引胷

戶中灸兩胛中各一處至六百壯多至千壯當覺氣下龍龍然如流水狀亦當有所下出若無停瘀宿疾則無所下也若病人已困不能正坐當令側卧挽上臂令前求取穴灸之也求穴大較以右手從右肩上住指頭表所不及者是也左手亦然乃以前法灸之若不能久正坐當伸兩臂者亦可伏衣襆上伸兩臂令人挽兩胛骨使相離不爾胛骨覆穴不可得也所伏衣襆當令大小常定不爾則失其穴也此灸訖後令人陽氣康盛當消息以自補養取身體平復其穴近第五椎相準望取之

論曰昔秦緩不救晉侯之疾以其在膏之上肓之下針藥所不及即此穴是也時人拙不能求得此穴所以宿痾難遣若能用心方便求得灸之無疾不愈矣

三里主腹中寒脹滿腸鳴腹痛腎腹中瘀血小腹脹皮腫陰

氣不足小腹堅熱病汗不出喜嘔口苦壯熱身反折口噤鼓頷腰痛不可以顧顧而有所見喜悲上下求之口僻乳腫喉痺痺不能言胃氣不足久泄利食不化脇下柱滿不能久立膝痿寒熱中消穀苦飢腹熱身煩狂言乳癰喜噫惡聞食臭狂歌妄笑恐怒大罵霍亂遺尿失氣陽厥悽悽惡寒頭眩小便不利喜噦凡此等疾皆灸刺之多至五百壯少至二三百壯

涌泉主喜噦喉痺身熱痛脊脇相引忽忽喜忘陰痺腹脹腰痛大便難有背頸項痛時眩男子如蠱女子如阻身體腰脊如解不欲食喘逆足下清至膝咽中痛不可內食瘖不能言小便不利小腹痛風入腸中癲疾俠臍痛急胥脇柱滿痛劒不止五疝指端盡痛足不踐地凡此諸疾皆主之

婦人病第八

少腹堅痛月水不通刺帶脉入六分灸五壯在季脇端一寸

八分

漏下若血閉不通逆氣脹刺血海入五分灸五壯在膝臏上內廉白肉際二寸半

漏血少腹脹滿如阻體寒熱腹偏腫刺陰谷入四分灸三壯在膝內輔骨後大筋之上屈膝乃得之（甲乙云痛血小便黃陰谷主之）

女子疝瘕按之如以湯沃兩股中少腹腫陰挺出痛經水來下陰中腫或癢漉青汁如葵羹血閉無子不嗜食刺曲泉在膝內輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝乃得之刺入六分灸三壯

疝瘕按之如以湯沃股內至膝狼泄陰中痛少腹痛堅急重下濕不嗜食刺陰陵泉入二分灸三壯在膝下內側輔骨下陷中伸足乃得之

經逆四肢淫濼陰暴跳疝小腹偏痛刺陰蹻入三分灸三壯

在內踝下容爪甲即照海穴也
少腹大字難嗌乾嗜飲俠臍旁刺中封入四分灸三壯在內
踝前一寸半伸足取之
女子不字陰暴出經漏刺然谷入三分灸三壯在足內踝前
起大骨下陷中
字難若胞衣不出泄風從頭至足刺崑崙入五分灸三壯在
足外踝後跟骨上
月事不利見赤白而有身反敗陰寒刺行間入六分灸三壯
在足大指間動應手
月閉溺赤脊強互引反折汗不出刺腰輸入二寸留七呼灸
三壯在第二十一椎節下間
絶子瘧寒熱陰挺出不禁白瀝痊脊反折刺上窌入二寸留
七呼灸三壯在第一空腰髁下一寸俠脊

赤白瀝心下積脹腰痛不可俛仰刺次窌入三寸留七呼灸
三壯在第二空俠脊陷中
赤淫時白氣瘙月事少刺中窌入二寸留七呼灸三壯在第
三空俠脊陷中
下蒈汁不禁赤瀝陰中癢痛引少腹控肶不可以俛仰刺腰
尻交者兩胂上以月生死為痛數發針立已一云下窌
腸鳴泄注刺下窌入二寸留七呼灸三壯在第四空俠脊陷中
赤白裹急瘛瘲刺五樞入一寸灸五壯在帶脉下三寸
拘攣腹滿疝月水不下乳餘疾絶子陰瘕賁豚上腨腹堅痛
下引陰中不得小便刺陰交入八分灸五壯在臍下一寸
腹滿疝積乳餘疾絶子陰瘕賁豚上腨少腹堅痛下引陰中
不得小便刺石門入五分在臍下二寸忌灸絶孕
絶子衄血在內不下胞轉不得尿小腹滿石水痛刺開元入

二寸灸七壯在臍下三寸又主引脇下脹頭痛身背熱賁豚
寒小便數泄不止
子門不端小腹苦寒陰癢及痛賁豚搶心飢不能食腹脹經
閉不通小便不利乳餘疾絕子內不足刺中極入二寸留十
呼灸三壯在臍下四寸
赤白沃陰中乾痛惡合陰陽小腹膜堅小便閉刺屈骨入一
寸半灸三壯在中極下一寸
月水不通奔泄氣上下引腰脊痛刺氣穴入一寸灸五壯在
四滿下一寸
胞中痛惡血月水不以時休止腹脹腸鳴氣上衝胃刺天樞
入五分灸三壯去盲輸一寸半
少腹脹滿痛引陰中月水至則腰背痛胞中瘕子門寒大小
便不通刺水道入二寸半灸五壯在大巨下三寸

月水不利或暴閉塞腹脹滿瘙淫樂身熱乳難子上搶心若
胞不出衆氣盡亂腹中絞痛不得反息正仰卧屈一膝伸一
膝並氣衝針上入三寸氣至瀉之在歸來下一寸動脉應手
產餘疾食飲不下賁豚上下傷食腹滿刺期門入四分灸五
壯在第二肋端
乳癰驚痺脛重足跗不收踵痛刺下廉入三分灸三壯在上
廉下三寸
月水不利見血而有身則敗乳腫刺臨泣入二分灸三壯在
足小指次指間去俠谿一寸半
女子疝及小腹腫溏泄瘭遺尿陰痛面塵黑目下皆痛漏血
在足大指本節後二寸中動脉
刺太衝入三分灸三壯在
女子疝赤白淫下時多時少暴腹痛刺蠡溝入三分灸三壯
在內踝上五寸

女子無子欬而短氣刺涌泉入三分灸三壯在足心陷者中
乳難子上衝心陰痂刺衝門入七分灸五壯在府舍下上去
大橫五寸
女子不下月水痺驚善悲不樂如墮墜汗不出刺照海入四
分灸二壯在內踝下四分又主女子淋陰挺出四肢淫濼
血不通刺會陰入二寸留七呼灸三壯在大便前小便後
子藏中有惡血內逆滿痛刺石關入一寸灸五壯在陰都下
一寸
肓門主乳餘疾
俠谿主少腹堅痛月水不通
神封　膺窓主乳癰寒熱短氣臥不安
三里主乳癰有熱
乳根主膺腫乳癰悽索寒熱痛不可按

天谿　俠谿主乳腫癰潰　大泉主妒乳膺胷痛
四滿主子藏中有惡血內逆滿痛痂
中極主拘攣腹痂月水不下乳餘疾絶子陰癢
四滿主胞中有血
大赫主女子赤沃
氣衝主無子小腹痛
支溝主女人脊急目赤
陰廉主絶產若未曾產
築賓主大痂絶子
涌泉　陰谷主男子如蠱女子如阻身體腰脊如解不欲食
水原　照海主不字陰暴出淋漏月水不來而多悶心下痛
照海主陰挺下血陰中腫或癢瀝清汁若葵汁
小兒病
本神　前頂　慫會　天柱主小兒驚癇
臨泣主小兒驚癇反視
顱息主小兒癇喘不得息

懸鍾主小兒腹滿不能食飲
癉脉　長強主小兒驚癎癇癡癉多吐泄注鷩恐失精視瞻不
明睒矇
然谷主小兒臍風口不開善驚
譩譆主小兒食晦頭痛
備急千金要方卷第三十

影宋本千金方攷異

按宋槧千金方三十卷目錄一卷原帙卽治
平三年所鏤版施行者每半葉十三行每行
二十三字其版心無題記文字寬裕欄界長
大玄匡貞殷癥恒敦等字皆有缺筆是也其
原版漫滅或全紙補刊或數字塡入者亦往
往有之蓋其款式字樣髣髴相類而版心記
甲丙丁卯庚午字者攷其干支始爲元祐補
刊其版心舉字數者及欄界狹隘文字緊小
者俱玄癥等字不缺筆唯愼字缺筆是乾道
淳熙間所補刊也元祐去治平不遠所以略
相類若乾淳其相距百餘年展轉摸刻則譌

舛亦在所不免也

原本第四卷僅存二葉今覆刻元本以補之

第三卷二十一葉五卷上十四葉六卷下十六葉二十三葉七卷十二葉十卷九葉二十葉二十八葉十七卷三十四葉二十五卷二十一葉二十七卷二十三葉三十葉二十九卷六葉并缺今亦以元本補

凡原本漫滅及空缺處亦皆據元本補塡其佳作隹及作反火作大曰作曰升作外之類譌字顯然可知者據元明諸本悉改之

凡木傍字或从手心傍字或从十禾傍字或从示竹冠艸帽互用及鋳作銃鼠作鼠鼡作

蓂鹽作監逢作蠭作虫之類皆六朝已來俗字今皆依舊不敢私改所以存古也顏眞卿干祿字書序云所謂俗者例皆淺近唯籍帳文案券契藥方非涉雅言用亦無爽據此則醫方相沿多用俗字蓋有所受之不必皆出宋時俗寫也

元明諸本亦皆原不得不據宋本也而其異文換位往往從臆改易讀不若宋本似難讀而竟存古義也其遇空兩義兼存者則謹取諸本校之

眞本皇國所傳李唐遺卷未經宋校者存序竝第一卷末云正和四年和氣嗣成以秘本寫是本甚多異同一匝校今唯摘其要耳

元本不記梓行年月題曰重刊孫眞人備
急千金要方總目後有識語云近得
前宋西蜀
校正二新
行記卽覆
刻元本者
正德辛行
正德
嘉靖本喬世寧刋卽抄于道
藏中九十三卷者
萬曆本乃嘉靖中聲據嘉
靖本校刋者
新校備急千金要方序 乃聖諸本作明
備急千金要方序 自肯萬曆本作肯
卷第一
治病略例第三 煩悶干驚玉函經干驚作驚悸
診候第四 蹈大火眞本蹈作涉元本正德本作陷肺氣盛則
夢恐懼哭泣眞本作肺氣盛則夢哀六字此下有短虫多乃夢聚衆長虫多
乃夢相擊破傷恐懼哭泣飛揚月二字案長蟲多以上原素問文腎氣盛以下是靈樞文
盛眞人先舉素問要據靈樞補其義者宋人從靈樞改訂
眞本恐懼云云六字疑寫手誤入
立已凡此拾伍不足者至而補之立已眞本无此
卅五字
用藥第六 三佐五使眞本作五佐五使
佐與經文合 玉石上部眞本無此四字
眞本無萎蕤此下有五字 牛膝畏車前諸本車作白
黃精反葛蒲反 桔梗畏女萎萎蕤
授節皮爲使醫心方節作奏皮作蜱 蟅蟲畏蟲
作飛蟲元明諸本作螣蟲 或曰自將採取諸本將作解
合和第七眞本此門中文多 例曰諸經方用
藥眞本提別門中 凡湯中用完物乾棗擘子眞本擘作枯擿子

不空入湯酒者蛇膽眞本及醫心方蛇作虵凡丸散云若干分兩者至三五兩藥耳眞本无錢匕者至並用五銖錢也皆眞本无案此等凡湯酒膏藥至片粒調和也皆宋臣據本草序例所加凡云末者謂擣篩如法也眞本无案此句亦宋臣所妄加細末法具于次凡煮湯極令精潔諸本靜作淨案靜古通用凡擣藥法過多爲佳眞本及醫心方此下有和合已就置施佛前藥上洛告十方三寶藥王藥藏者婆菩薩俞附扇鵲一心求請呪願述其本心卽有神助八方生氣充溢四體當以四時王相日造所求皆得攘災滅惡病者要生表針內藥與之令服可消無疵之病如此不活者命也千金之藥內本脫落係宋臣所刪去百一字今

服餌第八

凡服丸散至可通用也眞本不載凡服湯三日眞本別提凡服治風湯眞本補湯眞本別提凡服

別提凡諸惡瘡凡服酒藥眞本此二條無凡服藥忌見眞本不載凡人五十已上大虛者眞本不載

藥藏第九

眞本用藥第六末有藏藥貯擬法與此全同知唐本如此今本抄出用藥門中而剩成第九者蓋亦出于宋臣手一篇

存不忘亾

眞本冠論曰二字

世祿之家眞本別提上冠論曰二字貴畜而賤身誠可羞矣眞本無此九字石藥眞本此下有四十五種字下灰上藥根下皆有幾種字今不悉校鐵臼木臼眞本作杵作碓錘銅匙各一

求民之瘼

眞本作救

字求可貯藥藏眞本作立貯見諸藥未卽用者眞本不提頭

卷第二

求子第一

生熟二藏玉函同嘉靖本萬曆本二藏作五藏外臺引作

矣然五藏

妊娠諸病第四　胎動及數墮胎第一　酒服方寸　諸本寸下有匕字　心腹痛及脹滿第四　合煎食頃　嘉靖本頃作頓　萬曆本頃作食前頓服　外臺引食頃服入心諸本作心義　服

第七一方匕　方下有寸字　諸本小便病第八　蕪菁子　諸本作取　去爪甲　諸本去作夫　小兒尿　諸本作取　服傷寒第五　頭豉　諸本豉作豆　頭下血

十合　諸本七合　諸本作其　熟眞朱　諸本作珠　外臺眞朱諸本作珠　丹沙　外臺引後漢書袁安傳云以珠畫音義云以朱沙畫之也　珠與朱同是與後世作硃

子�old腹中第六　凡與阮河南　諸本及外臺凡作此

逆生第七　如法上　諸本如上法

胞胎不出第八　本作算　夫內衣　外臺引廣濟方作單衣　眞朱　諸本作珠　朱炊薇　嘉靖本薇作籐　萬曆本

下乳第九　揩拭　原誤揩據諸本改　外臺引作研一字　去滓　作飲字宋本補　刻時誤脫耳

卷第三

虛損第一　鹿肉湯　元本作三兩

虛煩第二　淡竹筎湯煮取一升　元本嘉靖本萬曆本作一二升　正德本作三升

中風第三　鹿肉湯　諸本作羊肉　芎藭各一兩　諸本作二兩

湯成擇大蒜　諸本作擇　葛根湯益加　加元本作挂嘉靖本萬曆本作佳　葛根湯桂心各一兩　諸本作薑　葛根神湯　諸本作常

心腹痛第四　內補當歸建中湯大棗十枚　諸本作八枚　大補中當歸湯益加　諸本作當　治產後腹中如弦當堅痛　諸本作當　蒲黃湯

消一兩諸本作二兩
惡露第五 治產後血瘕痛方秤錢諸本作錢鏈外臺引崔氏亦同
淋渴第七 葵根湯冬瓜練七合一作汁外臺引作冬瓜汁
下痢第六 桂蜜湯當歸二兩諸本作三兩
雜治第八 治產勞元本同嘉靖本萬曆本產後下有後字外臺引集驗作產後冷字
卷第四
補益第一 大澤蘭圓令人有子嘉靖本萬曆本子下有方字
月水不通第二 乾薑圓食不生肌嘉靖本萬曆本肌下有方字有方字嘉靖本萬曆本在月後嘉靖本萬曆本後下有方字
人竈突墨參升嘉靖本萬曆本參上恐脫各字或大腸人十分量缺
方若病去止服本同今據萬曆本改
尉所止圓服中所苦翼方作腹
赤白帶下崩中漏下第三 是所下之物物字初疑為衍
德本嘉靖本同雲母莒蒻散一方有龍骨乾
今據萬曆本改
葛嘉靖本萬曆本乾薑本生地黃湯又方桑中蜴屎
諸本同按娠諸病下血第七治胎墮下血不止方桑蜴蟲矢燒灰酒服方寸匕外臺引文同據之蜴即蜴蜥而中蜴二字疑蜴蟲誤倒者爾雅注蜴木蟲也本草拾遺有柘蟲屎
蓋亦此類
月經不調第四 大黃朴消湯空下之嘉靖本萬曆本

之下有方字
挑人散如瘧症狀嘉靖本萬曆本狀下有方字
卷第五上
序例第一 擇乳母法氣軟諸本軟作欬 癡癃外臺引崔氏癃作瘖醫心之論字譯名曰癡方引小品作癡癡案癡是癡之俗字徙也浸淫徙處口廣也故青徐謂癡爲徙癡同私淺反是也慧琳一切經音義又作癡非也自癡字一切經音義又作癡癡其義不通故淺人妄以瘖改癃今得據醫心方而正其謬矣
初生出腹第二 小兒生輒灸治之法諸本脚似掫提頭但諸本皆如此姑錄俟考相兒命短長法諸本別提多夭大翼方無大字是項託諸本作橐按託橐音通論衡篇云項託年七歲教孔子
客忤第四 治少卒客忤方下傻愈諸本傻上有咽字
傷寒第五 治小兒時氣方燒雄鼠屎二枚燒一恐衍燒字治少小有熱不汗程衍道云不當作出按不疑大字譌
卷第五下
欬嗽第六 杏人丸則痢諸本痢作利
癖結脹滿第七 桂心橘皮湯成擇薤外臺引作薤白
小兒雜病第九 治小兒氣癩方當歸二字脫今據諸本補 煎取一升據外臺引小品方當歸下有三兩二字
卷第六上
目病第一 補肝丸肝癆所損癆恐脾誤
鼻病第二 治鼻中息肉又方日再怠諸本怠作三案怠或作慾誤

口病第三　熏衣香又方麞下（諸本此下有篩字）裹衣香方麞下用之（諸本用上有篩字）又方丁香七枚（外臺引作一兩）甘松香各二兩（外臺作甘松香麝香分量缺）麝香一兩　沈香煎香分量缺

卷第六下

齒病第六　治齒斷痛又方馬齒一把（馬齒當是馬齒莧本事方治風齒腫痛馬齒一把搗汁漬之即此方耳）

喉病第七　治喉痺又方熬令濃熱傅之（諸本熱作熟）治牽咽痛又方燒炊箄（諸本箄作算）

耳病第八　治耳聾方微火炙以汗出（諸本汗作汁案此一字似後人補填）治百蟲入耳又方車肛脂（諸本肛作軸醫心方引小品作轂按車釭字从金今作肛者自脂字肉傍轉移者與肛門字自別）

面藥第九　治面黑又方蜜各等分（分量缺據諸本補）

卷第七

論風毒狀第一（諸本痛作瘡）論得之所由風如擊箭（諸本作急箭）論須療緩急或自汗（諸本及外臺作自汗）凡灸八處第四膝眼宛宛中是（諸本是作足）翼方是下有足巨陽穴外踝下即是）氣不止者可用之

論風毒相貌但覺臍下冷痛

諸散第三　單服松脂飴（諸本飴作錫按下祿字古錫鍾聲楚庆反錫為錫釜字兩以為錫當今按無別體）

湯液第二　治腳弱體痺不仁方烏梅十枚（諸本作癌）

十七　防風湯虛風微痊（諸本痊作癒）

十一　治大湯本書有足太陽穴治腰痛穴在外踝下即是）

十論　按止忍

膏第五　太傅白膏目痛灸緲縹白腎如珠諸本作目痛淚出縹白腎如珠

卷第八

論雜風狀第一　甲乙經云溫臥取汗則巨取之甲乙經巨下有鍼字按此注譌脫不可讀據例當在溫臥取汗下而云甲乙經作巨鍼取之肺生氣息元本正德本正作生實有外堅充滿諸本有作者作使人彊上而目脫經文作冥視新校正引作目眩神明白膏丹參亦諸本作膏

諸風第二　帝山太守馬灌酒乾薑各一兩諸本一作鑾三作參酒礬石諸本作礬石心輸穴橫三間此下六字空諸本接下文

賊風第三　治脾虛寒當歸丸言音沈鼓據上文沈下恐脫澀如破三字溫中生薑湯先煎麻黃煎恐煮誤人安改如此者

偏風第四　大理趙卿不能跪起行起下二字空諸本無字上窮一穴諸本此上有針字獨活寄生湯皆猶腎氣虛弱諸本猶古來多通用作由案由以

風癱第五　論曰古人立方不得與療風諸本風作中風口噤云云方瘖瘂不語諸本瘖瘂作喑瘂

風懿第六　治中風口噤云云方瘖瘂不語諸本瘖瘂作喑瘂

卷第九

傷寒例第一　小品曰君子周密諸本作固周哉治不主病諸本病作疾論作對陳廩丘云熱溼之氣諸本

溫作溫　數方與桂枝湯諸本方少論曰當白戒勒
嘉靖本勒改作謹鑿
痕可見萬曆本同
發汗散第四　一味諸本有紫葛其八味
治時病表裏大熱欲厥此方據方後少
麻黃湯甘草各一兩諸本作二兩
發汗湯第五　二作三作
旦湯膠飴半斤恐斤升譌
葛根龍膽湯生薑二兩諸本
宜下第八　生地黃湯大棗二枚諸本及外臺引集驗作二十枚
發汗吐下後第九　麻黃杏人石膏甘草湯諸本作四物甘草湯據倒麻與字初得病但刻火諸本刻作烈白虎湯醫心方古本當引作白獸湯蓋避唐太祖諱也如此今作白虎者係宋臣改正
卷第十
勞復第二　手足拘攣諸本拳作攣
傷寒不發汗變成狐惑病第四　不欲食聞食臭上恐衍食字瀉心湯井輸益腫黃汁出經合外爛外臺引益作絡六合作作
傷寒發黃第五　二升　桂枝加黃耆湯煎取三升據例煎字蛆宜作煮黃耆芍藥桂苦酒湯合煎取小半夏湯半斤金匱作一升半夏半斤疑升譌
診瘀毒證第七　張口欠欬諸本欬下有嗽字按欬疑欬字乃欠欬成語淺人嗽字愈不可解臆補
卷第十一
肝虛實第二　肝膽俱虛病如恍惚諸本及脈經如作若參酒無所聞諸本作不知
筋極第四　人參

堅癥積聚第五　果膿血諸本及經文累作裹蓋是通用太一
神明陷冰丸礬石嘉靖本萬曆作礬消石大丸又
盡一刻有餘一刻諸本有字　土瓜丸水中盡卵
生諸本盡作蟲

卷第十二

膽虛實第二　半夏千里流水湯集驗方麥門
冬桂心各二兩諸本及外臺引集驗二兩作三兩　治煩悶不
得眠方豉粟米各五合外臺引集驗作三合

吐血第六　先聞腥臊臭諸本作臊蓋據經文按說文腥有骨醢
也从肉聲　蝕諸本作慘慘然翼方作奄奄然　黃土湯方見
次前諸本無次字恐於論次論

萬病丸散第七　芫花散習習然爲定此下一字空諸本

卷第十三

心虛實第二　瀉心湯於釜湯中銚之諸本作加銚作煎
心腹痛第六　治暴心痛方內大豆黃末元本正德本且萬曆
本嘉靖本豆作且非

頭面風第八　茯神湯黃耆遠志防風五兩生
薑各三兩諸本在防風下　令髮不生方除日舊訛令髮不生
方改　又方蜂子灰舊訛令髮不生方據醫心改

卷第十四

小腸腑脈論第一

難經甲乙云長二丈二尺

卷第十六

胃腑脈論第一　據經文標緊二字衍甲乙經亦有

肉腘無小果累標緊者胃急

反胃第四　設言未止者言疑吐脈經亦作言

噎塞第六　竹篾薤白爵筋綿蜜　諸本作嚼筋疑係臆改　爵筋朱詳或是鹿筋之譌

卷第十七

肺藏脈論第一　其圠然獨在　諸本無其字圠作杌陰陽反祚祚似作祚語必別有義且諸本作祚今並仍舊精譌然次卷有陰陽翻祚字之譌

瘦急心　諸本瘦作癯經文作清廉

積氣第五　不可閑作　諸本及巢源外臺閑作劇

益服之　諸本盡作劇莊儇悄欲夭　諸本莊作者

諸本及今本難經甲乙經文復作作三丈二尺　尺與經文同時窘之復經後當從

主月卽冷　諸本同注云一本作五

風眩第四　不可以餘方相思雜　諸本思字無徐氏方字下墨圍方本直接下文　諸臺治語狂錯　諸本語上有言字

風癲第五　尸厥參服　諸本作及鬼參服甲粉察之　諸本及鬼作參服甲粉

虎睛丸千金藥名大鎮心丸　甲粉作宝此本誤宝改　並虎睛丸千金藥名大鎮心丸恐有誤諸本藥作翼今玫翼方有大鎮心丸數方與此方異又外臺載千金藥三字恐衍載千金大鎮心丸主癲癇醫所不救方出第十四卷中然與今本異續命風引

湯合煎　煎當作煮　湯合煎十黃散一方有生黃生恐牛訛

肉極第四　肉多肌合　諸本作肉與脾合

卷第十五下

小兒痢第十　黃蘗湯熱痢　諸本作熱劇

肺痿第六　欲者自愈諸本欲下有飲字脈經及外臺引作欲飲水
自張口者短氣也諸本欲下有飲字脈經及外臺引作欲飲水
字譌
肺癰第七　古今錄驗用一枚諸本作兩
飛尸鬼疰第八　諸本尸下有氣字
卷第十八　墨奴丸諸本作散　婦人尸鬼忤
大腸腑脈論第一　經文寸字據經文當疊
啾啾第五　右順時有風寒冷右疑有譌或曰右順當作又非
風欬者不下之下疑有譌外臺引無不字不能臥出者外臺引出作坐寒家欬而上氣其脈數者欠辨脈法寒家作傷寒
數作熏耳面諸本作其白前湯治水欬逆外臺引深

師水作久服豆子七丸諸本豆作荅以點摩飲調下摩恐靡字譌
卷第十九
腎藏脈論第一　腰髀痹并痛諸本髀下有一字注文而無并字按并是一作之壞字此篇作強食而生災經脈
精極第四　治虛損小便白濁夢洩方附子芎藭各二兩諸本作三兩當歸礬石各一兩諸本作二兩外臺引深師作附子三枚以下三味各三兩
腰痛第七　杜仲酒七八合下諸本無下字恐行腎著湯腹重前腎藏脈論及金匱作腰重
補腎第八　腎瀝湯煎取三升據例煎當作煮諸風著

諸本作著　丹三諸本作人參　三湯諸本作參　石斛散
亞消諸本作蘆　五補丸心中喜怒諸本作忘　怒無比
卷第二十
腸胱腑脈論第一　署預丸古今錄驗或冷痺肩疼諸本作骨　肩翟平
世諸本作崔　麋角丸諸本先出麋角則自餘七味各一兩
不妥改
腸胱虛實第二　治腸胱冷欬水一斗一升諸本作一斗二升　腨如刖據經文當作製刖但諸本皆作刖今
胞囊論第三　若腑有寒諸本作中有
三焦虛實第五　循足太陰之分經文無足字甲乙經與本書同　麥門冬理中湯取三升諸本取上有煮字　論曰秘

糟粕靈樞甲乙秘作泌　宏續斷止血方據翼方血下疑脫湯字
霍亂第六　論時雖小諸本作證　以求虛故也外臺引仲景論求作內　服石人嘔逆逾悶諸本作迷　灸慈宮
雜補第七　石硫黃散菟絲子各等分各等分三字原脫今據諸本補之　治陽不起又方日夜一諸本日下有三字
卷第二十一
消渴第一　鉛丹散古今錄驗方云宏傷淡食二十七壯諸本無十字恐衍
淋閉第二　治血淋小便磣痛方分溫三服不之嘉靖本萬曆本通宋本外臺亦作傷作常案傷常益音利諸本不利作溫服按不利二字恐衍　穴斷小行最佳嘉靖本萬曆本行作便　淋病九部諸疾據資生經九字

當作下

水腫第四　按其腹陷太素作脅諸本脅作宵與經文合只甲乙經作陷其腹如鼓要略巢源作如鼓及今本巢源作如故今本要略作如故出水者月灸諸本月上有一字麥門冬飲方米二十五元諸本元作粒按元字攷筆畫恐並字壞

卷第二十二

丁腫第一　六曰爛丁忌沸熱食外臺引無沸字

癰疽第二　枸杞煎如餳去諸本去作止揚腫方右四味咀諸本咀有哎字上可作依

發背第三　治發背及癰腫方可腫作餅子諸本

丹毒第四　有血跡諸本及外臺丹者引血作白

瘭疽第六多作躷病巢源作變作癘病按躷即字與腳同謂浮腫也足腫之症故从足太行踦申膝折尾作躷耳戰國策服鹽車而上腳字也此借膚字以爲腳字用癘亦足腫字與瘭同治瘭疽秘方外臺無黃芩云翼深師加黃芩外臺翼下有同字治腳腨及曲脉中據例宜別提此條諸本皆錯簡是本獨不誤

卷第二十三

九漏第一　七曰浮沮漏巢源沮作疽三因作蛆治蚯蚓

瘻方社豬下頷髓正德木社作杜衍義作牡案社恐牡譌治顛

當瘻方顛當卽蟷蠷瘻見巢源當螳

腸癰第二　大黃牡丹湯其脈遲堅者據金匱當作

緊治腸癰湯又方姚氏不用挑人用李人本諸李人作杏人作疑是便服此藥諸本疑作但論曰產後宜勤濟乳外臺引集驗濟作擠按此斷癰狀也諸本作脈狀便可手助迮將之外臺引集驗迮將作擠將飛烏今字說文頒當作頒陶隱居云燒時著釜上所化爲水銀丹沙名汞粉俗呼水銀灰按頒汞古也水銀上黑煙也按黑字不通疑熏譌一作湘粉諸本湘作緗外臺引集驗作細礬石各二兩諸本作三兩黃連胡粉散方奠皮果熟搜之諸本果作裹搜作挼蔌蔾丸通草各三分三字缺據元本嘉靖本補萬曆本作二分五痔第三槐皮膏棟實外臺作廮豉今本外臺作陳豉凡有瘡疥方續斷各一分諸本分作

疥癬第四治

兩千金翼云所長癰疽諸本及翼方長作是治寒熱瘡及風疥諸本此下有雜瘡方西字諸本有洗淨二字注文治久疥癬方亂髮諸本治細癬又方以酒三升諸本三作五灸癬法三姓灸之按姓恐灶譌

卷第二十四

解五石毒第三

胡臭漏腋第五

脫肛第六兌通方中疑巾字之訛下按到倒古通用

陰癩第八當路門冷溼萬曆本作當露臥冷溼按當路則露字壞訛者門亦臥字萬曆本有當字贅

卷第二十五
卒疚第一　治飲酒房勞虛受熱方四月中熱外臺引作四體中虛熱斷酒又方驢駒衣外臺引同程衍道云疑是驢胞衣
火瘡第四　愼以冷水洗之諸本愼下有勿字　治金瘡瘡生肉止血出突厥國色白如灰乃云石灰共諸藥合成之聖惠方黃耒作黃丹
大散方突厥質汗黃耒厥下疑脫白字本草云突厥白味苦主金
卷第二十六
果實第二　大棗少氣津液翼方津上亦有少字　杏核人翼方無桃核人卒暴聲血諸本聲作擊
菜蔬第三　胡瓜多瘧病據醫心方多當作發證類本草引嘉祐本作多
穀米第四　青小豆令人肝至元本作肝黃嘉靖本萬曆本作眼黃　粳米長肌肉溫諸本溫下有中字
鳥獸第五　沙牛唉嚨主小兒哬按哬字方書未經見恐哬鴿令人發強諸本強作狂
卷第二十七
道林養性第二
服食法第六　五穀俱然諸本俱作居　去三蟲又方
身老澤諸本澤作光　老採松脂法入北山諸本北作此　餌雲母水方從旦至中諸本至下有日字
卷第二十八
分別病形狀第五　實緊胃中有寒一作時時嘔稽難治萬曆本稽作利非也據脈經稽下脫留字

三關主對法第六 寸口脈微而弱微卽惡寒與極汗出脈經作而經與
卷第二十九
灸例第六 人神之所法氣口玉函法作注口作血可從
太醫針灸宜忌第七 外臺云癸卯日大人會今本外臺作人臣會
卷第三十
孔穴主對法 針灸而藥按而當元本此下有解鄰作不
頭面第一 崑崙絲竹空元本此下有瘈脈
心腹第二 衡門甲乙作衝門營衝四穴秘澀門衝作衝門大敦主陰跷遺據甲乙脫溺字大敦氣門氣當作冀大衝主溏泄痢泄下血諸本及甲乙泄作注肩輸據甲乙肩下脫中字

下文同 天容甲乙云胷中虛中下空白諸本及今本甲乙有憤字虛作安都恐有誤 庫房多士澤沫諸本及甲乙作多唾濁沫天樞甲乙云氣疝煩嘔諸本及甲乙煩作臌
四肢第三 肩貞主手臑小不舉甲乙外臺作手臂不舉丘墟主腕不收甲乙腕上有足字
熱病第五 丘墟附筋足攣附疑轉譌
婦人病第八 疝瘕按之堅急重下溼外臺無溼字月水不通奔泄氣據甲乙奔下脫狍字水原據甲乙原當作泉

影宋本千金方攷異

總閱

侍醫尚藥醫學教諭法印　多紀元堅

西城侍醫醫學教諭兼督務法眼　多紀元昕

內直醫官醫學教諭法眼　小島尚質

校勘

外班直房醫官　奈須信德

外班直房醫官醫學助教　森當璧

福山醫員　伊澤信重

來里醫員　堀川濟

醫生　森立之

千金方序

校定備急千金要方後序

臣嘗讀唐令見其制爲醫者皆習張仲景傷寒陳延之小品以類推之則小品亦仲景之比也常痛其遺逸無餘及觀陶隱居百一方王道外臺秘要多顯方之所由來乃得反覆二書究尋於千金方中則仲景之法十居其三三小品十居其五六粹乎哉孫真人之爲書也既備有漢志四種之事又兼載唐令二家之學其術精而博其道深而通以今知古由後視今信其百世可行之法也臣今所咏嘆不能已已者乃其書法也至於其爲人行事則盧照隣嘗云道洽古今學殫術數高談正一則古之蒙莊子深入不二則今之維摩詰則其爲人賢否不待今之稱述而可知已世俗妄人方區區稱海上龍官之事以附致爲奇何所發明於孫眞人哉

治平三年正月二十五日

進呈訖至四月二十六日奉

聖旨鏤板施行

朝奉郎守太子右贊善大夫同校正醫書騎都尉賜緋魚袋臣高保衡

朝奉郎守尚書都官員外郎同校正醫書騎都尉臣孫奇

朝奉郎守尚書司封郎中充祕閣校理判登聞檢院護軍賜緋魚袋臣林億

龍圖閣直學士朝散大夫尚書工部侍郎兼侍講充審刑院事兼判少府監提舉醴泉觀兼提舉校正醫書

上柱國彭城郡開國公食邑三千一百戶食實封三百戶賜紫金魚袋臣錢 象先

推忠協謀同德佐理功臣光祿大夫行尚書吏部侍郎參知政事上柱國天水

郡開國公食邑三千五百戶食實封捌伯戶臣趙 槩

推忠協謀同德佐理功臣光祿大夫行尚書吏部侍郎參知政事上柱國樂安

郡開國公食邑三千八百戶食實封捌伯戶臣歐陽 脩

推忠協謀同德守正佐理功臣開府儀同三司行尚書僕射兼門下侍郎同中書門下章事監修國

史兼譯經潤文使上柱國魏國公食邑五千七百戶食實封肆阡貳伯戶臣韓 琦

金澤文庫

嘉永癸丑江戸醫學
加賀藩本草蒐開彫